

**2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)
考前压轴密卷**

护理学

模拟试卷(二)

金英杰国家医学考试研究中心 编



答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷(二)

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 肝门静脉压力增高时,下列病理变化中最早出现的是
 - 腹水
 - 充血性脾大
 - 上消化道出血
 - 食管胃底静脉曲张
 - 腹壁静脉怒张
- 属于手术室限制区的是
 - 走廊
 - 更衣室
 - 手术间及刷手间
 - 休息室
 - 敷料准备间
- 肛裂好发生于膝胸位时的
 - 12 点处
 - 8 点处
 - 10 点处
 - 4 点处
 - 3 点和 6 点处
- 在普查和诊断肺癌时,下列检查占重要地位的是
 - 肺功能检查
 - 胸部 X 线摄片检查
 - 痰细胞学检查
 - 纤维支气管镜检查
 - 胸腔积液检查
- 胎盘早剥的病因除外
 - 妊娠高血压综合征
 - 外伤
 - 肾炎
 - 母体有血管病变
 - 胎膜早破
- 肿瘤转移途径最常见的是
 - 直接蔓延
 - 跳跃性转移
 - 血行转移
 - 种植性转移
 - 淋巴道转移
- 股骨下 1/3 骨折,易造成
 - 股动脉损伤
 - 腓动脉损伤
 - 皮神经损伤
 - 肱静脉损伤
 - 坐骨神经损伤
- 阴道毛滴虫最适合的生长环境 pH 为
 - 2~3.5
 - 3.6~4.2
 - 4.3~5.2
 - 5.5~6
 - 6.3~6.8
- 导致产后出血原因中最常见的是
 - 胎盘残留
 - 胎盘嵌顿
 - 软产道损伤
 - 血友病
 - 子宫收缩乏力
- 外科最常见的脱水类型是
 - 原发性脱水
 - 慢性脱水
 - 高渗性脱水

- D.低渗性脱水
E.等渗性脱水
- 11.胃癌的转移途径中主要是
- A.直接浸润
B.淋巴转移
C.血行转移
D.腹腔种植
E.肝肾转移
- 12.可以反映心脏后负荷的指标是
- A.血压
B.脉搏
C.中心静脉压
D.肺动脉楔压
E.周围血管阻力
- 13.阻塞性肺气肿的病理分型按累及肺小叶的部位,可分为
- A.小叶中央型、气肿型、混合型
B.小叶中央型、气肿型、全小叶型
C.小叶中央型、全小叶型、混合型
D.气肿型、全小叶型、混合型
E.全小叶型、气肿型、支气管炎型
- 14.病毒性脑炎最常见的病原体是
- A.肠道病毒
B.科萨奇病毒
C.EB病毒
D.腺病毒
E.疱疹病毒
- 15.临床最主要导致新生儿颅内出血的原因是
- A.窒息、产伤
B.脑血管先天畸形
C.脑膜炎
D.血友病
E.输注高渗液体
- 16.以下疾病可表现为前囟早闭或过小的是
- A.佝偻病
B.小头畸形
C.呆小病
D.早熟
E.脑肿瘤
- 17.乳牙出齐的年龄一般在
- A.10~12个月
B.12~18个月
C.20~24个月
D.2~2.5岁
E.3~3.5岁
- 18.最严重的肾损伤类型是
- A.肾挫伤
B.肾盂部分裂伤
C.肾实质部分裂伤
D.肾横断
E.肾蒂损伤
- 19.微循环的灌注状态取决于
- A.心功能、血容量、血压
B.心功能、周围血管张力、脉压
C.血容量、血压、周围血管张力
D.心功能、血容量、周围血管张力
E.血容量、脉压、周围血管张力
- 20.每人每天需要氨基酸的量是
- A.0.6~1.0 g/(kg·d)
B.1.0~1.5 g/(kg·d)
C.1.3~1.8 g/(kg·d)
D.2.0~2.5 g/(kg·d)
E.2.6~3.0 g/(kg·d)
- 21.确诊恶性肿瘤最可靠的方法是
- A.血清酶学检查
B.CT
C.MRI
D.病理检查
E.X线造影
- 22.确诊菌血症的可靠证据是
- A.表现脉搏、呼吸快,体温高
B.神志淡漠、嗜睡
C.出现黄疸、皮下淤血
D.肝、脾大
E.血细菌培养阳性
- 23.成年人体液量约占体重的

- A.35%
B.45%
C.50%
D.60%
E.65%
- 24.丹毒指的是
A.急性管状淋巴管炎
B.急性网状淋巴管炎
C.疖病
D.淋巴结炎
E.痈
- 25.肠套叠病人特征性 X 线表现为
A.杯口状阴影
B.鸟嘴状阴影
C.立位 X 线片见多个气-液平面
D.鱼肋骨刺征
E.充盈缺损
- 26.正常 5 个月小儿的体重是出生体重的
A.1.5 倍
B.2 倍
C.3 倍
D.3.5 倍
E.5 倍
- 27.输卵管通液检查的禁忌情况是
A.月经干净 5 天
B.术前体温 36.8 °C
C.阴道炎治疗中
D.婚后 2 年不孕
E.脂肪瘤
- 28.暴发性脑膜炎的病原体是
A.大肠埃希菌
B.肺炎链球菌
C.金黄色葡萄球菌
D.流感嗜血杆菌
E.脑膜炎双球菌
- 29.急性心肌梗死临床上特征性的心电图改变是
A.ST 段弓背向上抬高
B.ST 段弓背向下
C.高大的 R 波
D.ST 段水平下移
E.T 波倒置
- 30.与慢性胃炎发病有关的细菌为
A.大肠埃希菌
B.沙门球菌
C.空肠弯曲菌
D.幽门螺杆菌
E.嗜盐杆菌
- 31.胃壁细胞的功能是分泌
A.盐酸
B.胃蛋白酶
C.血清促胃液素
D.胃泌素
E.雌激素
- 32.出生时存在但 3~4 个月后消失的反射是
A.拥抱反射
B.喉反射
C.腹壁反射
D.角膜反射
E.吞咽反射
- 33.引起新生儿颅内出血的病因除外
A.产伤
B.臀位产
C.滴注高渗性溶液
D.新生儿窒息
E.妊娠早期母患风疹
- 34.易导致枕骨大孔疝的是
A.小脑蚓部
B.小脑扁桃体
C.大脑颞叶
D.下丘脑
E.小脑绒球小结叶
- 35.导致前列腺增生的主要原因是
A.慢性咳嗽
B.雌激素和雄激素水平失调
C.膀胱结石

- D.老龄化
E.雄激素增多
- 36.下列最常引起心搏、呼吸骤停的是
- A.感染
B.冠心病
C.颅内高压
D.麻醉
E.溺水
- 37.妊娠期母体心脏负荷最重的时间是妊娠
- A.24~28周
B.30~32周
C.32~34周
D.34~36周
E.36~40周
- 38.习惯性流产定义为
- A.连续2次流产
B.连续2次自然流产
C.连续3次流产
D.连续3次自然流产
E.连续3次人工流产
- 39.CO中毒时最先受损的器官是
- A.肝
B.肺部
C.胃肠道
D.肾
E.心、脑
- 40.导致心肌炎最主要的病原体是
- A.病毒
B.细菌
C.药物中毒
D.螺旋体
E.寄生虫
- 41.法洛四联症患儿,2岁,喜蹲踞,其原理是
- A.保证重要器官供血
B.缓解腹部不适
C.腔静脉回心血量增加
D.休息,缓解疲劳
E.增加体循环阻力,减少右向左分流血量
- 42.肝硬化腹水的性质是
- A.渗出液
B.漏出液
C.乳糜液
D.黏液性
E.血性液
- 43.我国产妇死亡第一位的原因是
- A.妊娠合并心脏病
B.产后出血
C.羊水栓塞
D.产褥感染
E.妊娠期高血压疾病
- 44.细菌引发细菌性肝脓肿的最主要入侵途径是
- A.胆道系统
B.肝动脉
C.门静脉系统
D.淋巴系统
E.直接入侵
- 45.发生急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是
- A.肿大胆囊压迫胆总管
B.胆总管狭窄
C.胆总管结石
D.胆总管肿瘤合并梗阻
E.肝脓肿并发出血,阻塞胆管
- 46.引起颅内压增高的主要原因
- A.颅内、外感染
B.颅内占位性病变
C.颅外占位性病变
D.脑缺血缺氧
E.脑脊液循环异常
- 47.胸膜腔内的压力为负压,其生理意义正确的是
- A.组成肺的弹性回缩力
B.使肺维持扩张状态
C.降低肺泡表面张力

- D.维持肺泡稳定性
E.不能促进淋巴液的回流
- 48.典型的苯丙酮尿症是因肝脏缺乏
- A.苯丙氨酸羟化酶
B.酪氨酸羟化酶
C.谷氨酸羟化酶
D.二氢生物蝶呤合成酶
E.羟苯丙酮酸氧化酶
- 49.慢性阻塞性肺气肿患者不会出现的体征是
- A.胸廓呈桶状
B.呼吸运动减弱
C.两肺语颤增强
D.双肺叩诊过清音
E.两肺肺泡呼吸音减弱
- 50.引起新生儿窒息的因素不包括
- A.母亲患糖尿病
B.急产
C.脐带绕颈
D.早产儿
E.胎粪吸入
- 51.引起早产儿发生新生儿颅内出血的主要原因是
- A.缺氧
B.产伤
C.过快输入高渗液体
D.机械通气不当
E.脑血管畸形
- 52.慢性呼吸系统疾病发生急性呼吸衰竭最常见的诱因是
- A.呼吸道感染
B.吸烟
C.剧烈活动
D.电解质紊乱
E.营养不良
- 53.符合产后循环系统变化特征的是
- A.循环血容量于产后3天恢复至未孕状态
B.血小板数量减少
C.红细胞计数和血红蛋白值变化不大
D.白细胞于产褥早期较高
E.血液处于低凝状态,易出血
- 54.阑尾炎直接蔓延可引起急性盆腔炎,其主要病原体是
- A.淋病奈瑟菌
B.支原体
C.链球菌
D.结核杆菌
E.大肠埃希菌
- 55.子宫脱垂的主要病因是
- A.营养不良
B.盆底组织先天发育不良
C.长期站立工作
D.便秘或长期咳嗽等致腹压增力
E.分娩损伤
- 56.子宫颈癌普查常用的检查方法是
- A.阴道镜检查
B.宫颈脱落细胞学检查
C.宫颈活组织检查
D.诊断性刮宫
E.女性激素测定
- 57.判断心肌梗死最具敏感性和特异性的生化指标是
- A.肌钙蛋白
B.酸激酶
C.肌酸激酶同工酶
D.C反应蛋白
E.中性粒细胞
- 58.非特异性感染病理改变不包括
- A.炎症介质、细胞因子释放
B.血管通透性增加
C.血浆成分渗出
D.干酪样坏死
E.转为慢性炎症
- 59.不属于闭合性单根单处肋骨骨折治疗原则的是
- A.手术治疗
B.对症止痛

- C.固定胸廓
 D.防止并发症
 E.鼓励患者咳嗽咳痰
- 60.急性心肌梗死最基本的病因是
 A.体力活动
 B.情绪激动
 C.血压剧升
 D.冠状动脉张力增高
 E.冠状动脉粥样硬化
- 61.慢性浅表性胃炎的最主要病因是
 A.幽门螺杆菌感染
 B.自身免疫
 C.饮食和环境因素
 D.十二指肠液反流
 E.长期食用刺激性食物和药物
- 62.符合铁代谢特征的是
 A.缺铁时正常肠黏膜对铁吸收减少
 B.铁主要在回肠吸收
 C.在肠黏膜内能合成铁蛋白
 D.人体所需铁完全依靠从食物中摄取
 E.血清铁一般是亚铁离子
- 63.急性白血病出血的主要原因是
 A.弥散性血管内凝血
 B.血小板数量减少
 C.血小板功能异常
 D.凝血因子减少
 E.血管损伤
- 64.不符合糖尿病临床特征的是
 A.糖尿病是一组常见的内分泌代谢疾病
 B.糖尿病是由多种原因导致的,绝对或相对胰岛素分泌不足或作用的缺陷而引起的代谢紊乱
 C.糖尿病特征为高血糖、糖尿、葡萄糖耐量降低及胰岛素释放试验异常
 D.糖尿病可引起糖、蛋白质、脂肪、水及电解质等代谢紊乱
 E.糖尿病是一种遗传病
- 65.与宫缩乏力导致的产后出血无关的因素是
 A.巨大儿
 B.双胞胎妊娠
 C.胎膜早破
 D.羊水过多
 E.产程延长
- 66.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性
 A.不变
 B.升至正常人的70%以上
 C.降至正常人的70%以下
 D.升至正常人的90%以上
 E.降至正常人的90%以下
- 67.微生态失衡会引起
 A.自身和交叉感染
 B.菌群失调和移位
 C.定植抵抗力提高
 D.内源性和外源性感染
 E.非特异性免疫功能增强
- 68.不符合内脏性疼痛临床特点的是
 A.疼痛过程缓慢、持续
 B.痛感弥散,定位不准确
 C.痛觉迟钝,对刺、割、灼等刺激不敏感
 D.感觉敏锐,定位准确
 E.对较强的张力及缺血、炎症等刺激较敏感
- 69.下肢深静脉血栓形成的原因之一是
 A.吸烟
 B.静脉腔狭窄
 C.静脉内膜损伤
 D.长久站立
 E.大隐静脉曲张
- 70.良性前列腺增生好发于
 A.外周区
 B.移行区
 C.中央区
 D.纤维区
 E.基质区
- 71.骨折早期并发症不包括

- A. 血管损伤
B. 内脏损伤
C. 脂肪栓塞
D. 畸形愈合
E. 神经损伤
72. 正常成人颅内压的范围是
A. 20~30 mmH₂O
B. 50~100 mmH₂O
C. 70~200 mmH₂O
D. 80~200 mmH₂O
E. 100~220 mmH₂O
73. 供移植器官的保存原则是
A. 常温保存
B. 低温原则
C. 延长热缺血时间
D. 变冷缺血为热缺血
E. 中断血流后不应立即降温
74. 新生儿低血糖的病因中属于葡萄糖消耗增加的是
A. 早产儿
B. Rh 溶血病患儿
C. 小于胎龄儿
D. 败血症患儿
E. 先天性心脏病患儿
75. 猩红热的主要传染源是
A. 患者及带菌者
B. 恢复期患者
C. 链球菌携带者
D. 家畜
E. 蚊蝇
76. 中毒性痢疾多见于
A. 新生儿
B. 婴幼儿
C. 儿童
D. 青年
E. 成人
77. 卵子排出后如未受精, 黄体开始萎缩的时间是
A. 排卵后第 24 小时
B. 排卵后第 7 日
C. 排卵后 9~10 日
D. 排卵后 14 日
E. 下次月经来潮前
78. 符合产后泌乳特征的是
A. 雌激素是产后泌乳的基础
B. 产后雄激素水平急剧下降, 解除了对垂体催乳素的抑制作用
C. 雌磁素有抑制垂体催乳素对乳腺的发育作用
D. 乳汁的分泌很大程度上取决于哺乳时的吸吮刺激
E. 吸吮动作可以反射性地引起腺垂体释放缩宫素, 促进乳汁排出
79. 软产道裂伤多见于
A. 阴道手术操作不当
B. 胎盘植入
C. 凝血功能障碍
D. 软产道充分扩张
E. 产程延长
80. 青春期功能失调性子宫出血的主要发病机制是
A. 黄体功能不足
B. 缺乏雌激素的负反馈作用
C. 孕激素分泌不足, 导致子宫内膜分泌反应不良
D. 垂体分泌 FSH 相对不足, 无 LH 高峰, 卵巢不能排卵
E. 子宫内膜含有过多前列腺素
81. 患者, 女性, 37 岁。孕 1 产 0, 孕 14 周出现口渴多饮症状, 孕 24 周糖筛查血糖值为 10.5 mmol/L, 下一步检查为
A. 尿糖检测
B. 空腹血糖
C. OGTT
D. 尿酮体
E. 羊水穿刺

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(82~84 题共用备选答案)

- A. 第一心音
- B. 第二心音
- C. 第三心音
- D. 第四心音
- E. 杂音

82. 主动脉瓣肺动脉关闭时产生的振动音为

83. 二尖瓣和三尖瓣关闭时振动产生的为

84. 心室舒张早期血流自心房急流入心室使心室振动产生的为

(85~86 题共用备选答案)

- A. 病史
- B. 临床表现
- C. 脑脊液病原学检查
- D. 脑电图检查
- E. 头部 CT

85. 确诊化脓性脑膜炎的主要依据是

86. 确诊脑积水的主要依据是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 正常
- B. 延长
- C. 减少
- D. 正常或增多
- E. 正常或减少

87. 特发性血小板减少性紫癜巨核细胞数目

88. 特发性血小板减少性紫癜白细胞数目

(89~90 题共用备选答案)

- A. 尿培养
- B. 痰培养
- C. 血培养
- D. 粪便培养
- E. 骨髓培养

89. 临床诊断败血症的重要方法是

90. 临床诊断白血病的重要依据是

(91~94 题共用备选答案)

- A. 大片炎症浸润影或实变影
- B. 肺蜂窝状肺脓肿
- C. 肺部多种形态浸润影,见于肺下野为
- D. 双肺弥漫性结节性浸润
- E. 肺下叶斑片状浸润

91. 军团菌肺炎 X 线所见是

92. 肺炎支原体肺炎 X 线所见是

93. 肺炎克雷伯杆菌肺炎 X 线所见是

94. 肺炎链球菌肺炎 X 线所见是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 幼儿急疹
- B. 风疹
- C. 麻疹
- D. 水痘
- E. 猩红

95. 由带状疱疹病毒引起的疾病是

96. 发热 3~4 天出现斑丘疹,疹间皮肤正常,出疹后热度增高见于

(97~98 题共用备选答案)

- A. 高血压
- B. 低血压
- C. 呼吸道梗阻
- D. 头痛
- E. 全脊髓麻醉

97. 全麻时麻醉过深可能引起

98. 硬膜外麻醉最危险的并发症是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 易复性疝
- B. 滑动性疝
- C. 难复性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝

99. 疝内容物很容易纳入腹腔多见于

100. 疝内容物不能或不能完全回纳入腹腔内多见于

相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 医院感染漏报调查年监测患者数及漏报率分别为

- A. 不少于 5%, 漏报率应低于 10%
- B. 不少于 10%, 漏报率应低于 10%
- C. 不少于 10%, 漏报率应低于 15%
- D. 不少于 10%, 漏报率应低于 20%
- E. 不少于 10%, 漏报率应低于 30%

2. 糖尿病病人学习皮下注射方法时, 常采用

- A. 无意模仿
- B. 有意模仿
- C. 强迫模仿
- D. 主动交往
- E. 被动交往

3. 计划工作中, 评估形势的主要内容

包括

A. 社会关系、社会经济、社会竞争、服务对象的需求

B. 社会需求、社会竞争、组织资源、社会

经济的需求

C. 社会竞争、社会关系、社会需求、服务对象的需求

D. 社会需求、社会竞争、组织资源、服务对象的需求

E. 社会需求、社会关系、社会竞争、组织资源的需求

4. 下列是协调活动的重要手段和依据准则的为

- A. 规章制度
- B. 行政法规
- C. 基本法
- D. 刑法
- E. 民法

5. 拉斯韦尔模式的正确表述是

A. 传者 → 信息 → 传播途径 → 受者 → 效果

B. 传者 → 传播途径 → 信息 → 效果 → 受者

C. 信息 → 传者 → 传播途径 → 受者 → 效果

D. 信息 → 传者 → 传播途径 → 效果 → 受者

E. 传者 → 信息 → 传播途径 → 效果 → 受者

6. 授权的步骤不包括

A. 选择授权对象

B. 明确授权内容

C. 形成沟通渠道

D. 实施授权计划

E. 排除被授权者的工作障碍

7. 医患关系要做到真诚相处, 最主要的是

A. 关系和谐

B. 尽职尽责

C. 平等相待

D. 互相尊重

E. 互相信任

8. 属于多线型组织结构的为

A. 直线型

B. 直线-参谋型

C. 职能型

D. 主导型

E. 综合型

9. 脓性指头炎若需要切开引流, 应采用

A. 鱼口状切开

B. 手指侧面纵切开

C. 手指掌面纵切开

D. 在波动明显处横行切开

- E.从原伤口处放射状切开
- 10.空气消毒不宜使用
- A.紫外线照射
- B.臭氧消毒
- C.甲醛熏蒸
- D.醋酸熏蒸
- E.过氧化氢喷雾消毒
- 11.肠道隔离使用的标志是
- A.黄色标志
- B.蓝色标志
- C.橙色标志
- D.红色标志
- E.棕色标志
- 12.健康教育的核心为
- A.促进人们自身护理能力和行为
- B.促进人们住院适应能力
- C.促进人们自我保健能力和行为
- D.促进人们的健康行为和生活方式
- E.帮助人们建立健康行为
- 13.领导效能的内容不包括
- A.时间效能
- B.用人效能
- C.决策办事效能
- D.组织整体贡献效能
- E.结构效能
- 14.三度原位菌群失调的主要原因为
- A.免疫功能降低
- B.大量应用广谱抗菌药物
- C.慢性病诱发
- D.插管或介入治疗
- E.细菌结构变化
- 15.护理部发现问题及时纠正,遵循的管理原则是
- A.整分合原则
- B.能级原则
- C.激励原则
- D.随机制宜原则
- E.反馈原则
- 16.从健康计划实施时开始,并贯穿于计划执行全过程的评价活动是指
- A.形成评价
- B.总结评价
- C.过程评价
- D.效应评价
- E.结局评价
- 17.不适宜血液病病区采用的空气净化方法是
- A.紫外线灯照射消毒
- B.化学消毒
- C.自然通风
- D.空气消毒器
- E.集中空调通风系统
- 18.不需要洗手的情况是
- A.护理两名病人之间
- B.穿隔离衣前
- C.给病人输液后,准备导尿管
- D.给病人伤口换药后
- E.与病人交谈后
- 19.吸毒行为应属于
- A.日常危害健康行为
- B.致病性行为模式
- C.不良疾病行为
- D.违规行为
- E.不良嗜好行为
- 20.不需进行消化道隔离的疾病是
- A.麻疹
- B.甲型肝炎
- C.脊髓灰质炎
- D.霍乱
- E.细菌性痢疾
- 21.以下可能导致偏倚的因素,哪项属于测量对象因素
- A.霍桑效应
- B.暗示效应
- C.评定错误
- D.干预组和对照组选择不均衡
- E.测量者成熟性
- 22.开放性肺结核应采取

- A. 保护性隔离
B. 血液隔离
C. 呼吸道隔离
D. 消化道隔离
E. 抗酸杆菌隔离
23. 直线参谋型组织结构的优点是
A. 组织适应性好
B. 组织反应灵敏
C. 满足统一指挥和严格责任制要求
D. 直线领导和职能部门职权明确
E. 联系便捷, 管理成本低
24. 抗感染药物的作用机制不包括
A. 抑制细菌核酸的合成
B. 影响细菌细胞壁的合成
C. 细菌缺乏药物的靶位点
D. 干扰细菌蛋白质的合成
E. 损伤细菌的细胞膜
25. 不属于责任心差引起的护患冲突表现在
A. 在班不在岗
B. 在岗不尽责
C. 医嘱执行不严格
D. 查对不认真
E. 知识有限
26. 手术前预防性应用抗生素方法错误的是
A. 术前 0.5~1 小时通过静脉给予一次足量抗生素
B. 需有明确指征
C. 总的预防用药时间不超过 24 小时
D. 择期的结直肠手术前, 还需通过导泻或灌肠进行肠道准备
E. 污染手术使用万古霉素作为预防药物
27. 通风的目的与哪项无关
A. 调节室内温湿度
B. 降低微生物密度
C. 避免噪音的刺激
D. 使患者心情舒畅
E. 增加室内空气中含氧量
28. 炭疽患者用过的治疗性废物和有机垃圾应
A. 熟石灰浸泡消毒
B. 丢弃
C. 焚烧
D. 过氧乙酸喷洒
E. 深埋
29. 医院的 I 类环境的空气消毒适用于
A. 层流洁净手术室和层流洁净病房
B. 产房、婴儿室、早产儿室
C. 供应室无菌室
D. 注射室、治疗室、换药室
E. 急诊室、化验室及各类普通病房
30. 美国管理学家莱金提出的 ABC 时间管理方法中, C 级目标指
A. 必须完成的目标
B. 最重要的目标
C. 较重要的目标
D. 很想完成的目标
E. 不太重要的目标
31. 门诊教育往往侧重于以下哪项的防治教育
A. 危重疾病的教育
B. 慢性病的教育
C. 常见疾病的教育
D. 发病机制的教育
E. 传染性疾病的教育
32. 组织或个人为了完成某一目标而制订具体行动方案称为
A. 程序化决策
B. 非程序化决策
C. 目标决策
D. 战略决策
E. 战术决策
33. “鱼和熊掌不可兼得”属于
A. 双趋式冲突
B. 双避式冲突
C. 趋避式冲突

- D.双趋双避式冲突
 E.多重趋避式冲突
- 34.用图形表示组织的整体结构、职权关系及主要职能,称为
- A.程序
 B.结构图
 C.规划图
 D.政策
 E.组织图
- 35.“动态”原理中管理工作动态特性是指
- A.稳定状态是相对的,运动状态是绝对的
 B.稳定状态是绝对的,运动状态也是绝对的
 C.稳定状态是绝对的,运动状态是相对的
 D.稳定状态是相对的,运动状态也是相对的
 E.稳定和运动状态的变化互不干扰
- 36.有效训导的方法错误的是
- A.用平等客观的态度对待下属
 B.对于反复发生的错误,逐步加重处罚
 C.批评对事不对人
 D.以行动强化语言
 E.提出防范错误的建议
- 37.关于抗菌药物的作用机制,错误的叙述是
- A.干扰细胞壁的合成
 B.抑制细菌芽孢生成
 C.抑制细菌核酸合成
 D.影响细菌蛋白质的合成
 E.损伤细胞膜
- 38.常规器械消毒灭菌合格率的评价属于
- A.基础质量评价
 B.服务质量评价
 C.环节质量评价
 D.综合评价
 E.终末质量评价
- 39.梅毒的病原体是
- A.奈瑟菌
 B.钩端螺旋体
 C.苍白螺旋体
 D.汉坦病毒
 E.人类乳头瘤病毒
- 40.四象限时间管理法的两个维度是指事情的
- A.战略性和战术性
 B.集体性和个人性
 C.时间性和紧迫性
 D.权威性和重要性
 E.重要性和紧迫性
- 41.不属于行政管理方法优点的是
- A.市管理系统达到高度统一
 B.利于对常规问题处理
 C.受决策者水平的限制
 D.保证整个系统计划、目标的实现
 E.灵活有效的解决各种例外问题
- 42.护理管理是现代医院管理的重要组成部分,其管理内容不包括
- A.角色管理
 B.组织管理
 C.人员管理
 D.业务管理
 E.质量管理
- 43.“霍桑实验”发现决定工作效率最重要的因素是
- A.人际关系
 B.严格的纪律
 C.统一的指挥
 D.科学的领导
 E.自我控制
- 44.不属于时间管理策略的是
- A.标准化消耗时间
 B.将一般事件安排在不干扰时间
 C.保持时间连续性
 D.充分利用最佳工作时间

- E.选择好的助手
- 45.经常出现的活动的决策是
- A.程序化决策
- B.非程序化决策
- C.战术决策
- D.不确定性决策
- E.确定性决策
- 46.护理组织文化建设不正确的是
- A.易接受性
- B.群众关注
- C.针对性
- D.独特性
- E.交流性
- 47.护理组织文化的核心是
- A.护理群体文化
- B.护理哲理
- C.社会文化
- D.护理价值观
- E.护理专业
- 48.不属于医院院外培训方法的是
- A.全脱产学习
- B.业余培训
- C.电视大学
- D.科室轮转
- E.自学高考
- 49.属于沟通过程中的一个步骤但却包括了信息沟通过程的几个环节的是
- A.信息源
- B.编码
- C.传递信息
- D.解码
- E.反馈
- 50.制定护理质量标准的原则不包括
- A.可衡量性原则
- B.科学性和先进性原则
- C.实用性原则
- D.严肃性和相对稳定性原则
- E.经济原则
- 51.“降低平均住院天数”属于评估指标分类中的
- A.年度评估指标
- B.质量评估指标
- C.差异度评估指标
- D.临床成果评估指标
- E.患者满意度评估指标
- 52.小组讨论是指在一位主持人的带领下,一小组人围绕某个主题进行座谈讨论。确保小组讨论效果的关键点不包括
- A.选择适当的主持人
- B.做好充分准备工作
- C.掌握小组讨论的技巧
- D.安排好小组人员座位排列
- E.现场提出讨论主题
- 53.影响传播效果的因素有多种,其中属于社会环境因素的是
- A.环境布置
- B.传播活动地点、场所
- C.相关的政策法规
- D.传播者的行为动机
- E.患者的心理需求
- 54.健康教育活动的目标是
- A.开展卫生宣传
- B.配合调查研究
- C.普及保健知识
- D.改善人类的健康相关行为
- E.实施系统的健康相关行为干预
- 55.下列不属于按教育目的分类的健康教育研究范畴的是
- A.营养健康教育
- B.生殖健康教育
- C.职业人群健康教育
- D.环境保护健康教育
- E.疾病防治健康教育
- 56.0~3岁时期,个体所处的行为发展阶段是
- A.初试发展阶段
- B.被动发展阶段
- C.主动发展阶段

- D. 自主发展阶段
E. 巩固发展阶段
57. 以下属于“日常危害健康行为”的是
A. 药物滥用
B. 讳疾忌医
C. 不遵医嘱
D. 缺乏体育锻炼
E. 违反法律法规
58. “您今天的气色好多了, 是吧?” 属于常见提问方式中的
A. 封闭式
B. 开放式
C. 复合式
D. 探索式
E. 偏向式
59. 选择健康传播途径的原则除准确性外还包括
A. 针对性、速度性、经济性
B. 科学性、速度性、经济性
C. 针对性、科学性、通用性
D. 速度性、通用性、经济性
E. 针对性、速度性、科学性
60. 关于健康教育计划目标的叙述, 下列错误的是
A. Who 是指对象
B. What 是指实现什么变化
C. When 是指在多长时间内实现这种变化
D. How much 是指有多少对象发生行为变化
E. Where 是指在什么范围内实现这种变化
61. 降低烟草的价格对吸烟行为来讲是一种
A. 倾向因素
B. 促成因素
C. 强化因素
D. 抑制因素
E. 强制因素
62. 为减少回归因素对评价结果正确性的影响, 可采用的方法是
A. 设立对照组
B. 重复测量
C. 抽样测量
D. 比较分析
E. 随机调查
63. 适度变化语音引起对方注意属于非语言传播技巧中的
A. 面部表情
B. 仪表形象
C. 动态语言
D. 同类语言
E. 体态语言
64. 医院感染学是研究医院感染
A. 发生、发展和控制的一门学科
B. 病原体特征的一门学科
C. 流行病学特征的一门学科
D. 管理制度建立和完善的一门学科
E. 控制措施的一门学科
65. 去污染就是人为地将机体的
A. 正常菌群或已定植的细菌部分去除
B. 正常菌群或已定植的细菌全部去除
C. 已定植的细菌部分或全部去除
D. 正常菌群部分或全部去除
E. 正常菌群或已定植的细菌部分或全部去除
66. ICU 最常见的条件致病菌是
A. 肺炎克雷伯菌
B. 大肠埃希菌
C. 铜绿假单胞菌
D. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌
E. 洋葱伯克霍德菌
67. 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院患者中, 短时间内突然发生
A. 许多医院感染病例
B. 医院感染流行
C. 医院感染集中
D. 医院感染失控

- E. 医院感染蔓延
68. 手术器械和物品属于
- A. 消毒物品
- B. 无危险性物品
- C. 低度危险性物品
- D. 中度危险性物品
- E. 高度危险性物品
69. 腹腔镜使用前必须经过
- A. 清洁
- B. 消毒
- C. 减菌
- D. 灭菌
- E. 无害
70. 接触下列物品护士不需戴手套的是
- A. 患者的血液
- B. 患者的分泌物
- C. 患者的药物
- D. 患者的排泄物
- E. 污染的敷料
71. 下列属于决策步骤的是
- A. 列出对象
- B. 目标分类
- C. 追踪评价
- D. 排列顺序
- E. 分配时间
72. 护士长担任咨询、协调、激励者角色

的护理组织方式是

- A. 个案护理
- B. 功能制护理
- C. 小组护理
- D. 责任制护理
- E. 综合护理

73. 领导在日常工作中有权调度人、财、物、时间等,体现了领导的

- A. 管理权
- B. 决策权
- C. 决定权
- D. 用人权
- E. 指挥权

74. 各要素配置达到科学化、最优化的基本要求是

- A. 解决问题要注重根本
- B. 及时协调出现的问题
- C. 调动组织成员积极性
- D. 协调问题注意合理原则
- E. 协调过程要相互尊重

75. 实施护理质量控制应注意

- A. 检查标准应人性化
- B. 重视细节的控制
- C. 质量控制应具体化
- D. 控制方法应体现管理技巧
- E. 强调综合系统的控制

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(76~77 题共用备选答案)

- A. 护士工作兴趣与满意度高
- B. 责任护士技能水平要求高
- C. 患者安全感与归属感增强
- D. 所需要的人力物力费用高
- E. 护士职责明确,责任心增强

76. 责任制护理的优点是

77. 综合护理的优点是

(78~80 题共用备选答案)

- A. 吸烟
- B. 戒烟
- C. 及时就医
- D. 讳疾忌医
- E. 药物滥用

78. 属于保健行为的是

79. 属于不良疾病行为的是

80. 属于戒除不良嗜好行为的是

(81~85 题共用备选答案)

- A. 消化道隔离
 B. 呼吸道隔离
 C. 血液、体液隔离
 D. 接触隔离
 E. 严密隔离
81. 皮肤白喉采取的隔离是
 82. 腮腺炎采取的隔离是
 83. 艾滋病采取的隔离是
 84. 伤寒采取的隔离是
 85. 疟疾采取的隔离是
 (86~89 题共用备选答案)
 A. 5%
 B. 10%
 C. 50%
 D. 80%
 E. 90%
86. 下排式灭菌剂的装载量不得超过柜室内容积的
 87. 预真空灭菌剂的装载量不得超过柜室容积的
 88. 预真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的
 89. 脉动真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的
 (90~91 题共用备选答案)
 A. 2 小时
 B. 4 小时
 C. 12 小时
 D. 24 小时
 E. 48 小时
90. 医疗机构发生 5 例以上疑似医院感染暴发事件的报告时限为
 91. 医疗机构发生 10 例以上的医院感染暴发事件的报告时限为
 (92~93 题共用备选答案)
 A. 个案护理
 B. 功能制护理
 C. 小组护理
 D. 责任制护理
 E. 综合护理
92. 由一名护理人员在当班期间承担一名患者所需要的全部护理, 被称为
 93. 由一组护理人员应用护理程序的工作方法, 共同完成对一组患者的护理工作, 被称为
 (94~96 题共用备选答案)
 A. 肯定性反馈
 B. 否定性反馈
 C. 模糊性反馈
 D. 动态体语
 E. 仪表形象
94. 护士小王在和患者交谈中, 适时插入了一些“是的”“很好”等语言或点头、微笑等非语言形式给予对方肯定和鼓励, 对患者的言行表示了赞同和支持, 小王在交谈中的反馈行为属于
 95. 当小王发现患者的言行不正确时, 她应当使用的恰当反馈形式是
 96. 在交谈中, 小王以关注的眼神注视患者, 表示在专心倾听对方的话, 小王的交流行为属非语言交流中的
 (97~98 题共用备选答案)
 A. 先天性
 B. 习得性
 C. 偶然性
 D. 一致性
 E. 可控性
97. 属于促进健康行为的特点是
 98. 属于危害健康行为的特点是
 (99~100 题共用备选答案)
 A. 食用生的污染贝类
 B. 直接接触有传染性的分泌物感染
 C. 破损的皮肤接触被病原菌污染的物品感染
 D. 输血感染
 E. 吸入被病原菌污染的空气感染
99. 淋病的传播途径是
 100. 炭疽的传播途径是

专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这也母所属的方框涂黑。

- 局麻药加肾上腺素的主要目的是
A. 延缓药物吸收, 避免或减轻中毒
B. 延缓药物吸收, 缩短作用时间
C. 使局部血管收缩, 减少出血
D. 预防术中血压过低
E. 预防术中心率减慢
- 下列肿瘤中对放疗高度敏感的是
A. 肺癌
B. 淋巴造血系统和某些胚胎组织的恶性肿瘤
C. 软组织恶性肿瘤
D. 胃肠道恶性肿瘤
E. 骨肉瘤
- 关于胃肠减压的目的叙述不正确的是
A. 改善肠壁的血液循环
B. 减少缝线张力, 减轻疼痛
C. 维持正常体液平衡
D. 减轻肠梗阻症状
E. 减轻腹胀
- 关于左侧小脑幕切迹病的临床表现描述正确的是
A. 昏迷、右侧瞳孔散大, 右侧肢体瘫痪
B. 昏迷、左侧瞳孔散大, 左侧肢体瘫痪
C. 昏迷、左侧瞳孔散大, 右侧肢体瘫痪
D. 昏迷、双侧瞳孔散大, 双侧肢体瘫痪
E. 昏迷、双侧瞳孔散大, 左侧肢体瘫痪
- 急性化脓性骨髓炎早期手术旨在
A. 防止疾病转为慢性
B. 减轻疼痛
C. 预防败血症
D. 预防病理性骨折
E. 减压和引流
- 用于判断小儿营养状况最重要的指标是
A. 身高
B. 体重
C. 头围
D. 腹围
E. 皮下脂肪厚度
- 以下最迟发育的系统是
A. 神经系统
B. 生殖系统
C. 心血管系统
D. 淋巴系统
E. 造血系统
- 我国将新生儿期定义为
A. 自出生脐带结扎至生后 28 天内
B. 从受孕至生后脐带结扎
C. 自出生脐带结扎至生后 7 天
D. 自出生脐带结扎至生后 14 天
E. 自受孕至生后满 1 个月
- 以下属于中毒性肺炎的典型表现是
A. 高热持续不退
B. 合并胃肠道症状
C. 出现神经系统症状
D. 出现休克
E. 血象异常
- 对于臀位阴道分娩不正确的说法是
A. 临产发动后卧床保持体力
B. 严密监测胎心
C. 勿灌肠
D. 少做肛门检查
E. 阴道口见胎足, 为子宫颈口开全
- 新生儿保健的关键时期是
A. 出生后 24 小时
B. 出生后 3 天内
C. 出生后 7 天内
D. 出生后 10 天内

- E. 出生后 14 天内
12. 产妇进入产房后, 护士不正确的处理是
- 再次清洁、消毒外阴
 - 铺无菌巾
 - 给予产妇精神支持
 - 当胎头着冠时, 指导病人开始向下屏气
 - 严密监测胎心
13. 急性呼吸性酸中毒的主要治疗措施是
- 应用 5% 碳酸氢钠溶液
 - 增加通气量
 - 积极补充液体
 - 限制摄入含钾食物
 - 利尿增加酸从肾排出
14. 支气管肺炎常见的并发症应除外
- 脓胸
 - 肺脓肿
 - 肾炎
 - 肺大疱
 - 心力衰竭
15. 病态窦房结综合征病人最理想的治疗方法是
- 静脉注射肾上腺素
 - 同步电复律
 - 静脉滴注异丙肾上腺素
 - 安装永久心脏起搏器
 - 静脉滴注洋地黄类药
16. 有关小儿急性肾小球肾炎的描述正确的是
- 秋冬季多发, 2 岁以下常见
 - 常有链球菌感染前驱史
 - 最先出现的症状为水肿, 凹陷性
 - 镜下血尿持续较短
 - 预后较差
17. 患儿, 男, 7 岁。诊断为“急性淋巴细胞白血病”。以下症状提示有中枢神经系统受累的是

- 关节疼痛明显
 - 发热
 - 头痛、呕吐、嗜睡
 - 皮肤出血点
 - 肝、脾大及淋巴结肿大
18. 护士在向慢性胃炎患者进行健康宣教, 其中不应该包括下列哪项
- 养成良好饮食习惯
 - 注意休息, 避免精神高度紧张
 - 戒烟、戒酒
 - 长期服用抑制胃酸分泌的药物
 - 避免服用刺激性药物和食物
19. 以下哪项症状或体征对于肝硬化失代偿期的诊断最有意义
- 右上腹间歇性隐痛
 - 肝功能异常
 - 食欲缺乏
 - 腹水
 - 大便情况
20. 水中毒病人每日输液总量应限制在
- 500~700 mL
 - 600~800 mL
 - 700~800 mL
 - 700~1 000 mL
 - 900~1 100 mL
21. 关于超急性排斥反应的描述正确的是
- 术后 1 个月内发生
 - 突发寒战、高热
 - 移植器官功能缓慢减退
 - 移植物肿大引起局部胀痛
 - 术后 24 小时内发生
22. 对阑尾炎的诊断有重要意义的是
- 转移性右下腹痛
 - 右下腹有固定且明显的压痛
 - 腹膜刺激征阳性
 - 结肠充气试验阳性
 - 闭孔内肌试验阳性
23. 患内痔病人的大便特点为

- A.黏液血便
B.便后滴血
C.果酱样粪便
D.细条状粪便
E.米泔水样粪便
- 24.食管癌进展期典型的症状是
A.进行性吞咽困难
B.体重减轻、贫血
C.进食后呕吐
D.进食后食管内异物感
E.进食后哽噎感
- 25.腰椎间盘突出症最主要的临床表现是
A.腰痛
B.腿部和臀部痛
C.腰和大腿后侧痛
D.坐骨神经痛、大小便功能障碍
E.腰痛伴坐骨神经痛
- 26.慢性支气管炎最具有特征性的症状是
A.长期反复咳嗽
B.经常咳痰
C.时有喘息
D.畏寒
E.气促
- 27.临床用于判断小儿体格发育指标的是
A.动作发展
B.语言能力
C.智力发育水平
D.对环境适应能力
E.体重、身高、头围、胸围、前囟
- 28.关于小儿囟门发育说法不正确的是
A.出生时前囟 1.5~2 cm
B.囟门过小多见于小头畸形
C.前囟隆起多见脑膜炎
D.前囟 1~1.5 岁关闭
E.后囟最迟在 3~4 个月闭合
- 29.肺炎球菌肺炎最有特征性的临床表

现是

- A.突然发冷、发热
B.胸痛
C.口角有单纯性疱疹
D.全身肌肉酸痛
E.咳铁锈色痰
- 30.学龄前期保健重点不包括
A.指导断奶,合理添加辅食
B.生长发育监测
C.加强早期教育
D.预防传染性疾病发生
E.培养良好生活习惯
- 31.护士在为胸腔积气患者查体时,其叩

诊音是

- A.鼓音
B.实音
C.浊音
D.支气管呼吸音
E.肺泡呼吸音
- 32.二度Ⅱ型房室传导阻滞伴阿-斯综合征患者,最佳的治疗方法是
A.安装永久性心脏起搏器
B.静脉滴注异丙肾上腺素
C.静脉注射阿托品
D.口服麻黄碱
E.静脉滴注地塞米松
- 33.对急性心肌梗死患者需严密观察患者心律失常发生情况,最需紧急处理的心律失常是
A.窦性心动过缓
B.二度Ⅱ型房室传导阻滞
C.预激综合征
D.期前收缩
E.多源性频发室性期前收缩
- 34.阴道灌洗常用溶液除外
A.1:5 000 高锰酸钾液
B.生理盐水
C.4%硼酸溶液
D.0.5%醋酸液

- E.8%碳酸氢钠液
- 35.肾病综合征患儿正确的饮食是
- 高蛋白质饮食
 - 高钠摄入
 - 急性期无盐饮食
 - 高糖饮食
 - 每日摄入蛋白质 2 g/kg
- 36.需要安装心脏永久起搏器治疗的是
- 外科手术前后的“保护性”应用,主要预防发生心率过速
 - 异位性快速心律失常药物治疗有效者
 - 病态窦房结综合征伴阿-斯综合征
 - 急性下壁心肌梗死伴三度房室传导阻滞
 - 以上都不是
- 37.前置胎盘的临床表现除外
- 妊娠晚期反复阴道出血
 - 胎位清楚
 - 阴道出血、剧烈腹痛
 - 子宫软、无压痛
 - 不同类型出血时间不同
- 38.降氨药不包括
- 精氨酸
 - 氟马西尼
 - 谷氨酸钾
 - 苯甲酸钠
 - γ -氨酪酸
- 39.糖尿病引起的并发症,不包括
- 动脉粥样硬化
 - 糖尿病足
 - 淋巴腺病
 - 神经病变
 - 感染
- 40.在我国与原发肝癌的发生关系最密切的疾病是
- 乙型肝炎
 - 甲型肝炎
 - 肝脓肿
 - 中毒性肝炎
 - 肝包虫病
- 41.急性下壁心肌梗死易发生的心律失常为
- 室上性心动过速
 - 心室颤动
 - 房性期前收缩
 - 三度房室传导阻滞
 - 心房纤颤
- 42.不符合高热惊厥特点的是
- 多在高热消退时发作
 - 恢复后无阳性神经系统体征
 - 热退后 1 周脑电图检查正常
 - 发病年龄多在 6 个月~3 岁
 - 发作呈全身性、次数少、时间短
- 43.生理性体重下降的范围一般为出生体重的
- 10%~20%
 - 3%~9%
 - 4%~6%
 - 20%~25%
 - 1%~5%
- 44.中暑痉挛时最常见的发生肌肉痉挛的部位是
- 肱三头肌
 - 肱二头肌
 - 股四头肌
 - 腹直肌
 - 腓肠肌
- 45.治疗消化性溃疡的药物中可引起黑便的是
- 西咪替丁
 - 氢氧化铝凝胶
 - 枸橼酸铋钾
 - 甲硝唑
 - 阿莫西林
- 46.治疗过敏性紫癜应优先考虑的是
- 查找过敏原并避免再次接触
 - 应用抗过敏药物

- C.联合应用抗生素
D.应用大剂量糖皮质激素
E.应用大剂量维生素 C
- 47.病人称呼物体名称的能力丧失,但能表达如何使用该物体,这种语言障碍类型属于
- A.运动性失语
B.感觉性失语
C.失写
D.失读
E.命名性失语
- 48.能反映患者取血前 8~12 周血糖水平的检查是
- A.尿糖
B.随机血糖
C.口服葡萄糖耐量试验
D.糖化血红蛋白
E.餐后 2 小时血糖
- 49.支气管扩张病人的咳嗽特点为
- A.晨起及晚间躺下时较重
B.常出现刺激性干咳
C.有时呈阵发性呛咳
D.后期咳嗽加重并伴喘鸣声
E.严重者出现呼气性呼吸困难
- 50.医务人员检查麻疹患儿后,应立即采取
- A.彻底洗手
B.更换隔离衣
C.日光下或流动的空气中停留 30 分钟
D.检疫 14 天
E.注射丙种球蛋白
- 51.甲状腺功能减退症的药物护理中服用甲状腺激素正确的是
- A.从小剂量开始
B.用药前后测脉搏
C.不可随意增减或停药
D.定时测体重
E.以上都是
- 52.没有外阴瘙痒症状的疾病是

- A.外阴炎
B.前庭大腺炎
C.滴虫阴道炎
D.念珠菌阴道炎
E.老年性阴道炎
- 53.维生素 D 缺乏性手足搐搦症治疗顺序是
- A.止惊、补钙、补维生素 D
B.补钙、止惊、补维生素 D
C.补维生素 D、止惊、补钙
D.止惊、补维生素 D、补钙
E.补维生素 D、补钙、止惊
- 54.急性病毒性肝炎早期最主要的治疗措施是
- A.维生素类药物
B.免疫制剂
C.卧床休息
D.抗病毒药物
E.保肝药物
- 55.水痘患儿应隔离至
- A.出疹后 5 天
B.出疹后 10 天
C.部分皮疹结痂
D.全部皮疹结痂
E.全部结痂脱落
- 56.下列各项中不能明确表明上消化道大出血尚未停止的是
- A.黑便次数增多伴肠鸣音亢进
B.网织红细胞计数持续增高
C.黑便由糊状变为成形略带黄色
D.呕吐物由咖啡色转为鲜红色
E.血尿素氮恢复正常后又升高
- 57.新生儿破伤风最早的临床表现是
- A.神志清醒
B.哭闹不安
C.吸吮困难
D.牙关紧闭
E.苦笑面容
- 58.类风湿关节炎关节疼痛的特点为

- A.固定于少数关节,剧烈难忍
 B.呈游走性
 C.关节痛于活动后减轻
 D.多呈不对称性
 E.发作急骤
- 59.关于胎膜早破的治疗原则,正确的叙述是
 A.卧床休息,抬高床头
 B.胎膜破裂后 48 小时给予抗生素预防感染
 C.若妊娠超过 37 周,在破膜 12 小时后应终止妊娠
 D.定时做阴道检查或肛诊,了解有无脐带脱垂
 E.破膜发生在妊娠 35 周以前,可给予静脉滴注维生素 C 促进胎肺成熟
- 60.下列有关阴道或宫颈上药患者的护理要点,错误的是
 A.行经期妇女应停止阴道上药
 B.子宫出血者须停止阴道上药
 C.用药期间应禁止性生活
 D.未婚妇女禁止阴道上药
 E.叮嘱患者按时取出阴道内的棉球
- 61.墨菲征阳性是指按压墨菲点时,病人
 A.因疼痛而出现呼吸抑制的现象
 B.深呼吸时因疼痛而屏气的现象
 C.因疼痛而出现休克的现象
 D.深呼吸时疼痛致血压升高的现象
 E.因疼痛而出现战栗的现象
- 62.重症脑损伤未休克病人的最适宜的体位是
 A.平卧位
 B.半卧位
 C.侧卧位
 D.侧俯卧位
 E.床头抬高 15~30 cm
- 63.麻疹病毒在流通的空气或日光下失去活力的时间为
 A.10 分钟
 B.20 分钟
 C.30 分钟
 D.40 分钟
 E.50 分钟
- 64.对流行性腮腺炎的护理,以下正确的是
 A.可以多进食饼干、薯片等调节食欲
 B.严禁温盐水漱口,防止疼痛加重
 C.可进食水果和补充维生素 C 片
 D.腺肿处可用如意黄金散外敷
 E.肿胀处可热敷
- 65.短暂性脑缺血发作的持续时间一般为
 A.5 分钟
 B.10 分钟
 C.10~15 分钟
 D.2 小时
 E.24 小时
- 66.血栓闭塞性脉管炎中,以下哪项不是局部缺血期表现
 A.肢端发凉,怕冷
 B.小腿酸痛
 C.间歇性跛行
 D.肢端感觉麻木
 E.足背动脉搏动消失
- 67.尿道损伤尿外渗产生的严重并发症是
 A.疼痛
 B.溃烂
 C.广泛面积的蜂窝织炎
 D.肿胀
 E.湿疹
- 68.肝硬化腹水患者每日进水量限制在
 A.1 000 mL
 B.1 500 mL
 C.2 000 mL
 D.800 mL
 E.500 mL
- 69.某新生儿出生后第 3 天,对其生命体

征的描述,正确的是

- A.胸式呼吸为主
- B.体温 38.7 ℃
- C.脉搏 90 次/分
- D.心率 100 次/分
- E.呼吸 20~40 次/分

70.肺结核全程督导治疗最重要的目的是

- A.减少药物的用量
- B.及时发现药物的毒副作用
- C.减少对家人的传染性
- D.提高规则治疗及完成全程用药率
- E.能及时调整治疗方案

71.患者,女性,65岁。冬季晨起家人发现其呼之不应、推之不动、脉快、多汗、皮肤黏膜呈樱桃红色。治疗原则中,最首要的是

- A.降低脑代谢
- B.立即脱离此环境
- C.治疗脑水肿
- D.纠正缺氧
- E.促进脑细胞功能恢复

72.患儿,男,10岁。诊断为原发性肾病综合征,已治疗1年,长期忌盐饮食。近3天来,患儿感乏力,反复呕吐,食欲差,精神萎靡,血压下降。除病因治疗外,首先应考虑给予

- A.补钙
- B.补镁
- C.补钠
- D.补铁
- E.补液体

73.患者,男性,24岁。8年前发现HIV抗体(+),40余天前无明显诱因,出现发热,体温波动在38.0~38.5℃,伴咳嗽、咳痰,入院诊断为“卡氏肺孢子虫肺炎”。目前该患者的艾滋病分期最可能的是

- A.潜伏期
- B.急性感染期
- C.无症状感染期

D.持续性全身淋巴结肿大综合征期

E.典型艾滋病期

74.患者,男性,58岁。有肝硬化20余年。近1个月来因腹水增多,曾放腹水3次,现有不明原因的低热,白细胞计数偏高。该患者最可能的诊断是

- A.肝硬化并发功能性肾衰
- B.肝硬化合并感染
- C.肝性脑病前驱期
- D.原发性肝癌
- E.肝脓肿

75.34岁女性,孕1产0,既往月经规律,但近1年来月经周期混乱,经期持续时间延长,经量不多,伴经期腹痛,行经19天至今未净,以下可除外的诊断是

- A.子宫肌瘤
- B.先排卵性功血
- C.排卵性功血
- D.异位妊娠
- E.子宫内膜炎

76.患者,男性,59岁。冠心病、心绞痛5年,平日胸痛发作时舌下含硝酸甘油1片2~5分钟缓解,近半个月来,胸痛发作较前频繁,疼痛不易缓解,3小时前发生心前区剧烈疼痛,服用硝酸甘油3片未缓解,急诊入院,心电图检查发现ST段弓背上抬,随后相应导联出现病理性Q波,血压85/55 mmHg,心率108次/分,律齐。入监护室观察治疗,经用药后上述疼痛缓解。2小时后心电监测示血压70/50 mmHg,心率118次/分,患者烦躁不安,皮肤湿冷,此时责任护士认为病人的病情变化是

- A.脑出血
- B.室壁瘤破裂
- C.心源性休克
- D.心律失常
- E.心力衰竭

77.患者,女性,45岁。因车祸致颅内血肿,昏迷,并频繁呕吐。拟手术清除血肿,术

前预防脑疝形成的有效措施是

- A. 冬眠低温疗法
- B. 避免剧烈咳嗽和便秘
- C. 限制液体输入量
- D. 静脉注射氯化可的松
- E. 快速静脉滴注甘露醇

78. 患者, 男性, 70 岁。近半年出现排尿射程短, 尿后滴沥, 尿排不尽, 考虑患者最可能的状况是

- A. 膀胱肿瘤
- B. 慢性细菌性前列腺炎
- C. 前列腺增生
- D. 前列腺癌
- E. 尿路结石

79. 患者, 女性, 5 岁。下午突然呕吐数次, 随之抽搐, 以昏迷待查急诊入院。查体: 唾液过多, 心率缓慢, 瞳孔缩小, 呈浅昏迷状态, 本患儿最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 食物中毒
- C. 有机磷中毒
- D. 药物中毒
- E. 脑炎

80. 患者, 男性, 36 岁。反复发作上腹部疼痛 2 年余, 可经进食或口服抗酸药缓解, 近 2 个月来疼痛经口服抗酸药效果差, 并进行性加重, 伴恶心、呕吐, 呕吐物为酸臭宿食, 患者出现贫血、消瘦, 该患者可能是

- A. 瘢痕性幽门梗阻
- B. 活动性溃疡所致幽门炎性水肿
- C. 胃癌所致幽门梗阻
- D. 幽门括约肌痉挛引起的幽门梗阻
- E. 溃疡引起幽门组织粘连所致的梗阻

81. 患者, 女性, 50 岁。患 1 型糖尿病 10 年。5 年前开始使用胰岛素治疗。近 2 周擅自停用胰岛素, 改服中药。3 天前患者腹股沟处长一疔子, 经抗生素治疗未见好转, 并出现恶心、呕吐、头痛、呼吸深快、脉细速。急送医院检查: 血糖 24 mmol/L, 血酮升高,

尿酮强阳性, 白细胞增高, 该患者被诊断为

- A. 感染性休克
- B. 酮症酸中毒
- C. 高渗性非酮症性昏迷
- D. 乳酸性酸中毒
- E. 低血糖昏迷

82. 患儿, 男性, 11 个月。自 5 个月起常有抽搐发作, 至今不能独坐和认识父母。查体: 表情呆滞, 皮肤白皙, 头发黄褐色, 尿有鼠臭味。该患儿最可能的情况是

- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 21-三体综合征
- C. 苯丙酮尿症
- D. 脑肿瘤
- E. 癫痫

83. 患者, 女性, 45 岁。足底被铁钉刺伤后发生破伤风, 频繁抽搐, 为减少血液中游离毒素水平, 应该采取的措施为

- A. 注射破伤风抗毒素
- B. 注射破伤风类毒素
- C. 注射甲硝唑
- D. 伤口用 3% 过氧化氢冲洗
- E. 注射破伤风人体免疫球蛋白

84. 患者, 女性, 54 岁。因上腹隐痛、食欲缺乏、体重减轻 3 个月, 排黑粪 4 次而就诊。查体: 腹部无阳性体征。可考虑患者是

- A. 肝硬化
- B. 十二指肠溃疡
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 胃癌
- E. 胃憩室

85. 正常 10 个月小儿, 体重 8 kg, 护士告知每日的需水量是

- A. 500 mL
- B. 700 mL
- C. 900 mL
- D. 1 100 mL
- E. 1 200 mL

86. 患者, 男性, 30 岁。有风湿性心脏

病,二尖瓣狭窄并关闭不全病史。每天服地高辛 0.25 mg,间断服氢氯噻嗪已 3 个月。近日出现心悸、气短、下肢水肿症状而就诊。心电图示室性期前收缩,二联律。最佳的治疗措施应是

- A.停用地高辛
- B.美心律
- C.利多卡因
- D.利尿
- E.抗凝治疗

87.产妇,29 岁。顺产后 3 天,主诉阵发性不规则腹痛,哺乳时腹痛明显,检查:体温 36.7 ℃,子宫底于脐下 3 横指,无压痛,双侧子宫旁压痛(-),恶露血性,量不多,无臭味。该产妇最可能的情况是

- A.子宫内膜炎
- B.盆腔炎
- C.产褥感染
- D.产后宫缩痛
- E.子宫复旧不良

88.患者,女性,25 岁。因失恋而服用药物中毒,发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻、呼吸困难等症状而入院。查体:呼吸有蒜味,瞳孔缩小。最可能的诊断是

- A.CO 中毒
- B.有机磷中毒
- C.亚硝酸盐中毒
- D.拟除虫菊酯类农药中毒
- E.酒精中毒

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(89~92 题共用题干)

患者,男性,75 岁。心绞痛发作持续 3 小时,伴恶心、呕吐、出冷汗,含服硝酸甘油无效。心电图示 II、III、aVF 导联 ST 段呈弓背样抬高 6 mm, V₁~V₃ 导联 ST 段压低 4 mm,偶发室性期前收缩 1 次,诊断为急性心肌梗死。

89.2 小时后随访心电图 II、III、aVF 导联出现病理性 Q 波,其心肌梗死部位可能在

- A.广泛前壁
- B.前壁
- C.下壁
- D.右侧壁
- E.正后壁

90.护士在配合医师进行上述治疗时,病人突然意识丧失,血压 70/34 mmHg。心电图示:室性心动过速,此时应立即进行

- A.非同步电复律
- B.同步电复律
- C.静脉推注肾上腺素
- D.永久性心脏起搏

E.静脉推注利多卡因

91.此后病人渐平稳,第 2 天早晨又出现频发室性期收缩,此时治疗上首选

- A.非同步电复律
- B.同步电复律
- C.永久性心脏起搏
- D.静脉推注利多卡因
- E.静脉滴注肾上腺素

92.最有效的处理措施是

- A.溶栓治疗
- B.静脉持续滴入硝普钠
- C.外科手术治疗
- D.静脉滴注利多卡因
- E.静脉滴注极化溶液

(93~95 题共用题干)

初产妇,26 岁。40 周妊娠,顺产,总产程 8 小时。目前产后 1.5 小时,阴道流血约 600 mL,拟诊为产后出血。检查:子宫底高度平脐,质软。血压 12/8 kPa (90/60 mmHg),心率 100 次/分。

93.有关产后出血的定义是

- A.产程中阴道流血量 ≥ 500 mL
 B.胎儿娩出后 24 小时内阴道流血量 ≥ 500 mL
 C.胎儿娩出后 2 天内阴道流血量 ≥ 500 mL
 D.胎儿娩出后 7 天内阴道流血量 ≥ 500 mL

E.产褥期有 1 次阴道流血量 ≥ 500 mL

94.该例产后出血最可能的原因是

- A.软产道撕裂
 B.胎盘残留
 C.急产
 D.宫缩乏力
 E.凝血功能障碍

95.该产妇的首要护理措施中哪项不妥

- A.用手按摩子宫
 B.静脉滴注缩宫素
 C.宫腔填塞纱条
 D.抗生素预防感染
 E.输血补充血容量

(96~97 题共用备选答案)

A.血友病

B.生理性贫血

C.急性白血病

D.营养性缺铁性贫血

E.特发性血小板减少性紫癜

96.婴儿,男,8 个月。米糊喂养,未添加其他辅食实验室检查:红细胞呈小细胞低色素,血清铁低,血清总铁结合力高。最可能的诊断是

97.患儿,男,3 岁。1 周前有上呼吸道感染史,今晨发现皮肤有出血点和紫癜,四肢较多,血常规检查血小板 $40 \times 10^9/L$,最可能的诊断是

(98~100 题共用备选答案)

A.脾破裂

B.消化道出血

C.阑尾炎

D.结肠破裂

E.胃破裂

98.可出现膈下游离气体的是

99.可伴失血性休克症状的是

100.可出现早期症状轻,而晚期症状重的是



专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 1.关于疝修补术后护理措施描述不正确的是
- A.注意保暖,防止受凉引起咳嗽
 - B.保持切口部位敷料清洁干燥
 - C.调整饮食,保持排便通畅
 - D.术后3个月内避免重体力劳动
 - E.鼓励病人早期下床活动
- 2.厌氧菌感染支气管扩张患者痰液的特征是
- A.铁锈色
 - B.胶冻样
 - C.脓痰
 - D.血性痰
 - E.痰有恶臭味
- 3.乳头皲裂的原因除外
- A.碱性肥皂清洗过度
 - B.婴儿吸吮时间过长
 - C.乳房肿胀
 - D.婴儿含住乳头睡觉
 - E.未吸入大部分乳晕
- 4.腹部触诊时若腹壁呈揉面感柔韧感,这种情况最多见于
- A.上消化道大出血
 - B.急性胰腺炎
 - C.结核性腹膜炎
 - D.急性胆管炎
 - E.急性弥漫性腹膜炎
- 5.三腔两囊管压迫止血时,注入胃囊内的气体压力最佳为
- A.30 mmHg
 - B.40 mmHg
 - C.20 mmHg
 - D.50 mmHg
 - E.60 mmHg
- 6.2:1等张液的组成是
- A.2份5%葡萄糖液:1份生理盐水
 - B.2份11.2%乳酸钠:1份10%葡萄糖
 - C.2份生理盐水:1份1.4%碳酸氢钠
 - D.2份5%葡萄糖液:1份1.4%碳酸氢钠
 - E.2份1.87%乳酸钠:1份1.4%碳酸氢钠
- 7.属于宫颈癌癌前病变的病理变化是
- A.宫颈鳞状上皮化生
 - B.宫颈鳞状上皮化
 - C.宫颈上皮内瘤样病变
 - D.宫颈息肉
 - E.宫颈肥厚
- 8.有关破伤风的护理措施错误的是
- A.病人要执行血液隔离
 - B.安置病人在单独暗室
 - C.护理操作应集中进行
 - D.加强营养支持
 - E.保持呼吸道通畅
- 9.头面部烧伤病人的护理重点是
- A.应用抗生素预防感染
 - B.包敷创面,避免感染
 - C.保持呼吸道通畅
 - D.做好五官护理
 - E.暴露疗法
- 10.治疗军团菌肺炎,最佳的抗菌药物是
- A.红霉素
 - B.青霉素
 - C.链霉素
 - D.头孢菌素
 - E.氨基糖苷类
- 11.哺乳期妇女避孕最简单有效的措施是

- A.放置宫内节育器
 B.阴道隔膜
 C.口服避孕药
 D.安全期避孕
 E.输卵管结扎
- 12.觅食反射消失的时间是出生后
 A.2~3个月
 B.3~4个月
 C.4~7个月
 D.8~9个月
 E.11~12个月
- 13.先天性心脏病中临床最常见的是
 A.动脉导管未闭
 B.室间隔缺损
 C.房间隔缺损
 D.大动脉转位
 E.主动脉狭窄
- 14.构成结核病重要传染源的肺结核类型是
 A.陈旧性肺结核
 B.急性粟粒型肺结核
 C.血行播散型肺结核
 D.浸润型肺结核
 E.慢性纤维空洞型肺结核
- 15.头盆不称引起子宫破裂是因为
 A.子宫本身病变
 B.手术损伤
 C.宫缩过强
 D.先露下降受阻
 E.胎儿过大
- 16.治疗暴发性溃疡性结肠炎的首选药物是
 A.大剂量抗胆碱能药物
 B.水杨酸柳氮磺吡啶
 C.大剂量肾上腺糖皮质激素
 D.细胞毒性药物
 E.大剂量抗生素治疗
- 17.常用的确诊肺结核的方法是
 A.结核菌素试验
 B.痰结核菌检查
 C.胸部CT检查
 D.纤维支气管镜检查
 E.胸部X线检查
- 18.关于石膏绷带固定护理描述错误的是
 A.观察肢端血液循环
 B.肢体肿胀消退引起石膏过松,应及时更换
 C.协助病人更换卧位
 D.石膏绷带固定过程中应进行主动肌肉舒缩锻炼
 E.抬高患肢,有利于消除肿胀
- 19.对小夹板固定者的护理错误的是
 A.绑带不能过松,以不能上下移动为宜
 B.松紧度以绑带在夹板上下可移动1cm为宜
 C.检查绷带小夹板松紧度,防止骨折再移位
 D.抬高患肢,减轻水肿
 E.指导病人早期进行功能锻炼
- 20.左侧心力衰竭患者早期出现的典型表现是
 A.呼吸困难
 B.颈静脉怒张
 C.乏力、头晕
 D.双下肢水肿
 E.发绀、心悸
- 21.女性一生中历时最长的时期是
 A.幼儿期
 B.性成熟期
 C.青春期
 D.围绝经期
 E.老年期
- 22.含铁最少的食物是
 A.动物肝脏
 B.猪肉
 C.香菇
 D.牛奶

- E.海带
- 23.有关痛经正确的描述不包括
- A.原发性痛经生殖器官无器质性病变
B.继发性痛经生殖器官有器质性病变
C.多发于无排卵性功能失调性子宫出血
D.痛经常于行经前数小时开始,持续经期的第1、2天
E.痛经与前列腺素分泌有关
- 24.慢性呼吸衰竭纠正缺氧和二氧化碳潴留的先决条件是
- A.建立通畅的气道
B.改善微循环
C.呼吸兴奋药
D.纠正代谢性酸中毒
E.建立静脉通路
- 25.硬脊膜外阻滞麻醉最危险的并发症是
- A.全脊麻
B.肺不张
C.血压下降
D.呼吸抑制
E.硬膜外间隙出血
- 26.刷手护士的职责不包括
- A.随时保持手术桌和器械托盘的无菌和清洁
B.提前洗手,穿无菌手术衣
C.术中切下的组织应妥善保管好
D.手术结束后,做手术室内清洁和消毒工作
E.手术结束后,整理手术台和清洗器械
- 27.低渗性脱水伴休克,补液时应首选
- A.3%氯化钠溶液
B.10%葡萄糖盐水
C.4:3:2液
D.2:3:1液
E.2:1等张液
- 28.护士指导法洛四联症患儿保证液体入量的目的是防止
- A.肾衰竭
B.肺水肿
C.血栓栓塞
D.脱水
E.便秘
- 29.哺乳后母亲协助婴儿的最佳体位是
- A.左侧卧位
B.右侧卧位
C.半卧位
D.平卧位
E.俯卧位
- 30.不适于进行新生儿脐静脉插管的是
- A.早产儿
B.病情危重新生儿
C.坏死性小肠结肠炎
D.ABO溶血患儿
E.重症贫血患儿
- 31.不协调性子宫收缩乏力的宫缩特点是
- A.收缩强度低,具有协调性
B.收缩力强,具有协调性
C.收缩过强且持续,无节律性放松
D.收缩极性倒置,间歇期子宫肌肉不能完全放松
E.子宫上下段交界处子宫环形肌不协调性过强收缩
- 32.腰椎间盘突出压迫神经会引起
- A.拇背伸肌减弱
B.肛门反射消失
C.足跖屈力减退
D.小腿前外侧痛
E.足背内侧痛
- 33.系统性红斑狼疮最常见的皮肤损害发生在
- A.颈部
B.胸部
C.腹部
D.暴露部位
E.腿部

- 34.病理性缩复环常见于
- 羊水过多
 - 双胎
 - 巨大儿
 - 胎盘早期剥离
 - 先兆子宫破膜
- 35.下列哪项并发症不可能发生于骨折晚期
- 骨化性肌炎
 - 骨缺血性坏死
 - 创伤性关节炎
 - 关节僵硬
 - 脂肪栓塞
- 36.下列哪项不可能是慢性粒细胞白血病患者护理诊断
- 活动无耐力
 - 营养失调:低于机体需要量
 - 有感染的危险
 - 疼痛:脾胀痛
 - 潜在并发症:周围循环衰竭
- 37.癫痫于短期内频繁发作,间歇期患者仍持续昏迷,则患者此次发作为
- 单纯部分性发作
 - 复杂部分性发作
 - 癫痫持续状态
 - 强直阵挛发作
 - 持续性部分性癫痫
- 38.下列不属于无排卵性功血患者特点的是
- 基础体温单相
 - 好发于围绝经期和青春期
 - 阴道涂片示中、高度雌激素影响
 - 内分泌测定示 FSH 持续低水平, LH 无高峰形成,雌激素水平不稳定,无孕激素
 - 内膜病理示分泌不良
- 39.阴道填塞纱条取出时间不宜超过
- 6 小时
 - 24 小时
 - 12 小时
 - 18 小时
 - 36 小时
- 40.门静脉高压症术前纠正贫血及凝血功能障碍的措施不妥的是
- 输全血
 - 肌注维生素 K
 - 口服维生素 K
 - 输浓缩红细胞
 - 注射含血小板血浆
- 41.充血性心力衰竭的症状不包括
- 呼吸浅表,增快
 - 面色苍白或青灰
 - 脉细速,心率可达 160~180 次/分
 - 尿少、肝大
 - 脉压增宽, >50 mmHg
- 42.有关放置子宫托的注意事项,不正确的是
- 宫颈重度糜烂者不宜放置
 - 可疑宫颈癌变者禁放
 - 放置前需要选择托的大小
 - 如果没有症状可以持续放置
 - 阴道壁有炎症、溃疡者不宜使用
- 43.急性肠梗阻最主要的体征为
- 腹部可见肿块
 - 腹部移动性浊音
 - 肠鸣音亢进或消失
 - 腹肌紧张、压痛
 - 腹胀
- 44.服用铁剂后出现黑便的原因
- 引起肠黏膜破溃出血
 - 引起上消化道出血
 - 腐蚀肠壁血管引起出血
 - 在肠道细菌作用下生成硫化铁所致
 - 腐蚀胃血管引起出血
- 45.控制新生儿惊厥的首选药物是
- 地西洋
 - 苯巴比妥
 - 苯妥英钠
 - 水合氯醛

- E. 氯硝西洋
46. 小儿断奶方法正确的是
- A. 可利用生病期间断奶
- B. 一般 10~12 个月可完全断奶
- C. 断奶最好在夏季进行
- D. 断奶应果断, 一次完成
- E. 最迟不晚于 2 岁半断奶
47. 左向右分流型先心病患儿生长发育落后是由于
- A. 肺动脉高压
- B. 肺循环血量增加
- C. 肺循环血量减少
- D. 体循环血量增加
- E. 体循环血量减少
48. 关于病理性黄疸的叙述, 错误的是
- A. 黄疸在生后 24 小时内出现
- B. 黄疸程度重
- C. 早产儿黄疸持续时间超过 2 周
- D. 黄疸退而复现
- E. 血清结合胆红素 $>1.5 \text{ mg/dl}$
49. 最简便的杀灭结核菌的方法是
- A. 阳光暴晒 2 小时
- B. 煮沸 1 分钟
- C. 70% 酒精接触 2 分钟
- D. 来苏水接触 2~12 小时
- E. 直接焚烧带有病菌的痰纸
50. 下列选项符合早产儿外观特点的是
- A. 皮肤红润, 胎毛少
- B. 足底光滑纹理少
- C. 耳壳软骨发育好
- D. 乳晕明显, 有结节
- E. 指甲长过指端
51. 腰椎间盘突出症的主要症状是
- A. 腰痛
- B. 腰和臀部痛
- C. 腰和大腿前方痛
- D. 坐骨神经痛
- E. 腰痛伴坐骨神经痛
52. 休克病人微循环衰竭期典型临床

表现

- A. 表情淡漠, 皮肤苍白
- B. 尿量减少
- C. 血压下降
- D. 脉搏增快
- E. 弥散性血管内凝血
53. 下列不是诊断性刮宫适应证的是
- A. 子宫异常出血, 原因不明者
- B. 了解卵巢的排卵情况
- C. 排除子宫内膜结核
- D. 诊断宫内节育器的位置
- E. 怀疑流产不全者
54. 子宫内膜癌 II 期时, 有价值的诊断是
- A. 诊断性刮宫
- B. 宫腔冲洗液涂片
- C. 阴道刮片细胞学检查
- D. 后穹隆脱落细胞学检查
- E. 分段性诊刮
55. 诊断颅底骨折最可靠的临床表现是
- A. 意识障碍
- B. 头皮下血肿
- C. 脑脊液漏
- D. 颅底骨凹陷
- E. 脑脊液含血
56. 下列属于 II 度房室传导阻滞心电图表现的是
- A. P-R 间期进行性延长, 直至 QRS 波群脱落
- B. P-R 间期超过 0.20 秒, 无 QRS 波群脱落
- C. P-P 间隔相等, RR 间隔相等
- D. P 波频率大于 QRS 波频率
- E. QRS 波群形态取决于阻滞部位
57. 颅内压增高的容积代偿 (即空间代偿) 主要依靠
- A. 脑组织的压缩
- B. 颅腔的扩大
- C. 脑脊液被排出颅外
- D. 血压的下降

- E.脑血流量减少
- 58.特发性血小板减少性紫癜患者的最重要护理措施是观察和预防
- 胃肠道出血
 - 脑出血
 - 鼻出血
 - 尿道出血
 - 感染
- 59.患者,女性,45岁。体重60 kg因阵发性绞痛、恶心、呕吐、停止排气和排便1天就诊。病人主诉口渴、尿少、头晕,查体发现其皮肤弹性下降、黏膜干燥,诊断为机械性肠梗阻,并认为已经失液量达5%。请问此病人第1天补液量应为
- 1 500 mL
 - 3 500~4 000 mL
 - 2 500~3 500 mL
 - 4 500~5 500 mL
 - 3 300 mL
- 60.患者,女性,43岁。行胆总管切开去除结石,T管引流术。术后第4天,护士查房时T管无胆汁流出,病人诉腹部胀痛,首先应
- 用无菌生理盐水+庆大霉素8万U低压冲洗T管
 - 检查T管是否受压扭曲
 - 用细硅胶管插入管内负压吸引
 - 准备拔除T管
 - 紧急手术更换T管
- 61.患者,女性,23岁。因受凉后出现畏寒,高热39.8℃,伴咳嗽、胸痛1天就诊,X线胸片为右上肺大片状阴影,白细胞计数 $21 \times 10^9/L$ 。神志清,血压12/8 kPa(90/60 mmHg),心率100次/分。可考虑患者是
- 肺结核
 - 肺脓肿
 - 大叶性肺炎
 - 上呼吸道感染
 - 肺炎球菌肺炎
- 62.患者,女性,30岁。患侵蚀性葡萄胎
- Ⅲ期并有不规则阴道出血3个月,以下不正确的是
- 有可能患有阴道转移
 - 需要绝对卧床休息
 - 为防止感染每日要用无菌生理盐水冲洗阴道
 - 根据体重计算化疗药物剂量
 - 记录阴道出血情况
- 63.患者,女性,52岁。风湿性心脏病二尖瓣狭窄15年,近1年来经常在重体力劳动时出现心悸、气短,症状加重1个月入院。昨夜11时突然憋醒,端坐位,出大汗,咳粉红色泡沫痰,心率120次/分,两肺布满湿啰音及哮鸣音,责任护士给病人吸氧的正确方法是
- 持续低流量吸氧
 - 间断高流量吸氧
 - 高流量吸氧
 - 低流量乙醇湿化吸氧
 - 高流量乙醇湿化吸氧
- 64.患者,女性,42岁。风心病二尖瓣狭窄伴心房颤动已10年,因1天前发生右半身麻木,活动不灵急诊入院,医生认为是栓塞,其栓塞部位可能是
- 肺动脉
 - 股动脉
 - 股后动脉
 - 脑动脉
 - 肠系膜上动脉
- 65.孕妇,24岁。停经52天,尿HCG(+),诊为早孕,其末次月经1999年5月13日,护士推算预产期约在
- 2000年3月20日
 - 2000年2月28日
 - 2000年2月20日
 - 2000年1月20日
 - 2000年1月5日
- 66.患者,男性,25岁。喷洒农药时出现恶心、呕吐、胸闷,大小便失禁,瞳孔缩小,流

延,面部肌肉抽搐,缓解面部肌肉抽搐的治疗措施是

- A.阿托品
- B.迅速离开喷洒农药现场
- C.吸氧
- D.补钙
- E.解磷定

67.患者,男性,60岁。既往糖尿病史5年,吸烟40年,春节与家人聚餐,情绪激动时突然跌倒,意识丧失,呼吸变深成鼾音,颈软无抵抗,左侧肢体瘫痪,肌张力低下,急诊以“急性脑出血”收入院。为明确诊断,应首先进行的检查项目是

- A.脑血管造影
- B.脑部CT
- C.脑电图检查
- D.脑部多普勒超声检查
- E.脑部X线检查

68.王先生,38岁。患1型糖尿病已10年,中断胰岛素治疗1周后,发生酮症酸中毒,经治疗后意识恢复,短时间内又突感心悸、饥饿、出汗,随即又意识不清,应立即

- A.加大胰岛素剂量
- B.加用格列本脲
- C.静脉滴注碳酸氢钠
- D.静脉注射50%葡萄糖
- E.应用呼吸兴奋剂

69.患儿,男,6个月,眼距宽,眼裂小,鼻根低平,舌根外伸,流涎,身材矮小,关节可过度屈伸,有通贯手。其母35岁,近亲结婚,患儿系2胎1产。最可能的诊断是

- A.糖原累积病
- B.猫叫综合征
- C.唐氏综合征
- D.苯丙酮尿症
- E.肝豆状核变性

70.患儿,女,4岁。低热3周,乏力,盗汗,精神萎靡,阵发性干咳,用青霉素治疗无效,今来就诊。出生时已接种卡介苗行X线

检查肺部示“哑铃状”阴影。最可能的诊断是

- A.支气管肺炎
- B.支原体肺炎
- C.腺病毒性肺炎
- D.粟粒性肺结核
- E.原发型肺结核

71.患者,女性,57岁。肝硬化病史5年。近1周出现腹胀,尿量减少,查体:神清,精神尚好;心肺(-),腹部饱满,移动:性浊音阳性,双下肢水肿。该患者目前最主要的护理诊断为

- A.体液过多
- B.潜在并发症
- C.焦虑
- D.活动无耐力
- E.有感染的危险

72.王女士,25岁。诊断为类风湿关节炎1个月,现双侧掌指关节、指间关节肿胀、压痛明显,早晨起床后晨僵明显,乏力、低热,护士对其进行健康教育,不妥的是

- A.严格限制双手关节活动,以减轻疼痛
- B.夜间睡眠时用弹力手套保暖
- C.起床时用热水浸泡僵硬的关节
- D.保持双手关节呈功能位
- E.睡眠时避免压迫双手关节、避免受寒

73.患者,男性,30岁。与别人打赌而大量进食后上腹部痛1天入院。查血淀粉酶为700 U/dl,诊断为急性胰腺炎,经治疗痊愈,为预防本病复发,进行健康教育时下列哪项措施是不恰当的

- A.避免暴饮暴食
- B.避免酗酒
- C.忌食油腻食物
- D.积极治疗胆石症
- E.定期预防性应用抑肽酶

74.患者,男性,51岁。进行性消瘦、贫血、乏力,右下腹可触及肿块,大便潜血试验阳性,可能的诊断是

- A. 直肠癌
- B. 结肠息肉
- C. 右半结肠癌
- D. 左半结肠癌
- E. 慢性痢疾

75. 患者, 男性, 71 岁。因情绪激动, 饭后感咽部及下颌有紧缩性发闷, 并放射至颈部, 自含硝酸甘油后逐渐缓解。应考虑为

- A. 脑供血不足
- B. 颈椎病
- C. 咽喉炎
- D. 心绞痛
- E. 心功能不全

76. 患儿, 男, 4 岁。颌下包块 3 天来诊。查体: 体温正常, 神志清, 咽充血, 双侧颌下包块, 不活动, 表面不红, 轻度压痛。1 周前有流行性腮腺炎接触史。最可能的诊断是

- A. 恶性淋巴瘤
- B. 颌下淋巴结炎
- C. 流行性腮腺炎
- D. 化脓性颌下腺炎
- E. 传染性单核细胞增多症

(77~78 题共用题干)

患者, 男性, 51 岁。毕氏 II 式胃大部切除手术后第 6 天, 突发右上腹剧痛, 伴有严重腹膜刺激征。

77. 护士应考虑其并发症

- A. 碱性反流性胃炎
- B. 输入肠梗阻
- C. 胃排空障碍
- D. 低血糖综合征
- E. 十二指肠残端破裂

78. 应立即采取的措施是

- A. 病人绝对卧床休息
- B. 禁食, 胃肠减压
- C. 立即手术
- D. 镇静、止痛
- E. 使用抗生素

(79~81 题共用题干)

患者, 女性, 82 岁。原发性高血压、高脂血症 20 年, 自服降压药, 血压维持在 (20~18.7)/12 kPa [(150~140)/90 mmHg], 确诊冠心病、心绞痛 3 年。近半个月来胸痛发作频繁, 休息或含服硝酸甘油效果欠佳, 1 天来与人争吵后胸痛 2 小时不缓解, 伴大汗来诊。心电图示 ST 段抬高, 出现病理性 Q 波。

79. 结合病史及心电图检查, 接诊护士应考虑病人的病情变化是

- A. 急性冠脉综合征
- B. 急性心肌梗死
- C. 变异型心绞痛
- D. 急性气管炎
- E. 急性肺栓塞

80. 急诊护士评估后认为病人目前最紧急的护理诊断是

- A. 知识缺乏
- B. 活动无耐力
- C. 活动受限
- D. 有感染的危险
- E. 疼痛

81. 给予病人的处理不妥的是

- A. 立即卧床休息
- B. 建立静脉通路遵医嘱给药
- C. 观察血压、脉率、体温、呼吸
- D. 吸氧
- E. 备好抢救的气管插管

(82~83 题共用题干)

患者, 女性, 27 岁。妊娠合并心脏病孕妇, 心功能 II 级, 足月入院待产。

82. 护士不正确的护理措施是

- A. 第二产程尽量缩短
- B. 胎儿娩出后立即腹部压沙袋
- C. 防止便秘
- D. 产后观察 1 小时后即送休养室
- E. 心理支持

83. 整个产程中, 该产妇心脏负担最重的时期是

- A. 第一产程

- B.第二产程
- C.第三产程
- D.第一产程末
- E.第二产程末

(84~86 题共用题干)

患者,男性,73 岁。河南林县人,因食管癌入院手术治疗,身高 1.75 m,体重 50 kg, P 85 次/分, R 18 次/分,既往吸烟 50 年,有一兄因食管癌去世。平时喜食腌制食品。

84.食管癌的好发部位是

- A.食管颈段
- B.食管上段
- C.食管中段
- D.食管下段
- E.食管腹段

85.病人术后可能出现的最严重的并发症是

- A.出血
- B.感染
- C.吻合口瘘
- D.乳糜胸
- E.反流性食管炎

86.此病人出院后 1 个月又出现吞咽不畅,可能的原因是

- A.反流性食管炎
- B.食管癌复发
- C.肠梗阻
- D.吻合口狭窄
- E.吻合口溃疡

(87~88 题共用题干)

小儿,3 岁。体温低热、食欲不振 1 天后,全身出现皮疹,且逐渐演变为水疱、脓疱。医生确诊为水痘,在家休养。

87.水痘皮疹的特点是

- A.分批连续出现
- B.24 小时波及全身
- C.自上而下蔓延

D.颜色由淡红发展至深红

E.愈后有米糠样脱屑

88.该小儿在家应隔离至

- A.出生后 5 天
- B.体温正常后 3 天
- C.无新出的皮疹
- D.全部结痂
- E.皮肤无水痘痕迹

(89~90 题共用题干)

患者,女性,35 岁。白带增多半年,近来出现性交后出血,妇科检查可见宫颈糜烂面明显凹凸不平,约占整个宫颈面积的 1/2,附件未见异常。

89.最适宜的诊断为

- A.单纯型重度糜烂
- B.颗粒型中度糜烂
- C.颗粒型重度糜烂
- D.乳突型中度糜烂
- E.乳突型重度糜烂

90.为排除宫颈癌,首选的检查项目是

- A.阴道分泌物悬滴检查
- B.宫颈活检
- C.宫颈碘试验
- D.宫腔镜检查
- E.宫颈刮片细胞学检查

91.确诊为宫颈糜烂后,最适宜的处理是

- A.口服抗生素
- B.宫颈锥切术
- C.阴道用药
- D.激光治疗
- E.阴道灌洗

92.该患儿首先应采取的措施是

- A.禁食,胃肠减压
- B.喂糖水
- C.稀释的牛奶
- D.少渣饮食
- E.低脂饮食

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(93~94 题共用备选答案)

- A. 肾上腺素
- B. 利多卡因
- C. 阿托品
- D. 去甲肾上腺素
- E. 普萘洛尔

93. 常用于抑制室性心律失常的药物是

94. 常用于解除迷走神经心脏作用的药物是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 先兆子宫破裂
- B. 胎盘剥离征象
- C. 子宫破裂
- D. 羊水栓塞
- E. 胎盘嵌顿

95. 子宫出现病理缩复环,血尿见于

96. 产后突然发生寒战、呼吸困难、发

绀为

(97~98 题共用备选答案)

- A. 骨肉瘤
- B. 骨瘤
- C. 骨巨细胞瘤
- D. 骨囊肿
- E. 骨软骨瘤

97. 非原发性骨肿瘤包括

98. 最常见的良性骨肿瘤是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 血性溢液
- B. 棕褐色溢液
- C. 黄绿色溢液
- D. 棕黑色溢液
- E. 黄褐色溢液

99. 乳管内乳头状瘤的溢液是

100. 乳管内癌的溢液是



考前点睛班