

**2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)  
考前压轴密卷**

**内科护理学**

**模拟试卷(一)**

金英杰国家医学考试研究中心 编



## 答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

## 模拟试卷(一)

### 基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 关于巨幼细胞贫血的实验室检查结果,不妥的是
  - 属大细胞性贫血
  - 白细胞、血小板增生显著
  - 骨髓检查见红系增生活跃,可见各阶段巨幼红细胞
  - 血清维生素 B 低于正常
  - 血清叶酸低于正常值
- 欲衡量小儿营养状况,首先应做下列哪项检查
  - 头围
  - 测体重
  - 身长的测量
  - 上、下部量
  - 坐高
- 我国流行性乙脑的流行季节主要是
  - 春季
  - 春夏季
  - 夏秋季
  - 秋冬季
  - 冬季
- 用农历计算预产期,应如何推算
  - 月份减 3 或加 9,日期加 7
  - 月份减 3 或加 9,日期加 8
  - 月份减 3 或加 9,日期加 10
  - 月份减 3 或加 9,日期加 13
  - 月份减 3 或加 9,日期加 15
- 初乳具有下列特点,但除外
  - 是产后 5~7 天分泌的乳汁
  - 量足
  - 含蛋白质多,脂肪少
  - 富含免疫物质
  - 有生长发育调节因子
- 支气管自哪级开始参与气体交换
  - 支气管
  - 终末细支气管
  - 呼吸性细支气管
  - 肺泡管
  - 肺泡囊
- 中央型肺癌一般是指发生在
  - 主支气管
  - 叶支气管
  - 段支气管
  - 段支气管以下主支气管
  - 段支气管以上主支气管
- 高钾血症的原因不包括
  - 静脉补钾过快
  - 急性肾功能衰竭
  - 输入大量库存血
  - 持续胃肠减压
  - 代谢性酸中毒
- 下列不属于冠心病危险因素的是
  - 高血压
  - 血脂异常
  - 女性绝经期前
  - 40 岁以上
  - 吸烟
- 对胰腺癌有定性诊断意义的是
  - 超声波
  - CT

- C. 癌胚抗原测定  
 D. 细胞学检查  
 E. X 线造影
11. 慢性胃炎的确诊依据是  
 A. 胃液分析  
 B. X 线钡餐  
 C. 胃镜检查  
 D. 腹部 B 超  
 E. 腹部 CT
12. 新生儿出生后, 开始喂哺母乳时间是  
 A. 15~30 分钟  
 B. 3~4 小时  
 C. 6~8 小时  
 D. 12 小时  
 E. 24 小时
13. 下列属于临产标志的是  
 A. 见红, 规律宫缩, 胎头下降  
 B. 规律宫缩, 破膜, 胎头下降  
 C. 见红, 破膜, 宫口扩张  
 D. 见红, 破膜, 规律宫缩  
 E. 规律宫缩, 胎头下降, 宫口扩张
14. 新生儿胎粪的特点是  
 A. 褐色、干厚  
 B. 金黄色、糊状  
 C. 陶土色、软膏状  
 D. 淡黄色水样便  
 E. 墨绿色、黏稠状
15. 结肠癌最常见的组织学类型是  
 A. 黏液癌  
 B. 腺癌  
 C. 未分化癌  
 D. 黏液腺癌  
 E. 类癌
16. 引起再生障碍性贫血最多见的药物是  
 A. 阿司匹林  
 B. 柔红霉素  
 C. 氯霉素  
 D. 保泰松
- E. 环磷酰胺
17. 麻疹的主要传播途径是  
 A. 血液传播  
 B. 呼吸道传播  
 C. 消化道传播  
 D. 皮肤接触传播  
 E. 间接传播
18. 好发于儿童的卵巢肿瘤是  
 A. 无性细胞瘤  
 B. 内胚窦瘤  
 C. 畸胎瘤  
 D. 颗粒细胞瘤  
 E. 勃勒纳瘤
19. 乳腺淋巴结转移的常见部位是  
 A. 锁骨上淋巴结  
 B. 锁骨下淋巴结  
 C. 患侧腋下淋巴结  
 D. 健侧腋下淋巴结  
 E. 胸骨旁淋巴结
20. 大便潜血持续阳性多提示  
 A. 浅表性胃炎  
 B. 萎缩性胃炎  
 C. 胃溃疡  
 D. 十二指肠壶腹部溃疡  
 E. 胃癌
21. 属于特异性感染的是  
 A. 金黄色葡萄球菌感染  
 B. 大肠埃希菌感染  
 C. 铜绿假单胞菌感染  
 D. 乙型溶血性链球菌感染  
 E. 破伤风芽胞梭菌感染
22. 女性生命中可发育成熟的卵泡数目是  
 A. 200 个或以下  
 B. 200~300 个  
 C. 300~400 个  
 D. 400~500 个  
 E. 500 个以上
23. 心肺复苏后, 最常见的继发性病理改

变是

- A. 心肌缺氧性损伤
- B. 肺透明膜形成
- C. 脑缺氧性损伤
- D. 急性胃黏膜糜烂
- E. 肾小管上皮细胞大量坏死

24. 诊断外伤性血气胸最简便可靠的依据是

- A. 病人出现呼吸困难及低血容量症状
- B. 胸腔穿刺抽出血液和气体
- C. X线检查患侧大片密度增高阴影
- D. 叩诊患侧为浊音,呼吸音减弱
- E. 胸部超声探查见有液平面

25. 颅内压的正常范围是

- A. 0.4~0.6 kPa (40~60 mmH<sub>2</sub>O)
- B. 0.7~2.0 kPa (70~200 mmH<sub>2</sub>O)
- C. 2.1~2.8 kPa (210~280 mmH<sub>2</sub>O)
- D. 2.8~3.6 kPa (280~360 mmH<sub>2</sub>O)
- E. 3.7~4.6 kPa (370~460 mmH<sub>2</sub>O)

26. 属于高渗性脱水病理生理特点的是

- A. 失钠>失水
- B. 失水>失钠
- C. 失水=失钾
- D. 失钾<失水
- E. 失钠>失钾

27. 肠梗阻时,肠腔积液主要来自

- A. 经口饮入尚未被吸收的水
- B. 梗阻近端的胃肠分泌物
- C. 肠腔渗出液
- D. 肠壁血管漏出液
- E. 肠壁炎症渗出液

28. 肝癌特异性的血清标志物是

- A. 谷氨酰转肽酶
- B. 甲胎蛋白
- C. 谷丙转氨酶
- D. 乳酸脱氢酶同工酶
- E.  $\alpha$ -抗胰蛋白酶

29. 有家族史的卵巢癌患者为

- A. 8%~12%

- B. 15%~20%

- C. 20%~25%

- D. 25%~30%

- E. 35%以上

30. 卵巢良性肿瘤中临床最常见的是

- A. 脂肪瘤
- B. 黏液性囊腺瘤
- C. 纤维瘤
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 成熟畸胎瘤

31. 与胆道蛔虫病发病无关的是

- A. 胃肠道功能紊乱
- B. 恶心、呕吐
- C. 体温升高
- D. 运动
- E. 驱虫不当

32. 主动脉瓣狭窄引起心功能代偿最主要的是

- A. 心脏节律改变
- B. 左心室肥厚
- C. 回心血容量增加
- D. 左心室腔扩大
- E. 右心房扩张

33. 引起左心室后负荷增加的主要因素是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 静脉回流增加
- C. 相对性主动脉瓣狭窄
- D. 外周血管阻力增加
- E. 动脉血容量增加

34. 急性胃炎按病因及病理变化的不同,分为不同类型,其中最常见的是

- A. 溃疡型
- B. 糜烂型
- C. 单纯型
- D. 出血型
- E. 感染型

35. 慢性支气管炎病情加剧的重要因素是

- A.大气污染  
 B.粉尘刺激  
 C.吸烟  
 D.反复感染  
 E.过敏
- 36.临床诊断新生儿低血糖标准为:血糖<
- A.1.2 mmol/L  
 B.1.67 mmol/L  
 C.2.2 mmol/L  
 D.3.2 mmol/L  
 E.3.67 mmol/L
- 37.引起上呼吸道感染的最常见病原体是
- A.革兰阳性细菌  
 B.病毒  
 C.肺炎支原体  
 D.肺炎衣原体  
 E.真菌
- 38.常见引起胃泌素升高的疾病是
- A.十二指肠球部溃疡  
 B.单纯型胃炎  
 C.胃溃疡  
 D.糜烂型胃炎  
 E.慢性萎缩性胃体胃炎
- 39.典型心绞痛的诱因中,应该除外
- A.情绪激动  
 B.贫血  
 C.体力劳动  
 D.睡眠  
 E.甲亢
- 40.患者被诊断为子痫前期轻度,其 24 小时尿蛋白定量超过
- A.0.15 g  
 B.0.3 g  
 C.0.4 g  
 D.0.5 g  
 E.0.7 g
- 41.先天性巨结肠的发病机制主要由于
- A.结肠的平滑肌发育不良  
 B.结肠交感神经丛发育不良  
 C.扩张结肠部分的平滑肌和弹力纤维发育不良  
 D.结肠肠壁的肌间神经节细胞缺失  
 E.病变发生在结肠近端
- 42.对判断新生儿缺血缺氧性脑病的预后有一定参考价值的检查是
- A.神经元特异性烯醇化酶  
 B.脑电图  
 C.头颅 B 超  
 D.CT 扫描  
 E.核磁共振
- 43.妊娠期 B 超监护不能显示的项目是
- A.胎肺成熟度  
 B.胎方位  
 C.有无胎心搏动  
 D.胎头双顶径  
 E.胎盘位置
- 44.可提示功血的发生是由于黄体功能不足的检查为
- A.基础体温呈单相型  
 B.基础体温呈双相型,但上升缓慢,高温相 10 天  
 C.经前宫颈黏液结晶检查出现羊齿植物叶状结晶  
 D.经前血清孕酮值处在卵泡期水平  
 E.经前阴道脱落细胞涂片表现为中高度雌激素作用
- 45.关于复方短效口服避孕药避孕机制的说法,错误的是
- A.抑制排卵  
 B.通过异物的局部效应发挥作用  
 C.改变子宫内膜形态与功能,不适于受精卵着床  
 D.改变宫颈黏液性状使黏液量少、黏度增高,不利精子穿透  
 E.受持续的雌、孕激素作用,输卵管的正常分泌和蠕动频率发生改变,从而改变受

精卵正常的运行速度

46.患者,女性,47岁。因子宫内膜癌行全子宫、双附件切除术及盆腔淋巴清扫术,术后48小时拔除尿管后自行排尿,第3天起阴道有尿液流出,同时仍可自行排尿,临床诊断为尿瘘,为明确瘘孔,不需做的辅助检查是

- A.宫腔镜检查
- B.靛胭脂试验
- C.输尿管镜检查
- D.排泄性尿路造影
- E.肾显像

47.吸气性呼吸困难严重者可出现三凹征,三凹征是指

A.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

B.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷

C.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在吸气时明显下陷

D.胸骨下窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

E.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在呼气时明显下陷

48.形成慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A.慢性支气管炎
- B.支气管哮喘
- C.支气管扩张
- D.肺结核
- E.肺间质纤维化

49.抗结核化学药物治疗的治疗原则是

- A.早期、联合、足量、规律、全程
- B.早期、联合、足量、规律、长期
- C.早期、联合、适量、规律、全程
- D.早期、联合、适量、规律
- E.早期、联合、适量、全程

50.诊断呼吸衰竭的正确依据是

- A.发绀,呼吸困难

B.肺通气功能明显减退

C.呼吸的节律、频率和幅度发生改变

D.结膜充血、水肿和精神、神经症状

E.  $\text{PaCO}_2 > 6.6 \text{ kPa}$  (50 mmHg)、 $\text{PaO}_2 <$

8.0 kPa(60 mmHg)

51.干性支气管扩张的唯一症状是

- A.慢性咳嗽
- B.大量脓痰
- C.咯血
- D.咳痰与体位变化有关
- E.呼吸困难

52.可以导致心脏压力负荷加重的疾病是

- A.主动脉瓣关闭不全
- B.室间隔缺损
- C.甲状腺功能亢进
- D.肺动脉高压
- E.慢性贫血

53.室性期前收缩的心电图特征不包括

- A.提前出现的QRS波群
- B.QRS波群时限超过0.12秒
- C.QRS波宽大畸形
- D.QRS前有P波
- E.代偿间歇完全

54.急性心肌梗死最基本的病因是

- A.体力活动
- B.情绪激动
- C.血压剧升
- D.冠状动脉张力增高
- E.冠状动脉粥样硬化

55.目前最佳的系统性红斑狼疮筛选试验是

- A.狼疮细胞检查
- B.皮肤狼疮带试验
- C.抗核抗体检查
- D.血清补体测定
- E.毛细血管镜检查

56.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性

- A. 不变  
 B. 升至正常人的 70% 以上  
 C. 降至正常人的 70% 以下  
 D. 升至正常人的 90% 以上  
 E. 降至正常人的 90% 以下
57. 患者, 男性, 被汽车撞伤右胸部, 呼吸 20 次/分, 胸部 X 线检查示: 右侧气胸, 肺受压 20%, 处理原则是
- A. 胸穿排气  
 B. 观察病情  
 C. 胸腔闭式引流  
 D. 牵引固定  
 E. 手术治疗
58. 诊断膀胱肿瘤最重要、不可或缺的方法是
- A. 膀胱镜检查  
 B. 膀胱造影  
 C. 双合诊检查  
 D. 尿脱落细胞检查  
 E. 尿道超声检查
59. 骨巨细胞瘤属于
- A. 骨瘤样病损  
 B. 良性肿瘤  
 C. 继发性肿瘤  
 D. 恶性肿瘤  
 E. 潜在恶性肿瘤
60. 擦伤的特点是
- A. 皮下淤血、肿胀  
 B. 皮肤水肿  
 C. 表皮破损  
 D. 皮肤呈多数小裂口及浆液渗出  
 E. 创缘较平整, 出血可渗可涌
61. 供移植器官的保存原则是
- A. 常温保存  
 B. 低温原则  
 C. 延长热缺血时间  
 D. 变冷缺血为热缺血  
 E. 中断血流后不应立即降温
62. 乳腺癌最常见的病理类型是
- A. 非浸润性癌  
 B. 早期浸润性癌  
 C. 浸润性特殊癌  
 D. 浸润性非特殊癌  
 E. 其他罕见癌
63. 腺病毒肺炎的发病年龄多见于
- A. 新生儿  
 B. 2~6 个月婴儿  
 C. 6~12 个月婴儿  
 D. 6~24 个月婴儿  
 E. 任何年龄
64. 猩红热治疗首选抗生素是
- A. 红霉素  
 B. 青霉素  
 C. 新霉素  
 D. 庆大霉素  
 E. 四环素
65. 符合正常卵巢临床特征的是
- A. 成年女性卵巢约 4 cm × 3 cm × 1 cm 大小  
 B. 卵巢由骨盆漏斗韧带与子宫相连  
 C. 卵巢髓质内有数以万计的原始卵泡  
 D. 位于阔韧带内  
 E. 卵巢白膜是一层立方上皮
66. 胎儿纵轴与母体纵轴的关系称为
- A. 胎姿势  
 B. 胎儿位置  
 C. 胎产式  
 D. 胎先露  
 E. 胎方位
67. 软产道裂伤多见于
- A. 阴道手术操作不当  
 B. 胎盘植入  
 C. 凝血功能障碍  
 D. 软产道充分扩张  
 E. 产程延长
68. 可以早期鉴别葡萄胎和侵蚀性葡萄胎的检查是
- A. 胸部 X 线摄片



- B.刮宫葡萄胎标本  
C.B超及彩色多普勒  
D.子宫输卵管造影术或宫腔镜  
E.血清 $\beta$ -hCG检测
- 69.引起支气管扩张的最常见病因是  
A.支气管先天性发育缺陷  
B.支气管外部纤维的牵拉  
C.支气管-肺组织感染和阻塞  
D.遗传因素  
E.机体免疫功能失调
- 70.不属于非特异性感染病原体的是  
A.大肠杆菌  
B.结核杆菌  
C.金黄色葡萄球菌  
D.乙型溶血性链球菌  
E.铜绿假单胞菌
- 71.患者,男性,77岁。高血压数年,近月来睡眠不佳,排尿困难,体重下降,且有腹部不适感,左侧腹股沟区出现肿块并逐渐增大,可进入阴囊,考虑该患者可能是腹股沟疝,与发病有关的因素是  
A.高血压数年  
B.睡眠不佳  
C.排尿困难  
D.腹部不适  
E.体重下降
- 72.肾病综合征最根本的病理生理特点是  
A.水肿  
B.蛋白尿  
C.低蛋白血症  
D.血清胆固醇增高  
E.低密度脂蛋白增高
- 73.膀胱炎的特征性表现不包括  
A.尿频  
B.尿急  
C.尿痛  
D.排尿困难  
E.晨尿有氨臭味
- 74.患者,女性,55岁。行ECG检查示:P波消失,代之是400次/分左右的f波,QRS波形态正常,QRS波群间隔绝对不规则,心室率通常在每分钟110次,从心电图可诊断  
A.房扑  
B.室扑  
C.房颤  
D.室上速  
E.室速
- 75.患者,男性,56岁。半年前因原发性肝癌行右半肝切除术,手术后建议其门诊定期随访。最能早期预测癌肿复发的检查是  
A.ALT  
B.GGT  
C.B型超声检查  
D.选择性肝动脉造影  
E.动态监测AFP的变化
- 76.我国引起慢性肾衰竭的最常见疾病是  
A.慢性肾盂肾炎  
B.慢性肾小球肾炎  
C.狼疮性肾炎  
D.高血压肾病  
E.糖尿病肾病
- 77.诊断贫血时血红蛋白含量正确的是  
A.男性 $<160$  g/L,女性 $<150$  g/L  
B.男性 $<150$  g/L,女性 $<140$  g/L  
C.男性 $<140$  g/L,女性 $<130$  g/L  
D.男性 $<130$  g/L,女性 $<120$  g/L  
E.男性 $<120$  g/L,女性 $<110$  g/L
- 78.确诊CO中毒最主要的依据是  
A.CO接触史  
B.口唇颜色  
C.血液中碳氧血红蛋白含量  
D.昏迷的深度  
E.缺氧的程度
- 79.对休克的认识正确的是  
A.休克就是动脉血压下降的情况  
B.休克就是心排出量减少的情况

C. 休克就是各种原因引起的组织灌注不足和细胞缺氧的结果

D. 休克就是心力衰竭

E. 休克是遭受打击后意识丧失

80. 应用复苏药物的目的不包括

A. 防治感染

B. 防治心律失常

C. 纠正急性酸中毒

D. 补充血容量和电解质

E. 防治脑水肿

81. 判断甲状腺功能亢进患者病情程度的主要指标是

A. 食欲亢进程度

B. 脉率增快和脉压增大的程度

C. 突眼程度

D. 甲状腺肿大程度

E. 体重减轻程度

82. 腹膜刺激征是指

A. 压痛、反跳痛、肌紧张

B. 肠鸣音亢进、压痛、反跳痛

C. 肠鸣音消失、腹痛、腹泻

D. 板状腹、压痛、腹泻

E. 反射性呕吐、恶心、腹泻

83. X 线检查可见气液平面及胀气肠袢的时间在肠梗阻发生后

A. 1~2 小时

B. 2~4 小时

C. 4~6 小时

D. 6~8 小时

E. 8~10 小时

84. 不符合肺炎克雷伯杆菌肺炎临床特点的是

A. 白红细胞正常或增加

B. 咳嗽, 咳红棕色胶冻状痰

C. 青壮年多见, 预后良好

D. 起病急、胸痛、畏寒

E. 对庆大霉素及第三代头孢菌素敏感

85. 患者, 男性, 54 岁。于晚餐后突发上腹持续性剧痛。考虑急性胰腺炎, 其血清淀粉酶升高的规律是

A. 发病后 2 小时开始升高, 12 小时达高峰

B. 发病后 1~2 小时开始升高, 24 小时达高峰

C. 发病后 24 小时开始升高, 48 小时达高峰

D. 发病后 12 小时开始升高, 72 小时达高峰

E. 发病后 48 小时开始升高, 72 小时达高峰

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(86~87 题共用备选答案)

A. 脐部

B. 呼吸道

C. 消化道

D. 皮肤

E. 胎盘

86. 新生儿感染性肺炎出生前的常见感染途径是

87. 新生儿感染性肺炎出生后的常见感染途径是

(88~90 题共用备选答案)

A. 游离移植

B. 带蒂移植

C. 吻合移植

D. 输注移植

E. 联合移植

88. 游离皮片移植属于

89. 肾移植属于

90. 骨髓移植属于

(91~92 题共用备选答案)

- A.尿培养  
B.痰培养  
C.血培养  
D.粪便培养  
E.骨髓培养
- 91.确诊伤寒最常用的方法是  
92.细菌性痢疾的确诊依据是  
(93~95 题共用备选答案)
- A.窦前  
B.窦后  
C.窦内  
D.肝前  
E.肝后
- 93.肝炎后肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在  
94.血吸虫肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在  
95.肝静脉阻塞综合征所致门静脉高压症的主要阻塞部位在  
(96~97 题共用备选答案)
- A.血红蛋白 30~60 g/L  
B.血红蛋白<120 g/L  
C.血红蛋白<110 g/L  
D.血红蛋白 90~120 g/L  
E.血红蛋白 145 g/L
- 96.6 个月至 6 岁小儿贫血的诊断标准是  
97.6~14 岁小儿贫血的诊断标准是  
(98~100 题共用备选答案)
- A.圆韧带  
B.主韧带  
C.阔韧带  
D.宫骶韧带  
E.骨盆漏斗韧带
- 98.固定子宫颈于正常位置的韧带是  
99.间接保持子宫呈前倾位置的韧带是  
100.维持子宫在盆腔正中央的韧带是



## 相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 不属于艾滋病传播途径的是
  - A. 同性性接触
  - B. 异性性接触
  - C. 同桌进餐
  - D. 输血
  - E. 分娩
2. 移位菌群失调的原因不包括
  - A. 使用抗菌药物不恰当
  - B. 外科手术
  - C. 插管或介入治疗
  - D. 免疫功能降低
  - E. 细菌结构变化
3. 治疗鹅口疮错误的是
  - A. 2% 碳酸氢钠液擦洗口腔
  - B. 积极治疗原发病
  - C. 局部涂甲紫
  - D. 加大抗生素剂量
  - E. 局部应用抗真菌药物
4. 无菌物品的保存方法不当的是
  - A. 储物架及运送车要保持干净
  - B. 无菌物品应有合格标志,并标明灭菌日期
  - C. 快速压力蒸汽灭菌物品不论是否潮湿,均可保存 7~14 天
  - D. 储藏房间要保持湿式清扫,避免扬尘
  - E. 无菌物品应与未无菌物品分开存放
5. 下列沟通障碍的原因中不属于发送者障碍的有
  - A. 目的不明,导致信息内容的不确定性
  - B. 表达模糊,导致信息传递错误
  - C. 选择失误,导致信息误解的可能性增大
  - D. 言行不当,导致信息理解错误
  - E. 过度加工,导致信息的模糊或失真
6. 传染病区设置隔离室的主要目的是
  - A. 为病人提供良好的休息环境
  - B. 便于对病人进行监护
  - C. 将感染源与传播的途径分开
  - D. 将感染源与易感宿主从空间上分开
  - E. 方便家属探视
7. 医院感染暴发中流行病学处理的基本步骤,前三步是
  - A. 证实流行或暴发→查找感染源→查找引起感染的因素
  - B. 证实流行或暴发→组织落实有效的控制措施→写出调查报告
  - C. 查找感染源→证实流行或暴发→查找引起感染的因素
  - D. 查找引起感染的因素→证实流行或暴发→查找感染源
  - E. 查找感染源→查找引起感染的因素→证实流行或暴发
8. 口腔科的牙钻属于
  - A. 高度危险性物品
  - B. 中度危险性物品
  - C. 低度危险性物品
  - D. 高度水平消毒物品
  - E. 中度水平消毒物品
9. 当为某冠心病病人进行健康教育时,病人向你表达了他认为吸烟对他的健康不会产生影响,所以即使在患病期间,他仍然不想戒烟,病人的这种行为受到了哪类因素的影响
  - A. 倾向因素
  - B. 促成因素
  - C. 强化因素
  - D. 环境因素
  - E. 学习因素
10. 资源评估属于
  - A. 管理与政策诊断

- B.组织诊断  
C.环境诊断  
D.社会诊断  
E.行为诊断
- 11.下列化学消毒剂中,可用于空气消毒的是
- A.2%戊二醛  
B.75%乙醇  
C.2%过氧乙酸  
D.3%过氧化氢  
E.0.5%氯己定
- 12.不耐热、不耐湿的物品消毒宜选用
- A.环氧乙烷气体熏蒸  
B.紫外线照射法  
C.高压蒸汽法  
D.消毒液浸泡法  
E.电离辐射法
- 13.关于控制的叙述,错误的是
- A.监视各项活动以保证它们按计划进行并纠正各种重要偏差的过程  
B.控制的重要性包括在执行组织计划中的保障作用和和管理职能中的关键作用  
C.控制的类型包括前馈控制、同期控制和反馈控制  
D.控制的基本过程包括建立标准、衡量绩效和纠正偏差  
E.控制的基本方法包括预算控制、质量控制、进度控制和数据控制
- 14.对病人最后的护理结果的质量评价属于
- A.基础质量管理  
B.成效管理  
C.环节质量管理  
D.过程质量管理  
E.终末质量管理
- 15.近中期效果评价是指
- A.形成评价  
B.过程评价  
C.效应评价  
D.结局评价  
E.总结评价
- 16.注射后处理针头的方法错误的是
- A.用过的针头采用双手“复帽”  
B.不将针尖指向身体任何部位  
C.使用后不用手去除针头  
D.将针头放入防水耐刺穿的容器内  
E.用过的针头不再重复使用
- 17.属于原位菌群二度失调的是
- A.正常菌群在原有部位发生了数量的暂时性变化  
B.正常菌群在原有部位发生了种类结构的暂时性变化  
C.正常菌群在原有部位比例发生了病理性波动  
D.正常菌群转移到另一部位定植或定居  
E.可逆性失调
- 18.连续使用的氧气湿化瓶应
- A.每周消毒 2 次,用后终末消毒,干燥保存  
B.每日清洁,用后消毒,干燥保存  
C.每日消毒,用后终末消毒,干燥保存  
D.每周 1 次消毒,用后终末消毒,干燥保存  
E.专人专用,用后进行终末消毒
- 19.护理管理的实践性下列哪句不妥
- A.护理工作时间性强,要按时完成护理服务  
B.护理工作面广量大,护士常处于劳累状态  
C.护理工作要保证 24 小时连续不间断  
D.护理工作责任性强,护士常处于紧张状态  
E.护士为护理对象提供健康服务就是管理过程
- 20.微生物从外界环境落到人体,并在一定部位不断生长、繁殖后代,这种现象称为
- A.植入  
B.转移  
C.定植

- D.定居  
E.易位
- 21.根据标准预防的概念,下列不被看作具有传染性的物质是
- A.粪便和尿液  
B.体液  
C.分泌物  
D.血液  
E.汗液
- 22.科学管理理论的基本出发点为
- A.提高劳动生产率  
B.实行科学化管理  
C.调动人的积极性  
D.体现公平的分配制度  
E.建立健全的管理系统
- 23.护理部根据护理专业的发展变化及时调整工作模式,遵循的动态管理原则是
- A.系统原则  
B.效益原则  
C.弹性原则  
D.人本原则  
E.价值原则
- 24.感染病人使用后的器械,正确的处理程序是
- A.消毒、去污、清洗、灭菌  
B.去污、清洗、消毒、灭菌  
C.清洗、去污、消毒、灭菌  
D.去污、消毒、清洗、灭菌  
E.清洗、灭菌、消毒、去污
- 25.在确定健康教育的计划目标时错误的是
- A.总体目标必须最终得以实现  
B.具体目标是由三个“W”和两个“H”组成  
C.总体目标是宏观的,较为笼统的  
D.总体目标可分解为多个具体目标  
E.具体目标是一些具体的量化的指标
- 26.危害健康的行为不包括
- A.高脂高糖低纤维素饮食  
B.A型行为  
C.不良生活习惯  
D.戒烟  
E.C型行为
- 27.除下列哪项外,均是采用观察法收集的资料
- A.测量患者的体温  
B.听右下肺有无湿啰音  
C.触摸皮肤温度、湿度  
D.阅读患者的查体记录  
E.查看患者尿液的颜色
- 28.可达到高水平消毒法的是
- A.聚维酮碘  
B.苯扎溴铵  
C.过氧化氢  
D.氯己定  
E.乙醇
- 29.喹诺酮类抗菌药的主要作用机制是
- A.干扰细菌细胞壁合成  
B.损伤细胞膜  
C.影响细菌蛋白质的合成  
D.抑制细菌核酸的形成  
E.抑制固醇类药物的合成
- 30.真菌引起的医院感染中,最常见的致病菌是
- A.毛霉菌  
B.隐球菌  
C.光滑念珠菌  
D.白色念珠菌  
E.李斯特菌
- 31.社交距离通常是指
- A.1.2~4 m  
B.4 m 以外  
C.50~120 cm  
D.50 cm 以内  
E.100 cm 以内
- 32.基础护理合格率的评价属于
- A.基础质量评价  
B.服务质量评价  
C.环节质量评价  
D.过程质量评价

- E. 终末质量评价
33. 下列属于高度危险物品的是
- A. 胃镜  
B. 体温表  
C. 便盆  
D. 导尿管  
E. 压舌板
34. 经粪-口途径传播的肝炎病毒有
- A. 甲型、丙型肝炎病毒  
B. 甲型、戊型肝炎病毒  
C. 乙型、丙型肝炎病毒  
D. 丙型、戊型肝炎病毒  
E. 甲型、乙型肝炎病毒
35. 下列区域物体表面消毒不合格的是
- A. 普通手术室, 细菌总数  $\leq 5$  cfu/cm<sup>2</sup>, 未检出致病菌  
B. 急诊抢救室, 细菌总数  $\leq 10$  cfu/cm<sup>2</sup>, 未检出致病菌  
C. 肝炎病房, 细菌总数  $\leq 15$  cfu/cm<sup>2</sup>, 未检出致病菌  
D. 注射室, 细菌总数  $\leq 15$  cfu/cm<sup>2</sup>, 未检出致病菌  
E. 新生儿室的工作人员, 细菌总数  $\leq 5$  cfu/cm<sup>2</sup>, 未检出致病菌
36. 手术前需预防性使用抗生素的是
- A. 经阴道子宫切除术  
B. 甲状腺手术  
C. 疝修补术  
D. 子宫肌瘤切除术  
E. 扁桃体摘除术
37. 我国护理管理标准规定一级医院医师与护理人员之比为
- A. 1 : 2  
B. 1 : 3  
C. 1 : 4  
D. 1 : 1  
E. 2 : 3
38. 被公认为“科学管理之父”的管理学家是
- A. 卢因  
B. 泰勒  
C. 韦伯  
D. 亚当斯  
E. 梅奥
39. 医疗用品污染后的危害程度可分为几类
- A. 1 类  
B. 3 类  
C. 5 类  
D. 7 类  
E. 9 类
40. “爱探究、好攻击、易激惹、喜欢自我表现”属于哪一行为发展阶段的主要表现
- A. 被动发展阶段  
B. 主动发展阶段  
C. 自主发展阶段  
D. 巩固发展阶段  
E. 自我发展阶段
41. 不属于目标管理局限性的是
- A. 目标制定有难度  
B. 限制管理者能力发挥  
C. 缺乏灵活性  
D. 常忽视成本估计  
E. 缺乏连续性
42. 随着计算机技术的日益成熟和广泛应用, 管理幅度管理层的理论也发生着革命性的变化, 不符合目前变化的是
- A. 中层管理功能正逐渐由计算机完成  
B. 组织管理幅度变宽  
C. 组织管理层级变少  
D. 组织日益由扁平化走向高耸型  
E. 信息传递加快
43. 组织图不能提供的信息是
- A. 指挥关系  
B. 人、财、物的流向  
C. 管理幅度  
D. 集中与分散  
E. 组织规模
44. 护理人才结构的群体结构不包括
- A. 专业结构

- B.能级结构  
 C.年龄结构  
 D.知识结构  
 E.智能结构
- 45.“条条大路通罗马”描述的有效沟通的策略是
- A.避免一味说教  
 B.使用恰当的沟通方式  
 C.考虑接受者的观点和立场  
 D.以行动强化语言  
 E.充分利用反馈机制
- 46.不属于协调基本要求的是
- A.及时协调与连续协调相结合  
 B.从根本上解决问题  
 C.调动当事者的积极性  
 D.以大多数人的利益为主  
 E.相互尊重
- 47.病房护士长最有效的监督方法是
- A.听取所有护士的汇报  
 B.直接观察  
 C.指派专人监督  
 D.护士之间相互尊重  
 E.护士之间相互监督
- 48.质量观的演变过程中,提出“全面顾客满意”概念的阶段是
- A.“符合性质量”阶段  
 B.“适用性质量”阶段  
 C.“满意性质量”阶段  
 D.“卓越性质量”阶段  
 E.“全面质量满意”阶段
- 49.在护理质量管理中树立“第一次把事情做对”观念的护理质量管理基本原则是
- A.以患者为中心原则  
 B.预防为主原则  
 C.工作标准“零缺陷”原则  
 D.全员参与原则  
 E.基于事实的决策方法原则
- 50.按教育目的或内容进行分类,不属于健康教育研究领域范畴的是
- A.学校健康教育  
 B.防治疾病健康教育  
 C.营养健康教育  
 D.环境保护健康教育  
 E.生殖健康教育
- 51.对信息和讯息的界定不正确的是
- A.讯息是一种信息  
 B.信息泛指人类社会传播的一切内容  
 C.讯息传播产生传、受双方有意义的交换  
 D.讯息传播产生传、受双方之间的互动  
 E.讯息是由信息符号构成的抽象信息
- 52.小组讨论时,一般适宜的小组人数为
- A.2~5人  
 B.3~6人  
 C.6~10人  
 D.10~15人以上  
 E.15~20人
- 53.患者在门诊诊疗过程中接受的健康教育称为
- A.住院教育  
 B.病房教育  
 C.随访教育  
 D.门诊教育  
 E.入院教育
- 54.在实施患者健康教育时,首先要进行的是
- A.确定患者教育目标  
 B.分析患者的需求  
 C.制订患者教育计划  
 D.考虑患者教育的形式  
 E.评价教育需求
- 55.属于医院获得性感染的是
- A.新生儿呕吐  
 B.新生儿水痘  
 C.新生儿红斑  
 D.新生儿黄疸  
 E.新生儿脐红
- 56.影响人体微生态平衡的因素不包括
- A.免疫系统疾病  
 B.腰穿



- C.长期服用抗生素  
D.慢性咽炎  
E.长期静脉输液
- 57.紫外线灯照射强度监测至少应
- A.每月一次  
B.每季度一次  
C.每半年一次  
D.每年一次  
E.每一年半一次
- 58.医务人员应立即洗手的条件是
- A.接触患者的分泌物前  
B.接触患者的血液前  
C.脱去污染手套后  
D.接触同一个患者身体的同一部位时  
E.接触污染器械前
- 59.甲型肝炎传播途径不包括
- A.粪-口途径  
B.密切接触  
C.垂直传播  
D.粪便污染食物  
E.粪便污染水源
- 60.乙型肝炎的传播途径是
- A.通过共同就餐传播  
B.通过拥抱传播  
C.通过共用牙刷和剃刀  
D.通过空气传播  
E.通过握手传播
- 61.系统的特性不包括
- A.整体性  
B.目的性  
C.相关性  
D.内部适应性  
E.层次性
- 62.护理仪器设备的维护计划是
- A.战略性计划  
B.战术性计划  
C.综合性计划  
D.长期计划  
E.短期计划
- 63.目标管理的基本精神是

- A.以自我管理为中心  
B.员工参与管理  
C.重视成果  
D.强调自我评价  
E.以共同制定的目标为依据
- 64.沟通障碍中属于接受者障碍的是
- A.目的不明  
B.表达模糊  
C.选择失误  
D.过度加工  
E.言行不当
- 65.有效沟通策略中不正确的是
- A.使用正式沟通的方式  
B.考虑接受者的观点和立场  
C.充分利用反馈机制  
D.以行动强化语言  
E.避免一味说教
- 66.正确的谈话技巧是
- A.善于掌控下属发言内容  
B.善于启发下属聆听,控制情绪  
C.善于启发下属讲真情实话  
D.善于抓住所有问题  
E.善于规避敏感话题
- 67.医疗护理所用材料及药品购买控制,其控制的对象类型是
- A.作业  
B.人员  
C.信息  
D.财务  
E.组织绩效
- 68.不属于护理管理控制关键点的是
- A.高危时间  
B.高危患者  
C.高危护士  
D.关键制度  
E.所有科室
- 69.获取患者满意程度的最佳方式是
- A.问卷调查  
B.电话随访  
C.患者投诉

- D.与患者直接沟通  
E.第三方调查
- 70.健康促进的三个基本策略是  
A.提倡、协调、控制  
B.提倡、赋权、协助  
C.控制、赋权、协调  
D.控制、赋权、倡导  
E.倡导、赋权、协调
- 71.不属于健康促进活动领域的是  
A.制定促进健康的公共政策  
B.描述人群的健康状况  
C.发展个人技能  
D.加强社区行动  
E.调整卫生服务方向
- 72.人的行为的基本构成要素有行为主体、行为客体、行为环境、行为手段和  
A.行为动机  
B.行为目的  
C.行为计划  
D.行为过程  
E.行为结果
- 73.人类的行为因遗传、环境以及学习经历的不同而千差万别,丰富多彩,表现出较大的  
A.目的性  
B.可塑性  
C.一致性  
D.差异性  
E.规律性
- 74.危害健康行为的主要特点是危害性、明显和稳定性以及  
A.连续性  
B.单一性  
C.危险性  
D.多样性  
E.习得性
- 75.健康信息应具有的特点中,针对性是指  
A.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播者的需求和特点  
B.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播媒介的特点  
C.健康信息的选择、制作、传递必须针对受者的需求和特点  
D.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播环境的特点  
E.健康信息的选择、制作、传递必须针对主管部门的需求和特点
- 76.健康传播中受者在接触信息时普遍存在的心理特点不包括  
A.求异  
B.求真  
C.求短  
D.求新  
E.求近

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- (77~78 题共用备选答案)
- A.胃炎  
B.痰中培养大肠埃希杆菌  
C.阑尾炎  
D.新生儿腹泻  
E.产后乳腺炎
- 77.通过消毒、灭菌、隔离、无菌技术等措施可有效地预防和控制的是
- 78.通过合理使用抗菌药物和免疫抑制类药物降低感染风险的是
- (79~81 题共用备选答案)
- A.高压蒸汽灭菌  
B.干热灭菌  
C.滤过除菌  
D.紫外线  
E.煮沸消毒
- 79.空气的消毒宜采用
- 80.动物免疫血清的除菌宜采用

- 81.手术用金属器械宜采用  
(82~83题共用备选答案)
- A.戴清洁手套
  - B.戴一次性手套
  - C.戴医用口罩
  - D.戴口罩
  - E.穿隔离衣
- 82.医务人员接触血液及污染物品时应
- 83.进行手术等无菌操作时应  
(84~86题共用备选答案)
- A.信息源
  - B.编码
  - C.传递信息
  - D.解码
  - E.反馈
- 84.信息被译成能理解的一系列符号的过程属于沟通步骤中
- 85.包括接受、译码和理解三个环节的沟通步骤是
- 86.信息沟通属于沟通步骤中的  
(87~89题共用备选答案)
- A.目标控制
  - B.进度控制
  - C.预算控制
  - D.质量控制
  - E.技术控制
- 87.将实际情况与预算计划对比检查,及时发现问题、纠正偏差的控制方法是
- 88.对生产和工作的进程在时间上进行控制的方法是
- 89.把执行结果与预期目标及标准进行对照检查,以发现问题,采取纠偏措施的控制  
(90~91题共用备选答案)
- A.呼吸机相关性肺炎
  - B.呼吸衰竭
  - C.肺癌
  - D.新生儿腹泻
  - E.结肠癌
- 90.属于医院感染的是
- 91.不属于医院感染的是  
(92~94题共用备选答案)
- A.碘伏消毒液原液局部擦拭2遍
  - B.碘伏消毒液原液局部擦拭
  - C.20 000 mg/mL 葡萄糖酸氯己定擦拭
  - D.有效含量>1 g/L 氯己定乙醇溶液局部擦拭2~3遍
  - E.3%过氧化氢冲洗
- 92.适用于穿刺部位的皮肤消毒的方法为
- 93.适用于手术切口部位的皮肤清洁方法为
- 94.适用于伤口创面消毒的冲洗方法为  
(95~97题共用备选答案)
- A.管理的科学性
  - B.管理的自然属性
  - C.管理的广泛性
  - D.人和时间
  - E.能源和信息
- 95.管理的基本特征
- 96.护理管理的特点
- 97.管理二重性的体现  
(98~100题共用备选答案)
- A.倒放
  - B.竖放
  - C.平放
  - D.斜放
  - E.侧放
- 98.手术器械包、硬式容器应
- 99.盆、盘、碗类物品应
- 100.纸袋、纸塑包装应

## 专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1.关于肺泡表面活性物质的描述错误的是

- A.维持肺泡的扩张状态
- B.降低肺泡表面张力
- C.稳定肺泡容积
- D.降低肺的顺应性
- E.防止毛细血管内液体滤入肺泡

2.对呼吸系统疾病引起的咳嗽、咳痰描述不正确的是

- A.长期、频繁的咳嗽可使胸腔内压增高
- B.剧烈的咳嗽常可引起呼吸肌疼痛
- C.常分为干性咳嗽和湿性咳嗽
- D.咳嗽是呼吸系统疾病最常见的症状
- E.胸膜疾病的病人常会因咳嗽引起自发性气胸

3.患者,男性,26岁。受凉后突起畏寒、发热,体温 39℃,咳嗽,咳少量白痰,无咽痛及淋巴肿大,双肺可闻及干性啰音。最可能的诊断是

- A.急性病毒性支气管炎
- B.急性病毒性咽炎
- C.急性病毒性喉炎
- D.急性细菌性喉炎
- E.急性细菌性扁桃体炎

4.支气管扩张临床表现的叙述不正确的是

- A.反复咯血
- B.咳大量脓痰
- C.病变部位固定湿啰音
- D.病程多呈急性经过
- E.可有杵状指

5.支气管扩张病人大咯血时应采取的体位是

- A.健侧卧位

B.患侧卧位

C.坐位

D.俯卧位

E.平卧位

6.肺炎支原体肺炎治疗首选

- A.青霉素
- B.氨基糖苷类
- C.阿昔洛韦
- D.先锋霉素
- E.红霉素

7.肺炎克雷伯杆菌肺炎治疗首选

- A.庆大霉素
- B.青霉素
- C.阿卡米星+头孢曲松
- D.氧氟沙星
- E.甲硝唑

8.治疗婴幼儿流感嗜血杆菌的感染,不可使用的药物是

- A.氨苄西林
- B.阿司匹林
- C.阿奇霉素
- D.2代头孢菌素
- E.3代头孢菌素

9.属于全杀菌剂的抗结核药是

- A.异烟肼+利福平
- B.利福平+链霉素
- C.链霉素+对氨基水杨酸钠
- D.乙胺丁醇+吡嗪酰胺
- E.对氨基水杨酸钠+乙胺丁醇

10.患者,男性,35岁。发热、咳嗽3天,体温 39.1℃胸片示右上肺大片阴影,痰涂片见较多革兰阳性成对或短链状球菌,治疗首选

- A.青霉素

B.红霉素

C.氯霉素

D.氟哌酸

E.丁胺卡那霉素

11.患者,男性,50岁。一天来寒战高热(39.6℃),咳嗽伴左胸痛,咳痰呈砖红色胶冻状,量多。查体轻度发绀,BP 80/50 mmHg,左肺叩浊,呼吸音低,X线胸片左肺呈多发性蜂窝状阴影,最可能的诊断为

A.肺炎链球菌肺炎,休克型

B.葡萄球菌肺炎

C.厌氧菌肺炎

D.军团菌肺炎

E.肺炎克雷伯杆菌肺炎

12.脑出血最常见的好发部位是

A.豆纹动脉

B.后交通动脉

C.大脑前动脉

D.椎动脉

E.基底动脉

13.血源性肺脓肿病人,突发左胸痛,继之出现呼吸困难、发绀伴大汗。查体:气管右移,左肺呼吸音减低,最可能发生

A.急性心肌梗死

B.肺血栓栓塞症

C.肺不张

D.急性肺水肿

E.自发性气胸

14. $\beta_2$ -肾上腺素受体激动剂缓解哮喘发作的主要机制

A.抑制变态反应过程

B.舒张支气管

C.抑制细胞因子生成

D.抑制炎症因子释放

E.调解LT生物活性

15.中央型肺癌的病变部位正确的是

A.肺门部

B.段支气管

C.段以下支气管

D.段支气管以上至主支气管

E.主支气管以上

16.对化疗最敏感的肺癌是

A.小细胞未分化癌

B.鳞癌

C.腺癌

D.肺泡细胞癌

E.大细胞癌

17.患者,男性,65岁。诊断COPD、肺大泡,因肺感染住院治疗,剧烈咳嗽后感觉憋气加重,继而出现烦躁不安、发绀、冷汗、脉速、意识不清,血氧饱和度80%。该病人可能出现

A.纵隔气肿

B.血气胸

C.张力性气胸

D.Ⅱ型呼吸衰竭

E.皮下气肿

18.关于发绀的影响因素描述不正确的是

A.红细胞增多

B.还原血红蛋白增加

C.皮肤色素

D.氧化血红蛋白增加

E.心功能状态

19.纠正呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒的措施错误的是

A.机械通气时要避免 $\text{CO}_2$ 排出过快

B.严格掌握补碱的量

C.应用利尿剂时注意补钾

D.必要时可考虑使用精氨酸盐等药物

E.过度通气

20.心脏传导系统中具有最高自律性的是

A.窦房结

B.结间束

C.房室结

D.希氏束

E.浦肯野纤维网

21. 心源性水肿的描述中不正确的是
- 由右心衰竭时体循环游血所致
  - 由左心衰竭时肺循环破血所致
  - 水肿首先出现在身体下垂部位
  - 一般病人易出现在双下肢
  - 严重者可出现胸腔和腹腔积液
22. 急性左心衰竭时除外肺水肿的表现, 还包括
- 早期血压下降, 随后升高
  - 血压持续下降
  - 心率减慢
  - 心尖部第一心音增强
  - 心尖部可闻及舒张期奔马律
23. 急性左心衰竭时的治疗措施中正确的是
- 平卧位
  - 10 分钟内静脉推注镇静药
  - 低流量吸氧
  - 静脉注射利尿剂
  - 静脉注射  $\beta$  受体阻滞剂
24. 慢心衰治疗中最常用的药物是
- 血管紧张素转换酶抑制剂
  - 利尿剂
  - $\beta$  受体阻滞剂
  - 洋地黄类药物
  - 醛固酮拮抗剂
25. 风湿性二尖瓣狭窄性心脏病最常见的早期症状是
- 呼吸困难
  - 二尖瓣面容
  - 心尖区舒张期隆隆样杂音
  - 肺动脉瓣区第二心音亢进
  - 合并心房颤动
26. 二尖瓣狭窄的典型临床表现不正确的是
- 呼吸困难为最常见的早期症状
  - 重度二尖瓣狭窄常有“二尖瓣面容”, 双颧绀红
  - 心尖部舒张期隆隆样杂音
  - 心尖部收缩期吹风样杂音
  - 心房颤动为早期并发症
27. 对心绞痛的描述不正确的是
- 发作于体力活动、情绪激动有关
  - 为一过性心肌供血不足
  - 左心衰竭可诱发心绞痛
  - 心尖部的刺痛
  - 发作时常伴血压升高、心率增快
28. 急性心肌梗死病人 50% ~ 81% 有先兆症状, 表现为
- 新发生心绞痛或原有心绞痛加重
  - 不稳定型心绞痛
  - 劳累型心绞痛
  - 变异型心绞痛
  - 急性冠脉综合征
29. 心肌梗死后的室性心律失常可引起猝死, 首选控制室性心律失常的药物是
- 利多卡因
  - 维拉帕米
  - 心律平
  - 胺碘酮
  - 阿托品
30. 具有消化和吸收食物功能的器官是
- 食管
  - 胃
  - 小肠
  - 大肠
  - 胰腺
31. 胃壁中的主细胞分泌
- 胃蛋白酶原
  - 盐酸
  - 内因子
  - 碱性黏液
  - 胃泌素
32. 大便隐血试验阳性提示出血量
- >5 mL/d
  - >15 mL/d
  - >25 mL/d
  - >35 mL/d

- E. >50 mL/d
33. 急性胃炎的治疗原则不包括
- A. 积极治疗原发病
- B. 停用损伤胃黏膜的药物, 服用抑酸或抗酸药物
- C. 出现消化道大出血应及时处理
- D. 呕吐明显, 不能进食者需静脉补充液体及营养, 补充电解质
- E. 如有恶性贫血可注射维生素 B<sub>12</sub> 纠正贫血
34. 服用抗酸药物时应避免食用
- A. 水果
- B. 米饭
- C. 牛奶
- D. 面食
- E. 鸡蛋
35. 慢性胃炎治疗原则叙述错误的是
- A. 幽门螺杆菌感染常采用二联疗法(枸橼酸铋钾与阿莫西林联合应用)
- B. 胃酸缺乏者可用稀盐酸、胃蛋白酶合剂
- C. 胃酸增高者可用抑酸或抗酸药
- D. 胃肠蠕动减慢者应用胃肠动力药
- E. 胆汁反流者可用氢氧化铝凝胶吸附
36. 原发性肝癌肝区疼痛特点是
- A. 间歇性隐痛
- B. 持续性胀痛
- C. 阵发性绞痛
- D. 烧灼样疼痛
- E. 刀割样疼痛
37. 急性胰腺炎的主要表现和首发症状是
- A. 发热
- B. 恶心、呕吐及腹胀
- C. 腹痛
- D. 水、电解质及酸碱平衡紊乱
- E. 低血压
38. 上消化道出血病人出现黑便, 提示出血量在
- A. 5~10 mL
- B. 30~50 mL
- C. 50~70 mL
- D. 70~90 mL
- E. 100 mL 以上
39. 溃疡性结肠炎腹痛的规律是
- A. 腹痛-进食-缓解
- B. 进食-腹痛加剧
- C. 腹痛-便意-便后缓解
- D. 腹痛-便意-便后加剧
- E. 进食-腹痛-便后缓解
40. 患者, 男性, 25 岁。既往有消化性溃疡病史。突发上腹部剧痛 5 小时, 伴大汗淋漓、烦躁不安, 服用制酸剂不能缓解, 考虑有溃疡病穿孔的可能。最可以判断穿孔的体征是
- A. 腹肌紧张
- B. 腹式呼吸减弱
- C. 腹部移动性浊音
- D. 肠鸣音消失
- E. 腹部叩诊鼓音
41. 患者, 女性, 45 岁。既往肝硬化病史 8 年。近日出现大部分时间昏睡, 可唤醒, 有扑翼样震颤, 肌张力增加, 脑电图异常, 锥体束征阳性。此时该病人处于肝性脑病的
- A. 病情无变化
- B. 肝性脑病前驱期
- C. 肝性脑病昏迷前期
- D. 肝性脑病昏睡期
- E. 肝性脑病昏迷期
42. 肝性脑病最早的表现是
- A. 嗜睡
- B. 性格和行为的改变
- C. 定向力障碍
- D. 扑翼样震颤
- E. 脑电图异常
43. 肾脏分泌的激素为
- A. 肾素, 前列腺素, 胰岛素, 缓激肽
- B. 前列腺素, 25-(OH)D<sub>3</sub>, 促红细胞生

成素

- C. 肾素, 前列腺素, 促红细胞生成素  
 D. 前列腺素, 25-(OH)D<sub>3</sub>, 肾素  
 E. 前列腺素, 肾素, 促红细胞生成素, 去甲肾上腺素
44. 不属于影响肾小球滤过率因素的是  
 A. 肾小球毛细血管内压  
 B. 囊内液胶体渗透压  
 C. 血浆胶体渗透压  
 D. 肾小囊内压  
 E. 肾小球有效滤过压
45. 急性肾小球肾炎的主要治疗原则  
 A. 加强营养  
 B. 休息和对症  
 C. 免疫抑制剂治疗  
 D. 换血疗法  
 E. 透析疗法
46. 慢性肾炎治疗原则说法不正确的为  
 A. 容量依赖型高血压病人首选利尿剂治疗  
 B. 注意休息, 避免剧烈运动, 避免劳累  
 C. 高磷饮食  
 D. 有高血压、水肿者限制盐的摄入, <3 g/d  
 E. 小剂量阿司匹林, 延缓肾衰
47. 肾盂肾炎的最主要致病菌为  
 A. 革兰阴性杆菌  
 B. 厌氧菌  
 C. 真菌感染  
 D. 支原体  
 E. 衣原体
48. 关于贫血的描述不正确的是  
 A. 贫血可由红细胞破坏过多引起  
 B. 贫血症状的轻重与病人的年龄无关  
 C. 贫血发生缓慢者, 机体能逐渐适应  
 D. 贫血可出现疲乏、困倦、心悸等表现  
 E. 女性贫血病人可表现为月经失调
49. 小细胞低色素性贫血最常见于  
 A. 缺铁性贫血  
 B. 再障性贫血  
 C. 骨髓病性贫血  
 D. 铁粒幼细胞性贫血  
 E. 巨幼细胞性贫血
50. 患者, 男性。发现腹部包块 3 年, 实验室检查外周血细胞成分与骨髓相似, 该病人可能患有  
 A. 单核细胞增多症  
 B. 慢性粒细胞白血病  
 C. 多发性骨髓瘤  
 D. 慢性淋巴细胞白血病  
 E. 急性早幼粒细胞白血病
51. 病人出现血压增高、向心性肥胖、满月脸、皮肤紫纹, 则最可能的诊断是  
 A. 肾动脉狭窄  
 B. 主动脉狭窄  
 C. 嗜铬细胞瘤  
 D. 库欣综合征  
 E. 原发性醛固酮增多症
52. 患者, 男性, 20 岁。发热起病, 体温 38℃, 三天后体温下降伴周身乏力, 食欲缺乏, 恶心呕吐, 近 2 天发现尿色深如豆油样, 胆红素定量 80 μmol/L, 抗 HBs(+), 抗 HAVIgM(+), 巩膜及皮肤中等度黄疸, 肝区轻度叩痛, 肝肋下触及 1.0 cm 质软, 脾肋下未及, 胆囊区无压痛。从病原学诊断应考虑  
 A. 急性乙型肝炎  
 B. 急性甲型肝炎  
 C. 急性戊型肝炎  
 D. 急性甲、乙型肝炎  
 E. 急性丁型肝炎
53. 甲型病毒性肝炎自起病日起的隔离期限为  
 A. 病后 3 周  
 B. 病后 1 个月  
 C. 病后 3 个月  
 D. 病后 50 天  
 E. 病后 2 个月
54. 患者, 女性, 54 岁。因“重症肌无力”收治入院。治疗期间给予抗生素治疗肺部



感染,3天后突发重症肌无力危象。此时首要的处理是

- A.根据危象类型,给予相应治疗
- B.应用抗胆碱酯酶药物
- C.保持呼吸道通畅
- D.继续治疗肺部感染
- E.停用抗生素

55.重症肌无力病人最先受累的肌肉是

- A.面肌
- B.咀嚼肌
- C.咽喉肌
- D.呼吸肌
- E.眼外肌

56.关于重症肌无力的治疗,说法不正确的是

- A.血浆置换法效果仅维持2周左右
- B.淋巴细胞置换法疗效短暂
- C.对年轻女性、病程短、进展快的病人可行胸腺摘除术
- D.对年龄较大,不宜手术者可行胸腺放射治疗
- E.免疫抑制剂治疗首选硫唑嘌呤

57.帕金森病病人的常见步态是

- A.共济失调步态
- B.慌张步态
- C.醉酒步态
- D.跨阈步态
- E.小步态

58.帕金森病病人静止性震颤的叙述不正确的是

- A.睡眠时完全消失
- B.情绪激动时加重
- C.静止时震颤明显
- D.下肢重于上肢
- E.运动时减轻或暂停

(59~61题共用题干)

患者,男性,80岁。有慢性支气管炎病史20年。一周前受凉后再次出现咳嗽、咳痰,痰白质黏,伴有呼吸困难、胸闷、乏力,夜

间为甚,活动后出现气促、心悸。

59.若病情进一步发展,最可能出现的并发症是

- A.肺性脑病
- B.上消化道出血
- C.心律失常
- D.呼吸衰竭
- E.DIC

60.常规治疗效果较差,病人病情进一步发展,出现呼吸困难加重,查体:口唇发绀,颈静脉怒张,双肺散在湿啰音。心率120次/分,律齐。肝肋下3cm,双下肢可见凹陷性水肿。此时给病人治疗不正确的是

- A.间断应用利尿剂
- B.联合应用抗生素
- C.低流量、低浓度吸氧
- D.常规剂量的强心药
- E.支气管扩张药

61.病人经上述治疗后,水肿消退,但出现躁动,四肢肌肉抽动,治疗宜选用

- A.强心剂
- B.增加氧流量
- C.氯化钾
- D.呼吸兴奋剂
- E.镇静剂

(62~65题共用题干)

患者,男性,71岁。反复咳嗽,咳痰、气喘30年,近2天来咳黄痰且黏稠不易咳出,白天嗜睡,夜间不眠,今晨被发现唤之不醒而入院。查体:嗜睡状,瞳孔等大,球结膜水肿,桶状胸,双肺可闻及较多干、湿啰音。

62.该病人昏睡最可能的原因是

- A.脑出血
- B.脑血栓
- C.脑梗死
- D.肺性脑病
- E.代谢性碱中毒

63.为进一步确诊,最有意义的首选检查是

- A.心脏超声波
- B.胸部 X 线
- C.血气分析
- D.脑部 CT
- E.心电图

64.假设上述原因确定,首选的治疗措施是

- A.使用利尿剂
- B.使用祛痰药物
- C.持续低浓度吸氧
- D.使用支气管扩张剂
- E.机械通气

65.为保持呼吸道通畅,护理措施中不正确的是

- A.清除呼吸道分泌物
- B.适当提高吸入氧浓度
- C.遵医嘱使用支气管解痉剂
- D.雾化吸入、协助排痰
- E.必要时建立气管插管或气管切开等人工气道

(66~67 题共用题干)

患者,男性,65 岁。主因“呼吸困难 1 周,加重 1 天”入院。1 周前出现活动后喘憋伴咳嗽,咳白色泡沫样痰,有夜间阵发性呼吸困难。1 天前出现呼吸困难加重、端坐呼吸,伴大汗,急诊室测血压 215/145 mmHg,心率 114 次/分。病人高血压病史 10 年,血压 180/120 mmHg 左右。

66.降压首选的药物是

- A.氯沙坦
- B.依那普利
- C.硝苯地平
- D.呋塞米
- E.硝普钠

67.降压药物使用时应注意

- A.选择中等剂量
- B.从中等剂量开始而后逐渐增加
- C.从大剂量开始而后逐渐减少
- D.初始阶段就将血压降至正常值

E.应进行控制性降压

(68~70 题共用题干)

患者,男性,35 岁。近半年来头晕乏力,轻度水肿,BP:160/100 mmHg,Hb 80 g/L,尿比重 1.012,尿蛋白(+),颗粒管型(0~1)/HP,血 BUN 20 mmol/L,今日突发抽搐,意识丧失,血 K<sup>+</sup>6.8 mmol/L。

68.根据病人目前病情判断,该病人最可能的诊断为

- A.慢性肾功能不全氮质血症期
- B.二期高血压
- C.慢性肾功能不全尿毒症期
- D.慢性肾盂肾炎
- E.中度营养不良性贫血

69.此病人现在紧急采取的治疗措施为

- A.速尿 200 mg 静推
- B.ACEI 类药物降压治疗
- C.血液透析
- D.输血治疗
- E.呼吸中枢兴奋剂治疗

70.该病人经急救治疗后,抽搐症状消失,针对该病人长期护理措施,不正确的是

- A.蛋白质摄入选择鸡蛋、牛奶等优质蛋白
- B.根据病人肾功能情况限制蛋白质摄入
- C.鼓励病人摄入花生、豆类及其制品
- D.为减轻病人烦渴想想,可用含冰块代替饮水
- E.限制钠盐摄入

(71~73 题共用题干)

患者,女性,36 岁。主因乏力、头晕,心悸伴注意力不集中,记忆力减退半年就诊,考虑为缺铁性贫血。

71.实验室检查结果应为

- A.红细胞计数减少
- B.血小板计数减少
- C.白细胞计数减少
- D.骨髓增生低下

E.淋巴细胞数增多

72. 其外周血红细胞形态主要为

- A. 巨红细胞
- B. 正常红细胞正常色素
- C. 小红细胞低色素
- D. 点彩红细胞
- E. 球形红细胞

73. 口服铁剂治疗有效的早期指标是

- A. 红细胞计数升高
- B. 血红蛋白量增多
- C. 网织红细胞数增加
- D. 血清铁增加
- E. 红细胞比容恢复正常

(74~76 题共用题干)

王女士, 38 岁。近期由于体检查出血糖高于正常而来医院就诊。

74. 对帮助诊断及判断王女士目前胰岛状况的检查项目是

- A. 空腹血糖
- B. 餐后 2 小时血糖
- C. 糖化血红蛋白
- D. OGTT
- E. 胰岛功能检查

75. 经检查王女士身高 158 cm, 体重 54 kg, 空腹血糖 7.8 mmol/L, 餐后 2 小时血糖 11.1 mmol/L, 胰岛功能较好。医生建议王女士控制饮食, 增加运动, 同时加用降糖药物。那么王女士应选择的运动是

- A. 有氧运动, 如步行、慢跑、骑自行车、太极拳等
- B. 无氧运动, 如跳远、举重、拔河、投掷
- C. 喜欢什么运动就做什么运动
- D. 最好选择空腹运动
- E. 运动时间越长越好, 这样有利于血糖降低

76. 王女士选择了胰岛素降糖治疗, 关于胰岛素的使用不正确的是

- A. 已开封的胰岛素可在室温下保存, 也可在冰箱中保存

B. 冰箱中保存的胰岛素可取出直接使用

C. 短效胰岛素或预混胰岛素最适合注射腹部

D. 中长效胰岛素最适合注射臀部或大腿

E. 打胰岛素后就可以不控制饮食, 如果不想吃饭, 可以不打胰岛素

(77~78 题共用题干)

77. 患者, 男性, 47 岁。炎热夏天持续在工地施工 5 小时, 突然晕倒。查体: 体温达 41 °C, 颜面潮红、皮肤干燥无汗。诊断为

- A. 热衰竭
- B. 热痉挛
- C. 日射病
- D. 热射病
- E. 轻度中暑

78. 治疗措施错误的是

- A. 冷水或酒精擦浴
- B. 药物降温
- C. 纠正脱水、酸中毒及电解质紊乱
- D. 积极处理并发症
- E. 大剂量激素

(79~81 题共用题干)

患者, 男性, 27 岁。农民。因发热、头痛、腰痛、口鼻出血 5 天入院。20 天前参加秋收(当地鼠害比较严重), 5 天前突发高热、寒战、头痛、全身酸痛, 尤以肾区疼痛为甚。血压 97/60 mmHg, 体温 38.8 °C。面色潮红, 呈醉酒貌。睑结膜及咽部、颊黏膜充血、水肿并点状出血。全身皮肤散在淤点、淤斑, 肾区叩痛。

79. 该病人应考虑为

- A. 疟疾
- B. 新疆出血热
- C. 登革出血热
- D. 流行性出血热
- E. 拉沙热

80. 该病的传播途径不包括

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 垂直传播
- D. 接触传播
- E. 体液传播

81. 流行性出血热的分期不包括

- A. 发热期
- B. 少尿期
- C. 无尿期
- D. 低血压休克期
- E. 恢复期

(82~84 题共用题干)

患者, 男性, 33 岁。因突然出现剧烈头痛、呕吐入院, 既往高血压病史, 入院血压 200/99 mmHg, 神经科查体: 神志清楚、脑膜刺激征阳性, 四肢肌力 5 级。

82. 判断病人可能发生了

- A. 脑梗死
- B. 脑出血
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 高血压 3 级
- E. 脑栓塞

83. 病人病因诊断的主要依靠

- A. CT
- B. MRI
- C. DSA
- D. 脑脊液检查
- E. 脑超声

84. 病人入院第四日家属探视, 病人情绪激动, 突然出现剧烈头痛, 呕吐, 随即出现意识障碍, 进入深昏迷状态, 双侧瞳孔不等大,

该病人可能的并发症为

- A. 心力衰竭
  - B. 呼吸衰竭
  - C. 脑梗死
  - D. 脑疝
  - E. 短暂性脑缺血发作
- (85~87 题共用题干)

患者, 女性, 17 岁。突然失去意识, 全身对称性抽搐, 近日频发, 每月 2~3 次。入院检查: 浅昏迷, 生命体征均正常。

85. 对确诊此病人最有价值的辅助检查是

- A. 脑脊液检查
- B. 脑血流图
- C. 脑电图
- D. 脑 CT 扫描
- E. 颅脑超声检查

86. 病人突然发作时, 最重要的护理措施是

- A. 保持呼吸道通畅
- B. 严密观察生命体征
- C. 避免按压肢体
- D. 禁测口温
- E. 避免外伤

87. 该病人药物治疗不正确的是

- A. 首选药物增加到有效血液浓度不能控制发作, 再改用次选药物
- B. 停药必须缓慢减量
- C. 症状严重时应同时使用多种药物
- D. 药物剂量由小到大, 逐步增加
- E. 发作时, 不立即用药

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(88~91 题共用备选答案)

- A. 铁锈色痰
- B. 砖红色胶冻样痰
- C. 少量黏痰, 阵发刺激性咳嗽

- D. 绿色脓痰
- E. 少量黏痰

88. 军团菌肺炎的咳嗽咳痰特点是

89. 肺炎支原体肺炎的咳嗽咳痰特点是

90.肺炎克雷伯杆菌肺炎的咳嗽咳痰特点是

91.肺炎链球菌肺炎的咳嗽咳痰特点是  
(92~93 题共用备选答案)

- A.疲倦、乏力
- B.心源性呼吸困难
- C.咳嗽、咳痰
- D.腹胀、纳差、恶心、呕吐
- E.头晕、心慌

92.慢性左心衰竭最主要的症状是

93.慢性右心衰竭最常见的症状是  
(94~95 题共用备选答案)

- A.CD4<sup>+</sup>T 细胞明显减低
- B.持续时间长,可达数月或数年
- C.体重明显下降
- D.慢性腹泻 1 个月以上
- E.腹股沟区淋巴结明显肿大

94.属于艾滋病无症状感染期特征的是

95.属于 HIV 急性感染期症状的是  
(96~97 题共用备选答案)

- A.消化道隔离
- B.切断传播途径
- C.对接触者观察 1 周
- D.带菌者调离工作岗位
- E.口服 T32 菌苗

96.预防伤寒的关键是

97.预防菌痢,保护易感人群可  
(98~100 题共用备选答案)

- A.解除血管痉挛,降低颅内压
- B.保持安静,呼吸道畅通
- C.控制脑水肿,维持生命体征的平稳
- D.颈动脉内膜切除术
- E.高压氧舱治疗

98.蛛网膜下腔出血的治疗方法

99.反复发作的 TIA 的治疗方法

100.脑梗死急性期的治疗方法



## 专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 急性上呼吸道感染的病人出现咽痛加重伴声嘶,这时最恰当的护理措施是
  - A. 适当休息
  - B. 保持室内空气流通
  - C. 维持水电平衡
  - D. 给予雾化吸入
  - E. 对病人进行隔离
2. 支气管扩张病人进行体位引流,不正确的是
  - A. 引流前 15 分钟遵医嘱给予支气管扩张剂
  - B. 抬高患部位置,引流支气管开口向下
  - C. 每次引流 30~60 分钟,每天 2~3 次
  - D. 在引流过程中指导病人腹式深呼吸
  - E. 引流后给予漱口
3. 治疗肺炎球菌肺炎,停用抗生素的指标一般是
  - A. 体温降至正常后 3 天
  - B. 体温降至正常后 1 周
  - C. 体温降至正常后 2 周
  - D. 症状体征完全消失
  - E. X 线示炎症阴影完全消失
4. 肺炎时可减轻胸痛的最常用体位是
  - A. 患侧卧位
  - B. 仰卧位
  - C. 端坐位
  - D. 健侧卧位
  - E. 俯卧位
5. 对肺脓肿病人进行口腔护理的主要目的是
  - A. 有利于痰液排出
  - B. 促进唾液分泌
  - C. 促进食欲
  - D. 减少感染
  - E. 减少痰量
6. 对被甲类传染病病原体污染的污水、污物、粪便、有关单位和个人进行处理时,必须遵循的处理规定是
  - A. 在卫生防疫机构的指导监督下进行严密消毒后处理
  - B. 在卫生防疫机构指导下进行消毒处理
  - C. 自行进行严密消毒后处理
  - D. 由卫生防疫机构进行消毒处理
  - E. 在医疗机构的指导监督下进行消毒处理
7. 关于胸腔闭式引流装置的护理不正确的是
  - A. 更换引流瓶遵循无菌原则
  - B. 向引流瓶内注入无菌注射用水,确保水密封状态
  - C. 引流瓶位置必须低于胸腔
  - D. 定期挤压引流管,保持通畅
  - E. 为防止引流管脱出,嘱病人不要深呼吸或咳嗽
8. 患者,男性,68 岁。因慢性呼吸衰竭急性发作入院,入院时神志尚清,动脉血气分析示  $\text{PaO}_2$  40 mmHg,  $\text{PaCO}_2$  60 mmHg,予吸氧后神志昏睡,复查动脉血气分析示  $\text{PaCO}_2$  80 mmHg,  $\text{PaO}_2$  60 mmHg,导致这种结果的原因极可能为
  - A. 脑疝发生
  - B. 心力衰竭加重
  - C. 痰液堵塞
  - D. 吸氧浓度过高
  - E. 周围循环衰竭
9. 关于呼吸衰竭疾病用药护理中,说法错误的是

A.指导、教会病人正确使用支气管解痉气雾剂

B.使用呼吸兴奋剂时应注意保持呼吸道通畅

C.使用茶碱类药物期间观察病人消化道反应

D.病人入睡困难、躁动,可给予地西泮

E.使用激素类气雾剂后要漱口

10.对纤维支气管镜检查术的护理措施错误的是

A.术前8小时禁食水

B.术前半小时内皮下注射阿托品

C.术后2小时可进温凉流质

D.术后半小时内减少说话,使声带得以休息

E.年老、病重或肺功能不全者,给予吸氧

11.纤维支气管镜检查的禁忌证不包括

A.严重心肺功能不全、高血压

B.两周内有支气管哮喘发作或大咯血者

C.凝血功能严重障碍

D.麻醉药过敏,而又无其他药物代替者

E.呼吸衰竭病人

12.血气分析标本采集时方法正确的是

A.采血部位需要利多卡因局部麻醉

B.用干燥的1 mL 无菌注射器

C.拔出针头后按压穿刺点1分钟

D.采血后立即用胶塞封堵针头以隔绝空气

E.需采血静脉血1 mL

13.酒精湿化氧气的酒精浓度一般选取

A.10%~20%

B.20%~30%

C.30%~50%

D.50%~60%

E.60%~80%

14.二尖瓣狭窄合并左房血栓病人,最易形成栓塞的部位是

A.脑栓塞

B.下肢动脉栓塞

C.肠系膜动脉栓塞

D.视网膜中央动脉栓塞

E.冠状动脉栓塞

15.人工心脏起搏器的适应证不包括

A. I度房室传导阻滞

B.病态窦房结综合症

C.外科手术前的保护性应用

D.介入性心脏病诊治

E.反复发作的颈动脉窦性晕厥

16.不属于电复律治疗术后护理措施是

A.持续24小时心电监护

B.遵医嘱注射镇静剂

C.病人绝对卧床休息24小时

D.常规低流量吸氧

E.遵医嘱服用抗心律失常药物

17.患者,男性,45岁。工程师。既往体健,因故与家人争吵后胸痛持续40分钟不缓解,伴大汗,服用硝酸甘油无效,送急诊,诊断为急性冠脉综合征,首选治疗是

A.静滴硝酸甘油

B.行选择性冠状动脉造影术

C.口服速效救心丸

D.口服阿司匹林

E.静脉注射镇静剂

18.患者,女性,50岁。拟行冠状动脉造影术,术前护理措施不正确的是

A.术前6小时禁食水及药物

B.术前练习连续咳嗽动作

C.术前练习床上排尿

D.备皮

E.心理护理

19.适宜行经皮穿刺腔内冠状动脉成形术的病人是

A.冠状动脉狭窄程度达45%

B.不稳定型心绞痛病人有多支病变

C.冠脉旁路移植术后移植血管狭窄

D.左冠状动脉主干狭窄

- E. 冠状动脉发生痉挛者
20. 经皮穿刺腔内冠状动脉成形术的护理措施及有关指导中, 不正确的是
- 术前口服抑制血小板药物
  - 术中肝素化
  - 术后服用抗血小板药物 1~3 个月
  - 术后坚持服用调节血脂药物
  - 术后应戒烟限酒
21. 适合行经皮穿刺冠状动脉内支架安置术的病人是
- 冠状动脉严重钙化
  - 冠状动脉成形术后再狭窄
  - 有出血倾向者
  - 冠状动脉痉挛
  - 病变血管直径 1.5 mm
22. 不适合行经皮穿刺冠状动脉内支架安置术的病人是
- 冠状动脉成形处有血栓
  - 急性心肌梗死
  - 冠状动脉近端狭窄
  - 冠状动脉远端狭窄
  - 不稳定型心绞痛
23. 急性胃炎并发大出血时, 进行纤维胃镜检查的时间是
- 0~12 小时内
  - 12~24 小时内
  - 24~48 小时内
  - 48 小时以后
  - 出血停止时
24. 呕吐病人的护理措施中正确的是
- 剧烈呕吐时需要暂时禁食
  - 口服补液应少次多量
  - 鼓励病人多进行浅快呼吸
  - 腹胀明显提示需要补钠
  - 可给予腹部热敷
25. 患者, 男性, 47 岁。肝动脉栓塞化疗术后 1 天, 护理措施不恰当的是
- 鼓励病人深呼吸、排痰
  - 密切观察体温变化
  - 观察穿刺部位有无血肿及渗血
  - 腹痛 48 小时内, 可根据需要按医嘱注射哌替啶以缓解疼痛
  - 进少量流质饮食
26. 肠结核病人的饮食护理, 叙述不正确的是
- 高热量
  - 高蛋白
  - 高维生素
  - 易于消化的食物
  - 富含脂肪和粗纤维的食物
27. 肝活检时病人采取的体位为
- 俯卧位
  - 仰卧位
  - 左侧卧位
  - 右侧卧位
  - 头高足低位
28. 病人行胃镜检查后正确的护理是
- 检查后可进食
  - 检查后如病人咽痛, 可用温水含漱或含咽片
  - 如腹胀不可进行腹部按摩
  - 流水清洗检查器械, 避免交叉感染
  - 检查后有溃疡的病人严密观察病情变化
29. 结肠镜检查的禁忌证不包括
- 严重心肺功能不全
  - 急性弥漫性腹膜炎
  - 急性重度结肠炎
  - 需作止血及结肠息肉摘除等治疗者
  - 腹腔脏器穿孔
30. 患者, 女性, 45 岁。间断发作下腹部疼痛伴腹泻近 3 年, 每天排便 4~5 次, 常有里急后重感, 并且排便后疼痛能够缓解, 检查中与本病无关的是
- 血液检查
  - 粪便检查
  - X 线钡剂造影
  - B 超检查



- E.结肠镜检
- 31.关于消化性溃疡病人饮食错误的是
- A.适量摄取脱脂牛奶  
B.溃疡活动期少食多餐,增加餐间零食  
C.避免刺激性食物  
D.避免夜间及睡前进食  
E.症状重者可以面食为主
- 32.有关慢性肾小球肾炎病人健康教育的描述不正确的是
- A.嘱病人少去入多的地方,尤其预防呼吸道感染  
B.嘱病人进食含磷量高的食物  
C.嘱病人避免预防接种、妊娠  
D.嘱病人加强休息,以延缓肾功能减退  
E.嘱病人进食低盐、高热量食物
- 33.肾盂肾炎的护理措施不正确的是
- A.给予病人清淡、营养丰富饮食  
B.指导病人若出现体温升高,出现腰痛加剧,需及时就诊  
C.嘱病人尽量少运动以防止疾病加重  
D.每天摄入足够水分,保证尿量  
E.嘱病人勿随意停药
- 34.血液透析的最常见并发症为
- A.低血压  
B.致热源反应  
C.空气栓塞  
D.出血  
E.心律失常
- 35.不属于血液透析适应证的是
- A.慢性肾衰竭合并严重心肺功能不全者  
B.急性药物中毒  
C.肾移植术前准备  
D.严重水、电解质失衡  
E.急性肾衰竭
- 36.腹膜透析病人护理措施不正确的为
- A.蛋白摄入量:1.2~1.4 g/(kg·d)  
B.若病人无明显高血压、水肿,可正常饮水  
C.若病人发生腹膜炎,则必须立即拔除透析管  
D.若病人发生腹痛,可控制透析液进出速度予以减轻症状  
E.若出现透析液引流不畅,可指导病人改变体位
- 37.经皮穿刺肾活组织检查术的禁忌证不包括
- A.重度高血压  
B.肾肿瘤  
C.出血倾向者  
D.活动性肾盂肾炎  
E.肾移植术后
- 38.经皮穿刺肾活组织检查术护理措施不正确的是
- A.术前教会病人练习憋气及床上排尿  
B.术前2~3天肌内注射维生素K  
C.指导病人术后三天内减少饮水  
D.术后绝对平卧24小时  
E.术中严密观察病人
- 39.患者,女性,27岁。临床诊断再生障碍性贫血,检查发现口唇及口腔黏膜有散在出血点,牙龈出血,护士在为其进行口腔护理时应特别注意的护理操作是
- A.先取下义齿  
B.口护时夹紧棉球  
C.口护动作必须轻柔  
D.禁忌漱口  
E.患处涂冰硼散
- 40.患者,女性,44岁。诊断为特发性血小板减少性紫癜,护士在为病人进行健康教育时不妥的指导是
- A.为病人介绍本病的有关知识  
B.告知病人应遵医嘱坚持服药  
C.服药期间应定期复查血小板  
D.应禁止活动减少外伤的发生  
E.患病期间不宜使用阿司匹林
- 41.患者,女性,31岁。半年来反复发生双下肢瘀斑,月经量增多。血红蛋白89 g/L,

红细胞  $3.2 \times 10^9/L$ , 血小板  $55 \times 10^9/L$ 。初步诊断“慢性特发性血小板减少性紫癜”。根据病情,与目前情况不符合的护理诊断或合作性问题是

- A. 组织完整性受损
- B. 有受伤的危险
- C. 有感染的危险
- D. 知识缺乏
- E. 潜在并发症:颅内出血

42. 患者,男性,36岁。入院后出现体力减退,骨痛难忍,化疗后发生脱发、恶心,感到悲观、失望,不想继续治疗下去。目前最合适的护理措施是

- A. 请家属陪伴
- B. 协助做好生活护理
- C. 耐心解释病情,使病人解除精神压力
- D. 满足病人提出的各种要求
- E. 减少病人孤独感

43. 患者,男性,31岁。突发高热,牙龈出血,胸骨压痛。血常规检查示白细胞明显增高,血小板减少,需进行骨髓检查。行腰椎棘突骨髓穿刺,一般应选择的体位是

- A. 仰卧位
- B. 侧卧位
- C. 坐位
- D. 中凹位
- E. 头低足高位

44. 甲状腺功能亢进症病人的药物护理措施中不正确的是

- A. 遵医嘱用药,并注意观察药物的疗效及其不良反应
- B. 警惕粒细胞缺乏,定期复查血象
- C. 需长期用药,嘱病人不要任意变更药物剂量
- D. 病人自觉身体不适可停药
- E.  $WBC < 3 \times 10^9/L$ 、粒细胞  $< 1.5 \times 10^9/L$  时应停药

45. 关于晨僵的护理措施叙述正确的是

- A. 睡眠时使用弹力手套保暖

B. 起床后用热水、冷水交替浸泡僵硬的关节

- C. 起床后可行冷水浴
- D. 减少关节的活动
- E. 避免做任何家务

46. 中暑高热进行降温治疗时错误的是

A. 每4小时测量一次体温、血压、脉搏及呼吸

- B. 室温应保持在  $20 \sim 25 \text{ }^\circ\text{C}$
- C. 要同时不断按摩四肢及躯干皮肤
- D. 避免体温过低
- E. 测量肛温时,肛表要插深

47. 患者,男性,65岁。因发热一周入院,诊断为肺炎,目前出现烦躁、出冷汗、血压下降、四肢厥冷,不正确的护理措施是

- A. 迅速建立静脉通路
- B. 输液速度不宜过快
- C. 监测血压
- D. 密切观察尿量
- E. 应用热水袋保暖

48. 患者,20岁。发热  $37.5 \text{ }^\circ\text{C}$ ,伴周身乏力,食欲缺乏,尿色加深如深茶样,化验肝功 ALT  $500 \text{ U/L}$ ,胆红素  $8 \text{ } \mu\text{mol/L}$ ,抗 HAVIgM(+), HBsAg(+),抗 HBcIgG(+),对该病人进行健康教育时最重要的宣教内容是

- A. 遵医嘱服药
- B. 卧床休息
- C. 避免过度劳累
- D. 注意消毒隔离
- E. 心理调适的方法

49. 流行性乙型脑炎病人意识障碍的护理措施不妥的是

- A. 病人侧卧,头低脚高
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 保持水电平衡
- D. 鼻饲
- E. 肢体放于功能位

50. 流行性出血热少尿期治疗原则错误的是

A.每日输液量为尿量加排泄量加500 mL

B.无消化道出血时可进行导泻疗法

C.腹膜或血液透析

D.促进利尿

E.饮食宜高糖、高维生素、高蛋白

51.护士对伤寒病人指导饮食,饮食原则错误的是

A.高热量、高蛋白、低脂、多渣、多纤维素、多维生素、易消化饮食

B.高热量、高蛋白、高脂、少渣、多纤维素、多维生素、易消化饮食

C.高热量、高蛋白、低脂、少渣、少纤维素、多维生素、易消化饮食

D.高热量、高蛋白、高脂、多渣、少纤维素、多维生素、易消化饮食

E.高热量、高蛋白、低脂、少渣、多纤维素、多维生素、易消化饮食

52.男孩,4岁。发热、头痛2天入院,查体:全身皮肤有散在出血点,脑脊液检查:压力240 mmH<sub>2</sub>O,WBC 924×10<sup>9</sup>/L,多核0.92,单核0.08,蛋白2.5 g/L,氯化物102 mmol/L,糖1.0 mmol/L。对该患儿应采取的隔离方式是

A.接触隔离

B.肠道感染

C.血液/体液隔离

D.严密隔离

E.呼吸道隔离

53.暴发性流行性脑脊髓膜炎休克型迅速出现大片瘀斑,血小板减少,顽固性休克时,除抗休克外,其重要对症治疗是

A.止血

B.纠正酸中毒

C.使用抗菌药物

D.及早应用肝素抗凝治疗

E.20%甘露醇脱水,预防脑疝

54.护理蛛网膜下腔出血的病人时,可导致再次出血的诱因不包括

A.用力屏气

B.打喷嚏

C.便秘

D.进食

E.剧烈咳嗽

55.吉兰-巴雷综合征的病人,最可能危及生命的原因是

A.呼吸肌麻痹

B.压疮

C.营养失调

D.意识障碍

E.感染

56.对于吉兰-巴雷综合征病人,不属于使用呼吸机指征的是

A.肺活量降至每公斤体重20~25 mL以下

B.血氧饱和度降低

C.病人出现呼吸费力、烦躁、出汗、口唇发绀等缺氧症状

D.动脉血氧分压低于70 mmHg

E.静脉血氧饱和度(SPO<sub>2</sub>)<97%

57.癫痫发作时的护理措施中不正确的是

A.对强直-阵挛发作者要扶持病人卧倒,防止跌伤或伤人

B.强行按压或用约束带捆扎抽搐的肢体以防受外伤

C.将病人的头部侧向一边,及时吸出呼吸道分泌物和呕吐物并给予吸氧

D.禁止口腔测温,应测腋下温度或肛温

E.病人抽搐发作时,需有专人守护、观察和记录全过程

58.患者,男性,68岁。帕金森病史3年。对其进行的康复护理措施中不正确的是

A.躺在床上时不应垫枕头,还应定时取仰卧姿势

B.病人尽量试着独立完成日常的活动,如写字和进食等

C.在步行时应以脚尖先着地

D.为预防关节挛缩可做关节的全范围运动

E.温水浴、按摩等物理治疗可预防挛缩

59.腰椎穿刺可以诊断的是

A.白血病

B.脑痛

C.颈椎占位

D.蛛网膜下腔出血

E.脑血管畸形

60.颅内压明显增高的病人,禁忌做腰椎穿刺是为了防止

A.脑脊液外漏

B.穿刺部位出血

C.并发颅内感染

D.穿刺部位感染

E.脑组织移位

61.脑血管造影检查不适用的疾病是

A.脑动脉痉挛

B.颅内血肿

C.硬膜下血肿

D.颅内动脉瘤

E.脑出血

62.脑血管造影术后,股动脉穿刺者肢体需要制动

A.1~3 小时

B.2~6 小时

C.5~8 小时

D.6~12 小时

E.12~16 小时

63.患者,女性,29 岁。2 个月前曾突发意识丧失,全身对称性抽搐。入院检查脑电图异常,诊断为癫痫强直-阵挛发作,经治疗症状好转并未再发作。以下的健康教育中,不正确的是

A.暂停服药

B.饮食宜清淡

C.保证充足的睡眠

D.禁止参加有危险的活动

E.保持心情愉快

64.多数的脑血栓形成发生在

A.情绪激动时

B.上呼吸道感染时

C.睡眠或安静状态时

D.重体力劳动时

E.抵抗力低下时

65.患者,女性,29 岁。因近日出现眼睑下垂就诊。确诊为重症肌无力,其应用抗胆碱酯酶药物进行治疗时,正确的是

A.首次服药加倍

B.若发现肌无力加重、瞳孔缩小、流涎,应减少药量

C.有咀嚼和吞咽无力者应在餐前 30 分钟

D.如原有症状急剧恶化,甚至呼吸肌麻痹、发绀,系抗胆碱酯酶药物过量引起

E.抗胆碱酯酶药物宜长期单独使用

(66~68 题共用题干)

患者,女性,21 岁。“咳嗽、痰中带血 2 天”,午后手足心发热、盗汗、心悸。胸片示右上肺大片阴影,密度不均,其内见一薄壁空洞。

66.最可能的诊断是

A.右上肺癌

B.继发性肺结核

C.慢性纤维空洞性肺结核

D.右肺脓肿

E.右上肺炎

67.该病人 3 小时前突然咯血不止,最关键的护理是

A.清除心理不良因素

B.保持呼吸道通畅,防止窒息

C.减少活动,保持安静

D.准备好急救药品和器械

E.做镇静、镇咳等对症处理

68.咯血的首选治疗药物是

A.肝素

B.华法林

C.垂体后叶素

D.肾上腺素

E.利多卡因

(69~70 题共用题干)

患者,男性,60岁。心绞痛病史5年,入院前5小时追赶公共汽车后出现胸骨后压榨样疼痛,即刻原地休息,含服硝酸甘油3片无效,到医院急诊室经心电图检查,诊断为急性前壁心肌梗死,病人既往肾功能不全病史3年,转入CCU治疗。

69.第二天,护士指导病人避免用力排便,病人问及其理由,正确的回答是

- A.血压升高导致脑出血
- B.体力不支,易跌倒
- C.氧耗增加致梗死面积扩大
- D.防止痔疮出血
- E.腹压增加导致呕吐

70.心梗后第3天,病人病情好转,食欲增加,对病人的饮食指导正确的是

- A.按自己的需求进食
- B.吃少量流质饮食,每天2次
- C.少食多餐
- D.多吃鸡蛋
- E.进食高蛋白、易消化食物

(71~73 题共用题干)

患者,男性,52岁。既往体健。大量饮酒后突然出现上腹部剧痛,频繁呕吐,面色苍白,诊断为急性胰腺炎,入院治疗。现给予禁食、胃肠减压。

71.急性胰腺炎病人禁食、胃肠减压的目的是

- A.防止感染蔓延
- B.减少胰液分泌
- C.减少胃酸分泌
- D.避免胃扩张
- E.减轻腹痛

72.急性胰腺炎病人禁食时,每日应补液多少毫升

- A.1 000
- B.1 500

C.2 000

D.2 500

E.3 000

73.经治疗后腹痛、呕吐基本消失,开始进食时应给予

- A.无渣半流质
- B.低脂低蛋白流质
- C.高脂高蛋白流质
- D.低脂高蛋白流质
- E.高脂低蛋白流质

(74~76 题共用题干)

患者,男性,42岁。意识模糊,既往肝硬化病史,一年来乏力,胃纳减退,口有臭味,扑翼样震颤,脑电图有 $\delta$ 波,血氨 $90\mu\text{g}/\text{dl}$ 。

74.该病人当前最可能的诊断是

- A.继发感染
- B.低血糖
- C.休克
- D.氮质血症
- E.肝性脑病

75.对该病人的护理措施中不正确的是

- A.尽量少食用含脂肪高的食物
- B.保持大便通畅,必要时用弱酸溶液灌肠
- C.避免使用麻醉、镇静剂
- D.鼻饲饮食
- E.注意水、电解质平衡,限制钠盐和钾盐摄入

76.病人病情稳定后出院休养,不正确的健康指导是

- A.介绍疾病相关知识及有关导致肝性脑病的诱发因素
- B.告知家属肝性脑病的早期征象,一旦发现及时就医
- C.指导合理饮食,严格限制蛋白质摄入及粗糙食物
- D.指导病人按医嘱用药,并定期复诊随访
- E.戒烟酒

(77~79题共用题干)

患者,女性,35岁。近5个月来自觉乏力,怕热多汗,并出现食欲增强,体重减轻,大便次数增多,每日3~5次,不成形。查体:BP 145/68 mmHg,皮肤潮湿,手颤,甲状腺Ⅱ度肿大。诊断为“甲状腺功能亢进症”。予以硫脲类药物治疗,症状渐趋好转。因与家庭纠纷与爱人争吵后情绪不佳,次日出现恶心、呕吐、烦躁不安,心动过速,发热,大汗,即来我院就诊。体检:T 39.5℃,R 24次/分, BP 170/100 mmHg,颈软,甲状腺肿大,眼球突出。

77.符合该患者目前情况的诊断应是

- A. 甲亢性心脏病
- B. 甲亢危象
- C. 淡漠型甲亢
- D. 应激性消化道溃疡
- E. 心肌梗死

78.对该病人进行的护理措施中不正确的是

- A. 严密观察生命体征
- B. 吸氧
- C. 监护心、肾、脑功能
- D. 按医嘱给药
- E. 应用乙酰水杨酸类解热剂进行降温

79.此时首选的治疗药物为

- A. 甲基硫氧嘧啶
- B. 丙基硫氧嘧啶
- C. 普萘洛尔
- D. 复方碘溶液
- E. 氢化可的松

(80~81题共用题干)

患者,女性,58岁。因煤气中毒入院,病人处于浅昏迷状态,脉搏130次/分,皮肤多汗,面色潮红,口唇呈樱桃红色。

80.协助诊断应进行的检查是

- A. 血常规
- B. 血液碳氧血红蛋白
- C. 血胆碱酯酶

D. 血氧饱和度

E. 血气分析

81.护士给予吸氧,氧流量是

- A. 持续低流量
- B. 4~6 L/min
- C. 6~8 L/min
- D. 8~10 L/min
- E. 30%~50%酒精湿化给氧

(82~84题共用题干)

患者,男性,32岁。不规则发热、咳嗽、伴间断腹泻、食欲减退及明显消瘦2个月,既往有静脉吸毒史。体格检查:体温38℃,全身淋巴结肿大,质韧、无触痛,能活动。血白细胞 $4.0 \times 10^9/L$ ,血清抗HIV(+).

82.该病人应考虑为

- A. 支气管肺癌
- B. 白血病
- C. 艾滋病
- D. 梅毒
- E. 淋病

83.该病人应采取的隔离措施是

- A. 呼吸道隔离
- B. 血液、体液隔离
- C. 接触隔离
- D. 肠道隔离
- E. 血液、体液隔离及保护性隔离

84.针对该病人的护理措施,错误的是

- A. 严格执行消毒隔离措施
- B. 提供病人与家属、亲友沟通机会,获得更多心理支持
- C. 给予高热量、高蛋白、高维生素易消化饮食
- D. 将病人安置于隔离病室内进行严密隔离
- E. 多与病人沟通,鼓励病人树立战胜疾病的信心

(85~87题共用题干)

患者,女性,21岁。主因突发高热,大便十余次,初为水样便,逐渐为黏液脓血便,收治入

院。查体:体温 39.5 ℃,血压 79/58 mmHg,面色苍白,四肢湿冷,脉搏细数,神志淡漠。

85.根据病人目前情况,护士给的最紧急护理措施是

- A.迅速建立静脉通道补液
- B.让病人取平卧位或头低脚高位
- C.密切观察病情
- D.保暖
- E.氧疗

86.为进一步确诊,需要做粪便培养,不正确的方法是

- A.采集新鲜粪便
- B.取黏液脓血部分
- C.可在用抗生素后采集
- D.用无菌容器留取
- E.及时送检

87.护士观察到病人病情逐渐好转,但不能提示病人病情好转的指征是

- A.面色红润
- B.发绀消失
- C.收缩压维持在 80 mmHg 以上
- D.脉压大于 20 mmHg
- E.尿量每小时超过 30 mL

(88~90 题共用题干)

患者,男性,64 岁。因左侧肢体无力 3 天,以脑梗死收入院,入院后神志清楚,查体:左侧肢体肌力上肢 2 级,下肢 3 级,右侧肢体肌力 5 级。既往有高血压病史 18 年,糖尿病病史 10 年,高脂血症 6 年,吸烟饮酒

史多年。给予改善循环、降压、降糖、降脂药物治疗。

88.在该病例中属于不可干预的危险因素是

- A.血压
- B.血糖
- C.血脂
- D.年龄
- E.神志

89.从病人疾病史来看,在饮食方面护士注意宣教的饮食类型为

- A.低盐饮食,低脂饮食
- B.低脂饮食,低蛋白饮食
- C.低盐低脂,糖尿病饮食
- D.低盐低蛋白,糖尿病饮食
- E.多食水果,蔬菜,细粮

90.病人准备出院,从健康指导的角度护士应告知病人

- A.注意绝对卧床休息,按需服药,及时就诊
- B.注意肢体康复锻炼,按时服药,及时就诊
- C.少饮酒少吸烟,少食蔬菜水果,多食肉食
- D.少饮酒少吸烟,高脂,高蛋白,低胆固醇
- E.维持原有生活方式和习惯,参加适当运动

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(91~94 题共用备选答案)

- A.青霉素 G
- B.红霉素
- C.氨基糖苷类
- D.阿昔洛韦
- E.喹诺酮类

- 91.军团菌肺炎的治疗首选
- 92.肺炎支原体肺炎的治疗首选
- 93.肺炎克雷伯杆菌肺炎的治疗首选
- 94.肺炎球菌肺炎的治疗首选

(95~97 题共用备选答案)

- A.进无渣、过凉的半流质食物

B. 给予流质饮食以中和胃酸

C. 多给予脂肪食物

D. 禁食

E. 将食物完全煮熟后食用

95. 急性胃炎发生少量出血者的正确饮食护理措施是

96. 急性胃炎发生大量出血者的正确饮食护理措施是

97. 慢性胃炎发生胃酸缺乏者的正确饮食护理措施是

(98~100 题共用备选答案)

A. 腹膜透析

B. 血液透析

C. 免疫抑制治疗

D. 血浆置换

E. 血液灌流

98. 患者, 女性, 40 岁。肠梗阻术后并发急性肾衰竭, 血钾浓度 7.0 mmol/L, 首选治疗方法为

99. 患者, 男性, 68 岁。慢性肾衰病史 1 年, Hb 80 g/L, PLT  $60 \times 10^9/L$ , 针对该病人目前状态的首选治疗方法为

100. 患者, 男性, 58 岁。全身水肿 3 个月, 实验室检查: 尿蛋白 4.5 g/L, 全身重度水肿, 根据患者目前表现推断, 该患者目前首选的治疗方法为



考前点睛班