

金英杰微信公众号“jinyingjieedu”

获取更多 2017 综合笔试真题及答案请加群 244977780

2017 中医执业

75. 腔隙性脑梗的发病原因是

- A. 脑动脉粥样硬化
- B. 心源性栓子
- C. 高血压致细小动脉硬化
- D. 脑血管畸形
- E. 脑动脉瘤

75. 答案: C

腔隙性梗死 发生于大脑深部及脑干的缺血性微梗死灶, 经吞噬细胞清除后形成腔隙。最主要的病因是高血压性小动脉硬化, 约占脑梗死的 20%。其他还有血流动力学和血液成分异常, 各种类型小栓子阻塞和破坏小动脉, 引起供血区形成小的梗死灶。

76. 抗休克治疗的输注血液, 应用的晶体液和胶体液的比例是

- A. 1:1
- B. 2:1
- C. 3:1
- D. 4:1
- E. 5:1

76. 答案: C

血容量扩充剂分胶体液与晶体液两种。晶体液常用平衡盐液、0.9%氯化钠溶液;胶体液包括全血、血浆、白蛋白、代血浆、右旋糖酐等。开始用晶体液 1000~2000mL, 然后补充胶体液, 晶体液与胶体液之比为 3:1, 胶体液输入量一般不超过 1500~2000mL。中度和重度休克应输部分全血。判断补液量充分的指

标为：①收缩压正常或接近正常，脉压 $>30\text{mmHg}$ ②CVP 升高 $>12\text{cmH}_2\text{O}$ ③尿量 $>30\text{mL/h}$ 。④临床症状好转如神志恢复，皮肤、黏膜红润、温暖等。

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

2017年医师资格考试综合笔试
考后真题解析

考后答疑 现场估分 考情点评

直播时间
8月27日-8月28日 19:00-22:00

★ 金英杰独家名师亲临 ★

77. 中暑热射病的关键性治疗措施是

A. 口服清凉含盐饮料

- B. 降温治疗
- C. 静脉输注水，电解质
- D. 保持呼吸道通畅
- E. 糖皮质激素

77. 答案：B

【解析】降温治疗为热射病的关键性治疗措施。

85. 成为名老中医和相关指导专家，要求在本领域从事相关工作满多少年

- A. 10 年
- B. 20 年
- C. 30 年
- D. 35 年
- E. 50 年

85. 答案：C

【解析】《中医药条例》对中医药学术经验和专业技术专长继承工作的规定

1. 承担中医药专家学术经验和专业技术专长继承工作的指导老师应当具备下列条件：

- (1) 具有较高学术水平和丰富的实践经验、技术专长和良好的职业品德；
- (2) 从事中医药专业工作 30 年以上并担任高级专业技术职务 10 年以上。

86. “气之本”的脏是

- A. 心
- B. 肺
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

86. 答案: B

【解析】《类证治裁·喘证》说:“肺为气之主, 肾为气之根。”

87. 脾的阴阳属性为

- A. 阳中之阴
- B. 阳中之阳
- C. 阴中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中之至阴

87. 答案: E

【解析】《素问·金匱真言论》说:“背为阳, 阳中之阳, 心也;背为阳, 阳中之阴, 肺也。腹为阴, 阴中之阴, 肾也;腹为阴, 阴中之阳, 肝也;腹为阴, 阴中之至阴, 脾也。”

75. 腔隙性脑梗的发病原因是()

- A. 脑动脉粥样硬化
- B. 心源性栓子
- C. 高血压致细小动脉硬化
- D. 脑血管畸形
- E. 脑动脉瘤

76. 抗休克治疗的输注血液, 应用的晶体液和胶体液的比例是()

- A. 1: 1
- B. 2: 1
- C. 3:1
- D. 4:1
- E. 5:1

77. 中暑热射病的关键性治疗措施是()

- A. 口服清凉含盐饮料
- B. 降温治疗
- C. 静脉输注水, 电解质
- D. 保持呼吸道通畅
- E. 糖皮质激素

85. 成为名老中医和相关指导专家, 要求在本领域从事相关工作满多少年?

- A. 10 年
- B. 20 年
- C. 30 年
- D. 35 年
- E. 50 年

86. 气之本, 气之根()

- A. 心
- B. 肺
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

87. 脾的阴阳属性()

- A. 阳中之阴
- B. 阳中之阳
- C. 阴中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中之至阴

中医助理

1. 脏腑关系中，“燥湿相济”指的是哪种关系

- A. 心与小肠
- B. 肝与胆
- C. 脾与胃
- D. 肺与大肠
- E. 肾与膀胱

答案：C

2. 巴豆内服的用量是

- A. 0.1-0.3 g
- B. 0.5-1 g
- C. 1.5-3 g
- D. 3-5 g
- E. 5-10 g

答案：A