

- 1、DIC 患者应用肝素抗凝治疗时正确的护理措施是
- A、用药前、用药后 30 分钟均应测定凝血时间
  - B、凝血时间在 30 分钟左右表示肝素剂量合适
  - C、若大出血不止，应快速注射等量鱼精蛋白拮抗
  - D、注意观察有无变态反应发生
  - E、在后期纤溶亢进时应继续单独使用肝素抗凝

1、答案： D

解析： DIC 患者应用肝素抗凝时，应在用药前、用药后 2 小时测定凝血时间，如凝血时间短于 12 分钟，提示肝素剂量不足，若超过 30 分钟提示过量，凝血时间在 20 分钟左右表示肝素剂量合适，故 A、B 错误。如出血不止，可用等量鱼精蛋白拮抗，注射时不宜太快，以免引起血压下降、心动过缓和呼吸困难，故 C 错误。在后期纤溶亢进时再单独使用肝素则有加重出血的危险，故 E 错误。而在抗凝治疗过程中，会发生变态反应，因此答案为 D。

- 2、建立人工气道，气囊的压力应维持在
- A、18cmH<sub>2</sub>O
  - B、20cmH<sub>2</sub>O
  - C、23cmH<sub>2</sub>O
  - D、24cmH<sub>2</sub>O
  - E、25cmH<sub>2</sub>O

2、答案： B

解析： 建立人工气道，气囊的压力应维持在 20cmH<sub>2</sub>O。

- 3、MODS 最常见的病因是
- A、营养不良
  - B、严重创伤和感染
  - C、输液过多
  - D、免疫力低下
  - E、吸氧浓度过高

3、答案： B

解析： MODS 可继发于下列急症：严重的损伤、心脏骤停复苏后、严重的急腹症、脓毒血症等。

- 4、诊断 ARDS 时，血气分析氧合指数 PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> 为
- A、<100
  - B、<200
  - C、<300
  - D、<400
  - E、<500

4、答案: C



解析：急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的辅助检查血气分析的诊断标准为氧合指数  $PaO_2/FiO_2 < 300$ ，故选 C。

5、病人出现弥散性血管内凝血的早期征兆是

- A、咯血
- B、便血
- C、易出现鼻出血
- D、皮肤出现出血点
- E、血液不易抽出，容易凝固

5、答案： E

解析：弥散性血管内凝血早期为高凝期，此期在促凝物质作用下，凝血因子被激活，血中凝血酶量增加，血液呈高凝状态，循环血液中易有血栓形成。最早的征兆是护士抽血取化验标本时，发现血液不易抽出、血液易凝固。

6、引起“肾前型肾功能衰竭”的病因是

- A、挤压综合征
- B、感染性休克
- C、双肾结石
- D、盆腔手术误扎双侧输尿管
- E、缺水、休克、血容量减少

6、答案： E

解析：急性肾功能衰竭依据发生原因不同分为肾前型、肾型和肾后型 3 种类型。所谓肾前型肾功能衰竭是指各种引起肾血流量减少的疾病如休克、脱水等造成循环衰竭，继之影响肾血流量，最终导致肾功能损害，故选项 E 正确。

7、成人呼吸窘迫综合征，胸部 X 线片呈现斑点状，片状阴影是在

- A、进展期和末期
- B、初期、进展期和末期
- C、末期
- D、进展期
- E、初期

7、答案： D

解析：进展期：初期 ARDS 未经过充分有效治疗，病理变化进展而进入该期，不但临床上呼吸困难加重，同时出现发绀，此时听诊双肺可有中小水泡音，呼吸音变化出现管状呼吸音，病情继续恶化。病人出现昏迷，体温升高，X 线胸部摄片可见网状阴影，继之肺出现斑点状或呈片状的阴影，血液生化检查呈现呼吸性及代谢性酸中毒。

8、急性肾衰病人的饮食护理中错误的是

- A、高蛋白
- B、高热量

- C、充足维生素
- D、忌含钾丰富的食物
- E、控制入水量

8、答案： A

解析： 急性肾衰病人主要表现为少尿、无尿、尿毒症和水、电解质、酸碱平衡紊乱。少尿期初期禁食蛋白质 3 天，热量供应以糖为主。3~4 天以后采用低蛋白、高糖、多种维生素饮食。

9、急性肾衰竭少尿期病人可出现的电解质紊乱是

- A、低钠血症
- B、低镁血症
- C、低钾血症
- D、高钙血症
- E、低磷血症

9、答案： A

解析： 急性肾衰竭病人电解质失调主要为三高（高钾、高磷、高镁）；二低（低钠、低钙）。

10、男性，50 岁，急性肾衰少尿期，病人出现呼吸困难，头痛、头晕，软瘫，心律不齐，心动过缓，腹胀，应考虑

- A、高钾血症
- B、低钾血症
- C、水中毒
- D、酸中毒
- E、尿毒症

10、答案： A

解析： 急性肾衰少尿期病人尤应注意高钾血症发生，该病人出现呼吸困难，头痛、头晕，软瘫，心律不齐，心动过缓，腹胀，符合高钾血症临床特点。