



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 答案

1、正确答案：E

答案解析：【解析】记忆题，考查腹股沟解剖。



## 2、正确答案：E

答案解析：【解析】仔细询问，核对职业史是诊断职业病的先决条件，内容包括：患者全部职业的工种和工龄，接触有害物质的种类，时间和数量，接触方式及防护措施使用情况等。

## 3、正确答案：A

答案解析：【解析】主动脉瓣狭窄，指由于风湿性、先天畸形、瓣膜结构老化等原因导致主动脉瓣病变，致使主动脉瓣开放受限。随着病变的进展可出现主动脉瓣狭窄的临床三联症：劳累性呼吸困难、心绞痛和晕厥。听诊主要部位在胸骨右缘第2肋间。

## 4、正确答案：B

答案解析：【解析】：《药品管理法》第四十八条禁止生产(包括配制，下同)、销售假药。有下列情形之一的，为假药：(一)药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符的；(二)以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。有下列情形之一的药品，按假药论处：(一)国务院药品监督管理部门规定禁止使用的；(二)依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验而未经检验即销售的；(三)变质的；(四)被污染的；(五)使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的；(六)所标明的适应症或者功能主治超出规定范围的。

## 5、正确答案：D

答案解析：

6、正确答案：B

答案解析：【解析】：有无累及其他系统是判断是否重症肺炎的标准。

7、正确答案：A

答案解析：【解析】：类风湿性关节炎尚不能治愈，缓解疼痛，防止病情进展。常用方案是甲氨蝶呤+来氟米特。

8、正确答案：E

答案解析：【解析】肥胖度=（实际体重-标准体重）÷标准体重×（±100%），肥胖度在±10%之内，称之为正常适中。肥胖度超过10%，称之为超重。肥胖度超过20%-30%，称之为轻度肥胖。肥胖度超过30%-50%，称之为中度肥胖。肥胖度超过50%以上，称之为重度肥胖。肥胖度小于-10%，称之为偏瘦。肥胖度小于-20%以上，称之为消瘦。

9、正确答案：E

答案解析：

10、正确答案：D

答案解析：【解析】鹅口疮又名雪口病白念菌病鹅口、雪口、鹅口疳、鹅口白疮。是由真菌传染，在粘膜表面形成白色斑膜的疾病多见于婴幼儿。本病是白色念珠菌感染所引起。这种真菌有时也可在口腔中找到当婴儿营养不良或身体衰弱时可以发病。白色念珠菌属于真菌，真菌属于真核生物。

11、正确答案：D

答案解析：记忆

12、正确答案：A

答案解析：解析：国家实行特殊管理的药品种类：麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、蛋白同化制剂、肽类激素、终止妊娠药品、部分含特殊药品复方制剂。

13、正确答案：E

答案解析：【解析】潜伏感染是一种病毒的持续性感染状态，原发感染后，病毒基因存在于一定的组织或细胞中，并不能产生感染性病毒，也不出现临床症状。在某些条件下病毒被激活增生，感染急性发作而出现症状。急性发作期可以检测出病毒。水痘——带状疱疹病毒同样可引起潜伏感染：在儿童初次感染后，引起水痘；而潜伏在体内脊糖后根神经节或脑感觉神经节中的病毒，当机体细胞免疫功能低下时，导致潜伏病毒激活，沿感觉神经到达皮肤上皮细胞，发生串联的水疱疹，多发于胸、腹、背和面部，局部剧烈疼痛，多见于成年人和老年人。

14、正确答案：C

答案解析：

15、正确答案：D

答案解析：【解析】：枕左前位时胎头矢状缝与骨盆入口右斜径相一致；。



16、正确答案：E

答案解析：【解析】：伤寒是由伤寒杆菌引起的急性传染病，以持续菌血症、单核-吞噬细胞系统受累、回肠远端微小脓肿及溃疡形成为基本病理特征。典型的临床表现包括持续高热，腹部不适，肝、脾大，白细胞低下，部分病人有玫瑰疹和相对缓脉。伤寒的并发症有肠出血、肠穿孔、中毒性肝炎、中毒性心肌炎、支气管炎等，其中肠穿孔是最严重的并发症。

17、正确答案：E

答案解析：记忆题

18、正确答案：A

答案解析：解析：必须优先抢救的急症有：心跳骤停、窒息、大出血、开放性和张力性气胸、休克、腹部内脏脱出等。

19、正确答案：D

答案解析：解析：成年子宫原2~3cm，宫体与宫颈比为2:1，已产妇宫颈外口受分娩影响形成横裂。

20、正确答案：B

答案解析：

21、正确答案：C

答案解析：解析：X线检查有助于鉴别，低位小肠梗阻，扩张的肠袢在腹中

部，呈阶梯状排列。

22、正确答案：C

答案解析：【解析】记忆题,考查药理作用。

23、正确答案：C

答案解析：解析:头皮裂伤清创的最佳时限最迟应在 24 小时之内。

24、正确答案：B

答案解析：记忆题

25、正确答案：C

答案解析：胎儿生后一周由于生理性贫血血红蛋白逐渐下降，直到第八周后才停止，2~3个月时血红蛋白降至约100g/L，红细胞数降至 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，早产儿生理性贫血出现早而且较重，在生后3~6周时血红蛋白可下降至70~90g/L，生理性贫血产生的原因有：(1)小儿出生后建立了肺呼吸，血氧饱和度由胎儿时期的45%升至95%，血氧饱和度成倍的增加使红细胞生成素明显减少，骨髓造血功能下降，这是最主要的原因；(2)胎儿红细胞的寿命比出生后制造的红细胞寿命短（胎儿红细胞寿命约为45~70天，出生后制造的红细胞平均寿命为120天），生后胎儿红细胞逐渐破坏；(3)生后3个月是体重增长最快的阶段，血容量增加很多，红细胞被稀释。

26、正确答案：D

答案解析：

27、正确答案：C

答案解析：解析：慢性肾病时电解质紊乱导致低钙血症，从而引起甲状旁腺功能亢进；。

28、正确答案：E

答案解析：心房颤动时f波的频率是350~600次/分

29、正确答案：C

答案解析：解析：预防艾滋病母婴传播工作原则(1)所有承担孕产期保健及提供助产服务的医疗保健机构，为孕产妇提供预防艾滋病母婴传播的技术服务。(2)为孕产妇及婚前保健人群提供免费咨询；为孕产妇及婚前保健人群提供免费的艾滋病病毒抗体检测，为艾滋病病毒感染的孕产妇及所生婴儿提供免费的抗病毒药物治疗。(3)为艾滋病病毒感染产妇及所生婴儿提供追踪和检测服务。(4)对孕期未知感染状况的产妇，在产时提供快速的艾滋病病毒抗体检测，以满足预防措施的需要。(5)所有预防及干预措施要坚持自愿原则，提供服务的机构有责任为服务对象保密。

30、正确答案：B

答案解析：解析：慢性胃炎是一类可由多种原因引起的胃黏膜慢性炎症，发病率居胃部多种疾病之首，在临床十分常见，现已明确Hp感染为慢性胃炎的最主要的病因，由于Hp的感染，黏膜固有层出现大量单核细胞浸润，上皮细胞



被破坏与细菌的浸润程度及细菌与细胞接触的紧密程度成正比。当中性粒细胞出现时为炎症活动的指标。故本题选 B。

31、正确答案：D

答案解析：解析：中枢性尿崩症：是由于各种原因导致的精氨酸血管加压素合成和释放减少，造成尿液浓缩障碍。表现为多饮、多尿、大量低渗尿，血浆精氨酸血管加压素水平降低。应用外源性精氨酸血管加压素有效。B、C、D选项尿液虽可增多，但无低渗表现。急性肾小球肾炎可出现血尿，但尿渗透压不降低，故不选 C。原发性醛固酮增多症多引起水钠潴留，不选 E。

32、正确答案：B

答案解析：【解析】淋病是淋病奈瑟菌（简称淋菌）引起的以泌尿生殖系统化脓性感染为主要表现的性传播疾病。

33、正确答案：A

答案解析：【解析】记忆题，考查胰腺癌病理类型。

34、正确答案：D

答案解析：解析：炎症的基本病理变化包括变质、渗出和增生。一、变质：炎症局部组织发生的变性和坏死。二、渗出：炎症局部组织血管内的液体和细胞成分，通过血管壁进入组织间质、体腔、粘膜表面和体表的过程。渗出是炎症最具特征性的变化。；三、增生：包括实质细胞(如鼻粘膜上皮细胞和腺体细胞)和间质细胞(巨噬细胞、血管内皮细胞、成纤维细胞)的增生。

35、正确答案：B

答案解析：

36、正确答案：D

答案解析：解析：复位是将移位的骨折段恢复正常或近乎正常的解剖关系，重建骨的支架作用。是治疗骨折的首要步骤，也是骨折固定和功能锻炼的基础。早期正确的复位，是骨折愈合过程顺利进行的必要条件。

37、正确答案：D

答案解析：解析：慢性肺心病右心增大，左心上翘。

38、正确答案：C

答案解析：【解析】右心感染性心内膜炎时，赘生物碎落进入肺动脉及其分支，易形成肺动脉栓塞。根据血流运行方向，可知右心感染性心内膜炎最常见的栓塞部位是肺动脉，左向右分流的先天性心血管病常见的栓塞部位也是肺动脉。

39、正确答案：A

答案解析：【解析】交感神经功能特点：（1）紧张性支配：例如，切断心交感神经后，心率减慢；切断支配虹膜的交感神经后，瞳孔缩小。（2）受效应器功能状态的影响：例如，刺激交感神经能引起未孕动物的子宫运动抑制，而对有孕子宫却可加强其运动。（3）对整体生理功能的调节意义：在环境急剧变化时，交感神经系统可以动员机体许多器官的潜力以适应环境的变化；



副交感神经的功能特点：副交感神经系统的作用与交感神经作用相反，它虽不如交感神经系统具有明显的副交感神经一致性，但也有相当关系。副交感神经系统可保持身体在安静状态下的生理平衡，其作用有三个方面：①增进胃肠的活动，消化腺的分泌，促进大小便的排出，保持身体的能量。②瞳孔缩小以减少刺激，促进肝糖原的生成，以储蓄能源。③心跳减慢，血压降低，支气管缩小，以节省不必要的消耗，协助生殖活动，如使生殖血管扩张，性器官分泌液增加。

40、正确答案：E

答案解析：解析：产后 1 周内使用吲哚美辛治疗；。

41、正确答案：B

答案解析：解析：各选项对比，肯定是疑有恶变尽快手术。

42、正确答案：E

答案解析：；【解析】正常的思维过程一般都具有目的性、连贯性和经济性等特点。

43、正确答案：C

答案解析：解析：麦角胺对部分病人有效。它是 5-HT 受体的促动剂，也有直接收缩血管作用。主要激动 5-HT<sub>1A</sub> 受体，但对多巴胺，肾上腺素受体也有作用，因此副作用较大。

44、正确答案：B

答案解析：乳头状癌乳头状癌是最常见的甲状腺癌，约占成人甲状腺癌的80%以上。低度恶性，易发生颈淋巴结转移，但预后较好。

45、正确答案：D

答案解析：佝偻病颅骨软化多发生于3-6月份，婴儿头骨软化的发生率相对较高

46、正确答案：C

答案解析：【解析】社区获得性肺炎是指在医院外罹患的感染性肺实质（含肺泡壁即广义上的肺间质）炎症，包括具有明确潜伏期的病原体感染而在入院后平均潜伏期内发病的肺炎。

47、正确答案：C

答案解析：解析：胎盘早剥分为3度。①Ⅰ度：多见于分娩期。胎盘剥离面积小，患者常无腹痛或腹痛轻微，贫血体征不明显。子宫软，大小与妊娠周数相符，胎位清楚，胎心率正常。产后检查见胎盘母体面有凝血块及压迹。②Ⅱ度：胎盘剥离面达胎盘面积1/3左右。主要症状为突然发生持续性腹痛、腰酸或腰背痛，疼痛程度与胎盘后积血量成正比。无阴道流血或流血量不多，贫血程度与阴道流血量不相符。子宫大于妊娠周数，宫底随胎盘后血肿增大而升高。胎盘附着处压痛明显（胎盘位于后壁则不明显），宫缩有间歇，胎位可触清，胎儿存活。③Ⅲ度：胎盘剥离面超过胎盘面积1/2。临床表现较Ⅱ度重。患者出现恶心、呕吐、面色苍白、四肢湿冷、脉搏细数、血压下降等休克症状，休克程度多与阴道流血量不成正比。子宫硬如板状，于宫缩间歇

时不能松弛，胎位扪不清，胎心消失。患者无凝血功能障碍属Ⅲa，有凝血功能障碍属Ⅲb。胎盘早剥是妊娠期发生凝血功能障碍最常见原因，伴有死胎时约 1/3 发生。

48、正确答案：D

答案解析：

49、正确答案：E

答案解析：

50、正确答案：D

答案解析：解析：原发型肺结核在营养不良患传染病和长期应用免疫抑制剂导致抵抗明显下降者均可发展为急性粟粒型肺结核。

51、正确答案：D

答案解析：记忆题，考查 RNA 合成过程。

52、正确答案：B

答案解析：解析：子宫肌瘤按肌瘤与子宫肌壁的关系分三类：肌壁间肌瘤、浆膜下肌瘤、黏膜下肌瘤。大的肌壁间肌瘤使宫腔及内膜面积增大，宫缩不良。黏膜下肌瘤常为月经过多，随肌瘤增大，经期延长。浆膜下肌瘤及肌壁间小肌瘤常无明显的月经改变。故 B 正确。

53、正确答案：D

答案解析：【解析】必需脂肪酸是为人体所需要但身体自己却不能制造必须从外界摄取的脂肪酸,而非必需脂肪酸是身体自己能自行制造的脂肪酸。

54、正确答案：C

答案解析：记忆题

55、正确答案：A

答案解析：【解析】：垂体加压素试验：鉴别中枢性尿崩症和肾性尿崩症。限水试验阳性者做此试验，两试验可连续进行，结束限水试验时，皮下注射垂体后叶加压素 2.5-5 单位，以后每小时测尿比重、尿量及血压。尿比重 > 1.016 为垂体性尿崩症。

56、正确答案：E

答案解析：【解析】：中国人急性胰腺炎常见病因是胆道系统疾病。

57、正确答案：C

答案解析：解析：糖皮质激素具有强大的抗炎作用，能抑制多种原因造成的炎症反应，炎症初期能提高血管的紧张性，减轻充血，同时抑制白细胞浸润剂吞噬反应。在炎症后期，激素抑制胶原蛋白粘多糖的合成肌肉芽组织的增生，防治粘连剂瘢痕形成，激素若使用不当可致感染扩散，创面延迟愈合。

58、正确答案：C

答案解析：【解析】二尖瓣狭窄引起左心室、右心房、右心室扩大，形成"



梨形心"。

59、正确答案：C

答案解析：【解析】：尿毒症患者血液系统的临床表现：肾性贫血和出血倾向。贫血常为中、重度，其原因是红细胞生成素缺乏。晚期有出血倾向，原因是血小板功能降低。因此本题选C。

60、正确答案：B

答案解析：解析：草绿色链球菌是引起亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌；金黄色葡萄球菌是引起急性感染性心内膜炎最常见的致病菌。

61、正确答案：E

答案解析：解析：记忆题,考查胃酸分泌。

62、正确答案：B

答案解析：解析：记忆题,每张处方所包含的药品种类上限为5种。

63、正确答案：C

答案解析：【解析】一些本能冲动、被压抑的欲望或生命力却在不知不觉的潜在境界里发生，因不符合社会道德和本人的理智，无法进入意识被个体所察觉，这种潜伏者的无法察觉的思想、观念、欲望等心理活动被称之为"潜意识"。

64、正确答案：D

答案解析：【解析】：当确诊为脾破裂时，在抗休克的同时行脾切除或脾缝合修补术。白细胞计数多升高，手术如无其他脏器损伤，可收集腹腔内的血行自体输血。

65、正确答案：B

答案解析：【解析】记忆题，考查药品的监管。

66、正确答案：B

答案解析：【解析】：临床预防服务是在临床环境下一级预防和二级预防的结合，其服务所针对的主要是健康人和无症状的“患者”。故本题答案是B。

67、正确答案：D

答案解析：【解析】：新生隐球菌是深部感染真菌中隐球菌属的主要菌种之一，种类较多，广泛分布与自然界。

68、正确答案：C

答案解析：解析：矽肺是由于长期吸入大量游离二氧化硅粉尘所引起，以肺部广泛的结节性纤维化为主的疾病。矽肺是尘肺中最常见、进展最快、危害最严重的一种类型。

69、正确答案：C

答案解析：【解析】：腹外疝分为易复性、难复性、嵌顿性、绞窄性等临床类型，前两者其内容物无血运障碍，嵌顿性疝和绞窄性疝是一个病理过程的

两个阶段，嵌顿如不能及时解除，肠管及其系膜受压情况不断加重可使动脉血流减少、最后导致完全阻断，形成绞窄性疝，故疝内容物是否有血液循环为判断疝是否绞窄的依据，故本题答案为 A。

70、正确答案：D

答案解析：【解析】：基因表达调控中，转录起始水平的调节，对基因表达起着至关重要的作用，转录起始是基因表达调控的基本控制点。

71、正确答案：D

答案解析：【解析】：患者属于慢性支气管炎，上感常使病情进入急性期，常需低浓度氧疗，如果氧浓度过高，呼吸中枢受到抑制使呼吸运动减少，导致二氧化碳潴留。

72、正确答案：C

答案解析：解析：年轻已婚女性,阴道流血,腹痛,考虑流产,患者,持续一侧下腹痛,并有不凝血抽出提示妊娠破裂,出血致休克。

73、正确答案：C

答案解析：解析：卵巢囊肿蒂扭转的典型症状是突然发生一侧下腹剧痛，常伴恶心、呕吐甚至休克，系腹膜牵引绞窄引起。妇科检查扪及肿物张力较大，有压痛，以瘤蒂部最明显，并有肌紧张。有时扭转自然复位，腹痛随之缓解。

74、正确答案：E



答案解析：解析：Dixon 手术由于吻合口位于齿状线附近，在术后的一段时间内病人出现便次增多、排便控制功能较差。

75、正确答案：C

答案解析：【解析】先天性甲状腺低下的临床表现

76、正确答案：B

答案解析：解析：结合该患者的病史及临床症状，诊断为血栓闭塞性脉管炎，其诱发因素与吸烟、骤冷、外伤等有密切关系。本病多见于 20-40 岁的男性，血管闭塞性脉管炎的处理包括：急救止血及手术治疗两个方面，故 B 项错误。

77、正确答案：B

答案解析：解析：该病例的特点为 40 岁以上男性，间歇性无痛肉眼血尿，膀胱镜检见输尿管口喷血，静脉尿路造影见肾盂内充盈缺损，其诊断应是肾盂癌。

78、正确答案：E

答案解析：解析：胸痛，呼吸困难气促，咳血是肺动脉栓塞三联征，有时候晕厥是首发症状。颈静脉充盈，肺动脉瓣区亢进符合该疾病的体征。

79、正确答案：B

答案解析：解析：X 线显示骨膜反应，且呈日光征，考虑为恶性骨肿瘤，患者 13

岁,为骨肉瘤高发年龄,最可能诊断为骨肉瘤。

80、正确答案：B

答案解析：【解析】：患者初产妇，已经 12 小时宫缩，胎儿下降位置可 S+1，紧急处理为破膜。宫口开 3cm 以上，无头盆不称，胎头已经衔接，行人工破膜。

81、正确答案：E

答案解析：

82、正确答案：D

答案解析：解析：药物性帕金森综合征，顾名思义就是由于药物使用不当而引发帕金森症的一种疾病。有可能诱发帕金森综合征的常用药物，有止吐药、降压药、安定药等。具有代表性的像降压药利血平；止吐药胃复安；抗精神病药氯丙嗪、奋乃静、氟奋乃静、氟哌啶醇、氟利多；抗抑郁剂丙咪嗪、阿密替林、多虑平、单胺氧化酶抑制剂苯乙肼、苯环丙胺等。该患者长期服用氟桂利嗪出现锥体外系症状，首先考虑为药物性帕金森综合症。

83、正确答案：C

答案解析：解析：过敏性紫癜是一种较常见的微血管变态反应性出血性疾病，常表现为双下肢对称性紫癜，伴腹痛和关节痛

84、正确答案：C

答案解析：解析：激素抵抗性肾病综合征是指肾病综合征患者使用常规剂量(泼尼松 1mg / kg·d)的激素治疗 8~12 周无效，或初始激素治疗有效，复发后再次使用无效的情况。在 4 周内转阴为激素敏感型。

85、正确答案：D

答案解析：解析：多次输血产生白细胞抗体的患者一般选去除白细胞的红细胞。

86、正确答案：C

答案解析：解析：吲达帕胺肾功不全的禁用，糖尿病慎用，本例心动过缓禁用于  $\beta$ -受体阻滞剂，螺内酯保钾，慎用于肾功不全者，氨氯地平降低血压增加心率，缬沙坦不但降压而且降尿蛋白和保护肾功作用。

87、正确答案：D

答案解析：

88、正确答案：C

答案解析：解析：肺炎最常见的致病菌为肺炎链球菌。结合患者的病史，最可能的致病菌是肺炎链球菌。

89、正确答案：D

答案解析：解析：本例为低血糖表现，首先进食或口含糖块或输葡萄糖。

90、正确答案：B

答案解析：【解析】胸骨左缘 3、4 肋间可闻及抓刮样粗糙音，屏气时仍存在是纤维素心包炎的特征诊断。

91、正确答案：E

答案解析：【解析】：患者干咳、喘憋，季节性发作，抗感染无效，自行缓解，考虑为支气管哮喘。故本题选 E。

92、正确答案：D

答案解析：解析：肝功能检查正常排除慢性肝炎，肝硬化代偿期，症状较轻，常缺乏特异性，以疲倦乏力、食欲减退及消化不良为主。可有恶心、厌油、腹部胀气、上腹不适、隐痛及腹泻。

93、正确答案：E

答案解析：对乳头溢液,而未扪及肿块，可作乳头溢液涂片细胞学检查，找到癌细胞即可确诊乳腺癌

94、正确答案：C

答案解析：【解析】：进行性血胸时才开胸查因，一般情况下采取胸腔闭式引流术。

95、正确答案：C

答案解析：【解析】：脊髓震荡：脊髓遭受强烈振荡后立即发生迟缓性瘫痪，损伤的平面以下，运动丧失，只是短暂性功能抑制，可以在数分钟或数小



时内完全恢复。

96、正确答案：E

答案解析：解析：1. 咳嗽持续发生或者反复发作一个月以上，常在夜间发生或清晨发作性咳嗽，运动后加重，痰多 2. 化验或者其他检查表明没有明显的感染征象或者经过长期的抗生素治疗无效 3. 用支气管扩张剂可以使发作减轻 4. 有个人过敏史即伴有湿疹、荨麻疹、过敏性鼻炎等病史，也可以查出家族过敏史 5. 运动、冷空气、过敏原或者病毒性感染等诱发哮喘发作 6. 哮喘有季节性，多见于春、秋两季且反复发作 7. 胸部 X 线片显示正常或者肺纹理增加但无其他器质性改变。符合以上特点的患者应当确诊为咳嗽变异性哮喘。

97、正确答案：D

答案解析：【解析】：患者食欲减退，消瘦，黑便，上消化道造影示胃粘膜紊乱，胃壁僵硬，故诊断为胃癌，最常见的转移途径为淋巴转移。

98、正确答案：D

答案解析：【解析】开放性骨折特别是污染较重或伴有较严重的软组织损伤者好发感染。若清创不彻底，可导致化脓性骨髓炎。

99、正确答案：B

答案解析：解析：慢性肾衰竭导致高血钾，最大危害是导致心搏骤停。所以本题的正确答案是 B。

100、正确答案：B

答案解析： 【解析】：患者为老年女性，无生育要求，且为 CINⅢ，故可行子宫切除术，以防发展为浸润癌。

101、正确答案：D

答案解析： 【解析】：右上腹刀刺伤后首先应该探查实质性脏器，位于右上腹的实质性脏器是肝脏和肾脏，肝脏体积大，容易受伤，所以应该先探查肝脏。

102、正确答案：C

答案解析： 【解析】：弹片损伤，可能深度过深时合并破伤风感染，应该延期缝合。

103、正确答案：C

答案解析： 【解析】：炎性乳腺癌往往发病急骤，患者多数以乳房皮肤的红、肿、热等乳房炎性症状而就诊，炎性乳腺癌的体征，常见乳房弥漫性或局限性皮肤硬化、变厚、表面不平，皮肤水肿似橘皮样，可有卫星结节。皮肤最初呈粉红色，很快变成瘀血样紫红色，呈丹毒样改变。乳房迅速增大，皮温增高，触之韧感，常见乳头干裂、结痂和内陷。

104、正确答案：E

答案解析：首先根据直腿抬高试验阳性，加强试验阳性，诊断为腰椎间盘突出症，再根据具体表现，选 E

105、正确答案：C

答案解析：【解析】红色样变多见于妊娠期或产褥期，为肌瘤的一种特殊类型坏死，患者可有剧烈腹痛伴恶心呕吐。

106、正确答案：C

答案解析：根据临床表现及经历，不难诊断该患者为淋病。

107、正确答案：D

答案解析：【解析】：睾丸鞘膜积液呈球形成卵圆形，表面光滑，有弹性和囊性感无压痛，触不到睾丸和附睾透光试验阳性。

108、正确答案：E

答案解析：胎心变异

109、正确答案：D

答案解析：【解析】：结合患者的症状考虑为慢性胃炎，诊断首选胃镜。

110、正确答案：C

答案解析：【解析】：应激性溃疡出血指重度颅脑损伤后，食管、胃和十二指肠的急性出血性黏膜糜烂和出血，其溃疡病变常呈多发性，形状不规则、范围较大而表浅，糜烂溃疡的部位可从食管、胃到十二指肠，但胃窦部一般不被累及。多仅累及黏膜，罕有超过黏膜肌层者，以上特点与消化性溃疡显著不同。除了重度颅脑损伤外，这种应激性溃疡出血也可见于其他严重创伤（包括烧伤）、重大手术，本病例由头颈部、双上肢浅Ⅱ°烧伤引发，最可能原因为应

激性溃疡出血，A、B、D、E 需排除。故本题选 C。临床表现特点为伤者在事先毫无自觉症状，也没有消化性溃疡史的情况下，突然发生上消化道大出血或穿孔，但大出血远较穿孔多见。出血时不伴腹痛，多呈间歇性。首次出血多在外伤后几天才出现。

111、正确答案：C

答案解析：

112、正确答案：D

答案解析：

113、正确答案：E

答案解析：

114、正确答案：B

答案解析：

115、正确答案：C

答案解析：

116、正确答案：E

答案解析：

117、正确答案：A

答案解析：

118、正确答案：E

答案解析：

119、正确答案：C

答案解析：

120、正确答案：E

答案解析：

121、正确答案：D

答案解析：

122、正确答案：D

答案解析：

123、正确答案：A

答案解析：

124、正确答案：D

答案解析：

125、正确答案：E



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

答案解析：

126、正确答案：E

答案解析：

127、正确答案：B

答案解析：

128、正确答案：A

答案解析：

129、正确答案：E

答案解析：

130、正确答案：B

答案解析：

131、正确答案：B

答案解析：

132、正确答案：A

答案解析：

133、正确答案：D



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



答案解析：

134、正确答案：B

答案解析：解析：1.患者外伤后出现肿胀明显、疼痛剧烈、缝合处血性液体渗出多，恶臭等症状，说明已经发生了厌氧菌感染，选D。2.其原因是外伤的简单的创口缝合，清创不彻底导致伤口出现无氧环境。

135、正确答案：B

答案解析：

136、正确答案：D

答案解析：解析：1.育龄期女性常规的避孕方法为宫内节育器、药物及避孕套。长效口服避孕药多不采用；紧急避孕药不是常规避孕方法；而外用杀精子剂、安全期避孕失败率较高。故只能选择E。2.宫内节育器的避孕原理是利用异物引起的无菌性炎症，影响受精卵在子宫内膜着床。

137、正确答案：E

答案解析：

138、正确答案：C

答案解析：解析：1.此患者诊断为绞窄性股疝，股疝传统术式是E。2.此为女性无精索，所以ABDE皆错误

139、正确答案：C

答案解析：

140、正确答案：C

答案解析：解析：1.心包积液典型的特征为 Ewart 征：表现为心音低钝、遥远，心尖搏动减弱。2.最有助于确诊心包积液的辅助检查是超声心动图。

141、正确答案：E

答案解析：

142、正确答案：D

答案解析：

143、正确答案：B

答案解析：

144、正确答案：B

答案解析：

145、正确答案：E

答案解析：

146、正确答案：A

答案解析：

147、正确答案：D

答案解析：

148、正确答案：B

答案解析：

149、正确答案：D

答案解析：

150、正确答案：D

答案解析：解析：1.手足抽搐为甲状旁腺被误切或血供不足所致，血钙下降至  $2.0\text{mmol/L}$  以下，轻则口唇手足麻木，重则四肢抽搐。2.甲状旁腺功能低下对症处理措施：症状轻者可口服钙剂，重者发作时静脉注射 10%葡萄糖酸钙 100-200ml;口服二氢速固醇长期效果较好。