

月度考试

- 1、（A1 型题）关于阻生齿的错误概念是
 - A.阻力可来源于邻牙
 - B.阻力可来源于骨
 - C.阻力可来源于软组织
 - D.只能部分萌出或完全不能萌出
 - E.常见阻生齿为下颌第三磨牙及上颌双尖牙
- 2、（A1 型题）在下列何种情况下可暂不拔除阻生齿
 - A.阻生齿有反复发生冠周炎病史
 - B.阻生齿近中出现食物嵌塞
 - C.完全骨埋伏阻生齿无临床症状
 - D.正畸要求
 - E.阻生齿大面积龋坏
- 3、（A1 型题）阻生牙最常见的牙位是
 - A.下颌第三磨牙
 - B.上颌第三磨牙
 - C.上颌尖牙
 - D.上颌多生牙
 - E.下颌切牙
- 4、（A1 型题）下列对下颌第三磨牙描述错误的是
 - A.颊侧骨板较厚，手术入路及去骨均较困难
 - B.内侧面有舌神经，通常位于根尖下，其位置有的较高，拔除时应避免对其造成损伤
 - C.位于下颌体后部与下颌支交界处，骨由厚变薄，拔除时应防止该部位发生骨折
 - D.形态变异较大，牙根可为 2 根、3 根等
 - E.双侧阻生时，两侧的牙位、形态等彼此相似者在 70% 以上
- 5、（A1 型题）关于切开拔除阻生智齿的切口设计错误的是
 - A.远中切口尽量偏舌侧
 - B.颊侧切口一般不必超过前庭沟
 - C.如仅用远中切口就可以消除阻力，可不作颊侧切口
 - D.应做黏骨膜全层切开，紧贴骨面将瓣翻起
 - E.缝合后切口下应有足够骨支持
- 6、（A1 型题）下列哪种情况下不能做口腔种植术
 - A.活动义齿固位差，黏膜不能耐受，但患者患有严重的无法控制的糖尿病
 - B.口腔内急性炎症已治愈者个别牙缺失，邻牙不宜作基牙
 - C.颌骨内有肿瘤，经手术后需功能性修复者
 - D.对义齿的修复要求高，常规义齿无法满足者
 - E.磨牙游离端缺失者
- 7、（A1 型题）下列描述不属于种植术的并发症的是
 - A.上颌窦或鼻腔损伤
 - B.种植体植入位置不佳
 - C.邻牙损伤
 - D.创口裂开及黏膜穿孔
 - E.神经损伤
- 8、（A1 型题）面部“危险三角区”指的是
 - A.由双侧眼外眦到上唇中点的连线

- B.由双侧眼外眦到颈部正中的连线
 - C.由双侧瞳孔连线的中点到双侧口角的连线
 - D.由双侧眼内眦到双侧鼻翼基脚的连线
 - E.由双侧瞳孔到颈部正中的连线
- 9、(A1型题)口腔颌面部感染中最易发生全身并发症的是
- A.智齿冠周炎
 - B.间隙感染
 - C.化脓性颌骨骨髓炎
 - D.化脓性淋巴结炎
 - E.颜面部疔痈
- 10、(A1型题)描述引起拔牙后出血的局部因素错误的是
- A.软组织撕裂
 - B.牙槽窝内残留牙片
 - C.牙槽内小血管破裂
 - D.牙槽突骨折
 - E.血凝块脱落
- 11、(A1型题)儿童行舌系带矫正术时,最好的年龄是
- A.4~6个月
 - B.7~12个月
 - C.1~2岁
 - D.3~4岁
 - E.4~5岁
- 12、(A1型题)应暂缓拔牙的情况是
- A.妊娠4、5、6个月
 - B.糖尿病的血糖150mg/dl,尿糖(+),无酸中毒
 - C.急性智齿冠周炎伴咬肌间隙感染
 - D.甲状腺功能亢进治疗后心率低于100次/分
 - E.高血压患者血压控制在160/100mmHg
- 13、(A1型题)单纯性高血压无其他合并症,血压高于多少时应先进行治疗后再拔牙
- A.21.3~12.7KPa(160~95mmHg)
 - B.22.7~12.7KPa(170~95mmHg)
 - C.24~13.3KPa(180~100mmHg)
 - D.25.3~13.3KPa(190~100mmHg)
 - E.25.3~14KPa(190~105mmHg)
- 14、(A1型题)患者除了下述何种心脏病时应禁忌拔牙
- A.充血性心力衰竭
 - B.右束支传导阻滞,心功能I级
 - C.前壁心梗5个月
 - D.频发的室性期前收缩未治疗
 - E.近期心绞痛频繁发作
- 15、(A1型题)下列不属于拔牙禁忌证的是
- A.频发心绞痛
 - B.充血性心功能衰竭
 - C.双束支传导阻滞者
 - D.未控制的心律不齐
 - E.8个月前发生过心肌梗死
- 16、(A1型题)患有下列疾病患者在拔牙前后应给予抗生素以预防并发症,但不包括

- A.糖尿病
 - B.先天性心脏病
 - C.慢性肝炎
 - D.风湿性心脏病
 - E.曾做过房间隔缺损修补术的患者
- 17、（A1型题）血友病患者必须拔牙时。首要的处理原则是
- A.拔牙创内填塞止血材料
 - B.注射止血药
 - C.麻药中多量副肾素
 - D.操作轻柔，减少创伤，缝合拔牙创
 - E.术前、术后多次输新鲜血
- 18、（A1型题）下列关于糖尿病患者拔牙哪个描述是错误的
- A.拔牙时空腹血糖应控制在 8.8mmol/L 以下
 - B.接受胰岛素治疗者，拔牙最好在早餐后 1~2 小时内进行
 - C.应该注意预防术中感染
 - D.未控制的严重的糖尿病，应暂缓拔牙
 - E.对于术后能进食者，一般拔牙不影响糖尿病的原治疗方案
- 19、（A1型题）拔牙术引发亚急性细菌性心内膜炎的致病菌是
- A.金黄色葡萄球菌
 - B.大肠杆菌
 - C.甲型溶血性链球菌
 - D.乙型溶血性链球菌
 - E.肺炎球菌
- 20、（A1型题）口腔医师在确定拔牙适应证时首先应考虑的是
- A.患者年龄因素
 - B.有无全身系统疾病
 - C.对局部麻药是否过敏
 - D.女性患者是否在月经期
 - E.患牙是否能够保留
- 21、（A1型题）系带矫正术适应证不包括
- A.成人无牙颌因牙槽骨吸收使系带附丽接近牙槽嵴顶，影响全口义齿的稳定与固位
 - B.儿童上唇系带附着过低，上中切牙之间有较大间隙
 - C.幼儿及儿童舌系带过短，舌前伸受限呈“W”形
 - D.幼儿及儿童舌系带过短，下中切牙之间摩擦发生溃疡
 - E.先天性腭裂导致发音不清
- 22、（A1型题）用牙挺时，挺刃一般插入牙槽嵴的
- A.颊侧
 - B.舌侧
 - C.邻牙间
 - D.近中颊侧
 - E.远中颊侧
- 23、（A1型题）关于牙根拔除术的说法。错误的是
- A.根钳拔除法为牙根拔除术时首选的方法
 - B.根钳和牙挺均不能拔除的牙根，可考虑用翻瓣去骨拔除
 - C.拔除牙根时要良好的照明
 - D.应用牙挺拔除牙根时，要注意选择挺刃大小、宽度应与牙根相适应
 - E.利用牙挺的楔力挺牙根时，应从牙根断面的最低点楔入

- 24、(A1型题)关于牙挺使用中应遵循的原则,下列哪项是错误的
- A.使用中必须以手指保持防止滑脱
 - B.拔除上颌智齿阻力较小,可以健康的邻牙为支点
 - C.龈缘水平处舌侧骨板不应作为支点
 - D.龈缘水平处颊侧骨板不应作为支点
 - E.使用中注意力量的控制,不可使用过大力量
- 25、(A1型题)牙挺使用时的注意事项中错误的一项是
- A.当邻牙需要同时拔除时,可以其作为支点
 - B.决不能以龈缘水平处的颊侧骨板作支点
 - C.必须以手指保护,以防牙挺滑脱
 - D.用力必须有控制
 - E.可以利用牙挺工作原理拔牙
- 26、(A1型题)牙挺使用的原则中不包括
- A.不可以邻牙作支点,除非邻牙一并拔除
 - B.龈缘水平的颊舌侧均不能作支点,除非拔除智齿或颊舌侧露去骨
 - C.必须以手指作保护,以防牙挺滑脱
 - D.用力必须有控制,用力方向必须正确
 - E.可兼作骨凿,用于增隙和去骨
- 27、(A1型题)单根牙近根尖1/3折断时,取根应采用的器械是
- A.根尖挺
 - B.丁字挺
 - C.根钳
 - D.根挺
 - E.直挺
- 28、(A1型题)关于牙钳使用,下列正确的是
- A.钳喙应尽量向根方夹持
 - B.夹持不可太紧,否则易断根
 - C.多个牙拔除时尽量选用万能牙钳
 - D.手掌握持时应尽量靠近牙钳关节
 - E.使用牙钳只能唇(颊)舌(腭)向摇动,否则易断根
- 29、(A1型题)拔上颌磨牙时牙根完整拔除,拔牙后发现口腔上颌窦瘘,但穿孔不大时
- A.必须做瘘口修补术
 - B.使拔牙创充满血块
 - C.冲洗拔牙创
 - D.填塞明胶海绵
 - E.行上颌窦根治
- 30、(A1型题)腭黏骨膜旋转瓣修补口腔上颌窦瘘最适宜的部位是
- A.靠腭侧的较大瘘孔
 - B.靠颊侧的较大瘘孔
 - C.靠近腭大孔的瘘孔
 - D.靠近腭小凹的瘘孔
 - E.局部无炎症时方可进行
- 31、(A2型题)患者,女,56岁,拔除右上后牙后伤口愈合良好。无明显炎症。半月后常感伤口疼痛不适,尤其触碰伤口颊侧时有明显疼痛,X线片检查无异常,常见的原因是
- A.伤口内有残根
 - B.伤口内有肉芽
 - C.干槽症
 - D.骨尖

E.神经损伤

32、（A2 型题）患者下前牙因残冠而行拔除术。拔牙脱位时因保护不够牙钳碰及上前牙。术后两天上前牙出现咬合痛。口腔检查：左上 1 牙体未见明显龋损，牙周检查无异常，叩诊(+)。引起咬合痛的可能原因是

- A.咬硬物损伤
- B.牙龈撕裂伤
- C.外伤
- D.拔牙时伤及对颌牙
- E.急性根尖周炎

33、（A1 型题）口腔种植学的指导理论是

- A.骨结合理论
- B.纤维结合理论
- C.骨牵张理论
- D.微创理论
- E.骨粘连理论

34、（A1 型题）常用的牙种植体种类为

- A.骨内种植体
- B.骨膜下种植体
- C.黏膜下种植体
- D.牙内种植体
- E.牙内骨内种植体

35、（A1 型题）口腔颌面部间隙的正确定义为

- A.正常情况下，颌面部各组织之间存在的间隙
- B.颌面部肌肉和涎腺之间存在的间隙
- C.颌面部间隙感染不易扩散
- D.颌面部各间隙之间无沟通
- E.正常情况下，颌面部各组织之间解剖结构上的潜在间隙

36、（A1 型题）颌面部间隙感染最常见的原因是

- A.血源性
- B.腺源性
- C.外伤性
- D.牙源性
- E.继发于其他感染

37、（A1 型题）口腔颌面部感染特点，不正确的是

- A.感染途径以腺源性为主
- B.需氧菌与厌氧菌的混合感染最多见
- C.牙源性感染极易波及颌骨与颌周软组织
- D.口腔颌面部感染沿相应淋巴引流途径扩散，可发生区域淋巴结炎
- E.正常时即有大量微生物存在，机体抵抗力下降时发生感染

38、（A1 型题）颌面部化脓性感染的局部表现一般为

- A.局部红、肿、热、痛、功能障碍
- B.局部软组织广泛性水肿
- C.局部产生皮下气肿，有捻发音
- D.局部剧烈疼痛，有脓肿形成
- E.张口受限，影响语言、咀嚼

39、（A1 型题）眶下间隙感染来源中，不包括

- A.上颌骨骨髓炎

- B.上颌第一前磨牙化脓性炎症
 - C.上颌尖牙化脓性炎症
 - D.上颌第二磨牙根尖化脓性炎症
 - E.上唇底部化脓性炎症
- 40、（A1型题）下列哪种间隙感染为最常见口腔颌面部间隙感染之一
- A.咬肌间隙感染
 - B.舌下间隙感染
 - C.咽旁间隙感染
 - D.颞下间隙感染
 - E.翼下颌间隙感染
- 41、（A1型题）咬肌间隙感染如未及时切开引流。最常引起的并发症是
- A.败血症
 - B.脓毒血症
 - C.下颌骨中央性骨髓炎
 - D.颈间隙感染
 - E.下颌骨边缘性骨髓炎
- 42、（A1型题）新生儿颌骨骨髓炎的感染来源多为
- A.腺源性
 - B.血源性
 - C.损伤性
 - D.牙源性
 - E.医源性
- 43、（A1型题）颊间隙感染来源常见于
- A.上下颌磨牙
 - B.上下颌双尖牙
 - C.上下颌尖牙
 - D.上下颌切牙
 - E.A+B
- 44、（A1型题）有关口腔颌面部感染的治疗原则，哪项是错误的
- A.口腔颌面部感染的治疗应采用全身抗感染和支持疗法，结合局部治疗
 - B.注意保持局部清洁，减少活动，避免不良刺激
 - C.感染早期可局部外敷，炎症局限、脓肿形成时应及时切开引流
 - D.在急性炎症控制后进行，要彻底控制感染，必须清除病灶，如拔除患牙、清除死骨块等
 - E.对于间隙感染等比较严重的感染应该积极预防其他并发症的出现
- 45、（A1型题）不易导致张口困难的间隙感染是
- A.咬肌间隙感染
 - B.颞间隙感染
 - C.舌下间隙感染
 - D.翼下颌间隙感染
 - E.颊间隙感染
- 46、（A1型题）冠周炎的病因是
- A.因智齿萌出最晚
 - B.冠周龈瓣与牙冠之间的盲袋易堆积食物及细菌
 - C.颌骨长度不足
 - D.下颌智齿发育异常
 - E.邻牙牙周炎
- 47、（A1型题）下列哪种现象不是智齿冠周炎局部检查的常见表现
- A.局部糜烂颗粒状增生似菜花状

- B.挤压龈袋可有脓液溢出
- C.肿胀的龈瓣覆盖低位阻生齿
- D.严重者炎症可波及舌腭弓和咽侧壁
- E.化脓性炎症局限后，可形成冠周脓肿

48、（A1型题）卢德维(Ludwig's)咽峡炎指

- A.腐败坏死性龈口炎
- B.化脓性咽峡炎
- C.腐败坏死性口底蜂窝织炎
- D.化脓性扁桃体炎
- E.粒细胞缺乏症

49、（A1型题）化脓性颌骨骨髓炎根据临床病理特点，病变始于颌骨骨松质和骨髓者称为

- A.边缘性骨髓炎
- B.放射性骨髓炎
- C.中央性骨髓炎
- D.婴幼儿上颌骨骨髓炎
- E.根尖周致密性胃炎

50、（A1型题）下列治疗颜面部疔痈的方法错误的是

- A.保守治疗
- B.10%高渗盐水纱布湿敷
- C.及早切开引流
- D.全身运用大剂量有效抗生素
- E.全身支持治疗

51、（A1型题）疔的局部治疗宜采用

- A.热敷
- B.尽早切开引流
- C.硝酸银或苯酚烧灼
- D.高渗盐水纱布持续湿敷
- E.切开引流后尽早停止局部湿敷

52、（A1型题）面部疔痈易发生全身并发症的原因除外

- A.病原菌毒力强
- B.静脉多有瓣膜
- C.颜面部血液循环丰富
- D.颜面表情肌的活动
- E.感染侵入面静脉时血栓形成，致静脉回流受阻

53、（A1型题）瘻孔中长期排脓，有时可排出死骨片的颌骨骨髓炎是

- A.新生儿颌骨骨髓炎
- B.中央性颌骨骨髓炎急性期
- C.中央性颌骨骨髓炎慢性期
- D.边缘性颌骨骨髓炎增生型
- E.边缘性颌骨骨髓炎溶解破坏型

54、（A1型题）化脓性中央性颌骨骨髓炎绝大多数发生于下颌骨的原因是

- A.下颌骨与上颌骨比较，无腔窦，骨外板厚、致密
- B.炎症发生时不易穿破引流
- C.单一血管供应，侧支循环少
- D.血管栓塞后可造成大块骨组织营养障碍及死骨形成
- E.以上原因共同作用的结果

55、（A1型题）化脓性颌骨骨髓炎临床中下列哪项是正确的

- A.疼痛不明显
- B.多为血源性
- C.常形成广泛的骨质破坏
- D.常在发病 5 周后由急性期转为慢性期
- E.占各类颌骨骨髓炎的比例为 90%以上

56、（A1 型题）对于下颌骨中部粉碎性骨折引起的呼吸困难首要的抢救措施是

- A.固定颌骨
- B.清除分泌物
- C.头低侧卧位
- D.牵舌向口外
- E.气管切开

57、（A1 型题）当出现双侧后牙早接触，前牙开，侧方运动受限时表示

- A.颞部骨折
- B.单侧髁状突骨折
- C.双侧髁状突骨折
- D.颞孔区骨折
- E.下颌角部骨折

58、（A1 型题）髁状突骨折患者应重视张口训练，其原因是

- A.防止关节内纤维增生，避免以后发生颞下颌关节强直
- B.使髁状突保持在功能位，促进髁状突复位
- C.使髁状突处于功能状态，促进骨折早期愈合
- D.张口时髁状突与骨折段之间的距离增加，避免下颌支向上方移位引起颌骨畸形
- E.张口时髁状突所受应力较小，使骨折免受不良应力干扰

59、（A1 型题）单侧下颌颞孔部垂直骨折，后段骨折片常向前上方移位并稍偏健侧是由于

- A.前段骨折片所附升颌肌群牵引
- B.后段骨折片所附升颌肌群牵引
- C.前段骨折片所附降颌肌群牵引
- D.后段骨折片所附降颌肌群牵引
- E.后段骨折片所附翼外肌牵引

60、（A1 型题）一侧颞部撕裂伤患者，现场有急救包的情况下，能够采用的止血方法是

- A.压迫止血
- B.包扎止血
- C.结扎止血
- D.填塞止血
- E.缝扎止血

61、（A1 型题）缝合舌组织创伤的方法中。错误的是

- A.使用较粗缝线缝合
- B.尽量保持舌的纵长度
- C.边距要大，缝得要深
- D.可将舌尖向后折转缝合
- E.创伤累及相邻组织时，应分别缝合

62、（A1 型题）现代医学认为，绝大多数恶性肿瘤的发生可能有内在和外在因素，下述因素中，不是内在因素的是

- A.机体免疫状态
- B.遗传因素
- C.神经精神因素
- D.生物性因素
- E.基因突变

- 63、(A1 型题) 以下说法哪项不正确
- A.恶性肿瘤组织来源不同, 治疗方法各异
 - B.根据肿瘤侵犯的范围, 国际抗癌协会制定了 TNM 分类法
 - C.T 表示原发肿瘤
 - D.N 表示肿瘤大小
 - E.M 表示有无远处转移
- 64、(A1 型题) 肿瘤治疗不包括
- A.手术
 - B.放疗
 - C.化疗
 - D.理疗
 - E.生物治疗
- 65、(A1 型题) 血友病患者必须拔牙时, 应将凝血因子Ⅷ浓度提高到正常的
- A.30%
 - B.10%
 - C.50%
 - D.20%
 - E.60%
- 66、(A1 型题) 关于分离牙龈正确的说法是
- A.可减少拔牙时软组织阻力
 - B.应分离至釉牙骨质界
 - C.乳牙拔除时可不分离牙龈
 - D.分离牙龈的目的是避免牙钳夹伤牙龈
 - E.上颌双侧第一前磨牙正畸时可不用分离牙龈
- 67、(A1 型题) 小儿大多数面颈部淋巴结炎感染来源是
- A.牙源性感染
 - B.口腔黏膜感染
 - C.颜面部皮肤损伤
 - D.面部疖痈
 - E.上呼吸道感染及扁桃体炎
- 68、(A1 型题) 以下哪项不是良性肿瘤的特征
- A.一般生长较慢
 - B.细胞分化好, 细胞形态和结构与正常相似
 - C.一般对机体无影响
 - D.多呈浸润性生长
 - E.一般不发生转移
- 69、(A1 型题) 月经周期中的激素变化错误的是
- A.排卵前 24 小时, FSH 出现高峰
 - B.排卵前 24 小时, LH 出现陡直高峰
 - C.LH 陡直高峰持续 24 小时后骤降
 - D.雌激素在排卵前后各出现一个高峰
 - E.孕激素在排卵前后各出现二个高峰
- 70、(A1 型题) 使子宫内膜从增殖期转变为分泌期的激素是
- A.GnRH
 - B.促性腺激素
 - C.雄激素
 - D.雌激素
 - E.孕激素

- 71、(A1 型题) 羊水的来源与吸收正确的是
- A. 胎儿尿液是妊娠早期羊水的主要来源
 - B. 妊娠 18 周后是母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
 - C. 胎儿的消化道是吸收羊水的重要途径
 - D. 脐带华通胶不吸收羊水
 - E. 妊娠中期以后, 羊水渗透压逐渐增高
- 72、(A1 型题) 乳房出现与妊娠无关的变化是
- A. 乳晕皮脂腺肥大形成蒙氏结节
 - B. 乳头增大并变黑
 - C. 可以挤出稀薄黄色液体
 - D. 乳头凹陷
 - E. 乳晕变黑
- 73、(A1 型题) 胚胎期指的是受孕后的
- A. 8 周以内
 - B. 9 周以内
 - C. 10 周以内
 - D. 11 周以内
 - E. 12 周以内
- 74、(A1 型题) 小儿体格发育的两个高峰期是
- A. 青春期、学龄期
 - B. 学龄期、学龄前期
 - C. 青春期、幼儿期
 - D. 青春期、婴儿期
 - E. 学龄期、新生儿期
- 75、(A1 型题) 小儿语言发育三个阶段的顺序是
- A. 发音、理解、表达
 - B. 理解、表达、发音
 - C. 表达、理解、发音
 - D. 听觉、发音、理解
 - E. 模仿、表达、理解
- 76、(A1 型题) 判断小儿体格发育最常用的指标是
- A. 动作发育能力
 - B. 语言发育程度
 - C. 智能发育水平
 - D. 神经反射发育
 - E. 体重、身高、头围
- 77、(A1 型题) 医学心理学的研究对象为
- A. 心理活动的规律的学科
 - B. 人类行为的科学发展
 - C. 疾病的发生发展的规律
 - D. 影响健康的有关心理问题和行为
 - E. 疾病的预防和治疗的原则
- 78、(A1 型题) 将人的心理活动分为潜意识、前意识和意识的理论是
- A. 行为主义理论
 - B. 心理生理理论
 - C. 认知学派理论
 - D. 精神分析理论

E.人本主义理论

- 79、(A1型题)“入芝兰之室，久闻而不知其香”说明的是
- A.感觉过敏
 - B.感觉适应
 - C.感觉相互作用
 - D.感觉减退
 - E.感受性补偿
- 80、(A1型题)目前我国医学伦理学主要的研究方向是
- A.公民道德问题
 - B.临床医学问题
 - C.公共道德的学说和体系
 - D.生命科学的发展
 - E.医学实践中的道德问题
- 81、(A1型题)医德修养的根本途径是
- A.不断地学习医德理论知识
 - B.创造一个良好的医德修养氛围
 - C.向医德高尚的医务人员学习
 - D.坚持在医疗卫生保健实践中修养
 - E.坚持有的放矢的医德修养
- 82、(A1型题)提出“人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此”观点的是
- A.孙思邈
 - B.扁鹊
 - C.李时珍
 - D.张仲景
 - E.华佗
- 83、(A1型题)下列做法中不违背医学伦理学不伤害原则的是
- A.因急于手术抢救患者，未由家属或患者签手术同意书
 - B.发生故意伤害
 - C.造成本可避免的残疾
 - D.造成本可避免的患者自杀
 - E.造成本可避免的人格伤害
- 84、(A1型题)医生在询问病史时应遵循的道德要求是
- A.举止热情、态度亲如兄弟
 - B.全神贯注、语言得当
 - C.医生在询问病史过程中，能发出惊叹、惋惜等语言
 - D.主导谈话，引导患者说出自己想听的内容
 - E.反复提问，尽量使用专业性术语
- 85、(A1型题)在慢性病诊治过程中，医患关系最理想的模式是
- A.主动-被动型
 - B.共同参与型
 - C.指导-合作型
 - D.主动-主动型
 - E.被动-主动型
- 86、(A1型题)预防医学是研究
- A.人体健康与环境的关系
 - B.个体与群体的健康
 - C.人群的健康

- D.社会环境与健康的关系
- E.健康和无症状患者

- 87、(A1型题) 已知某病患者8人的潜伏期(天)分别是6, 8, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 平均潜伏天数
- A.8
 - B.10
 - C.11
 - D.12
 - E.15
- 88、(A1型题) 关于随机抽样研究中, 下列描述哪项是错误的
- A.采集样本应遵循随机化原则
 - B.实行抽样时, 要使总体中每个个体都有同等机会被抽到
 - C.调查者可在总体中随意抽取任意部分作为样本
 - D.抽取的样本对总体要有代表性
 - E.严格控制的随机抽样有助于减少样本的偏性
- 89、(A1型题) 如果需要比较3~5个月男婴与7~8岁男童的身高变异程度, 应采用下列何种指标
- A.x
 - B.S
 - C.Sx
 - D.CV
 - E.Sp
- 90、(A1型题) 分析胎儿不同出生体重和围产儿死亡率之间是否有关, 可以选用的统计方法是
- A.t检验
 - B.F检验
 - C.X²检验
 - D.相关分析
 - E.秩和检验
- 91、(A1型选择题) 对于铁的摄入, 最好的食物来源是
- A.豆类
 - B.粮谷类
 - C.蔬菜、水果
 - D.动物肝脏
 - E.奶及奶制品
- 92、(A1型题) 食物中毒特征不包括
- A.潜伏期短
 - B.患者临床症状类似
 - C.一般有传染性
 - D.易集体发病
 - E.有明显季节性
- 93、(A1型题) 在环境化学污染物中, 一次污染物是指
- A.从污染源排入环境后, 理化特性发生了变化的污染物
 - B.从污染源直接排入环境后, 理化性质未发生变化的污染物
 - C.从污染源排入环境后, 其毒性增大的污染物
 - D.多个污染物同时排出的同一类污染物
 - E.多种环境介质中都存在的同一类污染物
- 94、(A1型题) 属于《疫苗流通和预防接种管理条例》规定的预防接种异常反应情形是
- A.心理因素发生的群体心因性反应
 - B.实施规范接种后造成受种者的损害
 - C.与受种者疾病偶合出现的损伤

- D.疫苗质量不合格给受种者造成的损害
- E.接种医生违反接种程序造成的损害

95、(A1型题)根据国务院2002年9月1日施行的《医疗事故处理条例》的规定,不属于医疗事故的情况是

- A.医护人员在护理中违反诊疗护理规范造成患者人身损害的后果
- B.医疗过程中患者及其家属不配合诊疗导致不良后果
- C.医务人员因技术过失造成的医疗技术事故
- D.医务人员缺乏经验,在诊疗中违反规章造成患者一般性功能障碍
- E.药房等非临床科室过失导致的患者损害

96、(A2型题)男,65岁。因扁桃体癌行放疗70Gy放疗后2年出现下颌磨牙区黏膜破溃,牙槽突骨面外露并长期溢脓,牙松动。最可能的诊断是

- A.牙周炎
- B.多间隙感染
- C.放射性颌骨骨髓炎
- D.扁桃体癌复发侵犯颌骨
- E.中央性化脓性颌骨骨髓炎

97、(A2型题)男,27岁。因伤致面中部损伤,昏迷半小时。除面中部开放性骨折表现以外。有血及脑脊液自鼻、耳流出。现神志清楚,逆行性遗忘,神经系统检查未见异常。病理反射阴性。若患者烦躁不安,使用的药物中禁忌的是

- A.安定
- B.鲁米那钠
- C.咪唑安定
- D.吗啡
- E.安痛定

98、(A2型题)患者,女,35岁,因颌面部肿物入院。查体见左颊部肿物质地柔软,体位试验阳性,未听及吹风样杂音。最有可能的诊断是

- A.静脉畸形
- B.脂肪瘤
- C.淋巴管畸形
- D.动静脉畸形
- E.囊性水瘤

99、(A2型题)16岁女性,右侧下颌骨逐渐膨大8年,近来增大速度减慢,检查见下颌骨体部弥漫性膨大,但以颊侧更明显,质硬,X线片示右下颌骨体部呈磨砂玻璃样,与骨皮质相移行,术后标本病理检查发现纤维组织代替正常骨组织,其中有较多的纤细骨小梁,最可能的诊断为

- A.牙骨质纤维瘤
- B.骨化性纤维瘤
- C.骨纤维异常增殖症
- D.巨颌症
- E.牙源性纤维瘤

100、(A2型题)一患者因舌受外伤致比较严重的出血,急诊止血的方法应选择

- A.注射止血药物
- B.纱布填塞
- C.颈外动脉结扎
- D.指压患侧总动脉
- E.缝合止血

101、(A2型题)一患者行下颌前部根尖下囊肿刮治术后,应该采用的绷带包扎方法是

- A.四头带
- B.单眼交叉绷带

- C.三角巾
- D.交叉十字绷带
- E.弹性绷带

102、(A2型题)女性,9岁。上颌前牙出现松动10天求拔。口腔检查:右上1开始萌出,右上1滞留,松动III°。最佳麻醉方法是

- A.冷冻麻醉
- B.2%盐酸丁卡因表面麻醉
- C.1%普鲁卡因局部浸润麻醉
- D.鼻腭神经阻滞麻醉
- E.眶下神经阻滞麻醉

103、(A2型题)男性,20岁。右下颌后牙出现肿痛,张口困难7天。检查见右下8斜位阻生,冠周组织稍红肿,张口度1cm,为了增加张口度以便拔除患牙,应采用

- A.下牙槽神经阻滞麻醉
- B.舌神经阻滞麻醉
- C.颊长神经阻滞麻醉
- D.咬肌神经阻滞麻醉
- E.颊神经、切牙神经阻滞麻醉

104、(A2型题)女性,50岁。左下颌后牙出现松动1年求拔除。口腔检查:左下5松动,牙周袋7mm行下牙槽神经+舌神经+颊长神经阻滞麻醉,麻醉成功的标志是

- A.舌肿胀、麻木
- B.同侧下唇、口角麻木
- C.同侧下颌牙麻木
- D.颊侧麻木
- E.A+B

105、(A2型题)女性,28岁。左下颌后牙出现反复肿痛3个月。现无明显症状。口腔检查:左下8近中斜位阻生,冠周组织无明显红肿,盲袋无溢脓,拟局麻下拔除,进针点正确的是

- A.在翼下颌韧带中点处
- B.在翼下颌韧带中点内侧2~3mm
- C.在翼下颌韧带上1/3外侧2~3mm
- D.在翼下颌韧带下1/3外侧3~4mm
- E.在翼下颌韧带中点外侧3~4mm,颊脂体尖端所指处

106、(A1型题)28岁妇女,14岁初潮,月经周期规律,周期35日,持续6日,预测排卵日期应在

- A.第14日
- B.第17日
- C.第21日
- D.第25日
- E.第29日

107、(A2型题)女,50岁,月经周期紊乱2年,现停经40日,基础体温单相,宫颈黏液呈典型羊齿植物叶状结晶,相应的子宫内膜表现应是

- A.增殖期图像
- B.分泌期早期图像
- C.分泌期中期图像
- D.分泌期晚期图像
- E.萎缩型图像

108、(A2型题)6个月龄男婴,近1个月烦躁、多汗、夜惊不安。查体:头发稀疏,心、肺检查未见异常、不能独坐。就诊过程中突然发生两眼上窜、面色青紫、四肢抽动。紧急处理首选

- A.维生素D330万U肌注
- B.10%葡萄糖酸钙10mL稀释1倍静脉缓慢推注

- C.苯巴比妥钠 40mg 肌注
- D.10%葡萄糖液 15mL 静脉注射
- E.20%甘露醇 20mL 静脉注射

109、(A2 型题) 1 岁男孩, 发热, 咳嗽, 气促 1 周, 近一天惊厥 4 次, 意识不清, 查体嗜睡, 双眼凝视, 球结膜水肿, 前囟隆起, 双肺散在中细湿啰音, 脑膜刺激征阳性, 巴氏征阳性, 脑脊液除压力增高外, 其他均正常, 根据病例诊断最大的可能是

- A.肺炎合并轻度缺氧
- B.肺炎合并结脑
- C.肺炎合并化脑
- D.肺炎合并心衰
- E.肺炎合并脑水肿

110、(A1 型题) 某职工, 竞争意识强, 总想胜过他人; 老觉时间不够用, 说话快、走路快; 脾气暴躁, 容易激动; 常与他人意见不一致。其行为类型属于

- A.A 型行为
- B.B 型行为
- C.C 型行为
- D.AB 混合型行为
- E.BC 混合型行为

111、(A1 型题) 患者, 女, 50 岁。10 年来因丈夫有外遇, 夫妻感情不佳, 总想离婚, 但又舍不得孩子, 又怕丢面子, 来到心理咨询门诊, 想问心理咨询师, 离婚好还是不离婚好, 此时心理咨询师最应注意采用的原则是

- A.回避原则
- B.中立原则
- C.耐心原则
- D.综合原则
- E.灵活原则

112、(A2 型题) 女, 45 岁, 大学教授。因车祸导致颅脑损伤, 智力测验显示其智商为 85 分。同时有一位从未接受过正规教育的老人测得智商也是 85。心理治疗师认为前者的智力出现了问题, 而后者正常。这一片段所遵循的原则是

- A.客观性原则
- B.中立性原则
- C.操作性原则
- D.保密性原则
- E.标准化原则

113、(A2 型题) 某人, 因工作压力大, 多年来经常反复出现心烦、心跳过速、胸部不适、出汗, 经心电图、血压、血脂、心脏多普勒检查均正常。这个病人的反应有可能为

- A.躯体疾病
- B.心身障碍
- C.心理症状
- D.神经衰弱
- E.精神疾病

114、(A2 型题) 患儿, 8 岁。言语发音不清, 词汇贫乏, 不能完整表达意思, 能做简单加法, 但不会减法, 简单活动难以完成。对该患儿首选的心理测验为

- A.情绪测验
- B.智力测验
- C.精神评定量表
- D.人格测验
- E.投射测验

115、(A2型题)患者,女,40岁。在心理治疗过程中,医生让该患者打消顾虑,想到什么就说什么,按照原始的想法讲出来。这种方法属于

- A.支持疗法
- B.认知疗法
- C.行为主义
- D.精神分析
- E.人本主义

116、(A2型题)因车祸受重伤的男子被送去医院急救,因没带押金,医生拒绝为患者办理住院手续,当患者家属拿来钱时,已错过了抢救最佳时机,患者死亡。本案例违背了患者权利的哪一点

- A.享有自主权
- B.享有知情同意权
- C.享有保密和隐私权
- D.享有基本的医疗权
- E.享有参与治疗权

117、(A2型题)某患者,因医生开药少而且便宜,所以对医生有意见,诊治医生在对患者作解释时,以下哪一点是不当的

- A.对症下药
- B.合理配伍
- C.节约费用
- D.医生权力有限
- E.遵守医疗报销制度

118、(A2型题)一位医生在为其患者进行角膜移植手术的前一夜,发现备用的眼球已经失效,于是到太平间看是否有尸体能供角膜移植之用,恰巧有一尸体。考虑到征得死者家属意见很可能会遭到拒绝,而且时间也紧迫,于是便取出了死者的一侧眼球,然后用义眼代替。尸体火化前,死者家属发现此事,便把医生告上法庭。经调查,医生完全是为了患者的利益,并没有任何与治疗无关的动机。对此案例的分析,哪个是最恰当的

- A.此案例说明我国器官来源的缺乏
- B.此案例说明我国在器官捐赠上观念的陈旧
- C.此案例说明医生为了患者的利益而摘取眼球在伦理学上是可以得到辩护的
- D.此案例说明首先征得家属的知情同意是一个最基本的伦理原则
- E.此案例说明医院对尸体的管理有问题

119、(A2型题)某幼儿园有200名儿童,近一周内有30名儿童患病,并且有相似的症状,这种情况称之为

- A.散发
- B.暴发
- C.流行
- D.集聚
- E.传染

120、(A2型题)为探索吸烟是否为慢性阻塞性肺病的主要危险因素,对40岁以上的男性5000人连续观察了20年,吸烟是否与慢性阻塞性肺病发病的关系,该研究为

- A.病例对照研究
- B.现况研究
- C.队列研究
- D.临床随访研究
- E.实验研究

121、(A2型题)某男性,某矿场采矿工,年龄25岁,工龄约2年,主诉咳嗽、气短、胸痛就诊。检查发现,X线胸片呈肺纹理增加,伴有块状阴影和典型结节。患者自述,他工作场所条件很差,无防尘设施。此工人最可能患何种类型矽肺

- A.晚发性矽肺

- B.矽肺
- C.煤肺
- D.尘肺
- E.速发性矽肺

122、（A2 型题）李某怀孕期间到医院进行产前检查，此时医生如果发现一些情况存在，就会提出终止妊娠的医学意见，这些情况中不包括

- A.李某有致畸物质接触史
- B.胎儿有严重缺陷
- C.胎儿患严重遗传性疾病
- D.李某患严重高血压，继续妊娠会危及其生命
- E.李某患严重糖尿病，继续妊娠会严重危害其健康

123、（A2 型题）发生医疗事故争议时，关于病历资料和现场实物的处理，做法不正确的是

- A.疑似输液引起不良后果的，医患双方应当共同对现场实物进行封存
- B.封存的病历资料必须是原件
- C.封存的病历资料和实物由医疗机构保管
- D.封存现场实物需要检验的，由医患双方共同指定的依法具有检验资格的检验机构进行检验
- E.医疗机构应妥善保管病历资料

124、（A2 型题）《药品管理法》对医疗机构配制的制剂有一系列规定，下列哪项不符合上述规定

- A.应当是本单位临床需要而市场上没有供应的品种
- B.可以部分在市场销售
- C.必须按照规定进行质量检验
- D.凭医师处方在本医疗机构使用
- E.不得在市场销售

125、（A2 型题）吉林省长春市某医疗机构欲取得麻醉药品的购用印鉴卡，如果要获得长春市人民政府卫生主管部门的批准，应当具备以下条件，除外

- A.有获得麻醉药品处方资格的执业医师
- B.有专职的麻醉药品管理人员
- C.有保证麻醉药品安全储存的设施
- D.有保证麻醉药品和安全储存的管理制度
- E.有获得麻醉药品处方资格的执业助理医师

126、（A2 型题）医师张某给一患者开具了处方。患者取药时，药剂师指出该处方不符合相关规定，不予调配。其理由是

- A.该处方使用了药品通用名称
- B.该处方同时开具了中药和西药
- C.该处方开具了五种药品
- D.该处方注明了三天有效期
- E.该处方开具了七天药物用量

127、（A2 型题）主治医师为一名择期手术患者提交了临床用血申请，经上级医师核准后予以签发，依照《医疗机构临床用血管理办法》的规定，申请的备血量应是

- A.1000 毫升
- B.1200 毫升
- C.1600 毫升
- D.600 毫升
- E.900 毫升

128、（A1 型题）某医疗机构拟开展放射治疗、核医学、X 射线影像诊断工作，批准部门为

- A.设区的市级以上地方人民政府卫生行政部门
- B.所在地县级人民政府卫生行政部门
- C.省级人民政府卫生行政部门

- D.所在地医学会
- E.所在地职业病防治机构

129、（A3/A4 型题）患者，男，24 岁，上唇部肿胀疼痛 3 天，伴发热。体温 38.5℃，上唇肿胀明显、紫红色，可见多个黄白色脓头。此病可诊断为

- A.上唇脓肿
- B.下唇疔
- C.上唇疔
- D.上唇皮脂腺囊肿继发感染
- E.以上都不是

130、（A3/A4 型题）患者，男，24 岁，上唇部肿胀疼痛 3 天，伴发热。体温 38.5℃，上唇肿胀明显、紫红色，可见多个黄白色脓头。此部位感染最常见的致病菌为

- A.铜绿假单胞菌
- B.大肠杆菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.变形杆菌
- E.白色念珠菌

131、（A3/A4 型题）患者，男，24 岁，上唇部肿胀疼痛 3 天，伴发热。体温 38.5℃，上唇肿胀明显、紫红色，可见多个黄白色脓头。此部位感染易引起海绵窦化脓性血栓性静脉炎可能的原因不包括

- A.血运丰富
- B.面静脉无静脉瓣
- C.上唇运动较多
- D.细菌毒力强
- E.局部皮脂腺丰富

132、（A3/A4 型题）患者，男，24 岁，上唇部肿胀疼痛 3 天，伴发热。体温 38.5℃，上唇肿胀明显、紫红色，可见多个黄白色脓头。此患者的治疗方案中，哪项是错误的

- A.局部高渗盐水持续湿敷
- B.全身运用抗生素
- C.加强营养，增强抵抗力
- D.唇部减少活动
- E.早期挑破或切开引流

133、（A3/A4 型题）女性，56 岁，因左上第一磨牙残根无法保留拟行拔除，给予 2%利多卡因 420mg 局部麻醉后，患者出现烦躁不安、多话、颤抖、恶心、呕吐、气急、多汗等症状，予以停止注射麻药、给氧、补液后症状逐渐缓解。最有可能的诊断是

- A.晕厥
- B.过敏反应
- C.中毒
- D.肾上腺素反应
- E.癔病

134、（A3/A4 型题）女性，56 岁，因左上第一磨牙残根无法保留拟行拔除，给予 2%利多卡因 420mg 局部麻醉后，患者出现烦躁不安、多话、颤抖、恶心、呕吐、气急、多汗等症状，予以停止注射麻药、给氧、补液后症状逐渐缓解。最有可能的原因是

- A.单位时间内进入血循环的局麻药量超过分解速度，血内浓度升高
- B.局麻是在空腹时进行
- C.过敏体质
- D.肾上腺素反应
- E.受暗示，曾有反复发作史

135、（A3/A4 型题）患者，男，26 岁，因交通事故造成面部外伤而来诊。检查见耳、鼻出血，并证实有脑脊液鼻漏，面部两侧不对称，右侧眶下区肿胀，右下眼睑肿胀、淤血，右侧上颌骨下垂，后牙早接触。应选用以下哪项 X 线检查

- A. 华特位片
- B. 颧弓位片
- C. 上颌前部横断片
- D. 许勒位片
- E. 上颌正位体层片

136、（A3/A4 型题）患者，男，26 岁，因交通事故造成面部外伤而来诊。检查见耳、鼻出血，并证实有脑脊液鼻漏，面部两侧不对称，右侧眶下区肿胀，右下眼睑肿胀、淤血，右侧上颌骨下垂，后牙早接触。如 X 线片显示右侧上颌骨骨折，骨折线横过鼻根、眶部，经颧额缝达翼突。正确的诊断是

- A. LeFort I 型骨折
- B. LeFort II 型骨折
- C. LeFort III 型骨折
- D. 鼻骨骨折
- E. 颧弓骨折

137、（A3/A4 型题）患者，男，26 岁，因交通事故造成面部外伤而来诊。检查见耳、鼻出血，并证实有脑脊液鼻漏，面部两侧不对称，右侧眶下区肿胀，右下眼睑肿胀、淤血，右侧上颌骨下垂，后牙早接触。如 X 线片显示右侧上颌骨骨折，骨折线自鼻额缝向两侧横过鼻梁、眶内侧壁、眶底，经颧上颌缝达翼突。正确的诊断是

- A. LeFort I 型骨折
- B. LeFort II 型骨折
- C. LeFort III 型骨折
- D. 鼻骨骨折
- E. 颧弓骨折

138、（B1 型题）洞穿性创口内出血选用

- A. 指压止血
- B. 包扎止血
- C. 填塞止血
- D. 结扎止血
- E. 药物止血

139、（B1 型题）现场无抢救器械及药品等，紧急情况下可用

- A. 指压止血
- B. 包扎止血
- C. 填塞止血
- D. 结扎止血
- E. 药物止血

140、（B1 型题）术后预防创面渗血选用

- A. 指压止血
- B. 包扎止血
- C. 填塞止血
- D. 结扎止血
- E. 药物止血

141、（B1 型题）腭大孔麻醉

- A. 暂时面瘫
- B. 翼静脉丛血肿
- C. 恶心、干呕
- D. 瞳孔缩小
- E. 颌后区血肿以下麻醉最易引起的相应并发症是

142、（B1 型题）下牙槽神经麻醉

- A.暂时面瘫
- B.翼静脉丛血肿
- C.恶心、干呕
- D.瞳孔缩小
- E.颌后区血肿以下麻醉最易引起的相应并发症是

143、（B1 型题）上颌结节麻醉

- A.暂时面瘫
- B.翼静脉丛血肿
- C.恶心、干呕
- D.瞳孔缩小
- E.颌后区血肿以下麻醉最易引起的相应并发症是

144、（B1 型题）适用于口腔、鼻、唇和颊部手术的铺巾法

- A.包头法
- B.孔巾铺置法
- C.三角形手术野铺巾法
- D.四边形手术野铺巾法
- E.不铺消毒巾

145、（B1 型题）适用于口腔门诊小手术的铺巾法

- A.包头法
- B.孔巾铺置法
- C.三角形手术野铺巾法
- D.四边形手术野铺巾法
- E.不铺消毒巾

146、（B1 型题）腮腺区及涉及多部位的大型手术的铺巾法

- A.包头法
- B.孔巾铺置法
- C.三角形手术野铺巾法
- D.四边形手术野铺巾法
- E.不铺消毒巾

147、（B1 型题）鳃裂囊肿穿刺液多为

- A.红褐色血样液体，经久不凝
- B.微混浊的黄色黏稠性液体
- C.淡黄色清亮液体，含淋巴细胞
- D.黄色或棕色清亮液体，含胆固醇结晶
- E.乳白色豆渣样分泌物

148、（B1 型题）囊性水瘤穿刺液多为

- A.红褐色血样液体，经久不凝
- B.微混浊的黄色黏稠性液体
- C.淡黄色清亮液体，含淋巴细胞
- D.黄色或棕色清亮液体，含胆固醇结晶
- E.乳白色豆渣样分泌物

149、（B1 型题）神经鞘瘤穿刺液多为

- A.红褐色血样液体，经久不凝
- B.微混浊的黄色黏稠性液体
- C.淡黄色清亮液体，含淋巴细胞
- D.黄色或棕色清亮液体，含胆固醇结晶

E.乳白色豆渣样分泌物

150、(B1型题) 甲状舌管囊肿穿刺液可为

- A.红褐色血样液体，经久不凝
- B.微混浊的黄色黏稠性液体
- C.淡黄色清亮液体，含淋巴细胞
- D.黄色或棕色清亮液体，含胆固醇结晶
- E.乳白色豆渣样分泌物

答案

1、正确答案：E

答案解析：

2、正确答案：C

答案解析：完全骨埋伏无临床症状的阻生齿长不出来也没什么危害，拔出难度大创伤大，可暂不拔牙。

3、正确答案：A

答案解析：下颌第三磨牙是阻生牙中最常见的好发部位。

4、正确答案：B

答案解析：内侧面有舌神经，通常位于黏膜下，其位置有的较高，拔除时应避免对其造成损伤，故B错。

5、正确答案：A

答案解析：远中切口从远中龈缘正中斜向外后方，不可偏舌侧。

6、正确答案：A

答案解析：糖尿病患者病情控制良好的情况下才能行种植手术。

7、正确答案：C

答案解析：正常种植术不会损伤邻牙。

8、正确答案：C

答案解析：

9、正确答案：E

答案解析：疔痈病原毒力强，由于位于危险三角区，区域静脉无瓣膜，可并发海绵窦血栓性静脉炎、败血症或脓毒血症。

10、正确答案：B

答案解析：牙槽窝内残留牙片不会引起出血。

11、正确答案：C

答案解析：儿童行舌系带矫正术应在学说话之前进行，在1~2岁期间最佳，故C正确。

12、正确答案：C

答案解析：急性炎症期不建议拔牙。

13、正确答案：C

答案解析：血压高于180/100 mmHg应先控制再拔牙。

14、正确答案：B

答案解析：详细掌握拔牙适应证与禁忌证。掌握禁忌证：(相对性)高血压、心脏病、甲亢等。

15、正确答案：E

答案解析：心梗好转6个月之后可根据具体情况考虑拔牙。

16、正确答案：C

答案解析：慢性肝炎凝血功能异常者应于术前2~3d开始给予足量V_k、V_c及保肝药物，术中还应加局部止血药物。

17、正确答案：E

答案解析：血友病患者如必须拔牙需要通过输血补充凝血因子VIII。

18、正确答案：C

答案解析：糖尿病患者抵抗力低下，易发生术后感染，术后创口愈合差，故应注意预防术后伤口感染。

19、正确答案：C

答案解析：拔牙术引发细菌性心内膜炎的致病菌是甲型溶血性链球菌(绿色链球菌)，此菌对青霉素高度敏感。

20、正确答案：E

答案解析：

21、正确答案：E

答案解析：先天性腭裂导致的发音不清与系带过短无关。

22、正确答案：D

答案解析：

23、正确答案：E

答案解析：从牙根断面的最高点楔入。

24、正确答案：B

答案解析：除非邻牙也需要拔出，否则一般不以邻牙为支点，此题为健康邻牙，所以不可作为支点。

25、正确答案：B

答案解析：在拔除阻生牙或颊侧需去骨者时，可以以龈缘水平处的颊侧骨板作支点。

26、正确答案：E

答案解析：牙挺原则上不可作骨凿使用。

27、正确答案：A

答案解析：根尖折断用根尖挺。

28、正确答案：A

答案解析：使用牙钳时钳喙应尽量向根方夹持尽量向根方推进，夹紧患牙，上前牙及下颌尖牙及前磨牙可摇动可旋转。

29、正确答案：B

答案解析：穿孔不大是可做一般拔牙创处理。

30、正确答案：A

答案解析：较大的瘘孔才需要黏骨膜转瓣，修补在允许的情况下就近选择。

31、正确答案：D

答案解析：伤口愈合良好无明显炎症排除ABC，神经损伤最常见症状为麻木。病人症状是触碰特定部位疼痛，可确定选D。

32、正确答案：D

答案解析：

33、正确答案：A

答案解析：

34、正确答案：A

答案解析：

35、正确答案：E

答案解析：颌面部间隙是指位于颅底、上、下颌骨及其周围的筋膜间、筋膜与肌肉间、肌肉与骨膜间、以及骨膜与骨膜之间的潜在间隙。

36、正确答案：D

答案解析：

37、正确答案：A

答案解析：

38、正确答案：A

答案解析：红肿热痛功能障碍是炎症的常见表现。

39、正确答案：D

答案解析：

40、正确答案：A

答案解析：咬肌间隙感染为最常见口腔颌面部间隙感染之一。

41、正确答案：E

答案解析：咬肌间隙感染最易引发边缘性骨髓炎。

42、正确答案：B

答案解析：血源性感染为新生儿颌骨骨髓炎的常见来源。

43、正确答案：A

答案解析：颊间隙感染常见源于上、下颌磨牙的根尖脓肿或牙槽脓肿穿破骨膜侵入颊间隙，也可因颊部皮肤损伤、颊黏膜溃疡继发感染，淋巴结的炎症扩散所致。

44、正确答案：A

答案解析：局部治疗为主配合全身治疗。

45、正确答案：E

答案解析：颊间隙感染主要影响颊肌。

46、正确答案：B

答案解析：炎症的主要病因还是细菌。

47、正确答案：A

答案解析：

48、正确答案：C

答案解析：卢德维(Ludwig's)咽峡炎就是腐败坏死性口底蜂窝织炎。

49、正确答案：C

答案解析：

50、正确答案：C

答案解析：面部疔痈多位于危险三角区，局部治疗应保守。

51、正确答案：D

答案解析：高渗盐水纱布持续湿敷有良好的提脓效果。

52、正确答案：B

答案解析：危险三角区的静脉常无瓣膜。

53、正确答案：C

答案解析：有死骨排出是慢性颌骨骨髓炎的临床表现，大块死骨形成及排出说明是中央性颌骨骨髓炎，边缘性颌骨骨髓炎的慢性期表现多为骨密度改变，很少有大块死骨形成。

54、正确答案：E

答案解析：

55、正确答案：E

答案解析：化脓性颌骨骨髓炎占各类型颌骨骨髓炎的90%以上，多为牙源性感染，疼痛剧烈，较少形成广泛的骨质破坏，常在发病2周后由急性期转为慢性期。

56、正确答案：D

答案解析：牵舌向口外防止窒息。

57、正确答案：C

答案解析：

58、正确答案：A

答案解析：

59、正确答案：B

答案解析：根据肌肉附着和牵拉方向选择。

60、正确答案：B

答案解析：

61、正确答案：D

答案解析：舌损伤缝合创口是应尽量保持舌的长度，将创口按前后纵形方向进行缝合。

62、正确答案：D

答案解析：生物性因素是外在因素。

63、正确答案：D

答案解析：N表示区域性淋巴结。

64、正确答案：D

答案解析：颌面部肿瘤的治疗方法有手术治疗、放疗、化疗、生物治疗、低温治疗、激光治疗、高温治疗、营养治疗及综合序列治疗。

65、正确答案：A

答案解析：血友病患者凝血因子Ⅷ浓度提高到正常的30%可进行拔牙和小型手术，提高到60%可进行较大的手术。

66、正确答案：D

答案解析：

67、正确答案：E

答案解析：

68、正确答案：D

答案解析：

69、正确答案：E

答案解析：孕激素只在排卵后形成一个高峰。

70、正确答案：E

答案解析：子宫内膜增殖期是雌激素的作用，而孕激素使子宫内膜从增殖期变为分泌期。

71、正确答案：C

答案解析：胎儿尿液是妊娠中期以后羊水的主要来源；妊娠早期主要是母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液；脐带华通胶能吸收羊水，每小时吸收羊水40~50 mL；妊娠中期以后，羊水渗透压逐渐降低。

72、正确答案：D

答案解析：

73、正确答案：A

答案解析：

74、正确答案：D

答案解析：

75、正确答案：A

答案解析：

76、正确答案：E

答案解析：

77、正确答案：D

答案解析：本题考核医学心理学的研究对象。医学心理学研究的是“医学领域中的心理学问题，侧重于研究影响健康的心理问题 and 行为”。故本题正确答案为D。

78、正确答案：D

答案解析：本题考核主要心理活动。学派及理论观点如下：①精神分析理论：将人的心理活动分为潜意识、前意识和意识。②行为主义理论：强调后天的学习作用及环境对人的心理发展的影响。③心理生理医学：主要研究心身疾病的发病原因和机制、分类、治疗、预防等。④认知理论：强调人的理性和认知对情绪产生的影响及对行为的支配作用。⑤人本主义理论：强调自我实现，为心理健康的概念及“询者中心疗法”提供依据。故本题正确答案为D。

79、正确答案：B

答案解析：考核感受变化规律。感觉过敏，即感觉增强，感觉阈值降低或强烈的情绪因素造成。感觉适应是指对持续的同一刺激所产生的应激性形态，特别是感受器的适应。感觉相互作用，是指在一定条件下，各种不同的感觉都可能发生相互作用，从而使感受性发生变化的现象。感觉减退是对事物个别属性的感受减退，即大刺激引起小感受，严重时不引起任何感受。感觉补偿是指人的某种感觉能力丧失后，为适应生活的需要，使其他感觉的能力获得突出的发展，以资补偿。故本题正确答案为B。

80、正确答案：E

答案解析：考核我国医学伦理学主要的研究方向。医学伦理学是运用一般伦理学原则解决医疗卫生实践和医学发展过程中的医学道德问题和医学道德现象的学科，它是医学的一个重要组成部分，又是伦理学的一个分支。故本题正确答案为E。

81、正确答案：D

答案解析：考核医德修养的根本途径。医德修养源于医疗卫生保健实践，又服务于医疗卫生保健实践。因此，坚持医疗卫生保健实践是医德修养的根本途径和方法。故本题正确答案为D。

82、正确答案：A

答案解析：考核医学伦理学的观点。孙思邈在《备急千金要方》中提出“人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此”观点。故本题正确答案为 A。

83、正确答案：A

答案解析：考核不伤害原则的特点。不伤害原则是指医务人员在整个医疗行为中，无论动机还是效果，均应避免对患者造成伤害。不伤害原则不是绝对的，有些诊疗护理手段。即使符合适应征，也会给患者带来躯体和心理上的伤害。抢救患者争分多秒，虽未征得家属或患者签手术同意书，但是不违背不伤害原则。故本题正确答案为 A。

84、正确答案：B

答案解析：考核医生询问病史的伦理要求。询问病史的伦理要求有举止端庄、态度热情；全神贯注、语言得当；耐心倾听，正确引导。医生在询问病史过程中，不能发出惊叹、惋惜等语言，会增加患者的心理负担。谈话过程中，医生可以引导病人说出相关的资料，但不是主导谈话。故本题正确答案为 B。

85、正确答案：B

答案解析：考核医患关系的模式。共同参与型，是指医患双方近似平等的权利和地位，医患双方共同合作、参与，建立了一种真诚，相互信任的医患关系，对提高医疗质量是非常有利的，是一种最理想的医患模式；主要适用于慢性疾病的治疗。故本题正确答案为 B。

86、正确答案：A

答案解析：本题考核预防医学定义。预防医学是以人群为主要研究对象，研究健康影响因素及其作用规律，阐明外界环境因素与人群健康的相互关系，制定公共卫生策略与措施以达到预防疾病的发生，控制疾病的发展及促进健康的一门科学。故本题正确答案为 A。

87、正确答案：C

答案解析：本题考核分中位数的计算。将观察值按大小顺序排列，样本含量为奇数时，位置居中的那个数值就是中位数（M），当样本含量为偶数时，位置居中的两个数值的平均数为中位数。 $M = (10+12) / 2 = 11$ 。故本题正确答案为 C。

88、正确答案：C

答案解析：本题考核调查或研究的随机化原则。随机不等于随意，要抽取具有代表性的样本，贯彻随机化原则是提高组间均衡性的一个重要手段。故本题正确答案为 C。

89、正确答案：D

答案解析：本题考核变异系数概念和意义的理解。变异系数（CV）是衡量资料中各观察值变异程度的统计量。主要用于：观察值度量单位不同时变异大小的比较，如身高与体重变异程度的比较；均数相差悬殊时，儿童身高与成人身高变异程度的；变异系数越大，表示变异程度越大。故本题正确答案为 D。

90、正确答案：C

答案解析：本题考核统计学假设检验方法的选择。X² 检验又称卡方检验。它是处理测试数据的一种常用方法，在分类变量资料的统计推断中的应用，包括：两个率或两个构成比比较的卡方检验；多个率或多个构成比的比较的卡方检验，以及分类资料的相关分析等。题干中说胎儿不同出生体重和围产儿死亡率之间是否有关，属于分类变量资料两个率的比较，故用 X² 检验。故本题答案为 C。

91、正确答案：D

答案解析：【解析】无

92、正确答案：C

答案解析：本题考核食物中毒的特点。特点包括：潜伏期短、多为集体爆发、临床表现相似，多以胃肠道症状为主、发病者有共同的饮食史、停用食物后，发病即可停止、无传染性。故本题正确答案为 C。

93、正确答案：C

答案解析：一次污染物是指从污染源直接进入环境，其理化性质未发生改变的污染物；二次污染物是指排入到环境中的一次污染物在环境物理、化学、生物因素作用下本身发生变化，或在环境中与其他化学物质发生化学反应，形成理化性质与一次污染物不同的新污染物，如光化学烟雾。故本题正确答案为 C。

94、正确答案：B

答案解析：《疫苗流通和预防接种管理条例》规定，疫苗接种后出现的预防接种反应是指合格疫苗、规范操作、全程无错时出现的机体组织的反应为疫苗接种的异常反应。故本题正确答案为B。

95、正确答案：B

答案解析：《医疗事故处理条例》规定，以下情形不属于医疗事故，①在紧急情况下抢救垂危患者生命而造成严重不良后果的；②在医疗活动中由于患者病情异常或者特殊体质的；③在现有科学技术条件下发生的无法预料或者不能防范的不良后果；④无过错输血感染造成严重不良后果的；⑤因患方原因延误诊疗导致不良后果的；⑥因不可抗力力量造成不良后果的。故本题正确答案为B。

96、正确答案：C

答案解析：放疗史加上临床表现，最可能的诊断为放射性颌骨骨髓炎。

97、正确答案：D

答案解析：吗啡会抑制呼吸，影响瞳孔对变化的观察以及引起呕吐，使颅内压增高等。

98、正确答案：A

答案解析：静脉畸形最重要的特征之一是体位试验阳性。

99、正确答案：C

答案解析：颌骨骨纤维异常增殖症X线表现可呈多样化，分为三大类：①透射性改变，又称囊样型；X线表现为单囊或多囊性密度减低病变，边界不很清楚，可有或无硬化边缘。②阻射性改变，包括“橘皮”样型、毛玻璃型及硬化型；病变密度高于正常且均匀一致，逐渐移行至正常骨。③透射及阻射混合性改变。除上述X线改变外，骨纤维异常增殖症尚有明显的沿颌骨外形膨大的特点。当病变累及牙周组织时，常使牙周骨硬板影像模糊或消失，但牙周膜间隙一般仍均匀存在。

100、正确答案：E

答案解析：舌外伤，严重出血，缝合止血为最可靠最常用的止血方法

101、正确答案：A

答案解析：四头带：可以兜住颈部，常用于包扎鼻、颈部创口。交叉十字绷带：颌面和上颈部术后和损伤的创口包扎。单眼交叉绷带：面部绷带常用于上颌骨、面、颊部手术后的创口包扎。

102、正确答案：B

答案解析：

103、正确答案：D

答案解析：注意题干，问的是为增加开口度选择的麻醉方法，麻醉咬肌神经可显著增加开口度。

104、正确答案：B

答案解析：

105、正确答案：E

答案解析：选择下牙槽神经+舌神经+颊长神经阻滞麻醉，标志点为上下颌牙槽嵴相距的中点线上与翼下颌韧带外侧3~4mm的交点，即颊脂垫尖。

106、正确答案：C

答案解析：排卵多发生在下次月经来潮前14日左右，所以月经周期为35日的妇女排卵日期应为周期第21日。

107、正确答案：A

答案解析：宫颈黏液受较高水平雌激素作用时，涂片检查可见清晰而典型的羊齿植物叶状结晶，此时，子宫内膜受雌激素作用表现为增殖期内膜图像。

108、正确答案：C

答案解析：对发生惊厥患儿首先要控制惊厥。

109、正确答案：E

答案解析：

110、正确答案：A

答案解析：A型行为类型的人竞争意识强，有激情，工作高效率，易急躁，容易和他人争执；B型的人表现为没有大志、随波逐流、小心谨慎、甘居下游，在人群中最不爱发言、出头露面；C型的人常常过度压抑自己的情绪，尤其是不良的情绪，容易使人患病

111、正确答案：B

答案解析：心理治疗工作的基本原则有，①帮助来访者自立原则；②客观中立原则；③尊重来访者的原则；④保密原则；⑤时间限定原则；⑥关系限定原则。本题涉及私人家庭问题，咨询师应站在客观中立的立场上，而不能给予一定的诱导性，所以该心理咨询师最应注意采用的是中立原则，故选B

112、正确答案：A

答案解析：本题考核心理测验的原则。心理测验的原则包括：①标准化原则；②客观化原则；③保密原则；心理测试只是测试出来的东西，对结果做出评价时要遵循客观性原则，即“实事求是”，对结果的解释要符合受试者的实际情况。该病例中一个是大学教授，一个是山区农民，虽然测得的智商一样，但是要结合他俩所受的教育程度和生活环境等条件来判定。故本题正确答案为A。

113、正确答案：B

答案解析：考核心身疾病。心身障碍是由于心理因素而导致的躯体疾病为表现形式的心理疾病，包括高血压、冠心病、消化性溃疡，神经性厌食等，症状以躯体疾病为主，但是与心理因素密切相关；故本题正确答案为B。

114、正确答案：B

答案解析：考核智力测验。患者表现为智力低下，需要做智力测验来判断患者智力水平，从而对智力落后的患者采取特殊的教育和训练。故本题正确答案为B。

115、正确答案：D

答案解析：考核精神分析的治疗方法精神分析的治疗中需要“节制”和“自由联想”，是指医生的节制和患者的自由联想。治疗者少说话更多的听从患者心理的内心的真实想法。故本题正确答案为D。

116、正确答案：D

答案解析：本题考核公民医疗权。包括①患者有获得为治疗他的疾病所必需的医疗服务的权利。②患者有获得尊重人的医疗服务的权利。③患者有获得公正的医疗服务的权利。④患者有获得费用节省的医疗服务的权利。题干中医生的做法违反了患者的基本的医疗权。故本题正确答案为D。

117、正确答案：D

答案解析：考核药物诊疗的伦理要求。医生应遵循：①对症下药、剂量安全；②合理配伍、细致观察；③节约费用、公正分配。医生开药少而便宜是与医生的权利有限无关的。故本题正确答案为D。

118、正确答案：D

答案解析：本题考核器官移植的基本伦理原则。凡病理解剖或法医解剖的尸体，可以留取部分组织或器官作为诊断及研究之用，但应以尽量保持外形完整为原则。如有损害外形的必要时，应征得死者家属的同意。本题医生虽然是为了患者的利益，但他违背了患者及家属的知情同意，知情同意是一个最基本的伦理原则。故本题正确答案为D。

119、正确答案：B

答案解析：本题考核疾病流行强度的特点。①流行是指某病在某地区发病率显著超过该病历年的散发发病率水平；②散发是指某病发病率维持历年的一般水平，各病例间无明显的时、空联系；③大流行起病急，涉及地域广，短时间可跨省界、国界、洲界的流行；④爆发：是指在一个局部地区或集体单位中，短时间内突然出现了大量相同患者的现象。故本题正确答案为B。

120、正确答案：C

答案解析：本题考核流行病学研究方法的应用。队列研究和实验研究均为前瞻性研究，但临床试验研究要采取干预措施，而队列研究只关注暴露因素与疾病之间的关联，没有干预措施，因此只能用队列研究的方法。注本题干中主要强调的是吸烟与慢阻肺发病的关系，故选队列研究。故本题正确答案为 C。

121、正确答案：E

答案解析：本题考核矽肺发病特点。通常持续吸入矽尘 5~10 年发生矽肺，有的发病前吸入时间长达 20 年以上。但有的患者持续吸入高浓度、高游离二氧化硅含量的粉尘，经 1~2 年即可发病，称为“速发性矽肺”。故本题正确答案为 E。

122、正确答案：A

答案解析：《母婴保健法》第十八条：经产前诊断，有下列情形之一的，医师应当向夫妻双方说明情况，并提出终止妊娠的医学意见：①胎儿患严重遗传性疾病的；②胎儿有严重缺陷的；③因患严重疾病，继续妊娠可能危及孕妇生命安全或者严重危害孕妇健康的。A 选项中所述曾经接触过致畸物质，但未具体说明接触时间、接触剂量以及后果，所以并非一定需要终止妊娠。故本题正确答案为 A。

123、正确答案：B

答案解析：《医疗事故处理条例》规定，疑似输液、输血、注射、药物等引起不良后果的，医患双方应当共同对现场实物进行封存和启封，封存的现场实物由医疗机构保管；需要检验的，应当由双方共同指定的、依法具有检验资格的检验机构进行检验；双方无法共同指定时，由卫生行政部门指定。疑似输血引起不良后果，需要对血液进行封存保留的，医疗机构应当通知提供该血液的采供血机构派员到场。发生医疗事故争议时，死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。封存的病历资料可以是复印件，由医疗机构保管。故封存的资料不一定非要是原件。故本题正确答案为 B。

124、正确答案：B

答案解析：《药品管理法》第二十五条：医疗机构配制的制剂，应当是本单位临床需要而市场上没有供应的品种，并须经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准后方可配制。配制的制剂必须按照规定进行质量检验；合格的，凭医师处方在本医疗机构使用。特殊情况下，经国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的药品监督管理部门批准，医疗机构配制的制剂可以在指定的医疗机构之间调剂使用。医疗机构配制的制剂不得在市场销售。故本题答案为 B。

125、正确答案：E

答案解析：申请《印鉴卡》的医疗机构应当符合下列条件：①有与使用麻醉药品和第一类精神药品相关的诊疗科目；②具有经过麻醉药品和第一类精神药品培训的、专职从事麻醉药品和第一类精神药品管理的药学专业技术人员；③有获得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的执业医师；④有保证麻醉药品和第一类精神药品安全储存的设施和管理制度。故本题正确答案为 E。

126、正确答案：B

答案解析：《药品处方管理办法》规定，①每个处方最多 5 个药品；②西药与中成药可同时开具，也可分别开具，但中药不可和西药、中成药开具同一张处方；③处方开具当天有效、特殊情况有效期不能超过 3 天；④药品名称应当使用通用名；⑤处方最多可开 7 日用量，急诊处方不超过 3 日用量。故本题正确答案为 B。

127、正确答案：D

答案解析：《医疗机构临床用血管理办法》的规定申请。

128、正确答案：C

答案解析：《放射诊疗管理规定》第 11 条规定：医疗机构设置放射诊疗项目，应当按照其开展的放射诊疗工作的类别，分别向相应的卫生行政部门提出建设项目卫生审查、竣工验收和设置放射诊疗项目申请：①开展放射治疗、核医学工作的，向省级卫生行政部门申请办理；②开展介入放射学工作的，向设区的市级卫生行政部门申请办理；③开展 X 射线影像诊断工作的，向县级卫生行政部门申请办理。故正确答案为 C。

129、正确答案：C

答案解析：

130、正确答案：C

答案解析：

131、正确答案：E

答案解析：

132、正确答案：E

答案解析：

133、正确答案：C

答案解析：中毒兴奋型：表现为烦躁不安、多话、颤抖、恶心、呕吐、气急、多汗、血压上升，严重者出现全身抽搐、缺氧、发绀。抑制型：迅速出现脉搏细弱、血压下降、神志不清，随即呼吸、心跳停止。

134、正确答案：A

答案解析：常因用量或单位时间内注射药量过大，以及直接快速注入血管而造成。

135、正确答案：A

答案解析：

136、正确答案：C

答案解析：

137、正确答案：B

答案解析：

138、正确答案：C

答案解析：

139、正确答案：A

答案解析：

140、正确答案：E

答案解析：

141、正确答案：C

答案解析：

142、正确答案：A

答案解析：

143、正确答案：B

答案解析：

144、正确答案：C

答案解析：孔巾铺置法适用于口腔门诊小手术；三角形手术野铺巾法适用于口腔、鼻、唇和颊部手术；四边形手术野铺巾法适用于腮腺区、颌下区、颈部及多部位的大型手术。

145、正确答案：B

答案解析：

146、正确答案：D

答案解析：

147、正确答案：D

答案解析：

148、正确答案：C
答案解析：

149、正确答案：A
答案解析：

150、正确答案：B
答案解析：