

月度考试

- 1、（A1 型题）牙列缺失影响较小的是
 - A.面容
 - B.发音功能
 - C.内分泌系统
 - D.咀嚼功能
 - E.颞下颌关节
- 2、（A1 型题）关于牙槽骨的吸收，正确的是
 - A.上下颌骨保持原有形状和大小
 - B.不同个体牙槽骨吸收结果相同
 - C.同一个体不同部位牙槽骨吸收结果不同
 - D.牙槽骨的吸收与全身健康状况无关
 - E.牙槽骨的吸收速率与是否修复缺失牙无关
- 3、（A1 型题）牙列缺失后与形成衰老面容无关的原因是
 - A.唇颊部内陷
 - B.上唇丰满度降低
 - C.鼻唇沟加深，口角下陷
 - D.面下 1/3 缩短
 - E.咀嚼功能丧失
- 4、（A1 型题）关于腭小凹的描述，准确的是
 - A.位于软硬腭交界处
 - B.位于腭中缝上
 - C.是口内黏液腺导管的开口
 - D.义齿基托的后缘应止于此
 - E.数目多为 1~2 个
- 5、（A1 型题）关于后堤区的描述，说法错误的是
 - A.硬腭后 1/3
 - B.后堤区通常呈弓形
 - C.后堤区根据腭穹窿的高低可分为三种
 - D.后堤区能起到边缘封闭的作用
 - E.前后颤动线之间称后堤区
- 6、（A1 型题）后堤区的作用是
 - A.基托后缘定位
 - B.边缘封闭作用
 - C.支持作用
 - D.排牙标志
 - E.缓冲作用
- 7、（A1 型题）全口义齿的固位与哪个因素关系最小
 - A.咬合力
 - B.内聚力
 - C.附着力
 - D.表面张力
 - E.大气压力
- 8、（A1 型题）关于高龄患者的特点，正确的是
 - A.骨愈合快

- B.组织感觉迟钝
- C.牙槽嵴萎缩明显
- D.耐受力强
- E.调节能力强

9、（A1型题）下列不属于烤瓷全冠适应证的是

- A.前牙切角切缘缺损
- B.前牙牙髓坏死而变色
- C.错位牙不宜进行正畸治疗
- D.牙冠充填治疗后需美观修复者
- E.发育未完成的青少年活髓牙

10、（A1型题）为减小基牙负担，桥体设计时应考虑

- A.减小颊舌径的宽度
- B.降低桥体面高度
- C.采用金属与树脂材料
- D.设计成卫生桥
- E.尽量扩大邻间隙

11、（A1型题）固定义齿连接体的截面积不小于

- A.1mm²
- B.2mm²
- C.3mm²
- D.4mm²
- E.5mm²

12、（A1型题）当一侧基牙明显倾斜时应当选择

- A.双端固定桥
- B.半固定桥
- C.单端固定桥
- D.复合固定桥
- E.特殊固定桥

13、（A1型题）关于陶瓷材料的性能描述错误的是

- A.硬度接近或超过牙釉质
- B.耐磨性差
- C.化学性能相当稳定
- D.生物性能良好
- E.美观性能优越

14、（A1型题）属于固定桥冠内固位体的是

- A.金属全冠
- B.烤瓷全冠
- C.3 / 4 冠
- D.针型固位高嵌体
- E.桩冠

15、（A1型题）钴铬合金可用于以下目的，除了

- A.制作固定义齿
- B.制作活动义齿基托
- C.用作焊媒
- D.制作卡环
- E.制作种植修复体

16、（A1型题）制作金属烤瓷修复体时，若烤瓷的热膨胀系数大于金属的热膨胀系数，在烧结冷却过程中，可产生下述哪种不良后果

- A.瓷层剥脱
- B.瓷层龟裂、破碎
- C.瓷层出现气泡
- D.瓷层颜色变灰暗
- E.金属变形

17、(A1型题)按植入体的手术分期设计可将金属种植体分为

- A.根上种植体和根内种植体
- B.一段式种植体和二段式种植体
- C.高熔种植体和低熔种植体
- D.叶状种植体
- E.钉、针型种植体

18、(A1型题)固位力最差的是

- A.金属全冠
- B.甲冠
- C.3/4冠
- D.嵌体
- E.烤瓷全冠

19、(A1型题)修复体的固位力与下列哪种因素无关

- A.修复体与制备牙的密合度
- B.粘结面的粗糙度
- C.粘固剂的厚度
- D.制备牙轴面聚合度
- E.制备牙的松动度

20、(A1型题)与普通桩冠相比,桩核冠的优点为

- A.固位力强
- B.做固定桥固位体时易形成共同就位道
- C.制作方便
- D.可用于咬合紧时
- E.强度好

21、(A1型题)下列措施中不能减小固定桥桥体所受力的是

- A.减小桥体颊舌径
- B.增加桥体牙尖斜度
- C.加深桥体面窝沟
- D.扩大桥体与固位体间的外展隙
- E.消除桥体早接触及干扰

22、(A1型题)支托具有以下作用,除了

- A.支持作用
- B.做间接固位体
- C.防止食物嵌塞
- D.防止向脱位的作用
- E.恢复咬合接触

23、(A1型题)下列哪些患者不适合进行可摘局部义齿修复

- A.恶性肿瘤患者
- B.癫痫患者
- C.颞下颌关节紊乱病患者
- D.牙周病患者
- E.冠心病患者

- 24、(A1型题)关于可摘局部义齿基托伸展的范围,下列哪项是错误的
- A.应与天然牙轴面的非倒凹区轻轻接触
 - B.上颌远中游离者应伸至翼颌切迹,远中颊角应覆盖上颌结节
 - C.下颌远中游离者应覆盖磨牙后垫 1/3~1/2
 - D.基托应尽量伸展以获得良好的封闭和固位效果
 - E.尽量减小基托范围,使患者感到轻巧、舒适、美观
- 25、(A1型题)下列对可摘局部义齿间接固位体的作用的描述中不正确的是
- A.辅助固位作用,间接防止义齿向脱位
 - B.对抗侧向力,防止义齿摆动
 - C.平衡作用,防止义齿旋转
 - D.支持作用,防止义齿下沉
 - E.稳定作用,防止义齿翘起
- 26、(A1型题)人工解剖式牙牙尖斜度为
- A.0°或 3°
 - B.10°或 13°
 - C.20°或 23°
 - D.30°或 33°
 - E.40°或 43°
- 27、(A1型题)前腭杆的前缘应
- A.位于上前牙舌隆突上
 - B.离开上前牙舌侧龈缘 6mm
 - C.离开上前牙舌侧龈缘 3mm
 - D.位于上前牙舌侧龈缘附近
 - E.离开上前牙舌侧龈缘 10mm 以上
- 28、(A1型题)上颌基托的哪个部分适宜做薄,以减少发音影响
- A.前腭 2/3 部分
 - B.前腭 1/2 部分
 - C.前腭 1/3 部分
 - D.后腭 2/3 部分
 - E.后腭 1/3 部分
- 29、(A1型题)上颌义齿远中游离端基托的颊侧应
- A.覆盖整个上颌结节
 - B.覆盖上颌结节的 2/3
 - C.覆盖上颌结节的 1/2
 - D.覆盖上颌结节的 1/3
 - E.让开上颌结节
- 30、(A1型题)下面关于黏膜支持式义齿的描述,正确的是
- A.力通过卡环传导到基牙上
 - B.力通过基托传导到黏膜和牙槽骨上
 - C.力通过支托传导到黏膜和牙槽骨上
 - D.力通过基托传导到基牙上
 - E.力通过支托传导到基牙上
- 31、(A1型题)可摘局部义齿基托组织面不作缓冲的部位是
- A.上颌结节颊侧
 - B.上颌硬区
 - C.下颌隆突
 - D.磨牙后垫
 - E.内斜嵴

- 32、(A1 型题) 制锁角是指
- A. 义齿部件与余留牙之间的夹角
 - B. 义齿就位道与基牙长轴之间的夹角
 - C. 义齿就位道与脱位道的方向之间所形成的夹角
 - D. 义齿就位道与基牙邻面间的夹角
 - E. 义齿脱位道与基牙长轴之间的夹角
- 33、(A1 型题) 多数上前牙缺失用活动义齿修复, 在排牙时不正确的提法是
- A. 人工牙的颜色应与相邻天然牙协调
 - B. 中线应与下颌前牙中线一致
 - C. 人工牙的颈缘线与相邻天然牙的颈缘在同一水平
 - D. 人工牙的大小应与患者面形协调
 - E. 人工牙的排列应与颌弓形状相适应
- 34、(A1 型题) 上颌 Kennedy 第一类牙列缺损者可以采取单侧分别设计的病例是
- A. 8778 缺失
 - B. 87645678 缺失
 - C. 876423678 缺失
 - D. 873678 缺失
 - E. 876578 缺失
- 35、(A1 型题) 属于特殊结构的固定桥是
- A. 半固定桥
 - B. 双端固定桥
 - C. 种植固定桥
 - D. 单端固定桥
 - E. 复合固定桥
- 36、(A1 型题) 调凹式就位道是指
- A. 两侧基牙长轴延长线的角平分线为就位道
 - B. 通过模型的倾斜把倒凹集中在一侧, 与力方向相一致的就位道, 义齿垂直向就位
 - C. 通过模型的倾斜把倒凹集中在一侧, 与力方向不一致的就位道, 义齿斜向就位
 - D. 义齿就位道与基牙长轴相一致
 - E. 义齿就位道与力方向相一致
- 37、(A1 型题) 牙列缺失影响较小的是
- A. 面容
 - B. 发音功能
 - C. 内分泌系统
 - D. 咀嚼功能
 - E. 颞下颌关节
- 38、(A1 型题) 关于牙槽骨的吸收, 正确的是
- A. 上下颌骨保持原有形状和大小
 - B. 不同个体牙槽骨吸收结果相同
 - C. 同一个体不同部位牙槽骨吸收结果不同
 - D. 牙槽骨的吸收与全身健康状况无关
 - E. 牙槽骨的吸收速率与是否修复缺失牙无关
- 39、(A1 型题) 关于腭小凹的描述, 准确的是
- A. 位于软硬腭交界处
 - B. 位于腭中缝上
 - C. 是口内黏液腺导管的开口
 - D. 义齿基托的后缘应止于此

E.数目多为 1~2 个

40、(A1 型题) 以下关于新生儿鹅口疮描述不正确的是

- A.多在出生后 2~8 日内发生
- B.散在的色白如雪的柔软小斑点, 如帽针头大小
- C.白色斑片遍布整个舌背
- D.白色斑片甚至可分布于软腭及咽部
- E.斑片附着十分紧密, 不可擦掉

41、(A1 型题) 以下关于慢性唇炎的临床表现, 描述不正确的是

- A.常累及上下唇部, 唇部可见针头大小结节
- B.唇红可见黄白色或褐色脱屑、脱皮
- C.有局部干胀、发痒、刺痛或灼痛感
- D.唇红糜烂剥脱
- E.有炎性渗出物, 形成黄色痂皮, 或出血后凝结为血痂

42、(A1 型题) 以下疾病中多发于下唇的是

- A.扁平苔藓
- B.肉芽肿性唇炎
- C.唇疱疹
- D.慢性唇炎
- E.过敏性唇炎

43、(A1 型题) 婚前医学检查的疾病不包括

- A.严重遗传性疾病
- B.精神分裂症
- C.麻风病
- D.艾滋病
- E.职业病

44、(A1 型题) 国家对艾滋病进行一系列行为干预措施, 下列属于《艾滋病防治条例》规定的干预措施的是

- A.强制咨询和强制检测制度
- B.强制咨询和自愿检测制度
- C.自愿咨询和强制检测制度
- D.自愿咨询和自愿检测制度
- E.强制检测制度

45、(A1 型题) 关于医师出现下列情形医疗机构可取消其处方权, 说法错误的是

- A.抗菌药物考核不合格的
- B.限制处方权后, 仍出现超常处方且无正当理由的
- C.未按照规定开具抗菌药物处方, 造成严重后果的
- D.开具抗菌药物处方未获得良好临床效果的
- E.未按照规定使用抗菌药物, 造成严重后果的

46、(A1 型题) 复发性口腔溃疡的临床特征不包括

- A.好发于中青年
- B.反复发作的溃疡为圆形或椭圆形, 表面有黄色假膜, 周围红晕
- C.多见于唇、颊、舌等非角化黏膜
- D.病变可影响到口周皮肤
- E.病程 7~14 天, 有自限性

47、(A1 型题) 以下关于复发性阿弗他溃疡治疗最合理的

- A.寻找与发病有关的全身及局部因素加以治疗
- B.口腔黏膜局部消炎止痛药物治疗

- C. 口眼肾上腺皮质激素
- D. 使用免疫增强药物
- E. 腐蚀性药物局部烧灼

- 48、(A1 型题) 关于牙震荡的临床表现的下列说法, 下列错误的是
- A. 患牙微酸痛感
 - B. 患牙可对于冷刺激一过性敏感
 - C. 牙冠完整, 通常不伴有牙体组织的缺损
 - D. 大幅松动, 患牙有移位
 - E. 叩痛 (±) ~ (+)
- 49、(A1 型题) 对牙髓疾病临床上热诊常用的方法
- A. 热牙胶
 - B. 热水
 - C. 加热的金属器械
 - D. 橡皮轮打磨生热法
 - E. 以上都是
- 50、(A1 型题) 慢性根尖周炎类型中, 哪一种类型是以局部骨质增生为特征的
- A. 根尖周肉芽肿
 - B. 根尖周囊肿
 - C. 根尖周骨硬化症
 - D. 根尖周脓肿
 - E. 以上均不是
- 51、(A1 型题) 根尖周脓肿切开排脓术中, 橡皮引流条的更换频率是
- A. 每天一次
 - B. 每两天一次
 - C. 每三天一次
 - D. 每周一次
 - E. 每五天一次
- 52、(A1 型题) 若器械分离时所有方法均不能去除根管内的器械, 则最后可使用保留牙齿的方案是
- A. 拔除
 - B. 根尖手术
 - C. 根管冲洗
 - D. 开放根管
 - E. 全冠修复术
- 53、(A1 型题) 关于侧压根管充填法不正确的是
- A. 主尖应充满根尖并于根尖孔平齐
 - B. 主尖尖端应位于根管狭窄处
 - C. 副尖可不必到达根尖
 - D. 副尖可根据情况放入不同的根管
 - E. 临床上多数情况下, 放入主尖后还需要插入副尖
- 54、(A1 型题) 下列有关根管治疗评价的叙述中, 不正确的是
- A. 复查包括临床表现和 X 线片检查
 - B. X 线片示骨缺损开始修复和牙周膜形成, 可视为成功
 - C. X 线片示骨缺损范围扩大, 则视为失败
 - D. X 线片的骨缺损较治疗前无明显变化, 视为成功
 - E. 患牙出现咬合痛、牙松动, 视为失败
- 55、(A1 型题) 根管治疗中, 根管消毒常用药物刺激性最强的为
- A. 丁香油
 - B. FC

- C. CP
- D. 碘仿
- E. 抗生素类药物

56、（A1 型题）以下药物中作为根管倒充填材料时渗透最小，根尖封闭性显著优于其他封闭剂的是

- A. 氢氧化钙
- B. 树脂类
- C. 氧化锌丁香油类
- D. 玻璃离子类
- E. 硅酮类

57、（A1 型题）实习医生准备为患者进行牙髓活力电测验，但其带教老师却否定他的建议，原因可能为

- A. 患者年龄大
- B. 患者为女性
- C. 患者年龄小
- D. 患者经济状况差
- E. 患者带有心脏起搏器

58、（A1 型题）为了便于清洁，防止继发龋，邻面洞的龈缘与邻牙之间的间隙宽度至少应为

- A. 0.5mm
- B. 1mm
- C. 1.2mm
- D. 1.5mm
- E. 2mm

59、（A1 型题）变形链球菌菌体表面的黏附素是

- A. 杂聚糖和果聚糖
- B. 葡聚糖和果聚糖
- C. 唾液糖蛋白和胶状物
- D. 表面蛋白和脂磷壁酸
- E. 乳酸脱氢酶和烯醇酶

60、（A1 型题）两个牙根发育完全以后发生粘连的牙称为

- A. 融合牙
- B. 结合牙
- C. 双生牙
- D. 过大牙
- E. 畸形中央尖

61、（A1 型题）牙槽骨垂直吸收时伴随的牙周袋多为

- A. 龈袋
- B. 复杂袋
- C. 骨上袋
- D. 骨下袋
- E. 假性牙周袋

62、（A1 型题）与牙槽骨快速破坏有关的菌斑是

- A. 窝沟处的菌斑
- B. 以革兰阳性需氧菌为主的菌斑
- C. 龈上菌斑
- D. 非附着性龈下菌斑
- E. 附着性龈下菌斑

63、（A1 型题）X 线片上有助于牙周诊断的内容不包括

- A. 牙槽骨间隔高度

- B.硬板存在情况
- C.牙槽骨密度
- D.牙周间隔的高度
- E.根尖周透影区

64、(A1型题)边缘性龈炎的表现有

- A.龈沟探诊无出血
- B.牙槽骨吸收
- C.牙龈质韧
- D.龈缘菲薄
- E.龈缘色红

65、(A1型题)导致药物性牙龈增生的药物为

- A.苯巴比妥
- B.四环素
- C.替硝唑
- D.螺旋霉素
- E.硝苯地平

66、(A1型题)牙龈炎症的主要表现之一是

- A.附着龈有点彩
- B.探诊后出血
- C.牙龈致密坚韧
- D.牙龈粉红色
- E.探诊深度 2mm

67、(A1型题)不属于牙周炎症状的是

- A.牙龈炎症
- B.假性牙周袋
- C.松动
- D.牙槽骨嵴顶吸收
- E.附着丧失

68、(A1型题)慢性牙周炎的临床症状如下,除外

- A.牙龈红肿出血
- B.真性牙周袋形成
- C.牙周脓肿
- D.无附着丧失
- E.牙槽骨吸收

69、(A1型题)调整咬合的目的如下,除外

- A.清除创伤,增加牙齿承受的咀嚼力
- B.使损伤的牙周组织得以恢复
- C.尽量将侧向力转为垂直向力
- D.使力重新分配
- E.使牙周支持力平衡

70、(A1型题)乳牙早萌的临床表现不正确的是

- A.多见于下颌中切牙及上颌切牙
- B.诞生牙多数是正常牙,少数是多生牙
- C.牙根尚未发育或发育很少
- D.无牙槽骨支持
- E.松动

71、(A1型题)氢氧化钙覆盖窝洞底,使脱矿牙本质再矿化需要多长时间

- A.1 周
- B.2 周
- C.4 周
- D.8 周
- E.10~12 周

72、(A1 型题) 哪一项不是 FC 断髓术应用受限的原因

- A.不易保持根尖部分的牙髓活力
- B.可能引起牙根内吸收
- C.可能引起牙根病理性吸收
- D.甲醛渗透易引起根尖周、牙周组织的刺激
- E.具有半抗原作用, 可能导致免疫学反应

73、(A1 型题) 融合牙临床表现不正确的是

- A.冠根完全融合
- B.冠部融合, 根部分离
- C.冠部分离, 根部融合
- D.乳牙列融合多发生在双侧
- E.乳牙列融合牙比恒牙列多

74、(A1 型题) 乳牙龋病对儿童口腔局部影响不正确的是

- A.咀嚼功能明显降低
- B.继承恒牙的窝沟龋
- C.特纳牙的发生
- D.损伤局部口腔黏膜组织
- E.继承恒牙萌出过早或过迟

75、(A1 型题) 乳牙钙化发育主要发生在

- A.出生前
- B.出生后半年
- C.出生后 1 年
- D.出生后 1 年半
- E.生后 2 年

76、(A1 型题) 乳牙完全萌出的平均年龄是

- A.1~5 岁
- B.2 岁
- C.2.5 岁
- D.3.5 岁
- E.4.5 岁

77、(A1 型题) 儿童上乳前牙外伤常见年龄为

- A.1.5~2.5 岁
- B.3~4 岁
- C.4~5 岁
- D.6~7 岁
- E.8~9 岁

78、(A1 型题) 乳牙根尖病治疗方法为

- A.直接盖髓
- B.活髓切断术
- C.变异干髓术
- D.根管治疗术
- E.干髓术

- 79、(A1型题) 静止龋出现的条件是
- A. 机体抵抗力增加
 - B. 龋损处致龋的环境消失
 - C. 口腔内致龋菌数量减少
 - D. 口腔唾液流量增加
 - E. 摄糖总量减少
- 80、(A1型题) II类洞制备时鸠尾峡应位于
- A. 窝洞轴髓线角处
 - B. 窝洞轴髓线角边缘右侧
 - C. 窝洞轴髓线角中线侧
 - D. 面的中央
 - E. 窝洞的中央
- 81、(A1型题) 常见的手用不锈钢根管切削器械为
- A. Protaper
 - B. R型锉
 - C. K型锉
 - D. 机用根管锉
 - E. 根管冲洗针
- 82、(A1型题) 以下哪项不是手动不锈钢器械从尖端到柄的距离规格
- A. 16mm
 - B. 21mm
 - C. 25mm
 - D. 28mm
 - E. 31mm
- 83、(A1型题) 若从颜色分辨器械的号码, 则紫色应对应的是
- A. 25号锉
 - B. 30号锉
 - C. 15号锉
 - D. 10号锉
 - E. 6号锉
- 84、(A1型题) 调制银汞合金时, 若汞量过少, 可造成
- A. 增加蠕变
 - B. 可塑性增加
 - C. 产生过度膨胀
 - D. 修复体易变形
 - E. 硬而脆
- 85、(A1型题) 盖髓剂的作用为诱导
- A. 成纤维细胞形成修复性牙本质
 - B. 牙骨质细胞形成修复性牙骨质
 - C. 未分化的间充质细胞形成牙本质
 - D. 成牙本质细胞形成继发性牙本质
 - E. 成牙本质细胞形成修复性牙本质
- 86、(A1型题) 磨牙因慢性根尖周炎进行根管治疗, 在根管预备的注意事项中不正确的是
- A. 首先测定工作长度
 - B. 器械只应到达根尖狭窄处
 - C. 根管锉应逐号使用
 - D. 每换一根锉, 应进行根管冲洗
 - E. 器械应超出根尖孔超预备

- 87、(A1型题) 龋齿的治疗方法包括
- A. 充填术+再矿化疗法
 - B. 修复治疗+磨除法
 - C. 充填术+窝沟封闭
 - D. 充填术+药物疗法+磨除法
 - E. 药物治疗+充填术+拔除术
- 88、(A1型题) 窝洞外形线需制成圆缓曲线, 其目的是为了
- A. 防止充填体脱落
 - B. 防止充填体折断
 - C. 防止继发龋的出现
 - D. 达到良好的美观效果
 - E. 防止牙体折裂
- 89、(A1型题) K型根管器械的横截面是
- A. 圆形
 - B. 三角形
 - C. 水滴形
 - D. 椭圆形
 - E. 不规则形
- 90、(A1型题) 患者, 男。因外伤致前牙折断, 口腔检查示断端位于龈下 3mm。如进行桩冠修复, 除行根管治疗外还应做
- A. 龈修整术
 - B. 正畸牵引残根至合适位置
 - C. 牙周洁治术
 - D. 牙周塞治术
 - E. 植入种植体
- 91、(A1型题) 患者, 男。1个月前拔除上中切牙, 欲行固定桥修复, 合适的修复时间为
- A. 3周后
 - B. 3个月后
 - C. 即刻
 - D. 2个月后
 - E. 1周后
- 92、(A1型题) 为了研究窝沟封闭的临床效果, 研究人员采用自身半口对照的方法对某小学 150 名儿童进行窝沟封闭。3年后发现封闭组中有 10 颗牙患龋, 140 颗牙无龋, 对照组中患龋牙 45 颗, 105 颗牙无龋。龋齿降低相对有效率为
- A. 22%
 - B. 50%
 - C. 64%
 - D. 75%
 - E. 78%
- 93、(A1型题) 患者, 男, 20岁。临床检查发现牙釉质半透明度改变, 可见白垩色不透明区呈不规则牙面分布, 不超过牙面的 25%。按照 Dean 分类标准, 诊断氟牙症为
- A. 正常
 - B. 可疑
 - C. 很轻度
 - D. 轻度
 - E. 中度
- 94、(A1型题) 患者, 女, 22岁。右下 6 龋损, 已完成治疗, 准备做金属烤瓷冠, 患者的牙弓弧度和邻牙凸度均正常, 在恢复轴面凸度时, 正确的是
- A. 颊侧中 1/3

- B.颊侧颈 1/3
- C.颊侧 1/3
- D.舌侧颈 1/3
- E.舌侧中 1/3

95、(A1型题)患者,女,30岁。右上第一前磨牙全冠黏固后发生龈缘炎,其可能的原因,除了

- A.冠边缘过长
- B.冠边缘不密合
- C.轴壁凸度不良
- D.龈沟内粘固剂残留
- E.咬合早接触

96、(A1型题)患者,女,担心使用牙签会使牙缝增宽,医生告诉她正确使用牙签的方法是

- A.轻轻置入龈沟底部,向龈方运动清洁
- B.轻轻置入龈沟底部,向冠方运动清洁
- C.置入牙间隙,轻轻上下运动清洁
- D.置入牙间隙,轻轻左右运动清洁
- E.需要向各个方向运动清洁

97、(A1型题)女,35岁。4天来口腔黏膜破溃肿胀,疼痛剧烈,检查:下唇近移行黏膜处有厚而扁平的黄褐色假膜。表面光滑,周围明显充血,擦去假膜出现糜烂面。有口臭,双侧颌下淋巴结压痛。该病应诊断为

- A.口腔结核
- B.带状疱疹
- C.球菌性口炎
- D.口腔念珠菌病
- E.复发性阿弗他溃疡

98、(A1型题)临床怀疑口腔念珠菌感染时,首先选用的辅助诊断技术为

- A.唾液培养
- B.唾液及血清念珠菌抗体测定
- C.血清铁及维生素
- D.直接在病损区涂片镜检
- E.活体组织检查

99、(A1型题)患者,女,56岁,戴全口义齿一年,近日义齿区黏膜疼痛不适,影响进食活动。检查:在上颌义齿腭侧面区域黏膜呈亮红色、水肿,有斑点状假膜。涂片见孢子和菌丝,患者同时有口角炎。该患者应诊断为

- A.球菌性口炎
- B.扁平苔藓
- C.白斑
- D.疱疹性口疮
- E.义齿性口炎

100、(A1型题)男性,17岁,右上后牙3天来遇甜酸痛,平时无其它不适。查见14近中边缘嵴约小米大小透暗色区,建议充填用材料是

- A.聚羧酸锌水门汀
- B.复合树脂
- C.银汞合金
- D.磷酸锌水门汀
- E.玻璃离子水门汀

101、(A1型题)患者,男,40岁,右下后牙遇冷不适,无自发疼,1年前患者曾一次补牙,检查:右下7面树脂充填物边缘破裂。可钩住探针,叩(-),冷侧敏感,刺激后疼痛立刻消失。最可能的诊断是

- A.中龋
- B.深龋
- C.继发龋
- D.急性牙髓炎
- E.慢性牙髓炎

102、(A1型题)患者要求前牙美观治疗,自觉自牙齿萌出后牙面有花斑,而且周围邻面也有类似表现。查:全口牙列均可见不同程度的散在黄褐色及白垩状斑。该患牙诊断为

- A.釉质发育不全症
- B.氟牙症
- C.四环素牙
- D.浅龋
- E.遗传性乳光牙本质

103、(A1型题)患者,男,24岁,上大学前一直在河北沧州居住,因上前牙有黄黑斑块要求治疗。检查:11,12,21,22唇面有黄褐色斑块,无缺损,表面光滑,质硬,叩(-),冷(-),乡亲中亦有相似情况。医师最可能的诊断是

- A.浅龋
- B.氟斑牙
- C.四环素牙
- D.釉质发育不全
- E.静止龋

104、(A1型题)男,45岁。全口牙龈反复肿痛。检查:全口牙龈肿胀充血明显,松动I度~II度。袋深4~6mm,袋内溢脓,全口牙颈部菌斑,321123牙石。X线片示,全口牙槽骨有不同程度的吸收。该病诊断为

- A.侵袭性牙周炎
- B.慢性牙周炎
- C.牙周牙髓联合病变
- D.牙周脓肿
- E.牙周创伤

105、(A1型题)男,60岁。下前牙松动1年,检查:两个下中切牙松动I度,牙石(++),探诊深度7mm。全口其他牙牙石(+),探诊深度普遍6mm,附着丧失3~4mm。最可能的诊断为

- A.慢性牙周炎
- B.增生性龈炎
- C.边缘性龈炎
- D.牙周牙髓联合病变
- E.侵袭性牙周炎

106、(A1型题)男,61岁。右下后牙床肿痛5天。检查:右下第一磨牙颊侧牙龈局限性肿胀、隆起,有深的牙周袋,波动感,诊断为牙周脓肿。此时对该患者的治疗首先应为

- A.刮治
- B.切开引流
- C.根面平整
- D.全身用药
- E.局部用药

107、(A1型题)患者,男,45岁,教师。因进食时牙酸疼。检查43211234牙龈萎缩、无龋、牙颈部楔状缺损、口腔环境良好。每日刷牙2次,造成楔状缺损的原因中,不必考虑

- A.刷牙方法不正确
- B.牙刷毛太硬
- C.刷牙用力过大
- D.喜进甜食
- E.牙膏中磨擦剂粗糙

108、(A1型题)患者,女,40岁。因右下第一中切牙缺失要求修复。临床检查时发现右下侧切牙近中面釉质呈白垩色及黄褐色斑点,探釉质有缺损,诊断为光滑面浅龋。应做的治疗是

- A.药物治疗
- B.再矿化治疗
- C.玻璃离子水门汀充填
- D.复合树脂充填
- E.银汞合金充填

109、(A1型题)患者,男,40岁。完全脱位牙需进行再植,90%可避免牙根吸收的时间是在外伤后

- A.30分钟以内
- B.1小时以内
- C.90分钟以内
- D.2小时以内
- E.12小时以内

110、(A1型题)患者,男,38岁,1天前骑自行车跌倒,上前牙受伤,现咬合疼。检查:左上1牙冠完整,叩(+),电活力测验无反应,松动I度,牙龈无红肿,X线片示根尖1/3处有根折线。该牙的处理应为

- A.调he、固定
- B.立即做根管治疗术
- C.立即做根尖切除术
- D.不做任何处理
- E.拔除患牙

111、(A1型题)某患者,女,63岁。全口牙列缺失,要求修复。若患者对基托材料过敏,应首先推荐哪种修复方法

- A.种植全口义齿
- B.活动全口义齿
- C.种植体支持的覆盖义齿
- D.种植体支持下的固定义齿
- E.金属基托的活动义齿

112、(A1型题)某患者,女,63岁。全口牙列缺失,要求修复。若患者上颌牙槽嵴低平,多次修复义齿固位差,但患者身体状况良好,应选用哪种修复方法

- A.采用全口义齿修复,通过形成良好的磨光面外形增加固位
- B.采用种植体固位的覆盖义齿
- C.采用种植体固位的套筒冠义齿修复
- D.行唇颊沟加深术和牙槽嵴重建术后进行全口义齿修复
- E.调整义齿边缘

113、(A1型题)某患者,女,63岁。全口牙列缺失,要求修复。若发现患者牙槽嵴上有明显的骨尖,应如何处理

- A.不处理,待其自然吸收
- B.在义齿基托组织面进行缓冲
- C.手术去除
- D.增大基托面积,分散力
- E.减少义齿与对颌牙接触面积

114、(A1型题)某患者,女,63岁。全口牙列缺失,要求修复。若患者上颌前部牙槽嵴被一种松软可移动的软组织所覆盖,应如何处理

- A.对义齿固位没有影响,不处理
- B.在义齿基托组织面进行缓冲
- C.增大基托面积,提高固位力
- D.减少义齿与对颌牙接触面积,以缓解不适

E.手术切除

115、(A1型题)某患者,女,63岁。全口牙列缺失,要求修复。患者身体和经济状况良好,但上颌牙槽嵴低平,且腭侧见2cm×2cm白色损害,此时应如何处理

- A.直接全口义齿修复
- B.行唇颊沟加深术和牙槽嵴重建术后进行全口义齿修复
- C.采用种植体固位的覆盖义齿
- D.用种植体固位的套筒冠义齿修复
- E.先治疗白色损害,暂不修复

116、(A1型题)患者,男。3年前行全口修复,使用1年后,一颗人工牙完整脱落,同时发现吃食物费力,咬合恶心,出现疼痛,要求诊治人工牙完整脱落的原因不包括

- A.人工牙盖嵴部粘蜡未去净
- B.人工牙盖嵴部未磨粗糙
- C.人工牙盖嵴部未用单体膨胀
- D.人工牙盖嵴部有分离剂
- E.人工牙大小不合适

117、(A1型题)患者,男。3年前行全口修复,使用1年后,一颗人工牙完整脱落,同时发现吃食物费力,咬合恶心,出现疼痛,要求诊治出现疼痛的原因是

- A.牙槽嵴骨尖
- B.咬合力过大
- C.黏膜有炎症
- D.咬合不平衡
- E.牙槽嵴吸收致基托边缘过长

118、(A1型题)患者,男。3年前行全口修复,使用1年后,一颗人工牙完整脱落,同时发现吃食物费力,咬合恶心,出现疼痛,要求诊治咀嚼费力的原因是

- A.患者年龄增加
- B.咬合面磨损
- C.咬合不平衡
- D.咬合疼痛
- E.选用的为塑料牙

119、(A1型题)患者,男。3年前行全口修复,使用1年后,一颗人工牙完整脱落,同时发现吃食物费力,咬合恶心,出现疼痛,要求诊治出现恶心感的原因是

- A.基托边缘过长
- B.患者年龄过大
- C.基托过厚
- D.垂直距离降低
- E.后牙磨损,前牙早接触致基托后缘与黏膜间出现间隙

120、(A1型题)患者,男。3年前行全口修复,使用1年后,一颗人工牙完整脱落,同时发现吃食物费力,咬合恶心,出现疼痛,要求诊治应如何处理

- A.修复脱落的人工牙
- B.调
- C.修整基托边缘
- D.重衬
- E.返工重做

121、(A1型题)男,20岁。全口多数牙龈均有不同程度的充血、水肿,以下前牙牙龈肿胀明显,牙龈呈暗红色,牙颈部可见堆积的软垢和牙石,舌侧较多,触之牙龈易出血,牙无松动,X线片未见异常该病最可能的诊断是

- A.边缘性龈炎
- B.慢性牙周炎

- C.牙龈纤维增生
- D.坏死性龈炎
- E.侵袭性牙周炎

122、(A1型题)男,20岁。全口多数牙龈均有不同程度的充血、水肿,以下前牙牙龈肿胀明显,牙龈呈暗红色,牙颈部可见堆积的软垢和牙石,舌侧较多,触之牙龈易出血,牙无松动,X线片未见异常引起该疾病的主要病因是

- A.吸烟
- B.不良习惯
- C.软垢与牙石
- D.激素水平
- E.不良的刷牙方法

123、(A1型题)男,20岁。全口多数牙龈均有不同程度的充血、水肿,以下前牙牙龈肿胀明显,牙龈呈暗红色,牙颈部可见堆积的软垢和牙石,舌侧较多,触之牙龈易出血,牙无松动,X线片未见异常对该病最适宜的治疗措施是

- A.洁治术
- B.保持口腔清洁
- C.局部用消炎药
- D.全身用消炎药
- E.牙龈切除术

124、(A1型题)患者,女,35岁。因左下后牙对冷热刺激敏感1周前来就诊,检查发现左下第一磨牙颊面深龋洞,探诊洞底感酸痛,冷测反应一过性敏感,叩诊(-),牙龈无异常该患牙的诊断是

- A.深龋
- B.可复性牙髓炎
- C.急性牙髓炎
- D.慢性牙髓炎
- E.牙髓钙化

125、(A1型题)患者,女,35岁。因左下后牙对冷热刺激敏感1周前来就诊,检查发现左下第一磨牙颊面深龋洞,探诊洞底感酸痛,冷测反应一过性敏感,叩诊(-),牙龈无异常作鉴别诊断时,最有价值的检查方法是

- A.X线检查
- B.温度测试
- C.探诊
- D.咬诊
- E.视诊

126、(A1型题)患者,女,35岁。因左下后牙对冷热刺激敏感1周前来就诊,检查发现左下第一磨牙颊面深龋洞,探诊洞底感酸痛,冷测反应一过性敏感,叩诊(-),牙龈无异常其处理方法是

- A.安抚治疗
- B.磷酸锌粘固粉垫底永久充填
- C.聚羧酸锌粘固粉垫底永久充填
- D.氧化锌丁香油粘固粉垫底永久充填
- E.直接永久充填

127、(A1型题)患者,男,38岁,自觉右下第一磨牙咀嚼时咬到某一处时明显酸痛,不咬合时无疼痛,今晨咬硬物时又出现同样症状,进冷热食时,无明显痛感采集病史时应特别注意询问

- A.有无自发痛
- B.有无夜间痛
- C.有无扳机点
- D.有无牙病治疗史
- E.酸痛是否在食物嵌入牙面龋洞时引起

128、(A1型题)患者,男,38岁,自觉右下第一磨牙咀嚼时咬到某一处时明显酸痛,不咬合时无疼痛,今晨咬硬物时又出现同样症状,进冷热食时,无明显痛感检查的重点是

- A.叩诊
- B.探诊
- C.视诊
- D.牙齿松动度
- E.冷热诊

129、(A1型题)患者,男,38岁,自觉右下第一磨牙咀嚼时咬到某一处时明显酸痛,不咬合时无疼痛,今晨咬硬物时又出现同样症状,进冷热食时,无明显痛感对鉴别诊断最有帮助的辅助检查是

- A.可根尖片
- B.下颌骨侧位片
- C.曲面体层片
- D.电活力测验
- E.神经系统检查

130、(A1型题)患者,男,40岁。戴用下颌磨牙修复体1年余,近来出现对冷热刺激敏感,并有自发痛而就诊。查:下颌第一磨牙PFM全冠修复体,叩诊(±),接触点及边缘良好该病例出现自发性疼痛的原因可能是

- A.继发龋
- B.牙髓炎
- C.金属微电流刺激
- D.粘固剂选用不当
- E.意外穿髓或管壁侧穿

131、(A1型题)患者,男,40岁。戴用下颌磨牙修复体1年余,近来出现对冷热刺激敏感,并有自发痛而就诊。查:下颌第一磨牙PFM全冠修复体,叩诊(±),接触点及边缘良好视目前该病例的具体情况,可供选择的进一步检查与处理方案是

- A.检查咬合
- B.拆除修复体
- C.X线牙片检查
- D.冠边缘贴合情况
- E.温度测试与牙髓治疗

132、(A1型题) I型观测线

- A.近缺牙区的倒凹区小,非倒凹区大,而远缺牙区的倒凹区大,非倒凹区小
- B.近缺牙区的倒凹区大,非倒凹区小
- C.倒凹区与非倒凹区均大
- D.倒凹区均大,非倒凹区均小
- E.倒凹区均小,非倒凹区均大

133、(A1型题) II型观测线

- A.近缺牙区的倒凹区小,非倒凹区大,而远缺牙区的倒凹区大,非倒凹区小
- B.近缺牙区的倒凹区大,非倒凹区小
- C.倒凹区与非倒凹区均大
- D.倒凹区均大,非倒凹区均小
- E.倒凹区均小,非倒凹区均大

134、(A1型题) III型观测线

- A.近缺牙区的倒凹区小,非倒凹区大,而远缺牙区的倒凹区大,非倒凹区小
- B.近缺牙区的倒凹区大,非倒凹区小
- C.倒凹区与非倒凹区均大
- D.倒凹区均大,非倒凹区均小
- E.倒凹区均小,非倒凹区均大

- 135、（A1 型题）桩核冠的根尖封闭区不少于
- A.4mm
 - B.2mm
 - C.1.5mm
 - D.1mm
 - E.3mm
- 136、（A1 型题）沟固位形的深度一般为
- A.4mm
 - B.2mm
 - C.1.5mm
 - D.1mm
 - E.3mm
- 137、（A1 型题）洞固位形的深度一般不小于
- A.4mm
 - B.2mm
 - C.1.5mm
 - D.1mm
 - E.3mm
- 138、（A1 型题）球菌性口炎的病因是
- A.细菌感染
 - B.真菌感染
 - C.自身免疫功能缺陷
 - D.变态反应
 - E.病毒感染
- 139、（A1 型题）带状疱疹的发病原因是
- A.细菌感染
 - B.真菌感染
 - C.自身免疫功能缺陷
 - D.变态反应
 - E.病毒感染
- 140、（A1 型题）义齿性口炎病因是
- A.细菌感染
 - B.真菌感染
 - C.自身免疫功能缺陷
 - D.变态反应
 - E.病毒感染
- 141、（A1 型题）上颌中切牙腭面洞
- A. I 类洞
 - B. II 类洞
 - C. III 类洞
 - D. IV 类洞
 - E. V 类洞下列龋病制备的洞形中，根据 Black 分类归为
- 142、（A1 型题）上颌侧切牙邻面龋未累计切角
- A. I 类洞
 - B. II 类洞
 - C. III 类洞
 - D. IV 类洞
 - E. V 类洞下列龋病制备的洞形中，根据 Black 分类归为
- 143、（A1 型题）上颌中切牙切角缺损

- A. I类洞
- B. II类洞
- C. III类洞
- D. IV类洞
- E. V类洞下列龋病制备的洞形中，根据 Black 分类归为

144、（A1 型题）下颌第一磨牙近中邻面颈部龋

- A. I类洞
- B. II类洞
- C. III类洞
- D. IV类洞
- E. V类洞下列龋病制备的洞形中，根据 Black 分类归为

145、（A1 型题）上颌尖牙颊侧颈部龋

- A. I类洞
- B. II类洞
- C. III类洞
- D. IV类洞
- E. V类洞下列龋病制备的洞形中，根据 Black 分类归为

146、（A1 型题）与龈下牙石形成有关

- A. 龈上菌斑
- B. 附着性龈下菌斑
- C. 非附着性龈下菌斑
- D. 陈旧的龈上菌斑
- E. 窝沟处龈上菌斑

147、（A1 型题）主要为革兰阴性厌氧菌构成的菌斑

- A. 龈上菌斑
- B. 附着性龈下菌斑
- C. 非附着性龈下菌斑
- D. 陈旧的龈上菌斑
- E. 窝沟处龈上菌斑

148、（A1 型题）被认为是牙周炎“进展前沿”的菌斑

- A. 龈上菌斑
- B. 附着性龈下菌斑
- C. 非附着性龈下菌斑
- D. 陈旧的龈上菌斑
- E. 窝沟处龈上菌斑

149、（A1 型题）与窝沟龋有关的菌斑本单元试卷到此结束参考答案

- A. 龈上菌斑
- B. 附着性龈下菌斑
- C. 非附着性龈下菌斑
- D. 陈旧的龈上菌斑
- E. 窝沟处龈上菌斑

150、（A1 型选择题）下面哪项描述不是球菌性口炎的临床表现

- A. 口腔黏膜充血，局部形成糜烂或溃疡
- B. 溃疡或糜烂的表面上覆盖假膜
- C. 口腔黏膜出现白色网纹样病变
- D. 患者唾液增多，疼痛明显
- E. 区域淋巴结肿大压痛

答案

1、正确答案：C
答案解析：

2、正确答案：C
答案解析：

3、正确答案：E
答案解析：

4、正确答案：C
答案解析：

5、正确答案：A
答案解析：

6、正确答案：B
答案解析：

7、正确答案：A
答案解析：

8、正确答案：C
答案解析：

9、正确答案：E
答案解析：

10、正确答案：A
答案解析：

11、正确答案：D
答案解析：

12、正确答案：B
答案解析：

13、正确答案：B
答案解析：

14、正确答案：D
答案解析：

15、正确答案：C
答案解析：

16、正确答案：B
答案解析：

17、正确答案：B
答案解析：

18、正确答案：D
答案解析：

19、正确答案：E
答案解析：

20、正确答案：B
答案解析：

21、正确答案：B
答案解析：

22、正确答案：D
答案解析：

23、正确答案：B
答案解析：

24、正确答案：D
答案解析：

25、正确答案：A
答案解析：

26、正确答案：D
答案解析：

27、正确答案：B
答案解析：

28、正确答案：C
答案解析：

29、正确答案：A
答案解析：

30、正确答案：B
答案解析：

31、正确答案：D
答案解析：

32、正确答案：C
答案解析：

33、正确答案：B
答案解析：

34、正确答案：A
答案解析：

35、正确答案：C
答案解析：

36、正确答案：C
答案解析：

37、正确答案：C
答案解析：

38、正确答案：C
答案解析：

39、正确答案：C
答案解析：

40、正确答案：E
答案解析：

41、正确答案：A
答案解析：

42、正确答案：D
答案解析：

43、正确答案：E
答案解析：

44、正确答案：D
答案解析：

45、正确答案：D
答案解析：

46、正确答案：D
答案解析：

47、正确答案：A
答案解析：

48、正确答案：D
答案解析：

49、正确答案：A
答案解析：

50、正确答案：C
答案解析：

51、正确答案：A
答案解析：

52、正确答案：B
答案解析：

53、正确答案：A
答案解析：

54、正确答案：D
答案解析：

55、正确答案：B
答案解析：

56、正确答案：D
答案解析：

57、正确答案：C
答案解析：

58、正确答案：A
答案解析：

59、正确答案：D
答案解析：

60、正确答案：B
答案解析：

61、正确答案：D
答案解析：

62、正确答案：D
答案解析：

63、正确答案：E
答案解析：

64、正确答案：E
答案解析：

65、正确答案：E
答案解析：

66、正确答案：B
答案解析：

67、正确答案：B
答案解析：

68、正确答案：D
答案解析：

69、正确答案：C
答案解析：

70、正确答案：A
答案解析：

71、正确答案：E
答案解析：

72、正确答案：A
答案解析：

73、正确答案：D
答案解析：

74、正确答案：D
答案解析：

75、正确答案：A
答案解析：

76、正确答案：C

答案解析：

77、正确答案：A

答案解析：

78、正确答案：D

答案解析：

79、正确答案：B

答案解析：

80、正确答案：C

答案解析：

81、正确答案：C

答案解析：

82、正确答案：A

答案解析：

83、正确答案：D

答案解析：

84、正确答案：E

答案解析：

85、正确答案：E

答案解析：

86、正确答案：E

答案解析：

87、正确答案：A

答案解析：

88、正确答案：E

答案解析：

89、正确答案：B

答案解析：

90、正确答案：B

答案解析：

91、正确答案：D

答案解析：

92、正确答案：E

答案解析：龋降低相对有效率=（对照组龋数—实验组龋数）/对照组龋数 ×100%

93、正确答案：C

答案解析：根据 Dean 氟牙症分类标准，很轻度（1）；小的似纸一样的白色不透明区不规则地分布在牙齿上，但不超过牙面的 25%

94、正确答案：B

答案解析：前牙及后牙邻面突度分别在切 1/3 和 he 1/3 处，相邻两牙藉邻接点相接，邻接点因磨耗呈小面，称为接触区。前牙接触区呈椭圆形，切颈径大于唇舌径，后牙接触区亦呈椭圆形，颊舌径大于 he 颈径。

95、正确答案：E

答案解析：修复体粘固后出现龈缘炎的原因：1、修复体轴壁突度不良 2、冠边缘过长 3、试冠、戴冠时对牙龈损伤 4、嵌塞食物压迫 5、倾斜牙、异位牙修复体未能恢复正常排列和外形 6、粘接剂残留

96、正确答案：B

答案解析：

97、正确答案：C

答案解析：球菌性口炎临床表现：在溃疡或糜烂的表面覆盖着一层灰白色或黄褐色假膜，假膜特点是较厚微突出黏膜表面，致密而光滑。擦去假膜，可见溢血的糜烂面。周围黏膜充血水肿。患者唾液增多，疼痛明显，有炎性口臭。区域淋巴结肿大压痛。有些患者可伴有发热等全身症状

98、正确答案：D

答案解析：

99、正确答案：E

答案解析：慢性萎缩型（红斑型）戴义齿的患者，又称义齿性口炎，义齿承托区黏膜广泛发红，形成鲜红色弥散红斑。红斑表面可有颗粒增生。舌背乳头可萎缩，舌质红

100、正确答案：B

答案解析：后牙首先保证有足够的机械倾度和耐磨性，可选用复合树脂和银汞合金。题干里提到查见 14 近中边缘嵴约小米大小透暗色区，所以选择复合树脂

101、正确答案：C

答案解析：根据题干右下 7 面树脂充填物边缘破裂、叩（-），冷侧敏感，刺激后疼痛立刻消失，可以知道是继发龋

102、正确答案：B

答案解析：氟牙症临床表现的特点是在同一时期萌出的釉质上有白垩色到褐色的斑块，严重者还并发釉质的实质缺损

103、正确答案：B

答案解析：氟牙症临床表现特点是在同一时期萌出的釉质上有白垩色到褐色斑块，严重者还并发釉质的实质缺损

104、正确答案：B

答案解析：慢性牙周炎牙龈的炎症表现：颜色，为鲜红色或暗红色；外形，在牙石堆积处有不同程度的炎性肿胀甚至增生；质地，松软；由于带内壁常有上皮溃疡和结缔组织的炎症，故探诊极易出血，甚至流脓

105、正确答案：A

答案解析：根据题干，下前牙松动 1 年，两个下中切牙牙石（++），全口牙石（+）探诊深度超过 3mm，附着丧失 3~4mm，属于慢性牙周炎

106、正确答案：B

答案解析：急性牙周脓肿的治疗原则是消炎止痛、防止感染扩散以及使脓液引流；1、在脓肿初期脓液尚未形成前，可清除大块牙石，冲洗牙周袋，将防腐抗菌药引入袋内，必要时全身给予抗生素或支持疗法 2、当脓液形成且局限，出现波动时，可进行引流，切开引流后的数日应嘱患者用盐水或氯己定等含漱 3、对于患牙挺出而咬合解除疼痛者，可将明显的早接触点调磨，使患牙获得迅速恢复的机会 4、慢性牙周脓肿可在洁治的基础上直接进行牙周手术。根据不同情况，做脓肿切除术，或翻瓣手术

107、正确答案：D

答案解析：楔状缺损病因：1、不恰当的刷牙方法 2、酸的作用 3、牙颈部结构的特点 4、应力疲劳

108、正确答案：A

答案解析：药物治疗是在磨除龋坏的基础上，应用药物抑制龋病发展的方法，适用于未成龋洞的光滑面浅龋；常用药物包括氟化物、硝酸银和氨硝酸银等。故选 A

109、正确答案：A

答案解析：完全脱位牙在 0.5 小时内进行再植，90% 患牙的牙根可免于吸收

110、正确答案：A

答案解析：根尖 1/3 处根折的牙应该先调(牙合)、固定。有牙髓症状的再做根管治疗，根管治疗失败了才拔除

111、正确答案：A

答案解析：

112、正确答案：D

答案解析：

113、正确答案：C

答案解析：

114、正确答案：E

答案解析：

115、正确答案：E

答案解析：

116、正确答案：E

答案解析：

117、正确答案：E

答案解析：

118、正确答案：B

答案解析：

119、正确答案：E

答案解析：

120、正确答案：E

答案解析：

121、正确答案：A

答案解析：

122、正确答案：C

答案解析：

123、正确答案：A

答案解析：

124、正确答案：B

答案解析：

125、正确答案：B

答案解析：

126、正确答案：D
答案解析：

127、正确答案：B
答案解析：

128、正确答案：A
答案解析：

129、正确答案：D
答案解析：

130、正确答案：B
答案解析：

131、正确答案：E
答案解析：

132、正确答案：A
答案解析：

133、正确答案：B
答案解析：

134、正确答案：D
答案解析：

135、正确答案：A
答案解析：

136、正确答案：D
答案解析：

137、正确答案：B
答案解析：

138、正确答案：A
答案解析：

139、正确答案：E
答案解析：

140、正确答案：B
答案解析：

141、正确答案：A
答案解析：

142、正确答案：C
答案解析：

143、正确答案：D
答案解析：

144、正确答案：B
答案解析：

145、正确答案：E

答案解析：

146、正确答案：B

答案解析：

147、正确答案：C

答案解析：

148、正确答案：C

答案解析：

149、正确答案：E

答案解析：

150、正确答案：C

答案解析：无