



2020 口腔 执业 (助理) 医师考试

王牌直播

核心考点精学笔记

- ◆ 核心考点
- ◆ 习题跟踪
- ◆ 名师精讲
- ◆ 重难点剖析



金英杰独家资料 (电子版)



金英杰直播学院

JINYINGJIE.COM



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

月度考试

- 1、（A1 型题）对于远中游离缺失的末端基牙，与远中支托比较，近中支托
 - A.减小了基牙所受的扭力，也减小了牙槽嵴的负担
 - B.减小了基牙所受的扭力，但增加了牙槽嵴的负担
 - C.增加了基牙所受的扭力，也增加了牙槽嵴的负担
 - D.增加了基牙所受的扭力，但减小了牙槽嵴的负担
 - E.对基牙所受的扭力和牙槽嵴的负担均无影响

- 2、（A1 型题）非解剖式牙不具备的特点是
 - A.上下颌牙具有一定的尖凹锁结关系
 - B.有溢出沟
 - C.咀嚼功能较差
 - D.侧向力小
 - E.对牙槽嵴损害小

- 3、（A1 型题）固定义齿的设计主要根据
 - A.患者对咀嚼功能的要求
 - B.患者对美观性的要求
 - C.患者对舒适度的要求
 - D.基牙的牙周膜面积
 - E.基牙的单根牙数目

- 4、（A1 型题）全口义齿修复的目的不包括
 - A.恢复咀嚼功能
 - B.保护颌骨
 - C.改善发音
 - D.增强心理适应能力
 - E.恢复原有的咀嚼效率

- 5、（A1 型题）全口义齿基托吸附力的大小与下列哪项因素关系最大
 - A.人造牙的排列是否正确
 - B.颌弓关系是否正常
 - C.印模是否准确
 - D.基托磨光面是否正确
 - E.颌位记录是否准确

- 6、（A1 型题）关于无牙颌的分区，下列不属于缓冲区的是
 - A.牙槽嵴上的骨尖
 - B.上颌隆突
 - C.上颌结节

- D.下颌磨牙后垫
E.切牙乳突
- 7、(A1型题) 下颌全口义齿基托的封闭区是
- A.唇、颊系带
B.磨牙后垫区
C.下颌舌骨嵴
D.下颌隆突
E.远中颊角区
- 8、(A1型题) 全口义齿修复要求获得
- A.功能印模
B.解剖式印模
C.加压印模
D.减压印模
E.均匀性印模
- 9、(A1型题) 全口义齿合适的凹形磨光面形态可以
- A.降低咀嚼效能
B.使发音清晰
C.帮助义齿固位
D.避免咬颊、咬舌
E.增加面部丰满度
- 10、(A1型题) 解剖式牙的牙尖斜度为
- A.33°
B.25°
C.20°
D.15°
E.10°
- 11、(A1型题) 全口义齿垂直距离过大的表现是
- A.鼻唇沟较深
B.咀嚼时要用较大的力量
C.唇红部显宽
D.说话时可闻及后牙撞击声
E.颈部前突
- 12、(A1型题) 全口义齿戴用一段时间后出现颞下颌关节病症状和髁突后移的原因是
- A.确定垂直距离过低
B.确定垂直距离过高
C.义齿固位不良反应
D.咬合力过大
E.前伸或侧向平衡不良

- 13、（A1 型题）全口义齿戴牙时无需检查的内容为
- A. 咬合关系
 - B. 义齿的稳定和固位
 - C. 发音及面容协调
 - D. 垂直距离
 - E. 唾液的质和量
- 14、（A1 型题）关于全口义齿重衬的描述，不正确的是
- A. 适用于全口义齿戴用一段时间后，由于组织的吸收所致固位不好
 - B. 在义齿初戴时发现的基托不密合，需要重衬
 - C. 义齿折断修理后如基托不密合也需要进行重衬
 - D. 全口重衬的方法有直接重衬法、间接重衬法和自凝软衬材料重衬法
 - E. 义齿不稳定时重衬
- 15、（A1 型题）全口义齿初戴时，如发现下颌义齿翘动，支点的位置通常是
- A. 下颌隆突
 - B. 磨牙后垫
 - C. 唇系带
 - D. 牙槽嵴顶
 - E. 舌系带
- 16、（A1 型题）全口义齿戴入后，如果垂直距离过高可出现
- A. 唇颊部软组织凹陷
 - B. 颊部前突
 - C. 咀嚼无力
 - D. 咀嚼肌酸痛
 - E. 面下部高度不足
- 17、（A1 型题）全口义齿初戴，与义齿稳定无关的因素是
- A. 良好的咬合关系
 - B. 适当的基托伸展
 - C. 理想的磨光面形态
 - D. 合理的人工牙排列
 - E. 具有 He 平衡
- 18、（A1 型题）戴用全口义齿后，休息时义齿稳固但说话及张口时脱位，最不可能的原因是
- A. 基托边缘过短
 - B. 基托边缘过长
 - C. 系带区基托未缓冲
 - D. 人工牙排列位置不当
 - E. 基托磨光面外形不好
- 19、（A1 型题）关于牙列缺失后骨组织改变的说法中，不正确的是

- A.上下颌骨的改变主要是颌骨的萎缩
B.形成牙槽嵴后吸收加快
C.上下颌骨逐渐失去原有形状和大小
D.上颌弓的外形逐渐缩小
E.下颌弓的外形逐渐变大
- 20、（A1 型题）与吸附力关系最密切的因素是
- A.唾液的黏稠度
B.唾液的分泌量
C.基托组织面与黏膜间的密合度
D.基托的厚度
E.牙槽嵴的吸收程度
- 21、（A1 型题）上颌总义齿牙槽嵴与硬区之间的区域是
- A.主承托区
B.副承托区
C.缓冲区
D.边缘伸展区
E.边缘封闭区
- 22、（A1 型题）无牙颌功能分区的缓冲区不包括
- A.切牙乳突
B.上颌硬区
C.下颌隆突
D.颧突
E.颊棚区
- 23、（A1 型题）总义齿修复中，作用于唾液与基托之间的力应称之为
- A.粘固力
B.吸引力
C.粘着力
D.黏附力
E.附着力
- 24、（A1 型题）全口义齿平衡的主要作用是
- A.与天然牙列咬合形式相区别
B.防止咬颊、舌
C.在下颌义齿做非正中滑动运动时，义齿稳定不移动
D.提高咀嚼效率
E.增进义齿美观
- 25、（A1 型题）磨牙后垫在排列人工牙时的标志作用如下，除了
- A.下颌第一磨牙的面应与磨牙后垫的 $1/2$ 等高
B.下颌第二磨牙应位于磨牙后垫前缘

- C.后牙的舌尖应位于磨牙后垫颊、舌面向前与下颌尖牙远中面形成的三角形内
D.后牙的舌尖应位于磨牙后垫颊、舌面向前与下颌尖牙近中面形成的三角形内
E.下全口义齿后缘应盖过磨牙后垫 1 / 2 或全部
- 26、（A1 型题）以下说法错误的是
- A.全口义齿的主要承重区在后牙牙槽嵴顶、腭穹窿、颊棚区
B.全口义齿基托磨光面的处理要求有一定的斜度和外形是为了便于食物排溢
C.全口义齿修复后出现咬颊现象的原因是后牙覆盖关系过小
D.全口义齿修复制作托的目的是确立颌位记录
E.
- 27、（A1 型题）无牙颌患者戴全口义齿时发现，吸附力良好，但无法发“斯”音，分析最可能的原因
- A.基托后缘过长
B.咬合有高点
C.垂直距离过高
D.垂直距离过低
E.前伸不平衡
- 28、（A1 型题）牙髓正常或牙髓炎未累及根尖者，根充后桩核冠开始的最早时间是
- A.3 天
B.5 天
C.1 周
D.2 周
E.3 周
- 29、（A1 型题）间接固位体主要增加可摘局部义齿的
- A.固位力
B.稳定性
C.支持力
D.坚固性
E.咀嚼力
- 30、（A1 型题）前牙金属烤瓷冠唇侧作龈下边缘的主要优点是
- A.龈沟内是免疫区
B.修复体边缘密合性好
C.不易产生继发龋
D.增进美观
E.防止菌斑附着
- 31、（A1 型题）切牙乳突在全口义齿修复中的作用是
- A.确定平面的标志
B.确定后堤区的标志
C.确定牙槽嵴顶的标志

- D.确定基托伸展范围的标志
E.排列上颌中切牙位置的参考标准
- 32、（A1型题）在决定可摘局部义齿人工后牙颊舌径大小时，可以不考虑
- A.义齿支持形式
 - B.缺牙的多少
 - C.基牙的状况
 - D.患者的爱好
 - E.牙槽嵴的情况
- 33、（A1型题）在排列可摘局部义齿人工后牙的要求中错误的是
- A.尽可能减小覆盖
 - B.前磨牙的排列兼顾美观
 - C.尽量排列在牙槽嵴顶上
 - D.与对颌牙排成尖、窝相对的咬合关系
 - E.上下颌双侧后牙缺失，平面平分颌间距离
- 34、（A1型题）铸造金属全冠颈部肩台的宽度通常为
- A.0.3~0.4 mm
 - B.0.5~0.8 mm
 - C.0.9~1.0 mm
 - D.1.1~1.2 mm
 - E.1.3~1.5 mm
- 35、（A1型题）对全口义齿固位有利的口腔黏膜是
- A.黏膜厚，弹性大，湿润度大
 - B.黏膜较薄，弹性大，湿润度大
 - C.黏膜厚，弹性适中，湿润度小
 - D.黏膜厚度及弹性适中，湿润度小
 - E.黏膜厚度、弹性、湿润度适中
- 36、（A1型题）固定义齿修复时，一端基牙有Ⅰ度松动可设计
- A.两端为固定连接
 - B.基牙松动端为活动连接
 - C.两端为活动连接
 - D.增加一端基牙数
 - E.增加两端基牙数
- 37、（A1型题）对上前牙邻面接触点的描述，正确的是
- A.位于邻面龈 1/3，切龈径等于唇舌径
 - B.位于邻面中 1/3，切龈径大于唇舌径
 - C.位于邻面切 1/3，切龈径大于唇舌径
 - D.位于邻面中 1/3，切龈径等于唇舌径
 - E.位于邻面切 1/3，切龈径等于唇舌径

- 38、（A1 型题）义齿修复前骨尖修整的最佳时机是拔牙后
- A.2 周左右
 - B.4 周左右
 - C.8 周左右
 - D.10 周左右
 - E.12 周左右
- 39、（A1 型题）牙片可检查的内容不包括
- A.牙根数目
 - B.牙根粗细
 - C.牙根弯曲度
 - D.牙根截面形状
 - E.牙根长短
- 40、（A1 型题）对于嵌入性脱位的年轻恒牙，下列处理错误的是
- A.对症处理
 - B.拉出复位
 - C.观察
 - D.任其自然萌出
 - E.定期复查
- 41、（A1 型题）牙隐裂时不宜采用哪种治疗措施
- A.调排除干扰
 - B.治疗后及时做全冠保护
 - C.隐裂浅时用釉质粘结剂处理
 - D.裂纹达牙本质浅层时，备洞，银汞充填
 - E.有牙髓病变者，牙髓治疗后全冠修复
- 42、（A1 型题）在临床上，发生楔状缺损的常见频率顺序是
- A.中切牙、侧切牙、尖牙、双尖牙、磨牙
 - B.双尖牙、尖牙、磨牙、侧切牙、中切牙
 - C.尖牙、中切牙、侧切牙、双尖牙、磨牙
 - D.尖牙、双尖牙、磨牙、中切牙、侧切牙
 - E.侧切牙、中切牙、尖牙、双尖牙、磨牙
- 43、（A1 型题）对牙本质过敏的患牙。最敏感刺激是
- A.冷
 - B.热
 - C.酸
 - D.机械
 - E.甜
- 44、（A1 型题）牙隐裂好发于

- A. 下颌第一磨牙
B. 上颌第一磨牙
C. 下颌第二磨牙
D. 上颌第二磨牙
E. 上颌前磨牙
- 45、（A1 型题）在 X 线片上，髓室及根管影像完全消失，不能分辨出髓腔界线表示有
A. 牙髓充血
B. 牙髓炎
C. 弥散性牙髓钙化
D. 牙髓坏死
E. 牙内吸收
- 46、（A1 型题）对于牙本质过敏首选的治疗方法有
A. 药物脱敏
B. 牙髓治疗
C. 牙周洁治
D. 垫底充填
E. 树脂充填
- 47、（A1 型题）关于逆行性牙髓炎的临床表现不正确的是
A. 可探及深的牙周袋
B. 严重的根分叉病变
C. 可有叩痛
D. 患牙的不同部位温度测验可有不同反应
E. 可探及深龋洞
- 48、（A1 型题）牙本质过敏症的发病机制被认为是
A. 体液学说
B. 化学细菌学说
C. 活体学说
D. 流体动力学说
E. 蛋白溶解学说
- 49、（A1 型题）牙髓活力测验的结果表示为
A. 正常、敏感、迟钝、无反应
B. 0°、1°、2°、3°、4°
C. (+)、(±)、(+)、(++)
D. 0°、I°、II°、III°、IV°
E. 10、20、30、60、80
- 50、（A1 型题）可复性牙髓炎临床表现的特点是
A. 患牙有深龋洞
B. 冷水入洞后痛

- C.有阵发性自发痛
D.热测引起迟缓痛
E.冷测一过性敏感
- 51、（A1型题）牙髓失活剂使用不当，可引起
- A.弥散性硬化性骨髓炎
B.颌骨化学性坏死
C.牙骨质增生
D.牙髓钙化
E.牙内吸收
- 52、（A1型题）中等深度以上的窝洞用银汞合金充填时需要垫底的原因是充填材料
- A.有牙髓刺激性
B.为温度良导体
C.具有收缩性
D.具有微渗漏
E.其中的汞有一定毒性
- 53、（A1型题）用复合树脂修复的窝洞预备洞斜面的目的是
- A.提高抗力性
B.去除悬轴
C.增加树脂的聚合收缩
D.减小树脂的聚合收缩
E.增加粘结面积
- 54、（A1型题）临床上去除龋坏组织的主要根据
- A.洞壁牙体组织的颜色深浅
B.洞壁牙体组织的硬度
C.洞底的位置
D.预计剩余牙体组织的多少
E.患者的敏感程度
- 55、（A1型题）根管和根尖周的感染是
- A.以厌氧菌为主的混合感染
B.以需氧菌为主的混合感染
C.厌氧菌的感染
D.需氧菌的感染
E.兼性厌氧菌的感染
- 56、（A1型题）四环素牙的临床表现如下，除外
- A.前牙着色比后牙明显
B.四环素的疗程数与着色程度成正比
C.乳牙着色比恒牙明显
D.釉质着色较牙本质深

E.在牙着色的同时，还有骨组织的着色

57、（A1 型题）正常情况下，最易引起牙本质敏感症的釉牙骨质界结构为

- A.少量牙骨质覆盖在牙釉质表面
- B.多量牙骨质覆盖在牙釉质表面
- C.牙釉质与牙骨质端端相接
- D.牙釉质与牙骨质分离
- E.以上都不是

58、（A1 型题）两个牙根发育完全以后发生粘连的牙称为

- A.融合牙
- B.结合牙
- C.双生牙
- D.过大牙
- E.畸形中央尖

59、（A1 型题）先天性梅毒牙在临床上可表现为

- A.牙本质发育不全
- B.釉质发育不全
- C.牙内陷
- D.畸形中央尖
- E.蕾状磨牙

60、（A1 型题）下列哪种药物不可用于早期龋的化学疗法

- A.75%NaF、甘油糊剂
- B.8%氟化亚锡
- C.氯化锶
- D.10%硝酸银
- E.含氟凝胶

61、（A1 型题）边缘性龈炎的治疗为

- A.可用甲硝唑
- B.牙龈切除术
- C.根面平整
- D.刮治术
- E.洁治术

62、（A1 型题）急性多发性龈脓肿最佳治疗方案为

- A.口服抗菌药物
- B.彻底清除牙石
- C.2% H_2O_2 含漱一周
- D.局部治疗配合中西医结合疗法
- E.局部治疗配合口服抗菌药物

- 63、（A1 型题）关于妊娠期龈炎，哪一项不正确
- A. 妊娠前存在慢性龈炎
 - B. 炎症在妊娠第 6 个月达高峰
 - C. 分娩后 2 个月，炎症逐渐缓解
 - D. 妊娠瘤通常开始于妊娠第 3 个月
 - E. 在分娩后，妊娠瘤可自行缩小
- 64、（A1 型题）关于获得性膜的功能，不正确的描述为
- A. 修复或保护釉质表面
 - B. 提供有选择的渗透性
 - C. 不影响特异性口腔微生物对牙面的附着
 - D. 作为菌斑微生物的底物
 - E. 作为菌斑微生物的营养
- 65、（A1 型题）附着性龈下菌斑中的优势细菌为
- A. 革兰阳性需氧菌
 - B. 革兰阳性兼性菌
 - C. 革兰阳性兼性菌和厌氧菌
 - D. 革兰阴性能动菌
 - E. 革兰阴性厌氧菌
- 66、（A1 型题）牙周病预防重点集中在
- A. 牙石的控制
 - B. 消除菌斑
 - C. 控制致病菌
 - D. 控制唾液菌量
 - E. 控制菌斑
- 67、（A1 型题）下列是由局部刺激因素引起的牙周疾病。除了
- A. 单纯性龈炎
 - B. 成年人牙周炎
 - C. 多发性龈脓肿
 - D. 龈乳头炎
 - E. 肥大性龈炎
- 68、（A1 型题）牙周炎的主要病理变化之一是
- A. 牙松动
 - B. 菌斑形成
 - C. 牙龈增生
 - D. 牙龈出血
 - E. 牙槽骨吸收
- 69、（A1 型题）乳牙患龋的最好发牙位是
- A. 上颌乳磨牙

- B. 下颌乳磨牙
C. 上颌乳切牙
D. 上颌乳尖牙
E. 下颌乳前牙
- 70、（A1 型题）修复体的固位力与下列哪种因素无关
A. 制备牙轴面聚合度
B. 粘结剂的厚度
C. 接触面积
D. 牙的松动度
E. 修复体与制备牙的密合度
- 71、（A1 型题）乳牙龋药物治疗时，具有腐蚀性的药物是
A. 2% 氟化钠
B. 8% 氟化钠
C. 10% 酸性氟磷酸
D. 38% 氟化银
E. 8% 氟化亚锡溶液
- 72、（A1 型题）乳牙易患龋的因素不正确的是
A. 口腔自洁和清洁作用差
B. 儿童饮食多为软质饮食
C. 乳牙的釉质、牙本质薄，抗酸力强
D. 乳牙牙颈部明显缩窄
E. 邻牙之间面的接触
- 73、（A1 型题）下列哪一项不是乳牙龋蚀的特点
A. 患龋率高于恒牙
B. 龋齿多发
C. 龋蚀在短时间内转变为牙髓炎等
D. 自觉症状不明显
E. 修复性牙骨质形成活跃
- 74、（A1 型题）不属于年轻恒牙牙髓特点的有
A. 组织疏松
B. 血运丰富
C. 防御修复功能强
D. 渗出作用强
E. 增生现象显著
- 75、（A1 型题）临床上乳牙根管治疗术常用药物是
A. 氧化锌丁香油糊剂
B. 聚羧酸水门汀
C. 磷酸水门汀

- D.樟脑酚
- E.甲醛甲酚

76、(A1型题) 乳牙根尖周病的主要病因是

- A.乳牙外伤
- B.重度磨耗
- C.髓腔感染
- D.化学烧伤
- E.先天畸形

77、(A1型题) 患者, 7岁。右下6面龋, 备洞时意外穿髓, 针尖大小。治疗方法宜采用

- A.干髓术
- B.直接盖髓术
- C.间接盖髓术
- D.根管充填术
- E.活髓切断术

78、(A1型题) 可以全面描述正态分布资料特征的两个指标是

- A.均数和中位数
- B.均数和标准差
- C.均数和极差
- D.中位数和方差
- E.几何均数和标准差

79、(A1型题) 平均数是用于表示一组同质观察值的

- A.集中趋势
- B.分布情况
- C.离散趋势
- D.抽样误差
- E.个体间变化水平

80、(A1型题) 正态分布的数值变量资料,描述离散趋势的指标最好选用

- A.全距
- B.百分位数
- C.方差
- D.标准差
- E.变异系数

81、(A1型题) 不引起剥脱性龈病损的疾病是

- A.白斑
- B.天疱疮
- C.扁平苔藓
- D.类天疱疮
- E.红斑狼疮

- 82、（A1 型题）口腔白斑分型如下，除外
- A.均质型
 - B.溃疡型
 - C.疣状型
 - D.颗粒型
 - E.增殖型
- 83、（A1 型题）慢性唇炎发病的重要原因是
- A.饮食不当
 - B.心理障碍
 - C.因干燥而有舔唇不良习惯
 - D.高血压
 - E.以上都不是
- 84、（A1 型题）湿疹糜烂型唇炎的表现与单独发生在唇部黏膜的斑纹表现难以鉴别的是
- A.慢性盘状红斑狼疮
 - B.多形性红斑
 - C.念珠菌性唇炎
 - D.糜烂型扁平苔藓
 - E.药物过敏性口炎
- 85、（A1 型题）氯喹口服治疗适用于
- A.干燥脱屑型唇炎
 - B.湿疹糜烂型唇炎
 - C.多形性红斑
 - D.口腔白斑
 - E.类天疱疮
- 86、（A1 型题）慢性唇炎的临床表现为，除外
- A.唇肿胀
 - B.皲裂
 - C.脱屑
 - D.结痂
 - E.放射状斑纹
- 87、（A1 型题）《执业医师法》规定对考核不合格的医师，卫生行政部门可以责令其暂停执业活动，并接受培训和继续医学教育，暂停期限是 3 个月至
- A.5 个月
 - B.6 个月
 - C.7 个月
 - D.8 个月
 - E.9 个月

- 88、(A1 型题) 医师在执业活动中不属于应当履行的义务是
- A. 宣传普及卫生保健知识
 - B. 尊重患者隐私权
 - C. 人格尊严、人身安全不受侵犯
 - D. 努力钻研业务, 及时更新知识
 - E. 爱岗敬业, 努力工作
- 89、(A1 型题) 《医师考核管理办法》已经明确规定, 国家将对医师施行定期考核的内容是
- A. 业务水平, 工作成绩, 外语水平
 - B. 业务水平, 工作效益, 职业道德
 - C. 业务水平, 工作成绩, 职业道德
 - D. 业务水平, 工作成绩, 人际关系
 - E. 业务水平, 外语水平, 职业道德
- 90、(A1 型题) 患者, 女, 13 岁, 左上 1 冠折近 $1/2$, 叩 (-), 无松动, 无变色。X 线示已行完善根充, 根尖孔已闭合。最宜的治疗方案是
- A. 直接树脂恢复前牙外形及美观
 - B. 置金属桩后恢复前牙外形及美观
 - C. 置纤维桩后恢复前牙外形及美观
 - D. 置纤维桩后冠修复
 - E. 树脂充填后贴面修复
- 91、(A1 型题) 患者, 男, 22 岁, 昨日与人打斗造成右上 1 冠折, 残根位于龈下 2 mm, 余留牙正常。最佳修复设计为
- A. 残根根管治疗后, 将牙根牵引至合适位置后再行桩核冠修复
 - B. 残根拔除后, 固定桥修复
 - C. 残根根管治疗, 桩核冠修复
 - D. 残根根管治疗后, 行根上托牙修复
 - E. 残根拔除后行隐形义齿修复
- 92、(A1 型题) 患者, 男, 35 岁。右下 6 需行全冠修复, 牙髓活力正常。行牙体预备后, 需戴用暂时冠的最主要的理由是
- A. 美观
 - B. 功能
 - C. 护髓
 - D. 治疗程序的需要
 - E. 防止邻牙倾斜
- 93、(A1 型题) 某女, 35 岁, 一周前行烤瓷冠修复, 近日出现咬物疼痛, 无其他症状, 查: 左下 6 烤瓷冠修复, 牙不松, 邻接尚可, 冠边缘密合, 咬合纸测试有咬合高点, 冷热试验未引出疼痛, 叩痛 (+), 余未见异常, 最可能的诊断是
- A. 邻接过紧
 - B. 创伤
 - C. 牙髓炎

- D.继发龋
- E.牙周病

94、(A1型题)一患者右下456缺失,余留牙健康。可摘局部义齿的支点线可以设计成

- A.斜线式
- B.直线式
- C.横线式
- D.纵线式
- E.平面式

95、(A1型题)完全固定桥是指

- A.单端固定桥
- B.复合固定桥
- C.双端固定桥
- D.粘结固定桥
- E.固定-可摘联合桥

96、(A1型题)患者一天来右侧后牙自发性痛,夜间加重。查见右上第二前磨牙近中深龋。确定患牙诊断的检查方法是配套名师课程

- A.叩诊
- B.探诊
- C.温度测试
- D.电活力测验
- E.X线片检查

97、(A1型题)患者,男,62岁,左下前牙充填后2天,出现自发痛,温度刺激加重。查:左下尖牙颊侧颈区树脂充填物,冷测(+++),叩诊(±)。该牙2天前处理中的问题最可能是

- A.牙髓情况误判
- B.材料选择不当
- C.充填时未垫底
- D.腐质未去净
- E.备洞时热刺激

98、(A1型题)患者,女,20岁,自觉上前牙牙面有斑点,要求美齿修复。临床检查:全口牙列均可见不同程度白垩色斑块,呈云雾状,边界不明确。患者有高氟区生活史,其最可能的诊断为

- A.釉质发育不全
- B.氟牙症
- C.四环素牙
- D.浅龋
- E.遗传性乳光牙本质

99、(A1型题)患者,女,13岁,上前牙咬合痛、自发痛3天。口腔检查:左上侧切牙舌面窝处深龋,探诊(-),叩诊(++)。最可能的病因是

- A.畸形中央尖
- B.牙周炎
- C.畸形舌侧窝
- D.畸形舌侧尖
- E.牙隐裂

100、(A1型题)患者,男,63岁,左下第一磨牙磨耗重,现出现自发痛,拟行根管治疗,根管治疗的步骤为

- A.根管预备和充填
- B.根管预备、根管消毒和根管充填
- C.根管清理、根管消毒和根管充填
- D.机械预备、根管消毒和根管充填
- E.根管清理、根管预备和根管充填

101、(A1型题)女,23岁,上前牙2年前不慎折断,未及时处理,现上唇肿胀,检查发现左上1牙冠冠折3/4,叩痛(+++),根管口暴露,探诊(-),牙体变色,前庭沟变浅,并有波动,为缓解疼痛、消除急性炎症,对该病例应及时进行以下应急处理。除了

- A.根管开放引流
- B.消炎止痛
- C.拔牙引流
- D.切开排脓
- E.根管冲洗上药

102、(A1型题)某女,26岁,主诉妊娠后下前牙唇侧牙龈长一肿物3个月,并慢慢增大。该患者如果诊断为妊娠瘤,需要切除时,应注意以下因素,除外

- A.牙龈炎症
- B.妊娠的时间
- C.肿物是否影响进食
- D.口腔卫生情况
- E.妊娠期是否服药

103、(A1型题)女性患者,24岁,主诉:近1个月全口牙龈肿胀增生,牙龈质地松软脆弱,易出血。其最不可能的诊断是

- A.妊娠期龈炎
- B.牙龈纤维瘤病
- C.慢性龈炎
- D.白血病
- E.浆细胞性龈炎

104、(A1型题)患儿9岁,左上侧切牙牙齿变色就诊。检查:冠折牙本质暴露,牙齿变色。冷热测无反应,X线片示根尖喇叭口,骨硬板不连续,下列各项中哪项最重要

- A.拔髓,不要出根尖孔
- B.彻底去除根管内感染物质,消除炎症,保护牙乳头
- C.根管内不要封FC等刺激性大的药物

- D.用氢氧化钙糊剂充填，不要超填
- E.定期复查，更换糊剂

105、（A1 型题）患儿女性，6 岁，右下颌第二乳磨牙残冠，髓室底完整，近中根吸收约 1/3，X 线检查有继承恒牙，相邻第一恒磨牙未萌出，首选治疗方法为

- A.暂不处理
- B.根管治疗，保留牙齿
- C.拔除乳牙
- D.拔除乳牙并立即做间隙保持器
- E.拔除乳牙，待相邻第一恒磨牙萌出后做间隙保持器

106、（A1 型题）患儿，女，27 岁，右下颌第一乳磨牙远中邻面龋洞，曾做过玻璃离子充填治疗，近几日充填材料脱落，无继发龋，无疼痛症状，叩（-），探敏感，松（-）。暂不考虑的治疗是

- A.重新预备洞形
- B.重新用玻璃离子充填
- C.光固化树脂修复
- D.根管治疗
- E.预成冠修复

107、（A1 型题）男性患者，48 岁，口腔溃疡反复发作，此次右颊黏膜已溃疡 7 天，疼痛不适明显。检查见牙周及牙齿健康，右颊黏膜近磨牙后垫见一深在溃疡，深至肌层，直径 1 cm 左右，周围充血明显。拟诊断为

- A.轻型口疮
- B.单纯疱疹
- C.癌性溃疡
- D.腺周口疮
- E.疱疹样口疮

108、（A1 型题）患者，女，36 岁，主诉上唇中份疼痛 3 天，进食刺激性食物可加剧疼痛。口腔检查：相对右上第一中切牙唇侧黏膜见一直径为 2 mm 溃疡，上覆假膜，溃疡基底充血，触痛明显，基底柔软。主诉近似病史约 3 年，每年发作 8~10 次，溃疡 7~10 天可自行愈合。拟诊断为

- A.盘状红斑狼疮
- B.天疱疮
- C.轻型口疮
- D.重型口疮
- E.多形红斑

109、（A1 型题）男性患者，24 岁，双颊出现白色条纹病损半年。查：双颊及下唇内侧黏膜有条形白纹交织成网状。临床应诊断为

- A.球菌性口炎
- B.扁平苔藓
- C.癌性溃疡

- D.单纯疱疹
- E.白色念珠菌病

110、（A3/A4 型题）男性，30 岁，左下 6 金属全冠粘固 1 周后脱落，咬合时常有瞬间性疼痛。口腔检查见患者咬合紧，牙冠短，对颌牙面有银汞合金充填物，脱落的全冠完整。全冠脱落最不可能的原因是

- A.牙体预备聚合度过大
- B.修复体不密合
- C.力过大
- D.粘固面积过小
- E.修复体粘结面未清洁干净

111、（A3/A4 型题）男性，30 岁，左下 6 金属全冠粘固 1 周后脱落，咬合时常有瞬间性疼痛。口腔检查见患者咬合紧，牙冠短，对颌牙面有银汞合金充填物，脱落的全冠完整。铸造金属全冠的修复体设计，可不考虑的因素是

- A.全冠的边缘位置
- B.全冠的面形态
- C.粘固剂的种类
- D.患者的年龄
- E.患者的性别

112、（A3/A4 型题）患者，男，36 岁，3 个月前因外伤致上前牙脱落，今要求烤瓷修复。口腔检查：左上 1 缺失，间隙正常，牙槽嵴无明显吸收。右上 1 牙冠 1/2 缺损，已露髓，探稍敏感，叩诊阴性，无松动。左上 2 牙冠良好，叩诊阴性，无松动。GI：0~2，OHI-S：0~3。余牙未见异常。下列哪项不是修复前需进行的必要的检查和治疗工作

- A.前牙区根尖片
- B.右上 1 根管治疗
- C.左上 2 根管治疗
- D.牙周洁治
- E.取研究模型

113、（A3/A4 型题）患者，男，36 岁，3 个月前因外伤致上前牙脱落，今要求烤瓷修复。口腔检查：左上 1 缺失，间隙正常，牙槽嵴无明显吸收。右上 1 牙冠 1/2 缺损，已露髓，探稍敏感，叩诊阴性，无松动。左上 2 牙冠良好，叩诊阴性，无松动。GI：0~2，OHI-S：0~3。余牙未见异常。最适合的治疗方案是

- A.覆盖义齿
- B.全瓷固定桥
- C.桩核与双端固定桥
- D.根内固位体固定桥
- E.嵌体固位体固位桥

114、（A3/A4 型题）患者，男，36 岁，3 个月前因外伤致上前牙脱落，今要求烤瓷修复。口腔检查：左上 1 缺失，间隙正常，牙槽嵴无明显吸收。右上 1 牙冠 1/2 缺损，已露髓，探稍敏感，

叩诊阴性，无松动。左上 2 牙冠良好，叩诊阴性，无松动。GI：0~2，OHI-S：0~3。余牙未见异常。下列哪项对桩核中桩的描述是正确的

- A. 桩可增强根管封闭
- B. 桩末端距根尖孔 1 mm
- C. 桩末端距根尖孔 4 mm
- D. 桩直径一般为根横径的 1/2
- E. 桩的固位力主要取决于粘固力

115、（A3/A4 型题）患者，男，60 岁，76556 缺失，左下 7 近中舌侧倾斜，牙槽嵴丰满，上颌散在骨尖，颌间距离正常。修复前应做的工作是

- A. 拔除左下 7
- B. 做牙槽骨加高术
- C. 唇颊沟加深术
- D. 上颌牙槽骨修整术去除异常骨尖
- E. 上颌结节修整术

116、（A3/A4 型题）患者，男，60 岁，76556 缺失，左下 7 近中舌侧倾斜，牙槽嵴丰满，上颌散在骨尖，颌间距离正常。制作可摘局部义齿后，出现疼痛的原因最可能是

- A. 基托边缘过长
- B. 骨尖未缓冲
- C. 牙槽嵴有组织倒凹
- D. 牙槽嵴黏膜过薄
- E. 义齿使用不当

117、（A3/A4 型题）患者，男，60 岁，76556 缺失，左下 7 近中舌侧倾斜，牙槽嵴丰满，上颌散在骨尖，颌间距离正常。正确的处理方法是

- A. 磨短缓冲过长基托
- B. 磨除进入组织倒凹的基托
- C. 骨尖进行手术或缓冲
- D. 增加使用软衬材料，调磨对颌牙
- E. 指导患者正确使用活动义齿

118、（A3/A4 型题）患者，男，60 岁，76556 缺失，左下 7 近中舌侧倾斜，牙槽嵴丰满，上颌散在骨尖，颌间距离正常。如果患者在咀嚼食物过程中感觉义齿有翘动转动等现象，临床进一步的检查中不包括

- A. 卡环固位有无松动
- B. 卡环体与基牙有无早接触
- C. 卡环臂是否过低
- D. 卡环数量和分布是否恰当
- E. 基托面积是否合适

119、（A3/A4 型题）男，40 岁。半年来左上后牙遇冷热痛，但无自发痛，近 1 个月来，除冷过敏外隐隐作痛。近 1 周出现自发痛，阵发加剧，夜间痛。检查发现左上第二磨牙近中龋深穿髓，探痛明显，叩诊（±）。该牙的确切诊断是

- A.急性根尖周炎
- B.慢性根尖周炎急性发作
- C.急性牙髓炎
- D.慢性牙髓炎急性发作
- E.慢性牙髓炎

120、（A3/A4 型题）男，40 岁。半年来左上后牙遇冷热痛，但无自发痛，近 1 个月来，除冷热过敏外隐隐作痛。近 1 周出现自发痛，阵发加剧，夜间痛。检查发现左上第二磨牙近中龋深穿髓，探痛明显，叩诊（±）。最佳治疗方法是

- A.活髓切断
- B.直接盖髓
- C.干髓治疗
- D.牙髓摘除术
- E.拔除

121、（A3/A4 型题）男，40 岁。半年来左上后牙遇冷热痛，但无自发痛，近 1 个月来，除冷热过敏外隐隐作痛。近 1 周出现自发痛，阵发加剧，夜间痛。检查发现左上第二磨牙近中龋深穿髓，探痛明显，叩诊（±）。如果患者左侧上、下颌后牙均有患牙，患者不能对患牙定位。最能确定患牙位置的方法是

- A.探诊
- B.麻醉法
- C.叩诊
- D.咬诊
- E.扪诊

122、（A3/A4 型题）男，40 岁。半年来左上后牙遇冷热痛，但无自发痛，近 1 个月来，除冷热过敏外隐隐作痛。近 1 周出现自发痛，阵发加剧，夜间痛。检查发现左上第二磨牙近中龋深穿髓，探痛明显，叩诊（±）。当该患牙出现阵发剧痛一段时间后，未经治疗疼痛反而减轻，但出现咀嚼痛，其最可能的原因是

- A.对疼痛逐渐适应
- B.炎症分泌物自行引流
- C.牙髓逐渐坏死
- D.机体免疫力增强
- E.已出现根尖周炎

123、（A3/A4 型题）患者，女，30 岁，喜酸食，左下前牙胀痛，伸长感 3 天，来诊。检查：前牙开，左下中切牙牙体未见明显龋坏，牙体变色，切缘磨耗重，唇舌侧牙齿表面呈熔融状外观，叩（++），X 线片示根尖区暗影，龈正常，未探及牙周袋。最有可能的诊断是

- A.创伤
- B.牙髓坏死
- C.急性根尖周炎
- D.牙周脓肿
- E.磨耗

124、（A3/A4 型题）患者，女，30 岁，喜酸食，左下前牙胀痛，伸长感 3 天，来诊。检查：前牙开，左下中切牙牙体未见明显龋坏，牙体变色，切缘磨耗重，唇舌侧牙齿表面呈熔融状外观，叩（++），X 线片示根尖区暗影，龈正常，未探及牙周袋。可能的病因为

- A. 创伤
- B. 酸蚀
- C. 牙菌斑
- D. 夜磨牙
- E. 牙周逆行感染

125、（A3/A4 型题）患者，女，30 岁，喜酸食，左下前牙胀痛，伸长感 3 天，来诊。检查：前牙开，左下中切牙牙体未见明显龋坏，牙体变色，切缘磨耗重，唇舌侧牙齿表面呈熔融状外观，叩（++），X 线片示根尖区暗影，龈正常，未探及牙周袋。除常规治疗外，应给予患者的口腔卫生指导是

- A. 自我菌斑控制
- B. 治疗磨牙症
- C. 减少酸性食物摄入
- D. 定期做牙周治疗
- E. 配合药物治疗

126、（A3/A4 型题）患者，男，18 岁。右上后牙刷牙时冷水刺激疼痛，刺激去除后症状即缓解，检查见咬合面龋，探诊（±），冷水入洞敏感，叩诊（-），牙周检查（-）。最可能的诊断为

- A. 牙本质过敏症
- B. 可复性牙髓炎
- C. 深龋
- D. 急性牙髓炎
- E. 慢性溃疡性牙髓炎

127、（A3/A4 型题）患者，男，18 岁。右上后牙刷牙时冷水刺激疼痛，刺激去除后症状即缓解，检查见咬合面龋，探诊（±），冷水入洞敏感，叩诊（-），牙周检查（-）。最佳的治疗方法是

- A. 牙髓失活
- B. 间接盖髓
- C. 牙脱敏治疗
- D. 安抚治疗
- E. 开髓引流

128、（A3/A4 型题）某女，58 岁，高血压病史 10 年。临床检查：全口龈缘及龈乳头充血水肿，牙龈增生覆盖牙冠的 1/2 左右，PD：4~7 mm，上前牙出现移位。最有可能的诊断是

- A. 维生素 C 缺乏症
- B. 药物性牙龈增生
- C. 慢性龈炎
- D. 牙龈纤维瘤病
- E. 伴糖尿病牙周炎

129、（A3/A4 型题）某女，58 岁，高血压病史 10 年。临床检查：全口龈缘及龈乳头充血水肿，牙龈增生覆盖牙冠的 1/2 左右，PD：4~7 mm，上前牙出现移位。此患者可能是哪一种药物引起的牙龈增生

- A. 苯妥英钠
- B. 阿司匹林
- C. 环孢素
- D. 硝苯地平
- E. 硝酸异山梨酯

130、（A3/A4 型题）某女，58 岁，高血压病史 10 年。临床检查：全口龈缘及龈乳头充血水肿，牙龈增生覆盖牙冠的 1/2 左右，PD：4~7 mm，上前牙出现移位。该患者的治疗方案不包括

- A. 口腔卫生宣教
- B. 牙周洁治、刮治
- C. 应用钙通道阻滞剂降压
- D. 必要时可作牙周手术
- E. 定期复查

131、（A3/A4 型题）8 岁患者，跌倒致右上中切牙牙冠斜折，即刻来院就诊。口腔检查见穿髓孔大，叩（+）。首选治疗为

- A. 活髓切断术
- B. 根尖诱导成形术
- C. 干髓术
- D. 直接盖髓术
- E. 根管治疗术

132、（A3/A4 型题）8 岁患者，跌倒致右上中切牙牙冠斜折，即刻来院就诊。口腔检查见穿髓孔大，叩（+）。进行这种治疗成功的关键是

- A. 盖髓剂的选择
- B. 无菌操作
- C. 正确的开髓
- D. 去除稍多些的健康冠髓
- E. 正确选择暂封剂

133、（B1 型题）有中间基牙的多单位固定桥，近中末端无基牙，其称为

- A. 双端固定桥
- B. 种植体固定桥
- C. 粘结固定桥
- D. 复合固定桥
- E. 单端固定桥

134、（B1 型题）缺隙两端各有一基牙，且两侧均为不动连接体的固定桥称为

- A. 双端固定桥
- B. 种植体固定桥
- C. 粘结固定桥

- D.复合固定桥
- E.单端固定桥

135、（B1 型题）仅一端有固位体和基牙的桥体称为

- A.双端固定桥
- B.种植体固定桥
- C.粘结固定桥
- D.复合固定桥
- E.单端固定桥

136、（B1 型题）全口义齿基托需缓冲的区域是

- A.上颌前后颤动线之间
- B.上颌牙槽嵴
- C.远中颊角区
- D.下颌牙槽嵴
- E.下颌舌骨嵴

137、（B1 型题）全口义齿基托边缘不能过度伸展的区域是

- A.上颌前后颤动线之间
- B.上颌牙槽嵴
- C.远中颊角区
- D.下颌牙槽嵴
- E.下颌舌骨嵴

138、（B1 型题）全口义齿基托的边缘封闭区是

- A.上颌前后颤动线之间
- B.上颌牙槽嵴
- C.远中颊角区
- D.下颌牙槽嵴
- E.下颌舌骨嵴

139、（B1 型题）充填物过高，咬合时出现早接触可引起

- A.药物性根尖周炎
- B.牙周炎咬合痛
- C.残髓炎
- D.药物性牙周组织坏死
- E.继发牙髓炎

140、（B1 型题）备洞时未去尽龋坏组织，致使充填后龋损继续发展，可引起

- A.药物性根尖周炎
- B.牙周炎咬合痛
- C.残髓炎
- D.药物性牙周组织坏死
- E.继发牙髓炎

141、（B1 型题）以亚硝酸失活剂置于邻面洞时，由于封闭不严，药物渗漏可引起

- A. 药物性根尖周炎
- B. 牙周炎咬合痛
- C. 残髓炎
- D. 药物性牙周组织坏死
- E. 继发牙髓炎

142、（B1 型题）三叉神经痛

- A. 机械性刺激敏感
- B. 突发性电击样痛
- C. 定点性咀嚼剧痛
- D. 疼痛不定位，夜间加重
- E. 刺激入洞引起疼痛；对下述疾病可能出现的疼痛描述正确的是

143、（B1 型题）急性牙髓炎

- A. 机械性刺激敏感
- B. 突发性电击样痛
- C. 定点性咀嚼剧痛
- D. 疼痛不定位，夜间加重
- E. 刺激入洞引起疼痛；对下述疾病可能出现的疼痛描述正确的是

144、（B1 型题）深龋

- A. 机械性刺激敏感
- B. 突发性电击样痛
- C. 定点性咀嚼剧痛
- D. 疼痛不定位，夜间加重
- E. 刺激入洞引起疼痛；对下述疾病可能出现的疼痛描述正确的是

145、（B1 型题）龈上牙石易沉积于

- A. 上前牙唇面
- B. 双尖牙舌面
- C. 牙齿邻面
- D. 颊面和下前牙舌面
- E. 舌腭面和邻面

146、（B1 型题）龈下牙石易沉积于

- A. 上前牙唇面
- B. 双尖牙舌面
- C. 牙齿邻面
- D. 颊面和下前牙舌面
- E. 舌腭面和邻面

147、（B1 型题）刷牙最不容易做到控制的牙菌斑位于

- A.上前牙唇面
- B.双尖牙舌面
- C.牙齿邻面
- D.颊面和下前牙舌面
- E.舌腭面和邻面

148、（B1 型题）治疗抗生素口炎可选用的药物是

- A.链霉素或异烟肼
- B.氯本那敏和泼尼松
- C.阿昔洛韦及干扰素或转移因子
- D.酮康唑和口泰
- E.抗生素或磺胺类药物

149、（B1 型题）治疗药物过敏性口炎可选用的药物是

- A.链霉素或异烟肼
- B.氯本那敏和泼尼松
- C.阿昔洛韦及干扰素或转移因子
- D.酮康唑和口泰
- E.抗生素或磺胺类药物

150、（B1 型题）治疗复发性疱疹性口炎可选用的药物是

- A.链霉素或异烟肼
- B.氯本那敏和泼尼松
- C.阿昔洛韦及干扰素或转移因子
- D.酮康唑和口泰
- E.抗生素或磺胺类药物

答案

1、正确答案：B

答案解析：无

2、正确答案：A

答案解析：非解剖式牙不具备的特点是上下颌牙具有一定的尖凹锁结关系。人工牙分解剖式牙：牙尖斜度 33° 或 30° ，上下颌牙锁结关系好，功能强，侧向力大；半解剖式牙：牙尖斜度 20° ，上下颌牙有一定锁结关系；非解剖式牙，牙尖斜度为 0° ，面有溢出沟，咀嚼效能差，侧向力小。故本题答案是 A。

3、正确答案：D

答案解析：固定义齿的设计主要根据是安氏法则，通过计算基牙的牙周膜面积与缺失牙的牙周膜面积来确定固定义齿设计方案。

4、正确答案：E

答案解析：全口义齿是为牙列缺失患者制作的义齿，由基托和人工牙组成。靠义齿基托与黏膜紧密贴合，边缘封闭产生的吸附力和大气压力产生固位，吸附在上、下颌牙槽嵴上，以恢复患者的面部形态和功能。全口义齿修复的目的恢复咀嚼功能以及恢复面容、发音功能保护颌骨、牙槽嵴、颞下颌关节等剩余组织。

5、正确答案：C

答案解析：全口义齿的基托组织面和黏膜紧密贴合，其间有一薄层的唾液，基托组织面与唾液以及唾液与黏膜之间产生了附着力，唾液本身分子之间产生内聚力（粘着力），使全口义齿获得固位。吸附力的大小与基托和黏膜之间的接触面积和密合程度有关。接触面积越大、越密合，其吸附力也就越大。吸附力的大小和唾液的质和质量也有关系。

6、正确答案：D

答案解析：缓冲区主要是指无牙颌上的上颌隆突、颧突、上颌结节的颊侧、切牙乳突、下颌隆突、下颌舌骨嵴以及牙槽嵴上的骨尖、骨棱等部位。该部位上面覆盖很薄的黏膜，不能承受咀嚼压力。应将上述各部分的义齿基托组织的相应部位磨除少许，做缓冲处理，以免组织受压产生疼痛。

7、正确答案：B

答案解析：边缘封闭区是义齿边缘接触的软组织部分，如黏膜皱襞、系带附丽部、上颌后堤区和下颌磨牙后垫。

8、正确答案：A

答案解析：取印模时，在印模材可塑期内进行肌肉功能整塑，唇、颊和舌做各种动作即功能性印模，形成的义齿基托边缘与运动时黏膜皱襞和系带相吻合，达到良好的边缘封闭。

9、正确答案：C

答案解析：凹形磨光面有利于义齿固位，磨光面的倾斜度、义齿周围边缘的宽度和人工牙的颊舌位置正常时，舌和颊才有帮助义齿稳定和抵抗脱位力的作用。

10、正确答案：A

答案解析：无

11、正确答案：D

答案解析：垂直距离过大表现：上下唇张开、颊唇沟变浅、肌张力增加、易出现肌疲劳、说话、进食后牙相撞声。

12、正确答案：A

答案解析：由于垂直距离低，患者感到在进食用不上力，进食慢、出现颞下颌关节病症状等。

13、正确答案：E

答案解析：唾液的质和量会影响义齿的固位和稳定，但是属于人为不可改变的条件，所以无需检查。

14、正确答案：E

答案解析：无

15、正确答案：A

答案解析：下颌隆突位于下颌前磨牙区的舌侧，常是引起下义齿翘动的支点，另外外斜线处也易形成支点。

16、正确答案：D

答案解析：垂直距离过高患者戴义齿后，感到下颌牙槽嵴普遍疼痛或压痛，不能坚持较长时间戴义齿，面颊部肌肉酸痛，上腭部有烧灼感。检查口腔黏膜无异常表现，这种情况多由于垂直距离过高或夜磨牙所致。

17、正确答案：B

答案解析：适当的基托伸展与义齿的固位有关。

18、正确答案：A

答案解析：当口腔处于休息状态时，义齿固位尚好，但张口、说话、打呵欠时义齿易脱位。这是由于基托边缘过长、过厚，唇、颊、舌系带区基托边缘缓冲不够，影响系带活动；人工牙排列的位置不当，排列在牙槽嵴顶的唇颊或舌侧，影响周围肌肉的活动；义齿磨光面外形不好等原因造成的。应采用磨改过长的基托或过厚的边缘或缓冲系带部位的基托，形成基托磨光面应有的外形、适当磨去部分人工牙的颊舌面或减小人工牙的宽度等对症方法处理。当口腔处于休息状态时，义齿容易松动脱落。这是由于基托组织面与黏膜不密合或基托边缘伸展不够、边缘封闭作用不好造成的。采用重衬

19、正确答案：B

答案解析：牙槽嵴的吸收速度与缺失牙的原因、时间及骨质致密程度有关，牙槽嵴的吸收速率在牙缺失后头三个月最快，大约六个月后吸收速率显著下降，拔牙后两年吸收速度趋于稳定。

20、正确答案：C

答案解析：吸附力包括附着力和内聚力。吸附力的大小与基托和黏膜之间的接触面积和密合程度、唾液的质和量有关系。其中基托面与黏膜之间的紧密贴合依附于之间的唾液所产生的吸附力，所以唾液的质和量最密切。

21、正确答案：B

答案解析：无

22、正确答案：E

答案解析：缓冲区主要指上颌隆突、颧突、上颌结节的颊侧、切牙乳突、下颌隆突、下颌舌骨嵴以及牙槽嵴上的骨尖、骨棱等。

23、正确答案：E

答案解析：吸附力包括附着力和内聚力。其中基托面与黏膜之间的紧密贴合依附于之间的唾液所产生的吸附力。

24、正确答案：C

答案解析：全口义齿的平衡是指在正中及下颌作前伸、侧方运动等非正中运动时，上下颌相关的牙都能同时接触。

25、正确答案：C

答案解析：无

26、正确答案：B

答案解析：全口义齿基托磨光面的处理要求有一定的斜度和外形是为了增加义齿的固位和稳定。

27、正确答案：C

答案解析：无

28、正确答案：A

答案解析：根管充填后选择桩核冠修复的时间参考治疗情况和全身状况而定。一般完善的根管治疗后，观察1~2周，无临床症状后可以开始修复；原牙髓正常或牙髓炎未累及根尖者，观察时间可短，根管治疗3天后无症状，可开始修复；有瘘管的患牙需在治疗愈合后进行修复；有根尖周炎的患牙，一般需在根管治疗后观察1周以上，没有临床症状，进行修复；如果根尖病变较广泛者，需在治疗后较长时间观察，待根尖病变明显缩小形成骨硬板后才能修复。

29、正确答案：B

答案解析：间接固位体的作用主要是防止义齿翘起，摆动，旋转，下沉等，增加可摘局部义齿的稳定性。

30、正确答案：D

答案解析：前牙金属烤瓷冠唇侧作龈下边缘的主要优点是增进美观。

31、正确答案：E

答案解析：切牙乳突与上颌中切牙之间有较稳定的位置关系，通常上中切牙唇面位于切牙乳突中点前8~10mm，两侧上颌尖牙的牙尖顶的连线通过切牙乳突的中点。故本题答案是E。

32、正确答案：D

答案解析：人工牙需要减小颊舌径大小的情况有：缺牙多，黏膜承受力大；基牙条件差，支持力弱；牙槽嵴条件差，支持力差；这些情况都需要减径。

33、正确答案：A

答案解析：覆盖过小容易咬颊咬舌，所以要排列正常的覆盖关系。

34、正确答案：B

答案解析：铸造金属全冠颈部肩台的宽度通常为0.5~0.8mm。

35、正确答案：E

答案解析：口腔黏膜的质地和湿润度直接影响全口义齿的固位，黏膜厚度应适宜，有一定的弹性和韧性，唾液应有一定的分泌量和黏稠度。黏膜过于肥厚松软，移动度大，不利于固位，反之黏

膜过薄没有弹性，不利于基托与黏膜的贴合，唾液过稀过少会降低吸附力，而过多过稠也会影响固位。故本题答案是 E。

36、正确答案：D

答案解析：固定义齿修复时，一端基牙有 I 度松动可设计增加一端基牙数。

37、正确答案：C

答案解析：上前牙邻面接触点位于邻面切 1/3，龈径大于唇舌径。

38、正确答案：B

答案解析：牙齿拔除后由于骨质的吸收不均，常可形成骨尖或骨突。若经过一段时间后仍不消退，且有压痛，或有明显倒凹，妨碍义齿摘戴时，应进行牙槽骨修整，一般在拔牙后 1 个月左右修整较好。

39、正确答案：D

答案解析：X 线牙片可显示残留牙冠方向，根管内充填材料的情况对根管预备的长度、直径大小、牙根弯曲度、牙根粗细、牙根数目等垂直方向做了解，而对水平方向无法显示。

40、正确答案：B

答案解析：对于嵌入性脱位的年轻恒牙，不应强行拉出复位，以免造成更大的创伤，诱发牙根和边缘牙槽突的吸收。

41、正确答案：D

答案解析：牙隐裂时裂纹深达牙本质浅层，若选择备洞充填，易造成更大的裂纹。

42、正确答案：B

答案解析：发生楔状缺损的常见频率顺序是：双尖牙、尖牙、磨牙、侧切牙、中切牙。

43、正确答案：D

答案解析：牙本质过敏的患牙对机械刺激最为敏感。

44、正确答案：B

答案解析：牙隐裂好发于上颌磨牙，而上颌第一磨牙明显多于上颌第二磨牙。

45、正确答案：C

答案解析：牙髓充血，牙髓炎和牙髓坏死在 X 线上没有异常表现，因此 A、B、D 错误。牙内吸收表现为髓腔有局部扩大呈圆形、卵圆形密度减低影像，因此 E 错误。弥散性牙髓钙化在 X 线片上表现为髓腔内散在的粟粒状密度增高影，有时整个髓腔影响消失，代之以均匀致密影像，因此 C 正确，故选 C。

46、正确答案：A

答案解析：无

47、正确答案：E

答案解析：无

48、正确答案：D

答案解析：牙本质过敏症的发病机制中，流体动力学说被广为接受。

49、正确答案：A

答案解析：牙髓活力测验结果以正常、敏感、迟钝或迟缓性反应、无反应来表示，故此题选 A。

50、正确答案：E

答案解析：可复性牙髓炎即牙髓充血，表现为冷热酸甜刺激痛，温度测验一过性敏感，故选 E。

51、正确答案：B

答案解析：牙髓失活剂封药时间过长会导致砷制剂烧穿髓腔底部，导致颌骨化学性骨髓炎直至颌骨化学性坏死，所以 B 正确。

52、正确答案：B

答案解析：中等深度以上的窝洞距离牙髓较近，而银汞合金为温度良导体，所以为了隔绝充填材料的理化刺激，保护牙髓，银汞合金充填时需要垫底，所以 B 正确。

53、正确答案：E

答案解析：洞缘斜面是横断釉柱，釉柱的末端较轴向酸蚀对提高粘结力更有效，使粘结树脂可以更深入地渗入到柱间质中，同时增加了釉质的酸蚀面积，使树脂和釉质间的结合更牢固，所以 E 正确。

54、正确答案：B

答案解析：临床一般根据洞壁的颜色和硬度判断去腐的标准，但是有时候牙本质龋的透明层可以着色，临床上主要是根据硬度的情况决定去留，如果较正常组织软，一般应去除，如果较正常组织硬，并且表面有光泽，则可保留，所以 B 正确。

55、正确答案：A

答案解析：根管和根尖周的感染是以厌氧菌为主的混合感染。

56、正确答案：D

答案解析：牙本质吸收四环素的量远较釉质多，造成牙本质为主要的着色硬组织，所以釉质着色较牙本质深是错误的，其余选项都是四环素牙的临床表现，故此题选 D。

57、正确答案：D

答案解析：无

58、正确答案：B

答案解析：两个牙根发育完全以后发生粘连的牙称为结合牙。

59、正确答案：E

答案解析：先天性梅毒牙临床上变现为半月形切牙，桑葚状磨牙和蕾状磨牙。

60、正确答案：C

答案解析：氯化锶没有治疗龋坏的作用。

61、正确答案：E

答案解析：边缘性龈炎的治疗为去除病因，通过洁治术彻底清除菌斑牙石。

62、正确答案：D

答案解析：急性多发性龈脓肿最佳治疗方案为局部治疗配合中西医结合疗法。

63、正确答案：B

答案解析：妊娠时血液中的雌性激素特别是黄体酮水平增高，妊娠6个月以后可以到平时的10倍妊娠期龈炎的炎症表现在妊娠第8个月达高峰。

64、正确答案：C

答案解析：获得性膜会影响特异性口腔微生物在牙面的附着。

65、正确答案：C

答案解析：附着性龈下菌斑中的优势细菌为革兰阳性兼性菌和厌氧菌。

66、正确答案：E

答案解析：牙周病的始动因子是牙菌斑，因此预防重点集中在控制菌斑，故选E。

67、正确答案：C

答案解析：单纯性龈炎及成年人牙周炎是局部的菌斑导致的，因此A、B正确。龈乳头炎是伴有局部促进因素的菌斑性龈炎，如食物嵌塞、充填物悬突、不良修复体等，因此D错误。肥大性龈炎是牙龈组织受局部刺激时发生的慢性炎症，因此E错误。多发性龈脓肿的病因尚不清楚，故选C。

68、正确答案：E

答案解析：牙周袋和牙槽骨吸收是牙周炎的主要病理变化。

69、正确答案：B

答案解析：乳牙龋病好发于下颌乳磨牙，上颌乳切牙，其次是上颌乳磨牙、上颌乳尖牙。

70、正确答案：D

答案解析：无

71、正确答案：D

答案解析：常用乳牙龋病治疗药物，除38%氟化氨银和硝酸银外，其余均无腐蚀性。

72、正确答案：C

答案解析：乳牙易患龋的因素：①乳牙牙颈部明显缩窄，牙冠近颈部1/3处隆起，邻牙之间为面的解除，面的点隙裂沟以及牙列中的生理间隙等均易致食物嵌塞，成为不洁区；②乳牙釉质，牙

本质薄，抗酸性弱；③儿童饮食多为软质食物，黏稠性强，含糖量高，易发酵产酸；④口腔清洁和自洁作用差。

73、正确答案：E

答案解析：①患龋率高、发病早；②龋齿多发，龋蚀范围广；③龋蚀发展速度快；④自觉症状不明显。

74、正确答案：D

答案解析：年轻恒牙的牙髓特点：牙髓组织疏松，血运丰富，防御修复功能强，受刺激后出现增生现象较多。

75、正确答案：A

答案解析：乳牙根管治疗药物为氧化锌丁香油糊剂。

76、正确答案：C

答案解析：乳牙根尖周病的最主要病源是来自牙髓的感染；其次是外伤；以及牙髓治疗过程中药物或充填材料使用不当引起的根尖周组织严重损害。

77、正确答案：B

答案解析：无

78、正确答案：B

答案解析：本题考核全面描述正态分布资料特征的指标。正态分布资料特征的两个指标是均数和标准差。中位数一般用于偏态分布或分布类型未知的数据；几何均数一般用于指数资料，取对数后资料近似呈对称分布；极差是最大值和最小值的差值，极差稳定性差，提供的信息少，一般不直接用极差描述数据的离散程度；方差的算术平方根是标准差，标准差的单位与原变量的单位一致，直接表示资料特征。故正确答案为B。

79、正确答案：A

答案解析：本题考核平均数概念的理解。平均数即均数，用于反映一组同质观察值的平均水平，适用于正态或近似正态分布的定量资料，是集中趋势指标。故正确答案为A。

80、正确答案：D

答案解析：本题考核正态分布的数值变量资料离散趋势的指标。标准差、变异系数都是描述计量资料离散趋势或变异程度大小的指标。标准差应用于正态分布资料，描述离散趋势。变异指数主要应用与所比较各组资料单位不同，或均数相差较大的情况。故正确答案为D。

81、正确答案：A

答案解析：天疱疮、扁平苔藓、类天疱疮、红斑狼疮都有剥脱性龈病损，口腔白斑病是指口腔黏膜上的白色斑块或斑片，不能以临床和组织病理学的方法诊断为其他任何疾病者。

82、正确答案：E

答案解析：可根据临床表现不同，分为均质型和非均质型；非均质型又可分为疣状型、溃疡型和颗粒型。

83、正确答案：C

答案解析：多与各种慢性长期持续性刺激有关，如干燥、寒冷、舔唇、咬唇、撕皮等不良习惯及日晒、烟酒、化妆品刺激等。

84、正确答案：A

答案解析：无

85、正确答案：B

答案解析：氯喹口服治疗适用于湿疹糜烂型唇炎。

86、正确答案：E

答案解析：无

87、正确答案：B

答案解析：根据《中华人民共和国执业医师法》第三十一条，受县级以上人民政府卫生行政部门委托的机构或者组织应当按照医师执业标准，对医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况进行定期考核。对考核不合格的医师，县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动3个月至6个月，并接受培训和继续医学教育，暂停执业活动期满，再次进行考核，如考核合格的，允许其继续执业；对考核还不合格的，由县级以上人民政府卫生行政部门注销注册，收回医师执业证书。故正确答案为C。

88、正确答案：C

答案解析：《执业医师法》规定，医师在执业活动中应负有的义务：①遵守法律、法规及技术操作规范；②敬业精神、职业道德、履行职责、服务患者；③关心、爱护、尊重患者，保护患者隐私；④钻研业务、更新知识、提高水平；⑤宣传卫生知识，对患者进行健康教育。C选项属于执业医师享有的权利。故正确答案为C。

89、正确答案：C

答案解析：从2007年4月1日起开始执行的《医师考核管理办法》已经明确规定，国家将对医师的业务水平，工作成绩，职业道德施行定期考核（每2年），其中工作成绩，职业道德由所在医疗机构考核，业务水平施行全国统考。考核不合格者责令暂停执业3~6个月，培训后再考核；合格者继续职业，再次考核不合格者注销注册，收回证书。故正确答案为C。

90、正确答案：C

答案解析：置纤维桩后恢复前牙外形及美观，纤维桩弹性模量更接近牙体组织，由于患者未成年，不能做永久性的修复体，仅恢复牙体的外形及美观。

91、正确答案：A

答案解析：残根位于龈下2mm应该残根根管治疗后，将牙根牵引至合适位置后再行桩核冠修复。

92、正确答案：C

答案解析：因牙髓活力正常，所以需要用暂时冠护髓。

93、正确答案：B

答案解析：一周前行烤瓷冠修复，咬合纸测试有咬合高点，提示有咬合高点应该是和创伤引起的。

94、正确答案：E

答案解析：一患者右下 456 缺失，余留牙健康，设计为跨过中线的大支架，支点线可以设计成平面式。

95、正确答案：C

答案解析：双端固定桥又叫完全固定桥，其两端都有固位体，固位体和桥体之间的连接形式为固定连接。

96、正确答案：C

答案解析：牙髓炎患牙热测试时出现的反应为引起剧痛，故可以通过温度测试来确定患牙。

97、正确答案：A

答案解析：充填后两天出现此症状说明初诊时牙髓的情况判断有误。

98、正确答案：B

答案解析：全口牙列均可见不同程度白垩色斑块，呈云雾状，边界不明确。患者有高氟区生活史。以上可以判断为氟牙症。

99、正确答案：C

答案解析：畸形舌侧窝多发于上侧切牙。

100、正确答案：B

答案解析：根管治疗的步骤为：根管预备、根管消毒和根管充填。

101、正确答案：C

答案解析：患牙可进行如下应急处理根管开放引流，消炎止痛，切开排脓，根管冲洗上药，不应拔出。

102、正确答案：E

答案解析：本题考查的是妊娠瘤的手术指征。

103、正确答案：B

答案解析：此题考查的是各类牙龈炎的诊断与鉴别诊断。牙龈纤维瘤病一般开始于恒牙萌出之后，增生的牙龈只表现为增生，其余正常。

104、正确答案：B

答案解析：根管治疗应该彻底去除根管内感染物质，消除炎症，保护牙乳头。

105、正确答案：B

答案解析：根据临床表现，髓室底完整，近中根吸收约 1/3，X 线检查有继承恒牙，相邻第一恒磨牙未萌出，可行根管治疗术，保留患牙，待其自然脱落。

106、正确答案：D

答案解析：患牙无明显牙髓症状，可不考虑根管治疗。

107、正确答案：D

答案解析：腺周口疮初始好发于口角，其后于舌腭弓、软硬腭交界处，溃疡大而深，似“弹坑”，直径可大于1 cm，通常是1~2个溃疡，疼痛剧烈，可留瘢痕，常伴低热乏力等全身不适症状和腺周口疮病损局部区域的淋巴结肿痛。

108、正确答案：C

答案解析：RAU一般表现为反复发作的圆形或椭圆形溃疡，具有“黄、红、凹、痛”的临床特征，唇、舌、颊、软腭等无角化或角化较差的黏膜，圆形或椭圆形，直径

109、正确答案：B

答案解析：无

110、正确答案：E

答案解析：修复体松动的主要原因是固位力不足、力过大、有创伤或边缘不密合而造成粘结水门汀溶解所致。

111、正确答案：E

答案解析：患者的年龄与冠修复设计无关。

112、正确答案：C

答案解析：因左上2牙冠良好，叩诊阴性，无松动，暂时无症状，无需做根管治疗。

113、正确答案：C

答案解析：右上1牙冠1/2缺损，已露髓，探稍敏感，故需进行根管治疗后桩核恢复形态；左上1缺失，间隙正常，牙槽嵴无明显吸收。右上1与左上2均叩诊阴性，无松动，所以可以作为基牙进行双端固定桥。

114、正确答案：C

答案解析：桩的长度应保证根尖不少于4 mm的根尖封闭，桩的直径在1/4~1/3根径范围内对根来说是安全的，桩的固位力主要取决于摩擦力。

115、正确答案：D

答案解析：上颌散在骨尖，故在修复前应上颌牙槽骨修整术去除异常骨尖。

116、正确答案：B

答案解析：上颌散在骨尖，如未做处理，则骨尖未缓冲可引起疼痛。

117、正确答案：C

答案解析：修复前应做上颌牙槽骨修整术去除异常骨尖，或义齿缓冲以缓解疼痛。

118、正确答案：C

答案解析：卡环臂过低进入倒凹区会引起基牙的疼痛。

119、正确答案：D

答案解析：患者有半年的冷热痛史，但无自发痛，说明曾经有慢性牙髓炎，现在有刺激痛、自发痛，夜间痛，表现为牙髓炎急性症状，检查近中龋深穿髓，所以诊断为慢性牙髓炎急性发作，所以D选项正确。

120、正确答案：D

答案解析：慢性牙髓炎的牙髓炎症扩散，髓腔已有感染应用牙髓摘除术，去除感染源，所以D选项正确。

121、正确答案：B

答案解析：牙髓急性炎症，疼痛无法定位，温度测验结果可帮助定位患牙，但是没有此选项，而且是上、下颌后牙的鉴别，因上下颌的感觉神经不一样，可以用麻醉法鉴别，故本题选B。

122、正确答案：E

答案解析：牙髓炎没有控制，进一步发展会导致根尖周炎，而且咀嚼痛是根尖周炎的表现，所以E正确。未经治疗疼痛反而减轻是因为牙髓坏死，活力丧失，而不是对疼痛逐渐适应、机体免疫力增强或炎症分泌物自行引流，所以A、B、D错误。牙髓逐渐坏死没有解释咀嚼痛，所以C错误，故选E。自发痛，且冷测反应敏感，所以C选项错误。慢性牙髓炎无冷测反应一过性敏感，所以D选项错误。牙髓钙化一般无症状，所以E选项错误。

123、正确答案：C

答案解析：前牙开，左下中切牙牙体未见明显龋坏，牙体变色，切缘磨耗重，唇舌侧牙齿表面呈熔融状外观，叩（++），X线片示根尖区暗影，龈正常。根据检查可确定为急性根尖周炎。

124、正确答案：B

答案解析：因前牙开，可确定不是创伤导致。未提及牙菌斑和夜磨牙，提及喜酸蚀，唇侧牙面被酸蚀严重，切面酸蚀严重，故可能病因为酸蚀症。

125、正确答案：C

答案解析：针对诊断，应减少酸性食物摄入。

126、正确答案：C

答案解析：咬合面可见龋坏，排除A；冷水刺激痛且刺激去除后症状即消失，探诊（±），冷测敏感，无一过性疼痛，可排除B；无自发痛、夜间痛、疼痛无法定位的症状，可排除D；未见龋洞内有溃疡性增生，可排除E。深龋的症状为冷水刺激疼痛，刺激去除后症状即缓解，探诊（+），冷水入洞敏感，叩诊（-）。故本题答案为C。

127、正确答案：D

答案解析：深龋的治疗根据有无牙髓充血症状，软龋是否能去净采取不同的治疗方法，包括垫底填充、安抚治疗、间接盖髓术。安抚治疗适用于一些患深龋，无自发痛，但有明显的激发痛的患者，这类病人应先做安抚治疗，待症状消除后再做进一步处理。故本题答案为D。

128、正确答案：B

答案解析：高血压病史 10 年，结合其临床表现提示药物性牙龈增生。

129、正确答案：D

答案解析：高血压病史 10 年，可能服用硝苯地平。

130、正确答案：C

答案解析：钙通道阻滞剂会引起药物性牙龈增生。

131、正确答案：A

答案解析：年轻恒牙外伤后意外露髓，根据穿髓孔大小使用活髓切断术和直接盖髓术。此患者穿髓孔大，故应使用活髓切断术。

132、正确答案：B

答案解析：活髓切断术治疗成功的关键是无菌操作。

133、正确答案：D

答案解析：无

134、正确答案：A

答案解析：无

135、正确答案：E

答案解析：双端固定桥是其两端都有固位体，固位体和桥体之间的连接形式为固定连接。单端固定桥又称为悬臂固定桥，单端固定桥仅一端有固位体和基牙，桥体与固位体之间由固定连接体连接，另一端是完全游离的悬臂，无基牙支持。对于中间有基牙的多单位固定桥，近中末端无基牙，一侧用双端固定桥，另一侧用单端固定桥，所以使用的是复合固定桥。

136、正确答案：E

答案解析：无

137、正确答案：C

答案解析：无

138、正确答案：A

答案解析：下颌舌骨嵴是口内突出的解剖标志义齿容易压迫的部位，所以需要基托缓冲。上下颌牙槽嵴是义齿主要承托区；远中颊角区有翼下颌韧带，所以边缘不能过伸展以免在咀嚼时影响义齿的固位。上颌前后颤动线之间是全口义齿边缘封闭区，全口义齿的边缘需要到达这个区域。

139、正确答案：B

答案解析：无

140、正确答案：E

答案解析：无

141、正确答案：D

答案解析：牙周炎咬合痛一般由于充填物过高，咬合时出现早接触。继发牙髓炎可由于深洞未护髓，去腐未净等引起。残髓炎是根管治疗不彻底，残留部分感染牙髓引起的。药物性牙周组织坏死可由砷剂等失活剂渗漏到牙周组织引起。

142、正确答案：B

答案解析：无

143、正确答案：D

答案解析：无

144、正确答案：E

答案解析：三叉神经痛突发性电击样痛；急性牙髓炎疼痛不定位，夜间加重；深龋刺痛入洞引起疼痛。

145、正确答案：D

答案解析：无

146、正确答案：E

答案解析：无

147、正确答案：C

答案解析：无

148、正确答案：D

答案解析：无

149、正确答案：B

答案解析：无

150、正确答案：C

答案解析：无



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训领导品牌
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



北京金英杰医考课程

金英杰直播，让学习更容易

全国免费咨询热线：**400-900-9392** 客服及投诉电话：**400-606-1615**

地址：北京市海淀区学清路甲38号金码大厦B座22层