



直播学院

2021 中医执业 医师资格考试

# 核心考点精学

## 直播笔记

— 金英杰直播学员**专属** —

学霸笔记:

白芷

笔记内容:

中医妇科学I

主讲专家:

王颖直播学员

上课时间:

王颖直播学员 核心考点精学

上课时间:

2021年3月10日 19:00



- 学霸笔记
- 课后总结
- 考点梳理
- 查缺补漏



上课提醒

金英杰直播学院  
专属内部资料

金英杰直播

智慧学习“医”学就会

# 金英杰直播学院

中医专业

中医外科学 3

直播笔记

整理教辅:白芷

2021年3月10日

## 第十节 湿疹

### 考点一 湿疹的临床特点

湿疹是一种过敏性炎症性皮肤病。相当于西医的**湿疹**。其特点是：**对称分布，多形性损害，剧烈瘙痒**，反复发作，易成慢性。急性湿疹以丘疱疹为主，有**渗出**倾向；慢性湿疹以苔藓样变为**主**，易反复发作。

| JINYINGJIE.COM<br>金英杰直播学院 |  | 失真隆鼻，失身当死 |             |
|---------------------------|--|-----------|-------------|
| 湿热蕴肤                      | 发病快，病程短，皮损潮红，有丘疱疹，灼热瘙痒无休，抓破 <b>渗液流脂水</b> ；伴心烦口渴，身热不扬，大便干，小便短赤；舌红，苔薄白或黄，脉 <b>滑或数</b>    | 清热利湿止痒    | 龙胆泻肝汤合萹薢渗湿汤 |
| 脾虚湿蕴                      | 发病较缓，皮损潮红，有丘疹，瘙痒，抓后糜烂渗出，可见鳞屑；伴纳少，腹胀 <b>便溏</b> ，易疲乏；舌淡胖，苔白腻，脉濡缓                         | 健脾利湿止痒    | 除湿胃苓汤或参苓白术散 |
| 血虚风燥                      | 病程久，反复发作，皮损色暗或色素沉着，或皮损 <b>粗糙</b> 肥厚，剧痒难忍，遇热或肥皂水洗后瘙痒加重；伴有 <b>口干</b> 不欲饮，纳差，腹胀；舌淡，苔白，脉弦细 | 养血润肤，祛风止痒 | 当归饮子或四物消风饮  |

### 婴儿湿疹-助理不考

婴儿湿疹是发于1~2岁婴儿的过敏性皮肤病，又称奶癣、胎疮。相当于西医的**婴幼儿湿疹**。其特点是：**好发在头面**，重者可延及躯干和四肢。由于禀性不耐，脾胃运化失职，内有胎火湿热，外受风湿热邪；或因消化不良、食物过敏、衣服摩擦、肥皂水洗等刺激而诱发。

| 助理不考     |  |               |       |
|----------|--|---------------|-------|
| 胎火<br>湿热 | 皮肤潮红，红斑水疱，抓痒，大便干，小便黄赤，苔黄腻，脉滑数                  | 凉血清火，<br>利湿止痒 | 消风导赤汤 |
| 脾虚<br>湿蕴 | 初起皮肤暗淡，继而出现水疱瘙痒，患儿多有消化不良，大便稀溏或完谷不化；舌淡，苔白或白腻，脉缓 | 健脾利湿          | 小儿化湿汤 |

### 第十一节 接触性皮炎

#### 考点一 接触性皮炎的诊断要点

1. 发病前有明显的接触史，均有一定的潜伏期。
2. 一般急性发病，常见于暴露部位（接触过的部位），如面、颈、四肢。
3. 皮损的形态、范围、严重程度取决于接触物质种类、性质、浓度、接触时间的久暂、接触部位和面积大小及机体对刺激物的反应程度。皮损边界清楚，多局限于接触部位，形态与接触物大抵一致。皮疹一般为红斑、肿胀、丘疹、水疱或大疱、糜烂、渗出等，一个时期内以某一种皮损为主。

| 接触性皮炎    |   |               |                 |
|----------|---|---------------|-----------------|
| 风热<br>蕴肤 | 证候：起病急，好发于头面部，皮损色红，自觉瘙痒，灼热，心烦，口干，小便微黄，苔薄黄，脉浮数 | 疏风清热<br>止痒    | 消风散             |
| 湿热<br>毒蕴 | 证候：皮损面积广，色鲜红肿胀，上有水疱，灼热瘙痒，舌红苔黄，脉滑数             | 清热祛湿，<br>凉血解毒 | 龙胆泻肝汤合<br>化斑解毒汤 |
| 血虚<br>风燥 | 证候：病程长，皮损肥厚干燥有鳞屑，或呈苔藓样变，瘙痒剧烈，有抓痕及结痂，舌淡红苔薄，脉细  | 养血润燥，<br>祛风止痒 | 当归饮子合<br>消风散    |

## 第十二节 药毒

### 考点一 药毒的病因病机

病由禀赋不耐，邪毒侵犯所致。或禀血热之体，受药毒侵扰，火毒炽盛，燔灼营血，外发皮肤，内攻脏腑；或禀湿热之体，受药毒侵扰，体内湿热蕴蒸，郁于肌肤；病久药毒灼伤津液，气阴两伤，肌肤失养。阴液耗竭，阳无所附，浮越于外，病重而危殆。

发病前常有**用药史**，**潜伏期**，**突然发病**。

| 立即 <b>停用一切可疑致过敏的药物</b> |   |           |         |
|------------------------|---|-----------|---------|
| 湿毒蕴肤                   | 皮疹为红斑、丘疹或风团、水疱，伴口干，大便燥结，小便黄赤，或有发热，舌红，苔薄白或黄，脉滑或数 | 清热利湿，解毒止痒 | 萆薢渗湿汤   |
| 热毒入营                   | 皮疹鲜红或紫红，灼热痒痛，伴高热，神志不清，舌红绛，镜面舌，脉洪数               | 清热凉血，解毒护阴 | 清营汤     |
| 气阴两虚                   | 药疹后期大片脱屑，伴低热，神疲乏力，口干欲饮，舌红少苔，脉细数                 | 益气养阴清热    | 增液汤合益胃汤 |

## 第十三节 瘾疹

### 考点一 瘾疹的病因病机

瘾疹是一种以皮肤出现红色或苍白色**风团**，**时隐时现**的瘙痒性、过敏性皮肤病。**相当于西医的荨麻疹**。本病因先天禀赋不足，卫外不固，风邪乘虚侵袭所致；或表虚不固，风寒、风热外袭；或饮食不节，肠胃积热，复感风邪。

|      |   |           |         |
|------|---|-----------|---------|
| 风寒束表 | 风团色白，遇寒加重，伴恶寒怕冷，舌淡红，苔薄白，脉浮紧                     | 疏风散寒止痒    | 麻黄桂枝各半汤 |
| 风热犯表 | 风团鲜红，灼热剧痒，遇热加重，得冷则减，伴有发热，恶寒，咽喉肿痛，舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数 | 疏风清热止痒    | 消风散     |
| 胃肠湿热 | 风团片大，瘙痒剧烈，伴脘腹疼痛，恶心呕吐，神疲纳呆，大便秘结或泄泻，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数  | 疏风解表，通腑泄热 | 防风通圣散   |
| 血虚风燥 | 反复发作，午后或夜间加剧，心烦易怒，口干，手足心热，舌红少津，脉沉细              | 养血祛风，润燥止痒 | 当归饮子    |

208

## 第十四节 牛皮癣

### 考点一 牛皮癣的皮损特点

牛皮癣是一种皮肤状如牛项之皮，厚而且坚的慢性瘙痒性皮肤病。相当于西医的神经性皮炎，特点是：皮损多呈圆形或多角形的扁平丘疹融合成片，剧烈瘙痒，搔抓后皮损肥厚，皮沟加深，皮峭隆起，极易形成苔藓化。

| 牛皮癣  |                                 |           |       |
|------|---------------------------------|-----------|-------|
| 肝郁化火 | 皮疹色红，伴心烦易怒，口苦咽干，舌边尖红，脉弦数        | 疏肝理气，清肝泻火 | 龙胆泻肝汤 |
| 风湿蕴肤 | 皮损呈淡褐色片状，粗糙剧痒，舌淡红，苔白腻，脉濡缓       | 祛风利湿，清热止痒 | 消风散   |
| 血虚风燥 | 皮损色淡或灰白，肥厚粗糙，心悸怔忡，失眠健忘，舌淡苔薄，脉沉细 | 养血润燥，息风止痒 | 当归饮子  |

## 第十五节 白庖

### 考点一 白庖(寻常型)的皮损特点

相当于西医的银屑病。其特点是：在红斑上有松散的银白色鳞屑，抓之有薄膜

及筛状出血点。

| 白花   |   |          |       |
|------|---|----------|-------|
| 血热内蕴 | 皮疹呈点滴状，颜色鲜红，瘙痒剧烈，伴口干舌燥，咽喉疼痛，舌红苔薄黄，脉弦滑或数 | 清热凉血解毒消斑 | 犀角地黄汤 |
| 血虚风燥 | 皮疹呈斑片状，颜色淡红，鳞屑较少，干燥皲裂，自觉瘙痒，舌红，苔少，脉沉细    | 养血滋阴润肤息风 | 当归饮子  |
| 气血瘀滞 | 皮疹斑片状，鳞屑较厚，颜色暗红，舌紫暗有瘀点，脉涩               | 活血化瘀解毒通络 | 桃红四物汤 |
| 湿毒蕴阻 | 红斑糜烂，痂屑黏厚，瘙痒剧烈，舌红苔黄腻，脉滑                 | 清利湿热解毒通络 | 萆薢渗湿汤 |
| 火毒炽盛 | 全身皮肤潮红，肿胀，灼热痒痛，伴壮热，口渴，大便干燥，舌红绛，苔黄腻，脉弦滑数 | 清热泻火凉血解毒 | 清瘟败毒饮 |

## 第十六节 淋病

### 考点一 淋病的病因病机

因宿娼恋色或误用污染之器具；肾虚阴亏，瘀结于内。本病的病原体为淋球菌，系革兰阴性球菌。

有不洁性交或间接接触传染史

尿道口溢脓

| 淋病             |  |          |       |
|----------------|--|----------|-------|
| 湿热毒蕴<br>(急性淋病) | 尿道口红肿，尿液混浊，尿道口溢脓，尿频、尿急、尿痛，淋漓不止。可伴有发热等全身症状；舌红，苔黄腻，脉滑数 | 清热利湿解毒化浊 | 龙胆泻肝汤 |
| 阴虚毒恋<br>(慢性淋病) | 小便不畅，短涩，淋漓不尽，腰酸腿软，五心烦热，舌红苔少，脉细数                      | 滋阴降火利湿祛浊 | 知柏地黄丸 |

考点四 淋病的其他治疗方法

1. **青霉素类 (首选)** 普鲁卡因青霉素; 氨苄西林并加服丙磺舒。
2. 喹诺酮类诺氟沙星; 氧氟沙星。
3. 其他壮观霉素(淋必治); 或头孢三嗪(菌必治)。

第十七节 梅毒 (助理不考)

考点一 梅毒的病因病机

中医认为**淫秽疫毒**可与**湿热、风邪杂合**致病。传播方式主要是精化传染(直接传染), 间有气化传染(间接传染)和胎中染毒。

本病的病原体为梅毒螺旋体, 亦称苍白螺旋体。

**一期梅毒**疳疮(硬下疳)-外生殖器红斑、溃疡-**2-4周** **乙肝而死**

**二期梅毒**杨梅疮-皮肤黏膜损害-**7-10周** **二妹其实**

**三期梅毒/晚期梅毒-杨梅结毒-结节** **三姐姐**

梅毒的**治疗**: **青霉素**类药物疗效确切-**首选**

**尖锐湿疣**: **秽浊之毒, 酿生湿热**

| 金英杰医学 JINYINGJIE.COM |  | 梅毒            |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 肝经<br>湿热             | 多见于 <b>一期梅毒</b> 。外生殖器 <b>疳疮</b> 质硬而润, 伴口苦口干, 尿赤, 便结, 舌苔 <b>黄腻</b> , 脉 <b>弦滑</b>            | 清热利湿,<br>解毒驱梅 | 龙胆泻肝汤         |
| 血热<br>蕴毒             | 见于 <b>二期梅毒</b> 。周身起 <b>杨梅疮</b> , 色如 <b>玫瑰</b> , 不痛不痒, <b>口舌生疮</b> , 大便秘结, 舌红绛, 苔薄黄, 脉细滑或细数 | 凉血解毒,<br>泻热散瘀 | 清营汤合桃<br>红四物汤 |
| 毒结<br>筋骨             | 见于 <b>杨梅结毒</b> 。四肢、头面、鼻咽部出现 <b>树胶肿</b> , 伴关节、骨骼作痛, 行走不便, 舌质暗, 苔薄白或灰或黄, 脉沉细涩                | 活血解毒,<br>通络止痛 | 五虎汤加减         |
| 肝肾<br>亏损             | 见于 <b>三期梅毒</b> 脊髓痨者。逐渐两足瘫痪或痿弱不行, 肌肤麻木, <b>腰膝酸软</b> 。虫行作痒, 筋骨窜痛, 小便困难, 舌质淡, 苔薄白, 脉沉细弱       | 滋补肝肾,<br>填髓息风 | 地黄饮子          |
| 心肾<br>亏虚             | 见于 <b>心血管梅毒</b> 患者。 <b>心慌</b> 气短, 神疲乏力, 下肢浮肿, <b>腰膝酸软</b> , 动则气喘。舌质淡有齿痕, 苔薄白而润, 脉沉弱或结代     | 养心补肾,<br>祛瘀通阳 | 苓桂术甘汤         |

## 第八节 尖锐湿疣

梅毒-淫秽疫毒与湿热、风邪杂合

### 考点一 尖锐湿疣的病因病机

尖锐湿疣又称生殖器疣、性病疣，是由人类乳头瘤病毒所引起的一种**良性**赘生物。本病主要为**性滥交或房室不洁，感受秽浊之毒，酿生湿热**，湿热下注皮肤黏膜而产生**赘生物**。

多发于**男女外生殖器和肛门**

潜伏期**1-12月**。醋酸白试验

| 中医辨证论治-尖锐湿疣 |  |               |           |
|-------------|--|---------------|-----------|
| 湿毒下注        | 外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，表面 <b>秽浊潮湿</b> ，伴小便黄，苔 <b>黄腻</b> ，脉滑或弦数                           | 利湿化浊，<br>清热解毒 | 萆薢化<br>毒汤 |
| 湿热毒蕴        | 外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，表面有大量秽浊分泌物，色淡黄， <b>恶臭</b> ， <b>瘙痒</b> ，伴小便色黄，口渴欲饮，大便干燥，舌红，苔黄腻，脉滑数 | 清热解毒，<br>化浊利湿 | 黄连解<br>毒汤 |

西医---内服---阿昔洛韦; 外治法: 激光、冷冻

## 第九章---肛门直肠疾病

**肛柱**——直肠下端与口径较小的肛管相接，直肠粘膜8~10个隆起的纵行皱襞。

**肛瓣**——肛柱基底之间半月形皱襞。

**肛窦**——肛瓣与肛柱围成的小**隐窝**。

**肛乳头**——肛管与肛柱连接部三角形乳头状隆起。

**齿状线**——肛瓣边缘和肛柱下端形成的锯齿状环形线。

### 第一节 痔

#### 考点一 痔的概念与分类

直肠末端黏膜下和肛管皮下的静脉丛发生扩大曲张所形成的柔软静脉团。分内痔、外痔和混合痔。

1. 内痔，齿状线以上。截石位的 3、7、11 点。便血，痔核脱出，肛门不适感
2. 外痔，齿状线以下。坠胀、疼痛、异物感。可分为静脉曲张性外痔、血栓性外痔和结缔组织性外痔等。


### 3. 混合痔

血栓性外痔: 3、9 点

内痔: 3、7、11 点

混合痔: 3、7、11(最多)

肛裂: 6、12 点



### 1. 内痔临床通常按脱出情况将其分为 4 期。

**I 期:** 仅以排便时出血、涌血或喷血，无疼痛及脱出。肛门镜可见齿状线上有肠黏膜下的红色突起、质软，有时表面有糜烂。

**II 期:** 排便时有间歇性出血，用力时有痔块脱出，但能自行回纳。有感染则疼痛、下坠。

**III 期:** 排便、用力、咳嗽、步行过久等痔块便脱出，不能自行回纳，须用手托回。

**IV 期:** 痔块长期脱垂在肛门外，不能回纳。

## 内痔证治汇总

| 证型   | 秒杀词           | 治法        | 处方    | 趣味 |
|------|---------------|-----------|-------|----|
| 气滞血瘀 | 嵌顿、血栓、剧痛、脉弦细涩 | 清热利湿，祛风活血 | 止痛如神汤 | 只  |
| 风伤肠络 | 喷射状出血         | 清热凉血祛风    | 凉血地黄汤 | 凉  |
| 脾虚气陷 | 肛门坠胀便溏        | 补气，升提     | 补中益气汤 | 不  |
| 湿热下注 | 苔黄腻           | 清热渗湿止血    | 脏连丸   | 脏  |

## 血栓性外痔的治疗

## 血热瘀结证

证候: 肛缘肿物突起，其色暗紫，疼痛剧烈难忍，肛门坠胀。伴口渴便秘，舌紫，苔薄黄，脉弦涩。

治法: 清热凉血，散瘀消肿。

方药: 凉血地黄汤合活血散瘀汤

## (2) 外治

**熏洗法:** 适用于各期内痔及内痔脱出或外痔肿胀明显或脱肛的患者。常用花椒盐水，或**苦参汤**、**五倍子汤**、**祛毒汤**煎水，或 1 : 5 000 的高锰酸钾溶液

**塞药法:** 适用于 I、II 期内痔。常用**痔疮锭**、**九华栓**等塞入肛门内，以清热消肿、止血止痛

**枯痔法:** 适用于 II、III 期内痔。常用**枯痔散**、**灰皂散**等外敷于痔核的表面，用来腐蚀痔核，促使痔核干枯、坏死、脱落

**注射疗法:** 适应证各期的**内痔**，混合痔的**内痔**部分

**枯痔钉疗法:** 适用于各期**内痔**，混合痔的**内痔**部分

冷冻疗法——适用于各期内痔，混合痔的内痔部分

激光治疗——适用于各期内痔、混合痔及外痔。

胶圈套扎疗法——适应证适用于Ⅱ、Ⅲ期内痔以及混合痔的内痔部分

结扎术——适应证适用于Ⅱ～Ⅲ期的内痔，特别是纤维型内痔

痔切除术——适用于**结缔组织性**外痔和**静脉曲张性**外痔

血栓性外痔（3、9）**剥离术**——适用于**血栓性**外痔，痔核较大，血栓不易吸收，炎症局限者

**外痔剥离内痔结扎术**——适用于治疗混合痔

外切内注结扎术——适用于混合痔

吻合器痔上黏膜环切术——适用于Ⅱ～Ⅲ期内痔、环状痔和部分Ⅳ期内痔

## 第二节 息肉痔

### 考点一 息肉痔的概念

息肉痔指的是生长在直肠内黏膜上的赘生物，是一种常见的**直肠良性肿瘤**。

其**临床特点**为：肿物蒂小质嫩，其**色鲜红**，便**后出血**。分为**单发性**和**多发性**两种，**单发性**多见于**儿童**，**多发性**多见于**青壮年**。

#### (1) 风伤肠络

证候：便血鲜红，或滴血，或便时带血，息肉表面充血明显，脱出或不脱出肛外；舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：清热凉血，祛风止血。

方药：槐角丸加减。

#### (2) 气滞血瘀

证候：肿物脱出肛外，不能回纳，疼痛甚，息肉表面紫暗，舌紫，脉涩。

治法: 活血化瘀, 软坚散结。

方药: 少腹逐瘀汤加减。

### (3)脾气亏虚证

证候: 肿物易于脱出肛外, 表面增生粗糙, 或有少量出血, 肛门松弛, 舌质淡, 苔薄, 脉弱。

治法: 补益脾胃。

方药: 参苓白术散加减

### 考点三 注射疗法、结扎法、电烙法的适应证

1. 结扎法、套扎法适用于低位带蒂息肉。
2. 内镜下切除术适用于较高位的息肉。

## 第三节 肛隐窝炎(助理不考)

### 考点一 肛隐窝炎的并发症

肛隐窝炎常并发肛乳头炎和肛乳头肥大, 可成为肛周脓肿和肛瘘的发病根源。急性期常伴便秘, 粪便常带少许黏液, 有时混有血丝。若并发肛乳头肥大, 并从肛门脱出, 可使肛门潮湿、瘙痒

**切开引流术**——单纯肛隐窝炎或已瘕;或有隐性瘘管

**切除术**——肛隐窝炎伴肛乳头肥大者

## 第四节 肛痛

### 考点一 肛痛的定义及病因病机

肛痛指的是肛管直肠周围间隙发生急、慢性感染而形成的脓肿。相当于西医学的肛门直肠周围脓肿。

发病急骤,疼痛剧烈, 伴高热, 破溃后多形成肛漏。多因过食肥甘、辛辣、

刺激性、醇酒等物,致湿热内生,下注大肠,蕴阻肛门;或肛门破损染毒,致经络阻塞,气血凝滞而成。也有因肺、脾、肾亏损,湿热乘虚下注而成。

| 肛肠   |  |           |             |
|------|--|-----------|-------------|
| 热毒蕴结 | 肛门周围突然肿痛,持续加剧,肛周 <b>红肿</b> ,触痛明显,皮肤 <b>焮热</b> 。舌红,苔薄黄,脉数 | 清热解毒      | 仙方活命饮、黄连解毒汤 |
| 火毒炽盛 | 肛周肿痛剧烈,痛如鸡啄,肛周红肿,按之有 <b>波动感</b> ,舌红苔黄,脉弦滑                | 清热解毒透脓    | 透脓散加减       |
| 阴虚毒恋 | 证肛周肿痛,皮色暗红,溃后脓出细胞,伴午后潮热,心烦口干,盗汗。 <b>舌红,苔少,脉细数</b>        | 养阴清热、祛湿解毒 | 青蒿鳖甲汤合三妙丸   |

|      |               |           |
|------|---------------|-----------|
| 一次切开 | 浅部脓肿(肛门旁皮下脓肿) |           |
| 切开挂线 | 高位脓肿          | 坐骨直肠间隙脓肿  |
|      |               | 骨盆直肠间隙脓肿  |
|      |               | 肛门直肠后间隙脓肿 |
|      |               | 马蹄形脓肿     |

挂线疗法——距离肛门 4cm 以内 有内外口低位肛漏

手术中的**注意事项**

- (1) 定位准确:脓肿切开引流前先穿刺,抽出脓液后再行切开引流。
- (2) 切口: **浅部脓肿放射状切口**, **深部脓肿弧形切口**,免伤括约肌。
- (3) 引流应彻底: 切开脓肿后要用手指去探查脓腔,分开脓腔内的纤维间隔以利引流。
- (4) 预防肛漏的形成: 术中如能找到原发性感染的肛隐窝,应尽可能切开或切除,以防止肛漏形成。
- (5) 术中如无法找到**内口**,不应强行一次根治术,可仅做切开引流。

## 第五节 肛漏

肛漏是指直肠、肛管与周围皮肤相通所形成的**瘻管**。多由肛门痈溃后脓水淋漓、久不收口所致。西医称之为**肛瘻**。本病发病率高，在肛门直肠疾病中仅次于痔，居第2位，肛漏多由**原发内口、瘻管和继发性外口**三部分组成，也有仅有内口或外口者。内口为原发性，绝大多数在肛管齿状线处的肛窦内。其**临床特点**为**肛周反复流脓水、疼痛、瘙痒**，并可从**流脓外口触及或探及管道通向肛内**。

### 手术治疗为主

**分类标准**，以外括约肌深部画线为标志，漏管经过此线以上者为高位，在此线以下者为低位

**挂线疗法**——适应证适用于距离**肛门4cm**以内，有**内外口**的低位肛漏

**切开疗法**——适应证低位单纯性(一个外口)肛漏和低位复杂性(>三个外口)

肛漏。

手术成败的关键在于**正确地找到内口**，并将内口切开或切除

**一次切开挂线法**——**高位脓肿**

## 第六节 肛裂

考点一 肛裂的定义与病因病机

肛管的**皮肤全层纵行裂开**并形成**感染性溃疡**者称肛裂。中医将本病称为“钩肠痔”“裂痔”等。本病因阴虚津乏或热结肠燥而致大便秘结，排便努责而使肛门皮肤裂伤，然后染毒而逐渐形成慢性溃疡。

部位: **前后正中位(截石位6、12点)**

主要症状: **周期性疼痛、出血、便秘**

**血栓性外痔: 3、9点**

内痔: 3、7、11 点

混合痔: 3、7、11 (最多)

肛裂: 6、12 点

|          |  |              |                 |
|----------|--|--------------|-----------------|
| 血热<br>肠燥 | 大便两三日1行，质较干硬，便时<br>肛门疼痛、滴血，裂口色红。腹部<br>胀满，溲黄。舌偏红，脉弦数  | 清热润肠<br>通便   | 凉血地黄汤合<br>脾约麻仁丸 |
| 阴虚<br>津亏 | 大便干结，数日1行，便时疼痛滴<br>血，裂口深红，口干咽燥，五心烦<br>热。舌红，苔少或无苔，脉细数 | 养阴清热<br>润肠   | 润肠汤             |
| 气滞<br>血瘀 | 肛门刺痛明显，肛门紧缩，裂口色<br>紫暗，舌紫黯，脉弦或涩                       | 理气活血<br>润肠通便 | 六磨汤             |

考点四 肛裂手术治疗的的不同方法及其适应证

1. 扩肛法适用于**早期的肛裂(仅溃疡)**，无结缔组织外痔、肛乳头肥大等合并症者。
2. 切开疗法适用于**陈旧性肛裂(裂口、内痔、内瘻、肛窦炎、乳头肥大)**，伴有结缔组织外痔、肛乳头肥大等。
3. 肛裂侧切术适用于不伴有结缔组织外痔、皮下瘻等的陈旧性肛裂。
4. **纵切横缝法**适用于陈旧性肛裂伴有肛管狭窄者。

## 第七节 脱肛

脱肛是直肠黏膜、肛管、直肠全层和部分乙状结肠向下移位，脱出肛门外的一种疾病。**相当于西医的直肠脱垂**。本病多因中气不足，气虚下陷，固摄失司，以致肛管直肠向外脱出。

- (1) 一度脱垂为直肠黏膜脱出，长**3~5 cm**，不易出血，便后可自行回纳。
- (2) 二度脱垂为直肠全层脱出，**圆锥状**，脱出物长**5~10cm**，触之较厚，有弹性，便后有时需用手回复。

(3) 三度脱垂为直肠及部分乙状结肠脱出，圆柱状，长达 10cm 以上，触之很厚，肛门松弛无力。

| 内治法  | 脱肛   |           |       |
|------|--|-----------|-------|
| 脾虚气陷 | 便时肛内肿物脱出，伴有肛门坠胀，神疲乏力，食欲不振，甚至头昏耳鸣，腰膝酸软。舌淡，苔薄白，脉细弱 | 补气升提，收敛固涩 | 补中益气汤 |
| 湿热下注 | 肛内肿物脱出，色紫黯或深红，肛内指检有灼热感，舌红，苔黄腻，脉弦数                | 清热利湿      | 萆薢渗湿汤 |
| 不必脱岗 |  |           |       |

## (二) 外治法

1. 熏洗 苦参汤加石榴皮、枯矾、五倍子煎水熏洗，每天 2 次
2. 外敷 以五倍子散或马勃散外敷

## (三) 其他疗法

- (1) 黏膜下注射法-- 6%~8%明矾溶液——适应证一、二度直肠脱垂
- (2) 直肠周围注射法-- 6%~8%明矾溶液——适应证二、三度直肠脱垂

## 第八节 锁肛痔

相当于西医的**肛管直肠癌**

### 症状:

- 1) 便血是直肠癌最常见的早期症状
- 2) 排便习惯改变

### 检查:

- 1) 直肠指检——最重要
- 2) 结肠镜——确诊

治疗: 手术

助理不考辨证论治

(1) 湿热蕴结证

证候: 肛门坠胀, 便次增多, 大便带血, 色泽暗红, 或夹黏液, 或下痢赤白, 里急后重;舌红, 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清热利湿。

方药: 槐角地榆丸加减。

(2) 气滞血瘀证

证候: 肛周肿物隆起, 触之坚硬如石, 疼痛拒按, 或大便带血, 色紫暗, 里急后重, 排便困难;舌紫暗, 脉涩。

治法: 行气活血。

方药: 桃红四物汤合失笑散加减。

(3) 气阴两虚证

证候: 面色无华, 消瘦乏力, 便塘或排便困难, 便中带血, 色泽紫暗, 肛门坠胀或伴心烦口干, 夜间盗汗;舌红或绛, 苔少, 脉细弱或细数。

治法: 益气养阴, 清热解毒。

方药: 四君子汤合增液汤



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌  
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲30号金码大厦8层22层



中医金鹰



中医王牌重读



中医王牌退费



课表公众号



中西医金鹰



中西医王牌重读



中西医王牌退费