

1. (A1 型题) 新生儿食管狭窄部位共有

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个
- E. 5 个

1. 答案: C

解析: 食管共有三处狭窄: 第一处位于食道的起端; 第二个处在食道入口以下 7cm 处; 第三处是食道通过膈肌的裂孔处。

2. (A1 型题) 人体食管的长度约为

- A. 25cm
- B. 28cm
- C. 30cm
- D. 45cm
- E. 50cm

2. 答案: A

解析: 食管是连接咽和胃的通道, 全长约 25cm。食管的功能是把食物和唾液等运送到胃内。

3. (A1 型题) (2014~专业实务) 肝脏组织基本的功能单位是

- A. 肝细胞
- B. 肝小叶
- C. 肝窦
- D. 肝段
- E. 门脉系统

3. 答案: B

解析: 肝是人体最大的腺体器官, 基本的结构和功能单位是肝小叶。

4. (A1 型题) 临床上区分直肠和肛管的解剖标志是

- A. 肛瓣
- B. 齿状线
- C. 直肠柱
- D. 肛柱
- E. 肛乳头

4. 答案: B

解析: 直肠与肛管交界处由肛瓣边缘与肛柱下端共同形成一条锯齿形的环行线, 称齿状线。故临床上区分直肠和肛管的解剖标志是齿状线。

5. (A1 型题) 溃疡性口腔炎清洗时宜选用的漱口液是

- A. 3%过氧化氢溶液
- B. 金霉素鱼肝油
- C. 2%碳酸氢钠溶液
- D. 蒸馏水
- E. 2%利多卡因溶液

5. 答案: A

解析: 溃疡性口腔炎用 3%过氧化氢溶液或 0.1%利凡诺溶液清洗溃疡面, 鹅口疮患者用 2%碳酸氢钠溶液清洁口腔。疱疹性口腔炎局部处理局部可涂疱疹净抑制病毒,

亦可喷西瓜霜、锡类散等中药；疼痛重者进食前在局部涂 2%利多卡因。为预防继发感染可涂 2.5%~5%金霉素鱼肝油。故正确答案为 A。

6. (A1 型题) 鹅口疮的临床表现是

- A. 口腔黏膜弥漫性充血
- B. 溃疡表面有黄白色渗出物
- C. 有发热等全身中毒症状
- D. 因疼痛出现拒乳和流涎
- E. 口腔黏膜有乳凝块样物

6. 答案: E

解析: 溃疡性口炎开始时口腔黏膜充血水肿。疱疹性口炎起病时发热, 体温达 38℃~40℃, 浅表溃疡面覆盖黄白色纤维素性分泌物。局部疼痛、流涎、拒食、烦躁, 鹅口疮是在口腔黏膜表面出现白色或灰白色乳凝块状物。故正确答案为 E。

7. (A1 型题) 患儿, 6 个月。患鹅口疮 5 天, 其首优的护理诊断/问题是

- A. 疼痛, 与口腔黏膜炎症有关
- B. 营养失调, 与拒食有关
- C. 体温过高, 与感染有关
- D. 口腔黏膜改变, 与感染有关
- E. 皮肤完整性受损, 与感染有关

7. 答案: D

解析: 鹅口疮为白色念珠菌感染所致, 特征是口腔黏膜表面出现白色或灰白色乳凝块状物, 略高于黏膜表面, 粗糙无光, 起初呈点状和小片状, 可逐渐融合成片, 形似乳凝块, 不易拭去。因此护理首要问题为口腔黏膜改变, 与感染有关。故选 D。

8. (A1 型题) 患儿, 1 岁半。因拒食、啼哭就诊, 查体: 颊黏膜、牙龈、舌面处出现成簇小水疱, 部分破溃成溃疡, 下颌下淋巴结肿大, 咽充血, 诊断为疱疹性口腔炎, 护士健康指导不正确的是

- A. 勤喂水
- B. 其病原体为白假丝酵母菌 (白念珠菌)
- C. 饮食以微凉流质或半流质为宜
- D. 养成良好的卫生习惯
- E. 注意隔离

8. 答案: B

解析: 小儿鹅口疮的病原是白色念珠菌, 疱疹性口炎的病原是单纯疱疹病毒 I 型, 溃疡性口炎致病菌为链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌。故 B 不正确

9. (A1 型题) 患儿女, 出生后 20 天。因发热应用抗生素治疗 10 余天, 查体时护士见其口腔颊黏膜有乳凝块样附着物, 不易擦掉。应考虑为

- A. 疱疹性口腔炎
- B. 溃疡性口腔炎
- C. 单纯性口腔炎
- D. 鹅口疮
- E. 口角炎

9. 答案: D

解析: 鹅口疮的临床表现口腔黏膜表面白色乳凝块样小点或小片状物; 不痛、不流涎, 不影响吃奶; 颊黏膜最常见。疱疹性口炎表现为发热, 口腔黏膜小疱疹,

破溃后有黄白色纤维素性分泌物覆盖；疱疹常见于齿龈、口唇、舌。疼痛，拒食、流涎，常有颌下淋巴结肿大。溃疡性口炎表现为口腔黏膜充血水肿，形成糜烂或溃疡，上有灰白色假膜；疼痛、流涎、拒食，有发热，局部淋巴结肿大。根据患儿表现，应考虑为鹅口疮。

10. (A1 型题) (2015~实践能力) 患儿女，1.5 岁。疱疹性口腔炎。护士在口腔涂药后应协助患儿闭口

- A. 5 分钟
- B. 10 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟
- E. 25 分钟

10. 答案：B

解析：涂药后嘱患儿闭口 10 分钟后取出纱布或棉球（2015），并嘱患儿不可立即漱口、饮水或进食。

11. (A1 型题) 下列慢性胃炎保健指导中，不妥的是

- A. 养成细嚼慢咽的进食习惯
- B. 戒烟忌酒
- C. 腹痛时口服阿司匹林
- D. 上腹饱胀、反酸时口服多潘立酮（吗丁啉）
- E. 避免使用泼尼松及利血平

11. 答案：C

解析：慢性胃炎患者指导病人加强饮食卫生和饮食营养，养成有规律的饮食习惯；避免过冷、过热、辛辣等刺激性食物及浓茶、咖啡等饮料；养成细嚼慢咽的进食习惯嗜酒者应戒酒，防止乙醇损伤胃黏膜；注意饮食卫生。避免使用对胃黏膜有刺激的药物，最常引起胃黏膜炎症的药物是非甾体类抗炎药如阿司匹林、吲哚美辛等，其机制可能是通过抑制胃黏膜生理性前列腺素的合成，削弱其对胃黏膜的保护作用。故答案为 C。

12. (A1 型题) 慢性胃炎临床表现一般不包括

- A. 食欲不振
- B. 餐后腹胀
- C. 恶心呕吐
- D. 反酸暖气
- E. 规律性上腹痛

12. 答案：E

解析：慢性胃炎无规律性上腹痛。慢性胃炎病程迁延，进展缓慢，缺乏特异性症状。大多无明显症状，部分表现为反复或持续性上腹不适、饱胀、钝、烧灼痛，无明显节律性，一般进食后较重，其次为食欲下降、暖气、反酸、恶心等消化不良症状。这些症状用抗酸剂及解痉剂不能缓解。有部分患者无临床症状。所以，慢性胃炎的疼痛不具规律性，故选 E。

13. (A2 型题) 慢性胃炎患者应避免口服

- A. 链霉素
- B. 庆大霉素
- C. 泼尼松
- D. 多潘立酮（吗丁啉）

E. 甲氧氯普胺（胃复安）

13. 答案：C

解析：链霉素、庆大霉素损害听力。多潘立酮是胃肠动力药加速胃排空。甲氧氯普胺可止吐，主要副反应为镇静作用，可有倦怠、嗜睡、头晕等。其他有便秘、腹泻、皮疹及溢乳、男子乳房发育等。泼尼松长期大量服用引起柯兴氏征，诱发神经精神症状以及消化系统溃疡、骨质疏松、生长发育受抑制、并发和加重感染，故答案为C。

14. (A1 型题) 慢性胃炎用多潘立酮最佳时间是

- A. 晨起时
- B. 饭前
- C. 饭后
- D. 饭中
- E. 睡前

14. 答案：B

解析：对胃黏膜有刺激的药物或助消化药宜在饭后服用。促进睡眠的如安定等在睡前服用，利尿药物宜晨起服用。胃肠动力药如多潘立酮，加速胃排空，应在饭前服。故正确答案为B。

15. (A1 型题) 自身免疫性胃炎的病变部位多见于

- A. 胃窦部
- B. 胃体部
- C. 胃底部
- D. 胃大弯
- E. 胃小弯

15. 答案：B

解析：自身免疫所致胃炎以富含壁细胞的胃体黏膜萎缩为主。

16. (A1 型题) 血清中抗内因子抗体阳性提示

- A. 胃泌素瘤
- B. 浅表性胃炎
- C. 多灶性萎缩性胃炎
- D. 自身免疫性胃炎
- E. 消化性溃疡

16. 答案：D

解析：自身免疫性胃炎时，抗壁细胞抗体和抗内因子抗体可呈阳性，血清促胃液素水平明显升高。多灶萎缩性胃炎时，血清促胃液素水平正常或偏低。

17. (A1 型题) 确诊慢性胃炎最可靠的依据是

- A. 胃液分析
- B. 消化道症状
- C. 胃脱落细胞检查
- D. 纤维胃镜检查
- E. 胃肠钡餐 X 线检查

17. 答案：D

解析：胃镜及胃黏膜活组织检查是最可靠的诊断方法。通过胃镜在直视下观察黏膜病损。慢性浅表性胃炎可见红斑（点、片状或条状）、黏膜粗糙不平、出血点

/斑；慢性萎缩性胃炎可见黏膜呈颗粒状、黏膜血管显露、色泽灰暗、皱襞细小。故正确答案为D。X线钡餐检查对消化性溃疡诊断有确诊价值。

18. (A2型题) 患者男, 38岁。因上腹部胀痛、饭后暖气及反酸明显来诊。胃镜报告示慢性胃炎。下列食物适合患者食用的有

- A. 浓茶
- B. 咖啡
- C. 纯牛奶
- D. 面条
- E. 油条

18. 答案: D

解析: 慢性胃炎患者给予高热量、高维生素、及易消化的饮食。故排除A、B、E答案, 纯牛奶中的钙质可使刺激胃酸分泌, 不宜多饮, 故排除C答案。故选D。

19. (A2型题) 患者, 女, 34岁, 反复中上腹饱胀不适6年, 无黑便和贫血。胃镜检查提示慢性胃窦胃炎伴糜烂。询问护士为明确诊断还需做哪项检查, 正确的是

- A. 大便潜血试验
- B. 幽门螺杆菌检查
- C. 胃液检查
- D. 内因子抗体检查
- E. 壁细胞抗体检查

19. 答案: B

解析: 幽门螺杆菌感染是慢性胃炎主要的病因。胃镜提示慢性胃窦胃炎伴糜烂, 再进行幽门螺杆菌检查可确定致病菌。

20. (A1型题) 十二指肠溃疡的好发部位是

- A. 十二指肠球部
- B. 十二指肠降部
- C. 十二指肠乳头处
- D. 十二指肠水平部
- E. 十二指肠升部

20. 答案: A

解析: 十二指肠溃疡是消化道的常见病, 一般认为是由于大脑皮质接受外界的不良刺激后, 导致胃和十二指肠壁血管和肌肉发生痉挛, 使胃肠壁细胞营养发生障碍和胃肠粘膜的抵抗力降低, 致使胃肠粘膜易受胃液消化而形成溃疡。典型的十二指肠溃疡发生在十二指肠球部(A正确), 十二指肠溃疡一般不发生恶变。十二指肠溃疡发生在球部远端是很少见的, 因此B、C、D、E均不正确。

21. (A1型题) 以下哪项是胃溃疡的特点

- A. 发病年龄多见于老年人
- B. 好发于胃大弯
- C. 上腹压痛点常在上腹偏右
- D. 疼痛多在饭后3~4小时发生
- E. X线钡餐检查龛影

21. 答案: E

解析: 胃溃疡多见于中老年人, A不正确。胃溃疡多发于胃小弯和胃角, B不正确。胃溃疡压痛点多位于中上腹偏高处, 或剑突下和剑突下偏左处, C不正确。

疼痛多在餐后 1 小时内发生，经 1~2 小时后缓解，D 不正确。X 线钡餐检查龛影是胃溃疡的特点，故选 E。

22. (A2 型题) 消化性溃疡患者服用制酸剂宜在

- A. 饭前 1~2 小时
- B. 饭后 1~2 小时
- C. 两餐之间
- D. 每日清晨一次
- E. 进餐时与食物同服

22. 答案: B

解析: 制酸剂如氢氧化铝凝胶等, 应在饭后 1h 和睡前服用。服用片剂时应嚼服故正确答案为 B。药物应在餐中或餐后即刻服用 H₂受体拮抗剂。硫糖铝片宜在进餐前 1h 服用。

23. (A1 型题) 以下因素中对消化性溃疡起决定性作用的是

- A. 胃酸、胃蛋白酶增高
- B. 吸烟
- C. 饮食不当
- D. O 型血型者
- E. 全身性疾病

23. 答案: A

解析: 溃疡的形成是胃壁或十二指肠壁组织被胃酸和胃蛋白酶消化的结果。这种自我消化过程是溃疡形成的直接原因。故选 A。

24. (A1 型题) 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是

- A. 链球菌
- B. 霍乱弧菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 痢疾杆菌
- E. 大肠杆菌

24. 答案: C

解析: 现已公认幽门螺杆菌感染为消化性溃疡的一个重要发病原因。Hp 感染破坏了胃的粘膜屏障, 使氢离子和胃蛋白酶渗入粘膜, 发生自身消化作用, 形成溃疡。因此, 本题的正确答案是 C。

25. (A1 型题) 毕 II 式胃大部切除术, 与残胃吻合的器官是

- A. 空肠近端
- B. 空肠远端
- C. 十二指肠
- D. 回肠远端
- E. 结肠远端

25. 答案: A

解析: 胃空肠吻合术有两种: 其一是毕 II 式胃大部切除术, 即切除远端胃后缝闭十二指肠残端, 残胃和空肠上段吻合。故本题选 A。

26. (A1 型题) 关于消化性溃疡的发病因素, 应除外

- A. 胃酸和胃蛋白酶
- B. 非甾体类消炎药
- C. 遗传因素

- D. 持久或过度精神紧张
- E. 前列腺素

26. 答案: E

解析: 消化性溃疡的发病因素: ①幽门螺杆菌感染: 主要病因; ②非甾体类抗炎药如阿司匹林、吲哚美辛等; ③胃酸和胃蛋白酶: 胃酸在其中起决定性作用, 是溃疡形成的直接原因; ④其他因素: 吸烟、遗传、胃十二指肠运动异常、应激如长期精神紧张、焦虑或情绪容易波动。故本题选 E。

27. (A1 型题) 消化性溃疡最主要的发病因素是

- A. 十二指肠肠壁薄弱
- B. 习惯性便秘
- C. 先天畸形
- D. 黏膜萎缩
- E. 幽门螺杆菌感染

27. 答案: E

解析: 消化性溃疡最主要的发病因素是幽门螺杆菌感染。因此在治疗中要抑制其感染。故本题选 E。

28. (A1 型题) 胃、十二指肠溃疡急性大出血的主要表现是

- A. 剧烈上腹痛
- B. 上腹部反跳痛
- C. 大量呕血或黑便
- D. 肠鸣音活跃
- E. 血细胞比容下降

28. 答案: C

解析: 胃十二指肠溃疡大出血时, 可表现为大量呕血与黑粪, 并有周围循环衰竭表现。故本题选 C。

29. (A2 型题) 消化道手术后, 提示患者肠蠕动恢复的有效指征是

- A. 听诊有肠鸣音
- B. 肛门排气
- C. 患者有饥饿感
- D. 患者有便意
- E. 胃管的引流量较前减少

29. 答案: B

解析: 在伴有消化道的手术时, 肛门排气及肠鸣音正常时提示肠蠕动恢复。可以开始进食水和流质食物。故本题选 B。

30. (A1 型题) 消化性溃疡特征性的临床表现是

- A. 黄疸
- B. 食欲下降
- C. 食欲下降
- D. 反酸、嗝气
- E. 节律性和周期性上腹痛

30. 答案: E

解析: 消化性溃疡以慢性病程、周期性发作、节律性上腹痛为特点。故本题选 E。

31. (A2 型题) 消化性溃疡患者的疼痛节律改变或消失, 常提示患者其可能的原因是

- A. 晨起
- B. 饮酒过度
- C. 夜晚
- D. 癌变
- E. 过度劳累

31. 答案: D

解析: ABCE 均加重疼痛, 如果疼痛失去了上述规律性, 变为不定时发作, 或成为持续性隐痛, 或疼痛性质与以往相比发生了明显的改变, 则应警惕为癌变的先兆。故本题选 D。

32. (A1 型题) 关于消化性溃疡用药的叙述, 不正确的是

- A. 氢氧化铝凝胶应在餐后 1 小时服用
- B. 服用西咪替丁应注意观察有无头晕、皮疹
- C. 硫糖铝片应在餐前 1 小时服用
- D. 奥美拉唑可引起头晕, 用药时不可开车
- E. 甲硝唑应在餐前半小时服用

32. 答案: E

解析: 氢氧化铝凝胶等应在餐后 1 小时或睡前服用, A 正确; 西咪替丁不良反应引起头晕皮疹, B 正确; 硫糖铝在酸性环境下起作用, 应在餐前 1 小时给药, C 正确; 奥美拉唑可引起头晕, 特别是用药初期, 因此初次服用应减少活动, D 正确。甲硝唑饭后半小时服用, 故本题选 E。

33. (A1 型题) 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是

- A. 头晕
- B. 皮疹
- C. 乏力
- D. 便秘
- E. 口干

33. 答案: D

解析: 服用硫糖铝后, 抑制肠道运动增加水分吸收, 引起便秘, 故本题选 D。

34. (A2 型题) 执行慢性胃炎患者的医嘱时, 使用前应着重与医生进行沟通的药物是

- A. 消胆胺
- B. 山莨菪碱
- C. 雷尼替丁
- D. 强的松
- E. 多潘立酮

34. 答案: D

解析: 强的松片最主要的副作用是降低免疫力, 其次是对胃肠道有刺激, 容易造成上消化道出血、大剂量易引起糖尿病。故本题选 D。

35. (A1 型题) 下列不是外科治疗胃十二指肠溃疡的适应证的是

- A. 并发急性穿孔
- B. 并发急性大出血
- C. 胃溃疡恶变
- D. 慢性萎缩性胃炎
- E. 并发瘢痕性幽门梗阻

35. 答案：D

解析：外科治疗胃十二指肠溃疡的适应证：①胃溃疡经过短期（4~6周）内科治疗无效或愈合后复发者，应在第二次复发前手术；②年龄已超过45岁的胃溃疡患者；③经X线或胃镜证实为较大溃疡（直径2.5cm以上）或高位溃疡；④不能排除或已证实有恶变者。⑤以往有一次急性穿孔或大出血病史者。所以选项D是错误的。

36. (A1型题) 消化性溃疡病在何种条件下疼痛节律会改变或消失

- A. 疲劳时
- B. 饮酒时
- C. 受凉时
- D. 焦虑时
- E. 癌变时

36. 答案：E

解析：消化性溃疡在癌变时疼痛节律会改变或消失，疼痛常因精神刺激、过度疲劳、饮食不慎、饮酒、药物影响、气候变化等因素诱发或加重；因休息、进食、服制酸药、以手按压疼痛部位、呕吐等方法而减轻或缓解。而溃疡疼痛节律性改变或消失可能是癌变的征兆，故选E。

37. (A2型题) 胃溃疡合并幽门梗阻患者的术前准备，下列哪项可减轻胃黏膜水肿

- A. 术前数日每晚用温等渗盐水洗胃
- B. 纠正脱水
- C. 纠正碱中毒
- D. 术前给予流质饮食
- E. 术前晚灌肠

37. 答案：A

解析：合并幽门梗阻病人的护理：非完全性梗阻者可进无渣半流质，输液、输血，纠正营养不良及低氯、低钾性碱中毒。持续性胃肠减压和温生理盐水洗胃有助于减轻胃组织水肿，利于术后愈合。故本题A是正确的。

38. (A2型题) 消化性溃疡患者，原有疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐，呕吐物含发酵性宿食。此时最可能的并发症是

- A. 幽门梗阻
- B. 急性胰腺炎
- C. 穿孔
- D. 胃癌
- E. 上消化道出血

38. 答案：A

解析：幽门梗阻使胃排空延迟，病人可感上腹饱胀不适，疼痛于餐后力重，且有反复大量呕吐，呕吐物为酸腐味的宿食，大量呕吐后疼痛可暂缓解。故正确答案为A。

39. (A2型题) 患者，男，34岁，饮酒后中上腹部闷痛不适，排柏油样大便1次。为进一步明确病情，宜选择哪项检查

- A. 血常规检查
- B. 大便常规和隐血试验
- C. 钡餐X线检查

- D. 急诊胃镜检查
- E. 插胃管，取胃液检查

39. 答案：D

解析：患者上腹不适，且排柏油样便，提示有上消化道出血。而胃镜检查是上消化道出血定位、定性诊断的首选检查方法。故本题选D。

40. (A2型题) 患者男，45岁。十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻。医嘱中出现下列哪种药物时，护士应提出质疑

- A. 氢氧化铝凝胶
- B. 口服补液盐
- C. 奥美拉唑
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 克拉霉素

40. 答案：B

解析：氢氧化铝是碱性药物，可中和胃酸，A正确；奥美拉唑是质子泵抑制剂，C正确；枸橼酸铋剂可保护黏膜，D正确，克拉霉素是抗生素，E正确；口服补液盐是世界卫生组织推荐的治疗急性腹泻脱水的药物，而幽门梗阻者应禁食，输血、输液、胃肠减压。故本题选B。

41. (A2型题) 患者男，36岁。胃溃疡5年，规律用药但依然反复发作。护士在收集资料时发现患者饮食极不规律，常暴饮暴食，每日饮酒量约500ml。在进行健康指导时应着重给患者讲解的是

- A. 药物的不良反应
- B. 胃溃疡的并发症
- C. 合理饮食的重要性
- D. 胃溃疡的发病机制
- E. 保持情绪稳定的重要性

41. 答案：C

解析：刺激性饮料，烈性酒除直接损伤黏膜外，还能促进胃酸过度分泌。对嗜烟酒者，劝其戒除，但应注意突然戒断烟酒可引起焦虑、烦躁，反过来也会刺激胃酸分泌，故应与病人共同制定切实可行的戒烟酒计划，并督促其执行。故本题选C。

42. (A2型题) 患者，男，35岁。十二指肠溃疡病史3年余，急性发作2天。今中午饱餐后突感上腹剧烈疼痛，伴肌紧张、压痛、反跳痛，肝浊音界消失。该患者最可能并发了

- A. 急性胃扩张
- B. 幽门梗阻
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性穿孔
- E. 大出血

42. 答案：D

解析：急性胃扩张主要引起反复呕吐，A错误；幽门梗阻引起胃痛渐加重，嗝气、反胃等，B错误；急性胰腺炎腹痛，恶心，呕吐，发热，血胰酶增高等，C错误；十二指肠溃疡易造成穿孔，突感上腹剧烈疼痛，伴肌紧张、压痛、反跳痛，肝浊音界消失。故本题选D。

43. (A2 型题) 患者男, 58 岁。行动不便。3 天来反复上腹痛, 进餐后发作或加重, 伴反酸嗝气。电话咨询社区护士其应进行哪项检查, 社区护士的建议是

- A. 腹部平片
- B. B 超
- C. CT
- D. 胃镜
- E. MRI

43. 答案: D

解析: 病人反复上腹痛, 进餐后发作或加重, 考虑可能为胃溃疡, 确诊消化性溃疡的首选检查方法是胃镜。故本题选 D。

44. (A2 型题) 患者, 女, 47 岁, 因十二指肠溃疡发作急诊入院, 经治疗后症状好转出院, 对该患者进行出院健康教育, 下列哪项是错误的

- A. 养成良好的饮食习惯和卫生习惯
- B. 保持清洁、均衡饮食
- C. 腹痛发作应立即服止痛药缓解
- D. 定时服药
- E. 避免剧烈运动

44. 答案: C

解析: 腹痛发作未明确诊断前不应使用止痛药物, 可能会掩盖患者的真实病情。故本题选 C。

45. (A2 型题) 患者女, 50 岁, 确认为胃溃疡活动期, 其最可能的腹痛特点是

- A. 夜间腹痛明显
- B. 空腹时腹痛明显
- C. 餐后 1/2~1 小时腹痛明显
- D. 餐后即刻腹痛明显
- E. 进餐时腹痛明显

45. 答案: C

解析: 胃溃疡疼痛多于餐后半小时至 2 小时出现, 持续 1~2 小时, 在下次进餐前疼痛已消失, 即所谓“餐后痛”, 本题选 C。而十二指肠溃疡疼痛多于餐后 3~4 小时出现, 持续至下次进餐, 进食后疼痛可减轻或缓解, 故叫“空腹痛”, 有的也可在夜间出现疼痛, 又叫“夜间痛。”

46. (A2 型题) 患者男, 22 岁, 消化性溃疡患者, 给予胶体次枸橼酸铋+克拉霉素+呋喃西林三联治疗期间出现黑便, 担心病情加重, 行粪便隐血试验, 报告呈阴性。此时应向患者解释其黑便的原因是

- A. 溃疡出血
- B. 溃疡癌变
- C. 呋喃西林不良反应
- D. 克拉霉素不良反应
- E. 胶体次枸橼酸铋不良反应

46. 答案: E

解析: 选项 A、B 化验便隐血试验结果是阳性, 但本患者粪便隐血试验阴性, 排除 A、B; 而 C、D 是不会影响大便的颜色的, 选项 E 在服用期间会出现大便颜色呈灰褐色便, 一般停药后会恢复正常的, 故本题选 E。

47. (A2 型题) 患者女, 63 岁。胃穿孔修补术后, 为预防发生粘连性肠梗阻, 应指导患者

- A. 早期取半卧位
- B. 早期离床活动
- C. 早期进食
- D. 保持排便通畅
- E. 多饮水

47. 答案: B

解析: 肠道手术后鼓励患者早期下床活动, 促进肠蠕动恢复, 防止肠粘连, 也可预防下肢静脉血栓的形成。故本题选 B。

48. (A2 型题) 患者, 女性, 56 岁, 胃窦部多发溃疡, 今日患者在硬膜外麻醉下行胃大部切除术, 术后安返病房。病区护士在术后的 12 小时内, 应注意观察的并发症是

- A. 吻合口瘘
- B. 吻合口炎症
- C. 吻合口出血
- D. 近侧空肠段梗阻
- E. 十二指肠残端瘘

48. 答案: C

解析: 胃大部切除术的术后并发症包括吻合口出血、十二指肠残端破裂、吻合口破裂或吻合口瘘、胃排空障碍、术后梗阻、倾倒综合征等, 但 12 小时内会出现的并发症多是吻合口出血, 短期内从胃管不断引流出新鲜血液, 甚至出现呕血和黑便。故本题选 C。

49. (A2 型题) 患者, 女性, 47 岁, 胃十二指肠溃疡, 手术后第 7 天护士发现患者出现高热、寒战, 右上腹疼痛, 伴有呃逆, 该护士首先考虑患者并发了

- A. 膈下脓肿
- B. 盆腔脓肿
- C. 肠间脓肿
- D. 吻合口瘘
- E. 切口感染

49. 答案: A

解析: 上述的术后并发症虽然都会出现高热、寒战等表现, 但伴有呃逆是膈下脓肿所特有的表现, 因此考虑并发膈下脓肿。故本题选 A。

50. (A2 型题) 患者, 男性, 42 岁, 十二指肠溃疡病 10 年。近 2 个月来, 上腹胀满不适, 伴反复呕吐酸臭味宿食。术前诊断最可靠的检查是

- A. X 线钡剂造影
- B. 血培养
- C. MRI
- D. 纤维胃镜
- E. 腹部 CT

50. 答案: D

解析: 胃镜检查是确诊消化性溃疡的首选检查方法。胃镜检查可直接观察溃疡部位、病变大小、性质。同时, 患者反复呕吐酸臭味宿食, 可能并发幽门梗阻, 胃镜检查可见胃内大量潴留的胃液和食物残渣。故本题选 D。

51. (A2 型题) 患者, 男性, 47 岁, 胃大部切除术后 4 天。观察发现: 患者体温 38.6℃, 切口红肿、疼痛。该患者最可能出现的情况是

- A. 切口裂开
- B. 切口感染
- C. 膈下脓肿
- D. 肺部感染
- E. 吻合口破裂

51. 答案: B

解析: 患者体温升高, 局部红肿、疼痛皆属于感染症状, 由于是在切口处发生红肿、疼痛, 考虑为切口感染。故本题选 B。

52. (A2 型题) 患者男, 患消化性溃疡 10 余年, 饮酒 30 分钟后出现剧烈上腹部疼痛。诊断为急性胃穿孔, 首要护理措施为

- A. 立即应用镇痛剂
- B. 立即输血
- C. 禁食和胃肠减压
- D. 安慰并陪伴病人
- E. 立即补液

52. 答案: C

解析: 消化道溃疡并发穿孔时, 应立即禁食并予以胃肠减压, 以减少对胃的刺激。急性穿孔是消化性溃疡最严重的并发症之一, 溃疡深达浆膜层时, 可突然穿透而发生急性穿孔, 以胃窦小弯及十二指肠球部前壁溃疡多见。故选 C。

53. (A2 型题) 患者, 女性, 37 岁, 胃大部切除术后第 3 天, 肠蠕动未恢复, 护士查体发现患者腹胀仍非常明显, 该护士给予患者最有效的护理措施是

- A. 增加床上活动
- B. 胃肠减压
- C. 腹部热敷
- D. 肛管排气
- E. 环行按摩腹部

53. 答案: B

解析: 术后患者肠蠕动尚未恢复, 出现腹胀, 首先进行胃肠减压, 将胃肠道内的气体和液体吸出, 可有效减轻腹胀、降低肠腔内压力。故本题选 B。

54. (A2 型题) 患者, 男性, 53 岁, 患有胃溃疡出血, 经治疗出血停止, 病情缓解, 粪便隐血试验阴性。如果患者再次发生呕血时, 护士应为其采取的体位是

- A. 平卧位, 头偏向一侧
- B. 头低足高位
- C. 截石位
- D. 平卧屈膝位
- E. 半坐卧位

54. 答案: A

解析: 发生呕血时, 应嘱患者平卧位, 头偏一侧, 防止窒息或误吸, 同时, 要清除气道内的异物, 保持呼吸道通畅。故本题选 A。

55. (A2 型题) 患者, 女性, 48 岁, 毕 II 式胃大部切除术后 36 小时, 突发右上腹剧烈疼痛伴腹膜刺激征。外科护士应首先考虑

- A. 术后胃出血

- B. 输入襻梗阻
- C. 低血糖综合征
- D. 碱性反流性胃炎
- E. 十二指肠残端破裂

55. 答案: E

解析: 十二指肠残端破裂多发生在术后 24~48 小时, 临床表现为突发性上腹部剧痛、发热和腹膜刺激征, 该患者的临床表现符合十二指肠残端破裂。故本题选 E。

56. (A2 型题) 患者, 女, 50 岁, 胃大部切除术后 2 周。进食 10~20 分钟后出现上腹饱胀、恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。应考虑并发了

- A. 吻合口炎症
- B. 吻合口梗阻
- C. 倾倒综合征
- D. 低钾血症
- E. 代谢性酸中毒

56. 答案: C

解析: 倾倒综合征是指在胃部手术后病人有时会在饭后 10~30 分钟出现上腹部胀痛, 恶心, 呕吐, 肠鸣, 有排便感, 腹泻, 病人可同时出现眩晕、头昏、大量出汗, 面色潮红或苍白, 极度软弱, 心动过速, 甚至血压下降。多出现于术后 1~3 周, 多在病人进食半流质饮食时出现, 特别是进食加糖的牛奶时更易出现, 症状多持续 1 小时, 然后自行缓解。与患者的症状符合, 所以选择 C。

57. (A2 型题) 患者, 男性, 34 岁, 因十二指肠溃疡行毕氏 II 式手术。术后 8 天进食, 进食后出现上腹部饱胀感, 后出现呕吐, 呕吐物为食物和胆汁。护士根据患者的情况, 考虑其出现了

- A. 幽门梗阻
- B. 吻合口梗阻
- C. 输入段梗阻
- D. 输出段梗阻
- E. 十二指肠溃疡复发

57. 答案: D

解析: 胃大部切除术后梗阻包括输入段梗阻、输出段梗阻和吻合口梗阻, 前两者常见于毕氏 II 式手术。输入段梗阻呕吐物不含胆汁; 吻合口梗阻呕吐物为食物, 不含胆汁; 输出段梗阻呕吐食物和胆汁。故本题选 D。

58. (A2 型题) 患者, 男性, 60 岁, 2 年前无明显诱因出现柏油样便, 伴头晕、乏力, 给予奥美拉唑治疗, 每次发作时伴有上腹胀痛, 多在餐后半小时发生, 近 3 个月来食欲较差, 体重下降, 上腹痛时轻时重, 疼痛逐渐加重, 不易缓解, 可考虑

- A. 胃溃疡出血
- B. 十二指肠溃疡伴出血
- C. 胃溃疡癌变
- D. 胰腺癌
- E. 胃穿孔

58. 答案: C

解析：上腹胀痛多在餐后半小时发生，可考虑为胃溃疡，现患者体重下降，食欲较差，且疼痛不已缓解，符合进展期胃癌的表现。故本题选 C。

59. (A2 型题) 患者男，35 岁。胃肠道术后第 1 天尚未排气，但患者感觉饥饿要求进食，护士首先应采取的措施是

- A. 直接拒绝患者请求
- B. 询问患者想进食的食物
- C. 告知其不能进食的原因
- D. 告知可进食的食物种类
- E. 直接将此情况报告医生

59. 答案：C

解析：胃肠道术后尚未排气不可进食，但应告知患者其原因。排气是肠蠕动恢复的标志，排气之后可拔除胃管，饮少量水或米汤。肠蠕动未恢复前进食会加重病情。故本题选 C。

60. (A1 型题) 溃疡性结肠炎最常见的临床表现为

- A. 腹痛
- B. 腹泻
- C. 腹水
- D. 腹胀
- E. 发热

60. 答案：B

解析：溃疡性结肠炎起病缓慢，腹泻是最常见症状、便血是溃疡性结肠炎最初的主要症状之一。腹痛，轻型和缓解期患者可无此症状，慢性反复发作的患者常有腹痛。伴食欲不振与恶心呕吐，可有腹部体征。故本题答案为 B。

61. (A1 型题) 溃疡性结肠炎的好发部位

- A. 升结肠
- B. 横结肠
- C. 降结肠
- D. 乙状结肠
- E. 盲肠

61. 答案：D

解析：溃疡性结肠炎病变呈连续非节段性分布，主要位于直肠和乙状结肠。故本题选 D。

62. (A1 型题) 溃疡性结肠炎病变常见的累及部位是

- A. 直肠和结肠
- B. 回盲部
- C. 盲肠
- D. 结肠
- E. 升结肠

62. 答案：A

解析：溃疡性结肠炎病变主要累及直肠和乙状结肠，可扩展至降结肠、横结肠，少数可累及全结肠。故本题选 A。

63. (A1 型题) 溃疡性结肠炎的临床表现应除外

- A. 腹痛-便意-便后缓解
- B. 左下腹有压痛

- C. 易形成肠腔狭窄
- D. 易形成肠瘘
- E. 少数可癌变

63. 答案: D

解析: 溃疡性结肠炎腹痛位于左下腹或下腹, B 正确。有疼痛-便意-排便后缓解的规律; A 正确。病变一般仅局限于黏膜和黏膜下层, 溃疡愈合形成瘢痕, 结肠变形缩短、结肠袋消失, 甚至结肠变窄; C 正确。少数病例可有结肠癌变, 以恶性程度高的未分化型多见。E 正确。克罗恩病易形成肠瘘, 故本题选 D。

64. (A2 型题) 患者, 男, 49 岁, 溃疡性结肠炎病史 11 年余, 近 1 周来腹痛加剧, 每天排便 20 余次, 呈血水样。下列饮食指导哪项正确

- A. 多喝牛奶
- B. 多吃新鲜水果
- C. 多吃含纤维素蔬菜
- D. 暂禁食
- E. 多喝果汁

64. 答案: D

解析: 溃疡性结肠炎急性发作期病人, 应进流质或半流质饮食, 病情严重者应禁食, 按患者每天排便 20 余次, 呈血水样, 属重型溃疡性结肠炎, 病情严重应暂禁食。故本题选 D。

65. (A2 型题) 患者, 男, 30 岁, 黏液脓血便伴里急后重 2 年, 诊断为溃疡性结肠炎。近 1 周腹痛加重伴发热入院治疗。护士遵医嘱为患者保留灌肠治疗, 患者应采取的体位是

- A. 右侧卧位
- B. 左侧卧位
- C. 仰卧位
- D. 俯卧位
- E. 半卧位

65. 答案: B

解析: 因溃疡性结肠炎病变部位一般为直肠和乙状结肠, 所以选择左侧卧位, 更有利于疾病的治疗, 灌肠治疗时全身不良反应较少。故本题选 B。

66. (A2 型题) 患者, 女, 40 岁, 反复排黏液便 2 年, 曾确诊溃疡性结肠炎, 不规则治疗, 症状间断出现。近 1 个月再发, 日排便 2~3 次, 入院时体温 36.5℃, 脉搏 72 次/分, 腹软, 左下腹轻压痛。血沉 15mm/h, 血红蛋白 98g/L。根据病程经过, 本患者分型属于

- A. 初发型
- B. 慢性复发型
- C. 慢性持续型
- D. 急性暴发型
- E. 急性复发型

66. 答案: B

解析: 慢性复发型症状较轻, 临床上最多见, 发作期与缓解期交替。患者反复排黏液便 2 年, 不规则治疗, 症状间断出现, 近 1 月再发, 排便 2~3 次, 故判断为慢性复发型。故本题选 B。

67. (A2 型题) 患者女, 32 岁。患溃疡性结肠炎 3 年, 急性加重 2 周入院。入院后护士评估患者的粪便形态最可能发现的是

- A. 米泔水样便
- B. 柏油便
- C. 粘液脓血便
- D. 白陶土样便
- E. 黄色软便

67. 答案: C

解析: 粘液脓性或脓血便常见于溃疡性结肠炎的病人, 故 C 正确。米泔水样便常见于霍乱, 故 A 不正确。柏油便常见于各种原因导致的上消化道出血, 如消化性溃疡、肝硬化等, 故 B 不正确。白陶土样便常见于梗阻性黄疸的病人, 故 D 不正确。黄色软便是正常粪便, 故不选 E。

68. (A1 型题) 婴儿腹泻的病因, 下列哪项是错误的

- A. 肠道内感染
- B. 喂养不当
- C. 消化系统发育不成熟
- D. 血液中 IgG 偏低
- E. 肠道外感染

68. 答案: D

解析: 小儿腹泻的病因包括: ①婴幼儿消化系统发育尚未成熟, 不能适应食物量和量的较大变化, 容易发生消化道功能紊乱 (C 正确); ②生长发育快, 胃肠道负担重; ③机体防御功能差: a. 婴儿胃酸偏低, 胃排空较快, 对进入胃内的细菌杀灭能力较弱; b. 血清免疫球蛋白 (尤其是 IgM、IgA) 和胃肠道分泌型 IgA 均较低 (D 错误); ④肠道菌群失调: 新生儿生后尚未建立正常肠道菌群时, 改变饮食使肠道内环境改变时、或滥用广谱抗生素时, 均可使肠道正常菌群的平衡失调, 而患肠道感染 (A 正确); ⑤人工喂养不当 (B 正确)。故本题 A、B、C、E 均正确, 错误的是 D。

69. (A1 型题) 引起小儿秋季腹泻常见的病原体是

- A. 空肠弯曲菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 埃可病毒
- D. 轮状病毒
- E. 柯萨奇病毒

69. 答案: D

解析: 病毒感染。寒冷季节的婴幼儿腹泻 80% 由病毒感染引起。小儿病毒性肠炎的主要病原是引起秋季腹泻的轮状病毒, 其次有诺沃克病毒、腺病毒等。因此, 引起小儿秋季腹泻常见的病原体是轮状病毒。

70. (A1 型题) 区别轻、重型婴儿腹泻的主要指标是

- A. 病程长短
- B. 热度高低
- C. 排便次数
- D. 呕吐次数
- E. 有无水、电解质紊乱

70. 答案: E

解析：重型腹泻多为肠道内感染所致。起病常比较急，也可由轻型逐渐加重而致。除有较重的胃肠道症状外，还有明显的脱水、电解质紊乱及全身中毒症状，如发热、烦躁、精神萎靡、嗜睡甚至昏迷、休克。故正确答案为 E。

71. (A1 型题) 下列哪项符合婴儿腹泻中度脱水的临床表现

- A. 昏睡或昏迷
- B. 眼窝凹陷
- C. 皮肤弹性极差
- D. 四肢厥冷，无尿
- E. 体重下降 10%以上

71. 答案：B

解析：昏睡或昏迷、皮肤弹性极差、四肢厥冷，无尿、体重下降 10%以上属于重度脱水的临床表现；符合婴儿腹泻中度脱水的是烦躁或萎靡、眼窝凹陷、皮肤弹性差、尿量少、体重下降 5%~10%。故本题选 B。

72. (A1 型题) 轮状病毒肠炎所致腹泻的临床特点不包括

- A. 多发生在秋、冬季
- B. 常伴上呼吸道感染症状
- C. 常伴腹痛、里急后重
- D. 全身感染中毒症状不明显
- E. 大便无腥臭味

72. 答案：C

解析：轮状病毒肠炎又称秋季腹泻，其临床特点是常伴有上呼吸道感染症状，全身中毒症状不明显，大便黄色水样或蛋花汤样，无腥臭味。腹痛、里急后重不属于轮状病毒肠炎临床特点，故选 C。其余答案均属于轮状病毒肠炎所致腹泻的临床特点。

73. (A1 型题) 10 月龄患儿患病毒性肠炎入院，不宜进食的食物有

- A. 母乳
- B. 纯牛乳
- C. 发酵乳
- D. 去乳糖配方乳
- E. 豆制代乳品

73. 答案：B

解析：病毒性肠炎多继发双糖酶（主要为乳糖酶）缺乏不宜用蔗糖，应暂停乳类喂养，改为豆制代乳品、去乳糖配方奶或发酵奶喂养。故本题选 B。

74. (A1 型题) 护士为腹泻小儿采取的饮食疗法，不包括

- A. 脱水患儿需禁食 2 天
- B. 严重呕吐者暂禁食 4~6 小时，不禁水
- C. 停喂不消化和脂肪类食物
- D. 人工喂养者可喂米汤、酸奶等
- E. 病毒性肠炎者以豆制代乳品，可减轻腹泻

74. 答案：A

解析：小儿腹泻应控制腹泻次数，预防继续失水；调整饮食、继续进食是必要的治疗与护理措施。不需要禁食，故本题选 A。

75. (A1 型题) 小儿腹泻伴严重脱水的主要表现是

- A. 发热

- B. 水样便
- C. 频繁呕吐
- D. 大便次数明显增多
- E. 有水、电解质紊乱

75. 答案: E

解析: 小儿腹泻典型表现为大便次数增多, 大便性状改变, 但伴严重脱水, 水电解质紊乱是其主要表现, 故本题选 E。

76. (A1 型题) 疝修补术后病人护理错误的是

- A. 及时处理粪便秘结
- B. 切口部位压沙袋
- C. 咳嗽时注意保护切口
- D. 术后 3 个月内避免重体力劳动
- E. 鼓励病人早期下床活动

76. 答案: E

解析: 疝修补术后病人护理: 体位与活动: 平卧 3 日, 膝下垫一软枕, 使髋关节微屈, 减少腹壁张力。一般于术后 3~5 天可考虑离床活动。防止剧烈咳嗽: 术后剧烈咳嗽可引起腹内压升高, 不利于愈合。因此术后需注意保暖, 防止受凉而引起咳嗽; 指导病人在咳嗽时用手掌按压、保护切口, 以免缝线撕脱造成手术失败。保持排便通畅: 给予便秘者通便药物, 嘱病人避免用力排便。积极处理尿潴留。病人出院后逐渐增加活动量, 3 个月内应避免重体力劳动或提举重物。故答案为 E。

77. (A1 型题) 对于小儿脱水补液的正确方法应除外

- A. 轻、中度脱水可口服补液
- B. 中、重度脱水应选静脉补液
- C. 重度伴休克者先扩容
- D. 补充累积丢失量, 滴速为 $5\text{ml}/(\text{kg} \cdot \text{h})$
- E. 继续损失量和生理需要量在 12~16 小时滴完

77. 答案: D

解析: 补充累积丢失量补液的速度取决于脱水的程度, 原则上先快后慢。累计损失量应在 8~12 小时内补足, 滴速约为每小时 $8\sim 10\text{ml}/\text{kg}$ 。故本题选 D。

78. (A1 型题) 小儿补钾时每日补钾总量静脉滴注时间不应短于

- A. 4 小时
- B. 6 小时
- C. 8 小时
- D. 10 小时
- E. 12 小时

78. 答案: C

解析: 重症患儿需静脉补钾, 每日剂量 $4\sim 6\text{mmol}/\text{kg}$, 浓度 $\leq 40\text{mmol}/\text{L}$, 静脉补钾时间不少于 8 小时, 见尿补钾。故本题选 C。

79. (A1 型题) 小儿低渗性脱水多见于

- A. 饮水不足
- B. 腹泻伴高热
- C. 腹泻时口服大量盐水
- D. 输入电解质溶液过多

E. 营养不良伴长期腹泻者

79. 答案: E

解析: 低渗性脱水, 电解质的丢失大于水的丢失, 血浆渗透压低于正常, 营养不良伴慢性腹泻、腹泻时补充非电解质溶液过多等情况时容易发生。故本题选 E。

80. (A1 型题) 属于 1/2 张的液体是

- A. 1: 1 溶液
- B. 1: 2 溶液
- C. 1: 2: 3 溶液
- D. ORS 溶液
- E. 9%氯化钠溶液

80. 答案: A

解析: 1 份生理盐水和 1 份 5%~10%的葡萄糖混合液的张力为 1/2, 应用于轻中度的等渗性脱水。故本题选 A。

81. (A1 型题) 小儿高渗性脱水发生惊厥的原因是

- A. 休克
- B. 脑水肿
- C. 循环衰竭
- D. 细胞内脱水
- E. 细胞外脱水

81. 答案: D

解析: 高渗性脱水水丢失的比例大于电解质的丢失, 血浆渗透压高于正常, 细胞外液渗透压高, 水从细胞内进入细胞外, 细胞内缺水, 表现为剧烈口渴、高热、烦躁不安、肌张力增高, 甚至发生惊厥。故本题选 D。

82. (A1 型题) 下列哪项不是生理性腹泻的临床特点

- A. 多见于出生 6 个月以内婴儿
- B. 大便次数增多
- C. 添加辅食后大便多逐渐转为正常
- D. 生长发育低于正常
- E. 小儿虚胖, 常伴湿疹

82. 答案: D

解析: 生理性腹泻多见于出生 6 个月以内的婴儿, 外观虚胖, 常伴湿疹, 生后不久即出现腹泻。一般无其他症状, 食欲好, 生长发育正常, 添加辅食后, 大便即逐渐转为正常。不符合生理性腹泻的是生长发育低于正常, 故本题选 D。

83. (A1 型题) 以下哪项不是小儿低血钾的临床表现

- A. 腹胀
- B. 全身乏力
- C. 心率减慢
- D. 心音低钝
- E. 肠鸣音减弱

83. 答案: C

解析: 低血钾表现: 精神萎靡、全身无力、腱反射减弱或消失、腹胀、肠鸣音减弱或消失、心肌收缩无力、心音低钝、血压降低、肾脏损害。故本题选 C。

84. (A1 型题) 高渗性脱水血清钠的浓度为

- A. 90mmol/L

- B. 100mmol/L
- C. 110mmol/L
- D. 120mmol/L
- E. 150mmol/L

84. 答案：E

解析：高渗性脱水水丢失的比例大于电解质的丢失，血清钠的浓度 150mmol/L，血浆渗透液高于正常。故本题选 E。

85. (A1 型题) 对于腹泻并伴脱水的患儿，首选的检查项目是

- A. B 超
- B. 血常规
- C. 心电图
- D. 血电解质
- E. 胸部 X 线检查

85. 答案：D

解析：小儿腹泻并伴脱水，应重点查血电解质，进行血液生化检查，血钠测定可提示脱水的性质，血钾测定可反应体内缺钾的程度，碳酸氢盐测定可了解酸碱失衡性质和程度。故首选的检查项目为血电解质。故本题选 D。

86. (A1 型题) 护理腹泻患儿时，哪项措施不正确

- A. 详细记录出入量
- B. 加强臀部护理
- C. 腹胀时应注意有无低钾血症
- D. 急性腹泻早期应使用止泻剂
- E. 呕吐频繁者应禁食、补液

86. 答案：D

解析：腹泻患儿由于腹泻、呕吐和摄入不足导致体液不足，因详细记录出入量，呕吐频繁者禁食，进行补液。低血钾可引起胃肠道蠕动缓慢，出现腹胀。腹泻患儿应加强臀部皮肤的护理。约 70% 的患儿表现为病毒及非侵袭性细菌所致的水样便腹泻，一般不用抗生素，应合理使用液体疗法，选用微生态制剂和粘膜保护剂；另外约占 30% 的患儿为侵袭性细菌感染所致的粘液、脓血便患者，应根据临床特点，结合大便细菌培养和药敏试验结果选用针对病原菌的抗生素，并随时进行调整。避免用止泻剂。故答案为 D。

87. (A1 型题) 腹泻患儿“有皮肤完整性受损的危险”，其下列护理哪项不妥

- A. 会阴皱褶处不能经常清洗
- B. 便后用温水清洗臀部并拭干
- C. 选用柔软、清洁的尿布
- D. 更换尿布时动作轻柔
- E. 避免使用塑料布包裹

87. 答案：A

解析：腹泻患儿排便次数明显增多，会阴部污染也明显加重，腹泻时排出的粪便对皮肤刺激较大，若皮肤完整性受损则更易导致微生物进人体内引发感染危险。因此，要经常清洗会阴皱褶处。故本题 A 错误，其余选项均为正确的护理原则，本题选 A。

88. (A1 型题) 重型腹泻患儿呕吐频繁时，禁食的时间一般为

- A. 6 小时

- B. 8 小时
- C. 10 小时
- D. 12 小时
- E. 14 小时

88. 答案: B

解析: 限制饮食过严或禁食过久常造成营养不良, 并发酸中毒, 造成病情迁延不愈而影响生长发育, 故脱水患儿除严重呕吐者暂禁食 8 小时(不禁水)外均应继续进食。因此禁食时间为 8 小时, 本题应选 B。

89. (A1 型题) 需配置 1:1 液 200ml, 其配制方法为 5%葡萄糖液 100ml 中应加入生理盐水多少毫升

- A. 50ml
- B. 100ml
- C. 150ml
- D. 200ml
- E. 250ml

89. 答案: B

解析: 1:1 含钠液的配置方法是一份 5%或 10%葡萄糖中加入一份 0.9%氯化钠, 因此 200ml 的 1:1 液 200ml 应在 100ml 5%葡萄糖液中应加入生理盐水 100ml。故本题正确答案为 B。

90. (A1 型题) 患儿, 女, 15 个月, 发热、腹泻 1 天, 尿少半天, 院外补液治疗, 护士对患儿家长的用药指导正确的是服用

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 葡萄糖溶液
- D. 口服补液盐
- E. 2:1 等张含钠液

90. 答案: D

解析: 口服补液盐是 WHO 推荐用以治疗急性腹泻合并脱水的口服液, 适用于轻、中度脱水的患儿。由本题知, 患儿腹泻 1 天, 尿少, 患儿属于轻、中度腹泻, 故本题选 D。

91. (A1 型题) 某 9 个月男婴, 腹泻 2 天, 大便每日 15~16 次, 蛋花汤样。判断患儿脱水程度的评估指标不包括

- A. 精神状态
- B. 尿量
- C. 肠鸣音
- D. 皮肤弹性
- E. 前囟

91. 答案: C

解析: 脱水程度一般从神志, 眼窝及前囟, 皮肤弹性, 尿量, 口腔黏膜, 休克症状, 失水量占体重比例等几个方面进行评估, 不包括肠鸣音。故本题选 C。

92. (A1 型题) 患儿女, 3 个月, 轻型腹泻, 家长主诉给患儿清洁臀部时哭闹明显。护士进行健康教育评估时要特别注意患儿的

- A. 体温
- B. 呼吸

- C. 尿量
- D. 肛周皮肤
- E. 每日大便次数

92. 答案: D

解析: 患儿轻型腹泻, 应指导家长保持患儿臀部的清洁干燥, 勤换尿布, 每次便后用温水清洗臀部及会阴部并吸干; 评估患儿的皮肤情况, 观察皮肤的颜色及表皮有无破损。故本题选 D。

93. (A1 型题) 患儿女, 3 岁。半年来“感冒”反复发作, 家长多次自行给予“阿司匹林”、“头孢拉定”、“阿莫西林”、“罗红霉素”等药物治疗。5 天前患金黄色葡萄球菌肠炎入院。出院时护士对家长进行健康指导应特别强调

- A. 合理喂养
- B. 注意饮食卫生
- C. 多进行户外活动
- D. 注意儿童个人卫生
- E. 滥用抗生素的严重后果

93. 答案: E

解析: 滥用抗生素在杀死有害细菌的同时, 也会杀死人体内的有益菌群, 最终导致菌群失调、二重感染或者真菌感染, 患者出现腹泻。故选 E。

94. (A1 型题) 患儿, 男, 7 个月, 诊断“婴儿腹泻”, 在脱水酸中毒纠正后, 出现手足抽搐, 遵医嘱首选下列哪种药物治疗

- A. 生理盐水
- B. 地塞米松
- C. 10%氯化钾
- D. 静脉给地西洋
- E. 10%葡萄糖酸钙

94. 答案: E

解析: 患儿在纠正脱水酸中毒的同时应注意补钾、补钙。在脱水、酸中毒时, 由于血液浓缩和钙离子增加, 可不出现低钙表现; 在脱水、酸中毒纠正后, 离子钙减少, 出现低钙症状, 表现为抽搐或惊厥。故本题选 E。

95. (A1 型题) 患儿, 女, 4 个月。出生后不久开始腹泻, 大便每天 5~6 次, 神志清楚, 营养中等, 面部见湿疹, 大便常规正常。患儿最可能发生了

- A. 婴儿腹泻
- B. 迁延性肠炎
- C. 病毒性肠炎
- D. 生理性腹泻
- E. 真菌性肠炎

95. 答案: D

解析: 生理性腹泻多见于出生 6 个月以内的婴儿, 患儿外观虚胖, 常伴湿疹, 出生后不久开始腹泻, 食欲好, 生长发育正常。本题患儿表现符合生理性腹泻的表现, 故本题选 D。

96. (A1 型题) 患儿, 1 岁, 因小儿腹泻, 中度脱水入院。经 2 日的补液治疗后脱水得到纠正, 今日突然出现惊厥, 护士首先应考虑的原因是

- A. 脑炎
- B. 低血糖

- C. 低钠血症
- D. 维生素 D 缺乏
- E. 低钙血症

96. 答案: E

解析: 在脱水、酸中毒时, 由于血液浓缩和钙离子增加, 可不出现低钙表现; 在脱水、酸中毒纠正后, 离子钙减少, 出现低钙症状, 表现为抽搐或惊厥。故本题选 E。

97. (A1 型题) 患儿, 男, 4 岁, 因腹泻, 呕吐 2 天入院。经 6 小时补液后, 护士发现患儿眼睑水肿明显, 判断可能的原因是

- A. 酸中毒未改善
- B. 碱中毒未改善
- C. 补液量不足
- D. 输入葡萄糖注射液过多
- E. 输入电解质溶液过多

97. 答案: E

解析: 补液后若患儿出现眼睑水肿, 可能是电解质溶液比例过高, 应及时通知医生调整补液。故本题选 E。

98. (A1 型题) 单纯性机械性肠梗阻的临床特点是

- A. 阵发性腹痛伴肠鸣音亢进
- B. 持续性绞痛, 频繁呕吐
- C. 持续性剧痛, 腹胀不对称
- D. 持续性胀痛, 肠鸣音消失
- E. 腹胀明显, 肛门停止排气

98. 答案: A

解析: 单纯性机械性肠梗阻指各种机械性原因引起的肠腔变窄, 肠内容通过受阻。因此单纯性机械性肠梗阻的临床表现主要为阵发性绞痛, 体检出现肠型与蠕动波, 压痛, 无腹膜刺激征, 肠鸣音亢进, 出现气过水声或金属声。故本题对于单纯性机械性肠梗阻的临床特点应选择 A。

99. (A1 型题) 肠梗阻时, 胃肠减压的液体为血性时, 首先考虑

- A. 肝破裂
- B. 肠管绞窄坏死
- C. 并发胆道出血
- D. 胃肠减压管刺破胃黏膜
- E. 凝血机制的障碍

99. 答案: B

解析: 胃肠减压: 清除肠腔内积气、积液, 有效缓解腹胀、腹痛。胃肠减压期间应注意保持负压吸引通畅, 密切观察并记录引流液的性状及量, 若抽出血性液体, 应高度怀疑绞窄性肠梗阻。故正确答案为 B。

100. (A1 型题) 肠梗阻的表现不包括

- A. 腹痛
- B. 腹胀
- C. 停止排气、排便
- D. 腹泻
- E. 呕吐

100. 答案：D

解析：肠梗阻的共性表现有：腹痛、呕吐、腹胀及停止排便排气。因此答案为D。

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

 金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

 金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

 金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

 金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

 金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

 金英杰医学®
JINYINGJIE.COM