

2021年

临床执业医师资格真题卷



关注山东金英杰医学，查看更多医考资料

第一单元

A1 型选择题(1—79 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 白化病患者体内缺乏的酶是
A. 苯丙氨酸羟化酶 B. 酪氨酸酶
C. 多巴脱羧酶 D. 酪氨酸转氨酶
E. 酪氨酸羟化酶
2. A 型行为性格与下列哪个疾病有关
A. 溃疡病 B. 风心病
C. 冠心病 D. 癌症
E. 神经症
3. 属于生物地球化学性疾病的是
A. 黑脚病,痛痛病
B. 水俣病,地方性氟中毒
C. 黑脚病,碘缺乏病
D. 心血管病,黑脚病
E. 痛痛病,地方性氟中毒
4. 核酸对紫外线的最大吸收峰是在
A. 200nm B. 220nm
C. 240nm D. 260nm
E. 280nm
5. 哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时,每张处方不得超过
A. 3 天常用量 B. 5 天常用量
C. 7 天常用量 D. 10 天常用量
E. 15 天常用量
6. 气性坏疽的临床特点是
A. 局部红、肿、热、痛不明显
B. 一般白细胞不升高
C. 体温正常
D. 局部肌肉坏死,有血性分泌物、恶臭
E. 休克发生早
7. 用巴氏涂片法对 18~65 岁有性生活的女性进行宫颈癌的筛检,从疾病的预防策略角度看,这属于
A. 第一级预防
B. 第一级预防合并第二级预防
C. 第三级预防
D. 第二级预防
E. 第二级预防合并第三级预防
8. 婚前医学检查服务的内容是指
A. 进行性卫生知识、生育知识的教育
B. 进行遗传病知识的教育
C. 对有关婚配问题提供医学意见
D. 对有关生育保健问题提供医学意见
E. 对严重遗传疾病、指定传染病和有关精神病的检查
9. 医德修养要坚持
A. 集体性 B. 组织性
C. 实践性 D. 强制性
E. 机动性
10. 医师在旅游途中救治了 1 位突发心脏病的旅客,该医师行为是
A. 岗位职责 B. 医师职权
C. 政治义务 D. 法律义务
E. 道德义务
11. 苯慢性中毒作用主要影响
A. 造血系统 B. 消化系统
C. 中枢神经系统 D. 呼吸系统
E. 内分泌系统
12. 饥饿时分解代谢可产生酮体的物质是
A. 维生素 B. 脂肪酸
C. 核苷酸 D. 葡萄糖
E. 氨基酸
13. 齿状韧带由什么构成
A. 后纵韧带 B. 黄韧带

- C. 软脊膜 D. 硬脊膜
E. 蛛网膜
14. 高浓度降钙素能迅速降低血钙的作用环节是
A. 减少肠对钙的吸收
B. 抑制甲状旁腺激素分泌
C. 抑制破骨细胞溶骨活动
D. 刺激成骨细胞成骨活动
E. 抑制肾小管对钙的重吸收
15. 缩窄性心包炎最有特异性的体征是
A. 奇脉 B. Ewart
C. 心包叩击音 D. 肝大
E. 浮肿
16. 维系 DNA 双链间碱基配对的化学键是
A. 氢键 B. 磷酸二酯键
C. 肽键 D. 疏水键
E. 糖苷键
17. 反密码子 UAG 识别的 mRNA 上的密码子是
A. GTC B. ATC
C. AUC D. CUA
E. CTA
18. 葡萄球菌感染灶内浸润的主要炎症细胞是
A. 单核细胞 B. 中性粒细胞
C. 嗜酸性粒细胞 D. 淋巴细胞
E. 嗜碱性粒细胞
19. 医患沟通中的非语言沟通形式不包括
A. 面部表情 B. 人际距离
C. 引导话题 D. 身段姿态
E. 目光接触
20. 目前临床常用的戒烟药物包括
A. 去甲替林 B. 可乐定
C. 阿司匹林 D. 肾上腺素
E. 尼古丁贴片
21. 炎热环境中皮肤散热的主要形式是
A. 发汗 B. 对流
C. 血流 D. 传导
E. 辐射
22. 质子泵抑制剂奥美拉唑的代谢产物与酶共价结合属于
A. 竞争性抑制 B. 不可逆抑制
C. 可逆抑制剂 D. 反竞争性抑制
E. H_1 受体拮抗剂
23. 根据晶体智力和流体智力的发展模式,开始出现流体智力下降,晶体智力上升的是哪个年龄阶段的人群
A. 婴儿 B. 儿童
C. 青年 D. 中年
E. 老年
24. 右心衰竭的患者常因组织液生成过多而致下肢浮肿,其主要原因是
A. 血浆胶体渗透压降低
B. 毛细血管血压增高
C. 组织液静水压降低
D. 组织液胶体渗透压升高
E. 淋巴回流受阻
25. 与胃 MALT 淋巴瘤发病相关的病原体是
A. EBV B. HIV
C. HBV D. CMV
E. HP
26. 佩戴金属首饰后局部皮肤出现炎症反应,其免疫病理基础可能是
A. I 型超敏反应
B. II 型超敏反应
C. III 型超敏反应
D. IV 型超敏反应
E. Arthus 反应
27. 湿性坏疽常发生在
A. 脑、脾、肝 B. 肺、肠、子宫
C. 肺、肠、肝 D. 肺、肠、四肢
E. 肺、肾、脑
28. 选项中违背卫健委颁布的人类辅助生殖技术伦理原则的是使用
A. 捐赠的精子
B. 亲属代孕
C. 卵泡浆内单精注射
D. 捐赠的卵子
E. 植入前胚胎遗传学诊断
29. 医疗机构应当设置电离辐射醒目警示标志的场所是
A. 放射性工作人员办公室
B. 放射性检查报告单发放处
C. 接受放射诊疗患者的病房
D. 医学影像科候诊区
E. 放射性废物储存场所

30. 所谓的燕麦细胞癌是下列何种癌症的典型细胞
 A. 肺腺癌 B. 乳腺癌
 C. Pancoast 肿瘤 D. 小细胞性未分化癌
 E. 鳞癌
31. 站立位胸膜腔最低位置是
 A. 左肺胸膜下界 B. 肋膈窝
 C. 心脏切迹 D. 斜裂
 E. 右肺前界
32. 下列哪种酶缺乏可引起蚕豆病
 A. 磷酸戊糖异构酶
 B. 苯丙氨酸羟化酶
 C. 丙酮酸脱氢酶
 D. 转醛醇酶
 E. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
33. 不含味蕾的舌乳头是
 A. 丝状乳头 B. 菌状乳头
 C. 轮廓乳头 D. 软腭的黏膜上皮
 E. 会厌的黏膜上皮
34. 内痔好发部位是截石位
 A. 3、5、9 点 B. 4、8、11 点
 C. 3、7、11 点 D. 4、7、11 点
 E. 5、9、12 点
35. 卫生服务需要主要取决于卫生服务消费者的
 A. 实际支付能力 B. 购买愿望
 C. 购买愿望和支付能力 D. 自身健康状况
 E. 健康状况和购买愿望
36. 关于职业病特点的描述,不正确的是
 A. 接触水平与发病呈正相关
 B. 病因明确
 C. 常先后或同时有一定人数发病
 D. 发病可以预防
 E. 容易治愈
37. 可授予特殊使用级抗菌的药物处方权的医务人员是
 A. 主治医师 B. 住院医师
 C. 乡村医师 D. 副主任医师
 E. 实习医生
38. 盆腔炎症性疾病的最低诊断标准是
 A. 红细胞沉降率升高
 B. 血 C 反应蛋白升高
 C. 宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛
 D. 宫颈脓性分泌物
 E. 体温超过 38.3℃
39. 早期流产的最常见原因是
 A. 胚胎染色体异常
 B. 免疫功能异常
 C. 黄体功能不足
 D. 宫颈口松弛
 E. 甲状腺功能减退症
40. 疾病的三间分布是指
 A. 国家、地区和城乡分布
 B. 职业、家庭和环境分布
 C. 短期波动、季节性和周期性分布
 D. 年龄、性别和种族分布
 E. 时间、地区和人群分布
41. 健康管理的首要步骤一般是
 A. 收集健康信息
 B. 人群的健康体检
 C. 健康维护计划的制订
 D. 健康维护计划的实施
 E. 疾病危险度评估
42. 粒细胞缺乏症的诊断标准是指外周血的中性粒细胞绝对数低于
 A. 0.2×10^9 B. 0.5×10^9
 C. 4.0×10^9 D. 1.5×10^9
 E. 3.0×10^9
43. 子宫内膜癌最常见的病理类型是
 A. 腺角化癌 B. 腺癌
 C. 透明细胞癌 D. 鳞腺癌
 E. 鳞癌
44. 基础代谢率低于正常范围的疾病是
 A. 白血病 B. 库欣综合征
 C. 垂体性肥胖症 D. 中暑
 E. 糖尿病
45. 细菌性阴道病的首选治疗药物是
 A. 头孢菌素 B. 青霉素
 C. 制菌霉素 D. 阿奇霉素
 E. 甲硝唑
46. 因肺结核引起的支气管扩张,湿啰音最常见的部位是
 A. 肺底部 B. 肺尖部
 C. 腋窝部 D. 肩胛间区
 E. 双肺弥漫
47. 含硫基的氨基酸是



- A. 半胱氨酸 B. 丝氨酸
C. 蛋氨酸 D. 脯氨酸
E. 鸟氨酸
48. 肉眼观察不能确定的坏死是
A. 凝固性坏死 B. 液化性坏死
C. 纤维素样坏死 D. 脂肪坏死
E. 干酪样坏死
49. 动脉粥样硬化性心脏病患者的膳食原则不包括
A. 提高植物性蛋白的摄入, 少吃甜食
B. 食盐摄入在 6~10g 之间
C. 供给充足的微量营养素和膳食纤维
D. 限制总能量摄入, 保持理想体重
E. 限制脂肪和胆固醇的摄入
50. 小儿死亡率最高的时期是
A. 学龄前期 B. 学龄期
C. 婴儿期 D. 幼儿期
E. 新生儿期
51. 下述生产性毒物中, 属于窒息性气体的是
A. 氢氰酸
B. 氯气
C. 氯乙烯
D. 一氧化氮
E. 苯
52. 用力牵拉肌肉时, 肌张力突然降低的原因是
A. 肌梭抑制 B. 拮抗肌抑制
C. 骨骼肌疲劳 D. 协同肌兴奋
E. 腱器官兴奋
53. 有些人在面对应激事件时易采用“钻牛角尖”的方式应对, 这种应对方式属于
A. 自我防御反应 B. 情绪反应
C. 行为反应 D. 生理反应
E. 认知反应
54. Meta 分析汇总异质性检查目的是检查各个独立研究结果的
A. 真实性 B. 同质性
C. 代表性 D. 敏感性
E. 可靠性
55. 双胎输血综合征见于
A. 双羊膜囊单绒毛膜单卵双胎
B. 双羊膜囊双绒毛膜单卵双胎
C. 单羊膜囊单绒毛膜单卵双胎
D. 双羊膜囊单绒毛膜双卵双胎
E. 单羊膜囊双绒毛膜单卵双胎
56. 卵巢纤维瘤常伴什么综合征
A. 美尼尔综合征 B. 唐氏综合征
C. 梅格斯综合征 D. 库欣综合征
E. 类癌综合征
57. 乳糜池临近的椎体是
A. T₁₁ B. T₁₂
C. L₁ D. L₂
E. L₃
58. 孕妇服用叶酸属于什么
A. 化学预防 B. 筛查
C. 健康咨询 D. 免疫接种
E. 药物治疗
59. 下列哪项不是表示疾病流行强度的指标
A. 暴发 B. 大流行
C. 短期波动 D. 散发
E. 流行
60. 根据《传染病防治法》规定, 需按照甲类传染病采取预防控制措施的乙类传染病是
A. 疟疾 B. 肺炭疽
C. 登革热 D. 梅毒
E. 肺结核
61. 严重甲状腺功能亢进患者的动脉血压变化特点是
A. 主要为收缩压升高
B. 收缩压与舒张压均升高
C. 主要为舒张压升高
D. 收缩压降低, 舒张压升高
E. 收缩压升高, 舒张压降低
62. 慢性肾衰出现下列情况, 需要紧急透析治疗的是
A. 血肌酐 (Scr) 700 μmol/L
B. 血钾 6.8 mmol/L
C. 血红蛋白 (Hb) 72 g/L
D. 血钠 130 mmol/L
E. 血钙 1.9 mmol/L
63. 与脊柱结核有关的体格检查方法是
A. 抽屈试验
B. 直腿抬高试验
C. “4”字试验
D. 拾物试验
E. 研磨试验
64. 尿蛋白的定义是 24 小时尿蛋白超过
A. 150mg B. 100mg

- C. 200mg
E. 300mg
65. 先天性巨结肠最常见的并发症是
A. 肠梗阻
C. 营养不良
E. 肠穿孔
B. 败血症
D. 小肠结肠炎
66. 符合骨折功能复位标准的是
A. 允许下肢骨折存在与关节活动方向垂直的侧方成角
B. 儿童下肢骨干骨折缩短 2cm 以内
C. 骨折部分的旋转移位不必完全矫正
D. 复位后骨折断端对位达 1/5
E. 骨折部分的分离移位不必完全矫正
67. 不属于腹膜内位器官的是
A. 阑尾
C. 横结肠
E. 乙状结肠
B. 回肠
D. 十二指肠降部
68. 属于骨折晚期并发症的是
A. 休克
C. 肝脾破裂
E. 神经损伤
B. 骨化性肌炎
D. 脂肪栓塞
69. 属于专职抗原提呈细胞(APC)的是
A. 中性粒细胞
C. 内皮细胞
E. 肥大细胞
B. 树突状细胞(DC)
D. NK 细胞
70. 骨折急救处理中不正确的是
A. 包扎伤口
B. 妥善的外固定
C. 首先抢救生命
D. 外露的骨折端立即复位
E. 迅速运往医院
71. 每当听到电话铃声的同时就听到辱骂自己的声音,该症状是
A. 心因性幻听
C. 反射性幻听
E. 功能性幻听
B. 元素性幻听
D. 假性幻听
72. 下列关于佐剂的叙述,错误的是
A. 佐剂是特异性免疫增强剂
B. 与抗原混合后可增强抗原在体内存留时间
C. 最常用于动物实验的是弗氏佐剂
D. 可刺激吞噬细胞,增加他对抗原的处理和呈递
E. 增强辅助性 T 细胞的作用
73. 参与联合脱氨基的酶是
A. NADH - 泛醌还原酶
B. HMGCoA 还原酶
C. 葡萄糖-6-磷酸酶
D. 谷氨酸脱氢酶
E. 丙酮酸脱氢酶
74. 可引起视神经炎的抗结核药是
A. 异烟肼
B. 利福平
C. 吡嗪酰胺
D. 乙胺丁醇
E. 链霉素
75. 不属于肠外营养(PN)制剂成分的是
A. 碳水化合物
B. 脂肪乳剂
C. 蛋白质
D. 非必需氨基酸
E. 复方氨基酸溶液
76. 由于 V2 受体缺陷引起的肾性尿崩症,其相关的水孔蛋白是
A. AQP - 4
C. AQP - 2
E. AQP - 3
B. AQP - 1
D. AQP - 5
77. 成熟红细胞利用葡萄糖的主要代谢途径是
A. 磷酸戊糖途径
B. 无氧酵解
C. 有氧氧化
D. 三羧酸循环
E. 糖原分解
78. 根据心身疾病的定义,以下不属于心身疾病的是
A. 原发性高血压
B. 腹股沟斜疝
C. 神经性皮炎
D. 消化性溃疡
E. 支气管哮喘
79. 教育部所属综合大学的附属医院发现脊髓灰质炎疫情,应当报告的部门是
A. 国家教育行政部门
B. 国家卫生行政部门
C. 国家疾病预防控制机构
D. 所在地的政府卫生行政部门
E. 所在地的疾病预防控制机构



A2 型选择题 (80—119 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

80. 张某,因妊娠异常需行剖宫产术,经治医师在告知孕妇丈夫手术相关信息并取得签字后实施手术。胎儿被取出后发现产妇患有双侧卵巢畸胎瘤,遂告知其丈夫并建议切除双侧卵巢。张某丈夫立即打电话与其他家属商议,医师在尚未得到家属商议结果的情况下,继续手术并切除双侧卵巢,于是发生医患纠纷。此案例中,医师侵犯的患方权利是
- A. 疾病认知权 B. 知情同意权
C. 隐私保护权 D. 生命权
E. 健康权
81. 男,45 岁。左颈部淋巴结进行性肿大 3 个月。淋巴结活检病理结果示弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。最可能出现的细胞免疫表型是
- A. CD₁₀⁺ B. CD₁₃⁺
C. CD₂₀⁺ D. CD₅⁺
E. CD₃₄⁺
82. 为了解 5 年内城市人口高血压的患病情况,随机抽取城市人口的 15% 进行调查,为防止调查产生偏倚,下列措施不正确的是
- A. 对于那些检查血压时不肯合作的人应以较合作的人代替
B. 对 5 年内死亡的调查人群的成员应追踪其死亡是否与高血压有关
C. 应当使用统一的血压计
D. 应反复多次对调查人群观察、测量
E. 对 5 年期间调查人群中搬出该城市的那部分人应尽量查明新地址继续测量他们的血压变化情况
83. 男,31 岁。4 个月来工作较累,近 4 周出现兴趣缺乏,易疲劳,言语少,动作迟缓,自觉脑子笨,没有以前聪明,早醒,食欲减退,腹胀,便秘,全身酸痛,有时感心慌气紧。总觉自己患了不治之症,给家庭带来许多麻烦。你认为该患者最可能的诊断是
- A. 焦虑症 B. 神经衰弱
C. 疑病症 D. 抑郁症
E. 心身疾病
84. 小王,女,24 岁。硕士研究生毕业后参加工作。1 年来对上级领导布置的任务总感觉不能胜任,屡屡出错,受到多次批评后内心受挫,选择了辞职。小王的这种选择在应激反应属于
- A. 认知反应 B. 生理反应
C. 情绪反应 D. 行为反应
E. 防御反应
85. 女,7 岁。肾病综合征初治,体重 23kg,泼尼松每次 25mg,每天 2 次,治疗 2 周后,水肿消失,3 周时尿蛋白转阴。此时判断该患儿疗效为
- A. 激素部分敏感 B. 激素依赖
C. 激素不耐受 D. 激素敏感
E. 激素耐药
86. 女,32 岁。现左乳房包块 10 天,无不适症状。查体:乳房视诊无异常,左乳房外上象限可触及 1.5×1.5cm 包块,质硬,活动度良好,左腋窝未触及肿大淋巴结。钼靶 X 线片检查示 1.5×1.0cm 密度增高影,周边有小毛刺,中央可见聚集细小钙化点。术后 10 天拟行综合治疗,决定是否可用靶向治疗(曲妥珠单抗)的肿瘤标记物是
- A. ER B. Her-2
C. P₅₃ D. Ki₆₇
E. PR
87. 男,43 岁。因反复咳嗽 1 个月到社区卫生服务中心就诊。医生与其交谈中得知该患者已经吸烟 20 多年,4 年前曾经尝试戒烟 1 个月并得到家人的支持和鼓励。但后来患者由于听说戒烟会生病等传闻而不再考虑戒烟。针对该患者的情况,根据提高患者戒烟动机的干预措施的“5R”法,此时医生应侧重于采用下列哪项措施进行干预
- A. 建议改吸低焦油卷烟
B. 使患者认识到戒烟可能的障碍
C. 强调吸烟与其家人健康的相关性
D. 指出二手烟暴露的健康危害
E. 说明戒烟的益处
88. 某医师随机抽取性别、病情严重程度等条件相近的红斑狼疮患者 28 例,随机等分为两个治疗组。

一个疗程后检测 dsDNA 抗体滴度(倒数)资料如下:抗体滴度(倒数)为阴性时,甲、乙两组各 1 人;滴度为 10 时,甲组 1 人乙组 0 人;滴度为 40 时,甲组 1 人乙组 2 人;滴度为 60 时,甲组 2 人乙组 0 人;滴度为 80 时,甲组 1 人乙组 0 人;滴度为 120 时,甲组 1 人乙组 5 人;滴度为 320 时,甲组 1 人乙组 0 人;滴度为 480 时,甲组 1 人乙组 2 人;滴度为 560 时,甲组 2 人乙组 2 人;滴度为 1240 时,甲组 1 人乙组 2 人;滴度为 1240 以上时,甲组 2 人乙组 0 人。该资料分析可选用

- A. χ^2 检验
B. 秩和检验
C. t 检验
D. Z 检验
E. 方差分析

89. 女,60 岁。纳差、上腹部不适 4 年。胃镜检查示:胃黏膜变薄,皱襞稀疏。实验室检查:Hb 86g/L, MCV 102fl。该患者应主要补充的维生素是

- A. 维生素 C
B. 维生素 A
C. 维生素 E
D. 维生素 K
E. 维生素 B₁₂

90. 女,1.6 岁。近半年发现尿有怪臭味,1 岁时发现智力较同龄儿童低,鼠尿味,近 1 个月经常抽搐发作。体检:表情呆滞,毛发棕黄,面部湿疹,皮肤白皙。应采取的治疗措施是

- A. 观察,抽搐时给予止抽搐药物
B. 口服甲状腺片
C. 静推 10% 葡萄糖酸钙,同时口服维生素 D
D. 限制苯丙氨酸摄入量
E. 口服碘化钾

91. 男,40 岁,张某。因手术效果不佳与医院发生争议,要求复制病历资料。医院按照规定复制了病历资料,并告知陈某另有部分病历资料不予复制,只能在医患双方在场的情况下封存。这部分病历资料是

- A. 病程记录
B. 医学影像检查资料
C. 手术及麻醉记录单
D. 住院志
E. 医嘱单

92. 某糖尿病患者为了控制血糖,在医生的建议下准备和营养师一起制定一份饮食计划。患者家属表示积极配合,本人也了解饮食控制的好处,但总认为无法管住自己,计划难以实施。对于这样的患者的干预重点是

- A. 提高自我效能
B. 培养行为能力
C. 建立支持性环境
D. 提供社会支持

E. 提高结果预期

93. 医疗机构应对无正当理由开具抗菌药物超常处方达到一定次数的医师提出警告。应当予以警告的最低次数是

- A. 2 次
B. 6 次
C. 3 次
D. 4 次
E. 5 次

94. 医师张某与一药厂达成协议后,在处方时使用了该药厂生产的药品,并接受了该厂给予的提成。对于张某的违法行为,有权决定给予行政处分并没收其违法所得的部门是

- A. 药品监督管理部门
B. 工商行政管理部门
C. 监察部门
D. 消费者权益保护协会
E. 卫生行政部门

95. 某人做事总是风风火火,速度很快,脾气暴躁,缺乏耐性,而且时不时会出些错误。其气质类型属于

- A. 胆汁质
B. 多血质
C. 黏液质
D. 多动力
E. 抑郁质

96. 医师对同一个患者申请一天备血达到或超过一定数量时,必须报医院医务部门批准。该血量是

- A. 1 600ml
B. 1 400ml
C. 800ml
D. 1 000ml
E. 1 200ml

97. 女,46 岁。被发现昏倒在煤气热水器浴室内。查体:浅昏迷, BP 160/90mmHg,口唇樱红色,四肢无瘫痪,尿糖(+ +),尿酮体(-)。最可能的诊断是

- A. 阿托品中毒
B. 一氧化碳中毒
C. 乙醇中毒
D. 有机磷杀虫药中毒
E. 糖尿病酮症酸中毒

98. 女,37 岁。腹泻 1 天。1 天前进食海产品后出现腹泻。大便 30 余次,为米泔样便。查体:P 110 次/分, BP 80/50mmHg,皮肤干燥,弹性稍差,眼窝凹陷。血常规:Hb 162g/L, WBC $13.7 \times 10^9/L$, N 0.85, PLT $142 \times 10^9/L$ 该患者腹泻的发病机制是

- A. 肠黏膜细胞内 cAMP 水平升高,过度分泌水及电解质
B. 胆汁分泌减少引起胃肠功能紊乱
C. 主要由于结肠、乙状结肠肠管麻痹
D. 主要由于脏器的实质性损害
E. 与致病菌引起的侵袭性病变有关

99. 女, 30 岁。近 2 个月中度发热, 全身肌痛, 四肢关节肿痛, 口腔溃疡。尿常规示: 红细胞 (+)/高倍视野, 蛋白 (++)。免疫学检查最可能出现的抗体是
- A. 抗核抗体 B. 抗 Jo-1 抗体
C. 抗 Scl-70 抗体 D. 类风湿因子
E. 抗中性粒细胞胞浆抗体
100. 女, 35 岁。早饱、体重下降 1 年。每餐进食约 50g 固体食物即感上腹部饱胀而无法继续进食。胃镜检查: 黏膜光滑、花斑, 以红为主。该患者胃运动障碍主要为
- A. 胃体蠕动减弱
B. 胃窦蠕动减弱
C. 胃底容受性舒张障碍
D. 胃排空延迟
E. 幽门痉挛
101. 男, 46 岁。右季肋区疼痛 4 月。既往有乙型肝炎病毒性肝病 8 年。B 超检查见肝右叶巨大肿块。血 AFP 增高。符合该肿瘤病理学特点的是
- A. 肿瘤组织间质较多
B. 癌细胞呈腺管状排列
C. 癌细胞分泌黏液且血管少
D. 癌细胞与肝细胞类似
E. 发生于肝内胆管上皮最常见
102. 女, 67 岁。手关节痛伴晨僵 4 年。查体: 双手近端和远端指间关节压痛, 无软组织肿胀, 远端指间关节变形, 可见多个 Heberden 结节。化验: ESR 22mm/h, 类风湿因子 22U/L(正常), 抗 CCP 抗体阴性。X 线片示远端指间关节半脱位。最可能的诊断是
- A. 强直性脊柱炎 B. 骨关节炎
C. 类风湿关节炎 D. 风湿性关节炎
E. 银屑病关节炎
103. 男, 72 岁。间断咳嗽, 咳痰 12 年, 加重伴气短 2 天就诊。吸烟 45 余年, 每天约 1 包。胸部 X 线片示双肺纹理粗乱。动脉血气示: pH 7.34, PaCO₂ 48mmHg, PaO₂ 55mmHg。该患者氧疗的最佳方式是
- A. 持续低流量吸氧
B. 无重复呼吸面罩吸氧
C. 气管插管、机械通气
D. 无创通气
E. 普通面罩吸氧
104. 女, 42 岁。向心性肥胖伴乏力 2 年。查体: BP 180/110mmHg, 满月脸、多血质, 皮肤可见宽大紫纹, 血糖 12.6mmol/L, 血钾 3.7mmol/L, 尿皮质醇增高, 小剂量地塞米松试验不能抑制, 但大剂量地塞米松试验能抑制。为明确病因, 除肾上腺 CT 检查外, 最需要进行的检查是
- A. 鞍区 MRI B. 肾区 B 超
C. 胸部 CT D. 肾动脉造影
E. 头颅 X 线平片
105. 女, 28 岁。恶心、呕吐、乏力、头晕 6 天。近 2 个月体重减低, 皮肤变黑。查体: BP 90/60mmHg, 心率 84 次/分, 立位 BP 75/50mmHg, 心率 99 次/分, 身高 169cm, 体重 50kg, 皮肤黑, 甲状腺 I 度肿大。心、肺、腹未见异常。实验室检查: 血钠 124mmol/L, 血钾 5.8mmol/L, 血糖 3.5mmol/L。该患者最可能的诊断是
- A. 甲状腺功能减退
B. 垂体卒中
C. 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症
D. 慢性肾衰竭
E. 真菌感染
106. 女, 26 岁。车祸后昏迷 2 周。查体: 昏迷, 压眶反射消失, 颈后仰伸, 四肢强直性伸直, 上肢内收、过度旋前和下肢内收、内旋、踝跖屈。该患者的损害水平在
- A. 脊髓 B. 脑干
C. 大脑皮层 D. 小脑
E. 基底节
107. 女, 53 岁, 某乡镇企业负责人。4 个月前被确诊为乳腺癌并接受了手术治疗。术后患者仅休息了 2 个月, 便全身心投入了工作, 同病前一样从事日常工作, 参加各种会议和活动。对于自己身体的康复情况并不重视, 不按要求到医院复查, 也不愿再接受任何其他的治疗。该女性角色行为改变类型属于
- A. 角色行为冲突 B. 角色行为缺如
C. 角色行为异常 D. 角色行为减退
E. 角色行为强化
108. 女, 26 岁。甲状腺右叶包块 3 年, 无不适症状, 包块增大缓慢。B 超示包块内有点状钙化。行甲状腺右叶和峡部全切, 左叶次全切除术。根据术后病理报告判断为预后良好的一种恶性肿瘤, 但需终身服用甲状腺素片治疗。病理诊断的主要

依据是

- A. 有复杂分支乳头样结构
 B. 可见印戒细胞
 C. 腺腔高度扩张呈囊状
 D. 含大量黏液
 E. 癌巢少而间质纤维组织多
109. 女, 3 岁。发热、呕吐 1 周, 双眼呆滞 1 天。查体: 消瘦明显, 颈项强直。经治疗无效死亡。尸体解剖见脑膜血管扩张淤血, 脑底蛛网膜下腔见灰白色胶样渗出物聚集, 以脑桥、脚间池、视神经交叉处最明显, 并见灰白色粟粒大小结节弥漫分布。镜下见渗出物中有淋巴细胞、单核细胞、纤维素及肉芽肿。最可能的诊断是
- A. 流行性乙型脑炎 B. 化脓性脑脊髓膜炎
 C. 真菌性脑膜炎 D. 结核性脑膜炎
 E. 多发性脑脓肿
110. 女, 52 岁。双下肢水肿 9 年余, 晨轻暮重, 无眼睑水肿和泡沫尿。查体: BP 130/70mmHg, 双肺呼吸音清, 心界不大, 心率 87 次/分, 律齐。腹软, 肝脾肋下未触及, 移动性浊音阴性, 双下肢见凹陷性水肿, 浅静脉呈蚯蚓状改变。该患者下肢水肿的最可能原因是
- A. 下肢静脉压增高 B. 血浆胶体渗透压降低
 C. 心肌收缩力降低 D. 血浆晶体渗透压降低
 E. 淋巴液回流受阻
111. 男, 50 岁。活动时喘憋渐加重, 出现夜间憋醒。高血压病史 10 年余。超声心动图示: 左心房、左心室扩大, LVEF 38%。患者喘憋的机理为
- A. 左心室充盈压明显降低
 B. 左心室舒张功能明显受损
 C. 左心室每搏功明显高于右心室每搏功
 D. 左心室心搏出量明显少于右心室心搏出量
 E. 心室搏出量占心室舒张末容积的百分比明显降低
112. 女, 21 岁。4 天前受凉后“感冒”, 症状已好转。1 小时前参加篮球比赛后出现气促。查体: 双肺散在哮鸣音, 心率 84 次/分。该患者发病最可能的机制是
- A. 肺血管阻力增加 B. 心力衰竭
 C. 神经调节失衡 D. 气道高反应性
 E. 气道重构
113. 男, 18 岁。午餐进食海鱼后, 即出现头痛、头晕、胸闷。心跳呼吸加快, 伴有眼结膜充血, 颜面部及全身潮红。测体温正常, 无呕吐、腹泻等症状。患者最可能是
- A. 河豚中毒 B. 组胺中毒
 C. 肉毒梭菌毒素中毒 D. 麻痹性贝类中毒
 E. 副溶血性弧菌中毒
114. 女, 45 岁。因阵发性室上性心动过速行射频消融治疗, 术中患者突然出现胸闷、烦躁、呼吸困难。查体: BP 80/70mmHg, 颈静脉怒张, 两肺呼吸音清, 心界向两侧扩大。心率 120 次/分, 律齐。各瓣膜听诊区未闻及杂音, 奇脉 (+)。导致其临床表现机制是
- A. 心排血量增加, 静脉压升高
 B. 心排血量不变, 静脉压升高
 C. 心排血量下降, 静脉压降低
 D. 心排血量增加, 静脉压降低
 E. 心排血量下降, 静脉压升高
115. 女, 74 岁。右手震颤伴动作缓慢 8 年, 翻身困难 1 年。诊断为帕金森病。有青光眼和轻度肾功能不全病史。无消化性溃疡史。服用复方左旋多巴时症状改善明显, 近 1 年来疗效减退, 单剂疗效仅 3 小时。为改善症状, 最适合增加的药物是
- A. 溴隐亭 B. 金刚烷胺
 C. 司来吉兰 D. 苯海索
 E. 苯甲托品
116. 女, 64 岁, 家庭主妇, 初中文化程度。糖尿病史, 医生给予的饮食建议, 容易理解和执行的说法是
- A. “您每天摄入热量不能超过 1 200kcal。”
 B. “您必须严格控制饮食, 要低盐、低脂、低糖饮食。”
 C. “每顿饭主食 2 两, 少吃油腻的。”
 D. “不吃甜食。稀饭、甘蔗、西瓜、甜饮料, 少吃肉、油, 可吃点粗粮。”
 E. “您一定要管住自己的嘴, 原来爱吃的都不能吃了。”
117. 患儿, 女。出生后表现持续性鹅口疮, 10 个月后因真菌性肺炎死亡。尸检发现其胸腺发育不全。此患儿发生持续感染主要由于
- A. 继发性免疫缺陷 B. 细胞免疫缺陷
 C. 体液免疫缺陷 D. 吞噬细胞缺陷
 E. 补体系统缺陷
118. 男, 25 岁。在心理咨询中谈到所交的两个女朋友他都很喜欢, 不知道该与哪个继续相处, 难以做出抉择, 希望得到帮助, 而根据心理治疗的原则,

心理咨询师没有替他作出决定。该咨询师遵循的原则是

- A. 灵活原则
B. 综合原则
C. 中立性原则
D. 耐心原则
E. 回避原则

119. 女, 33岁, 公司员工。因感冒去医院看病, 医生帮他测量血压。这是

- A. 医疗性体检
B. 社会性体检
C. 机会性筛检
D. 定期健康体检
E. 随机性筛检

A3/A4 型选择题 (120—137 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(120—122 题共用题干)

孙某因患严重躁狂抑郁障碍, 正在精神病专科医院住院治疗。因病情恶化, 患者出现伤人毁物等行为, 医院在没有其他可替代措施的情况下, 对其实施了约束身体的措施, 但实施后没有及时通知孙某的监护人。孙某的父亲作为监护人探视时, 看到儿子被捆绑在病床上非常气愤。

120. 依照《精神卫生法》对患者孙某实施约束行为的性质属于

- A. 治疗性措施
B. 惩罚性措施
C. 保护性医疗措施
D. 诊断性措施
E. 警告性措施

121. 对患者孙某实施身体约束而未告知其监护人的做法, 侵犯的患方权利是

- A. 生命权
B. 健康权
C. 认知权
D. 知情权
E. 名誉权

122. 该案例中所形成的医患关系模式是

- A. 主动被动型
B. 指导合作型
C. 契约许可型
D. 指导参与型
E. 共同参与型

(123—125 题共用题干)

用钼靶 X 线摄片检查方法做乳腺癌的筛检试验, 分别检查了 100 名经活检确诊为乳腺癌的妇女和 100 名未患乳腺癌的妇女, 结果如下: 乳腺癌妇女筛查结果阳性 64 例, 阴性 36 例; 非乳腺癌妇女筛查结果阳性 16 例, 阴性 84 例。

123. 此项筛检试验中灵敏度为

- A. 16%
B. 84%
C. 64%
D. 36%
E. 74%

124. 此项筛检试验中特异度为

- A. 16%
B. 84%
C. 64%
D. 36%
E. 74%

125. 此项筛检试验的粗一致率为

- A. 16%
B. 84%
C. 64%
D. 36%
E. 74%

(126—128 题共用题干)

男, 53 岁。肝硬化腹水。近 1 周发热、腹胀, 稍有呼吸困难, 腹水较前增长, 心率 96 次/分, 应用呋塞米治疗 2 天后出现沉默寡言、性格改变。

126. 下列检查哪项最可能正常

- A. 血钾钠氯离子测定
B. 血氨
C. 脑电图
D. 扑翼样震颤检查
E. 腹水常规

127. 下列患者的异常中最不可能包括

- A. 血钾升高
B. 血氨升高
C. 脑电图正常
D. 扑翼样震颤
E. 腹水常规检查呈渗出性

128. 下列治疗较不合适的是

- A. 静脉补钾
B. 抗生素早期, 足量联合应用
C. 乳果糖口服
D. 精氨酸静脉滴注
E. 复方氨基酸静脉滴注

(129—130 题共用题干)

男, 33 岁。心悸、怕热、手颤、乏力 1 年, 大便不成形, 3~4 次/天, 体重下降 11kg。查体: P 90 次/分, 血

压 128/90mmHg, 皮肤潮湿, 双手细颤, 双眼突出, 甲状腺弥漫 II 度肿大, 可闻及血管杂音, 心率 105 次/分, 心律不齐, 心音强弱不等, 腹平软, 肝脾肋下未及, 双下肢无水肿。

129. 本例心律不齐最可能是

- A. 窦性心律不齐
- B. 阵发性期前收缩
- C. 心房颤动
- D. 心房扑动
- E. 二度房室传导阻滞

130. 本患治疗首选是

- A. 丙硫氧嘧啶
- B. 立即行甲状腺大部分切除
- C. 核素¹³¹I
- D. 心得安
- E. 复方碘溶液

(131—134 题共用题干)

男, 55 岁。右下肢静脉迂曲扩张 16 年, 伴下肢酸胀, 水肿, 活动或抬高患肢减轻, 近 1 年右足靴区皮肤发红, 时有瘙痒, 逐渐加重, 查体右下肢大腿内侧、小腿后可见迂曲扩张静脉团, 足靴区色素沉着, 皮肤变厚。

131. 该患者属于哪一类病变

- A. 下肢静脉回流障碍
- B. 下肢静脉倒流性疾病
- C. 动静脉瘘
- D. 静脉瘤
- E. 以上均不是

132. 为进一步明确病因应进行哪项检查

- A. 下肢皮温测定
- B. 下肢静脉压测定
- C. 静脉多普勒血流检查
- D. 静脉造影
- E. 深静脉瓣功能试验

133. 为明确手术治疗方法, 术前必须进行哪项检查

- A. 下肢皮温测定
- B. 下肢静脉压测定
- C. 下肢多普勒超声检查
- D. 右下肢静脉造影
- E. 深静脉瓣功能试验

134. 该患者可能发生的严重并发症是

- A. 右小腿溃疡
- B. 血栓性浅静脉炎
- C. 右下肢坏死
- D. 溃疡破裂出血
- E. 右踝关节强直

(135—137 题共用题干)

女, 16 岁, 学生。不出门怕见人, 不去上课, 纠缠父母出钱给自己做美容手术半年。原因是半年来反复照镜子发现自己的鼻子比以前变大了, 难看了。说班上的同学都讥笑她, 出门就感觉别人在说她, 别人的眼光看她时很特别, 能使她头痛。父母不愿意出钱就说父母不关心她, 父母不是亲生的, 曾说要去亲子鉴定。

135. 该患者的精神症状中不存在

- A. 关系妄想
- B. 物理影响妄想
- C. 非血统妄想
- D. 被控制妄想
- E. 非幻觉性知觉障碍

136. 如给予药物治疗, 下列不属于抗精神病药的是

- A. 氟哌啶醇
- B. 氟奋乃静
- C. 氟西汀
- D. 氯氮平
- E. 三氟拉嗪

137. 判断一种抗精神病药是否有效至少要足量使用的时间是

- A. 4 周
- B. 5 周
- C. 6 周
- D. 7 周
- E. 8 周

B1 型选择题 (138—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题, 每组试题共用 5 个备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(138—139 题共用备选答案)

- A. 极化
- B. 去极化
- C. 复极化
- D. 超极化
- E. 反极化

138. 细胞受刺激兴奋时, 膜电位负值减小, 称为

139. 安静时细胞两侧存在电位差的状态, 称为

(140—142 题共用备选答案)

- A. 脊髓胸段
- B. 脊髓颈膨大
- C. 脊髓圆锥
- D. 脊髓高位段
- E. 马尾

140. 双上肢正常,双下肢中枢性瘫痪的病变部位是
 141. 双下肢周围性瘫痪的病变部位是
 142. 四肢中枢性瘫痪的病变部位是

(143—144 题共用备选答案)

- A. 心交感神经冲动增多
- B. 交感缩血管纤维冲动增多
- C. 心迷走神经冲动增多
- D. 窦神经冲动增多
- E. 交感舒血管纤维冲动增多

143. 颈动脉窦灌注压升高时,诱发降压反射的起因是
 144. 体位性低血压恢复正常时,心率加快的原因是

(145—146 题共用备选答案)

- A. 先兆流产
- B. 不全流产
- C. 稽留流产
- D. 难免流产
- E. 复发流产

145. 可引起失血性休克的是

146. 会导致凝血障碍的是

(147—148 题共用备选答案)

- A. 出血性大肠埃希菌肠炎
- B. 真菌性肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌肠炎
- D. 侵袭性大肠杆菌肠炎
- E. 空肠弯曲菌肠炎

147. 起病急,高热 40℃,粪便呈黏液和脓血,诊断是
 148. 继发于大剂量应用抗生素后,大便为暗绿色水样便,镜检发现大量脓细胞,诊断是

(149—150 题共用备选答案)

- A. 乳腺癌
- B. 乳管内乳头状瘤
- C. 乳房肉瘤
- D. 乳房纤维瘤
- E. 乳房囊性增生病

149. 因雌孕激素分泌失调导致乳腺实质细胞增生过度和复旧不全引起的疾病是
 150. 因小叶纤维细胞对雌激素敏感性异常增生而引起的疾病是

第二单元

A1 型选择题 (1—55 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 引起医院内获得性肺炎的常见致病菌中,占比最高的是
A. 金黄色葡萄球菌 B. 革兰阴性杆菌
C. 肺炎球菌 D. 真菌
E. 病毒
- 最容易发生急性肾损伤的肾病综合征病理类型是
A. 膜性肾病
B. 脂性肾病
C. 系膜增生性肾炎
D. 局灶性节段性肾小球硬化
E. 系膜毛细血管性肾炎
- 与动脉粥样斑块表面的纤维帽形成关系密切的细胞是
A. 平滑肌细胞 B. 内皮细胞
C. 成纤维细胞 D. 单核细胞
E. 淋巴细胞
- 二尖瓣狭窄患者出现急性左心衰竭时,一般不宜采用的治疗措施是
A. 面罩吸氧 B. 静脉注射呋塞米
C. 静脉注射西地兰 D. 静脉滴注硝酸甘油
E. 无创通气
- 胆囊动脉最多来源于
A. 肝总动脉 B. 肝固有动脉
C. 胃十二指肠动脉 D. 腹腔干
E. 肝右动脉
- 休克代偿期,大量儿茶酚胺释放,但不减少血液供应的脏器是
A. 肺 B. 肝
C. 心 D. 肾
E. 肠
- 垂体后叶储存的激素是
A. 抗利尿激素 B. 生长激素
C. 促肾上腺皮质激素 D. 促甲状腺激素
E. 泌乳素(PRL)
- 类风湿关节炎(RA)的自身抗体检查中,主要检测的是哪种类型的类风湿因子(RF)
A. IgM B. IgA
C. IgG D. IgE
E. IgD
- 柯萨奇病毒感染人体引发糖尿病的机制是
A. 淋巴细胞的多克隆激活
B. 表位拓展
C. 分子模拟
D. 自身抗原的改变
E. 隐蔽抗原的释放
- 医疗卫生机构发现重大食物中毒事件后,应当在规定的时限内向所在地县级卫生行政部门报告。该时限是
A. 2 小时 B. 1 小时
C. 6 小时 D. 12 小时
E. 24 小时
- 出现颞叶钩回疝时,有定位意义的瞳孔变化是
A. 患侧瞳孔逐渐扩大
B. 患侧瞳孔逐渐缩小
C. 双侧瞳孔散大
D. 双侧瞳孔缩小
E. 双侧瞳孔大小多变
- 关于妊娠期母体内分泌系统改变的描述,正确的是
A. 皮质醇减少
B. PRL 增多
C. FSH 增多
D. 游离甲状腺激素增多
E. LH 增多

13. 小儿结核性脑膜炎常引起神经损害但不包括
A. 第7对 B. 第6对
C. 第5对 D. 第4对
E. 第3对
14. 长期缺乏维生素 B₁ 引起的疾病是
A. 坏血病 B. 夜盲症
C. 癞皮病 D. 脚气病
E. 佝偻病
15. 下述病原体中, 血浆凝固酶(+)的是
A. 肺炎克雷伯杆菌 B. 大肠埃希菌
C. 铜绿假单胞菌 D. 金黄色葡萄球菌
E. 流感嗜血杆菌
16. 下列疾病中, 最常出现 II 型呼吸衰竭的是
A. 肺结核 B. 矽肺
C. 膈肌麻痹 D. 特发性肺纤维化
E. 肺水肿
17. 系统性红斑狼疮的心血管损害中, 最多见的是
A. 心肌炎 B. 心内膜炎
C. 心包炎 D. 心功能不全
E. 心律失常
18. 原发性肾小球疾病的发病机制, 多数是
A. 链球菌感染所致
B. 病毒感染所致
C. 药物所致
D. 免疫介导性炎症所致
E. 遗传变异基因所致
19. 下列属于糖尿病自主神经病变表现的是
A. 直立性低血压
B. 动眼神经麻痹
C. 肌紧张减低
D. 共济失调
E. 肢端感觉异常
20. 与速发型哮喘反应有关的细胞是
A. 中性粒细胞 B. 肥大细胞
C. 淋巴细胞 D. 嗜碱性粒细胞
E. 巨噬细胞
21. 引起慢性心衰的继发性心肌损害是
A. 冠状动脉硬化性心脏病
B. 扩张型心肌病
C. 肥厚性心肌病
D. 结缔组织病
E. 线粒体肌病
22. 下列中哪项不可用于鉴别脾大与左上腹包块
A. 脾脏位于左肋缘下
B. 脾脏不随呼吸上下移动
C. 脾大部位叩诊浊音, 并与左下胸腔浊音区相连
D. 可触及 1~2 个脾切迹
E. 脾脏在腹壁前面较易触及
23. 无功能性垂体腺瘤可能分泌的是
A. α 亚单位 B. LH
C. 促甲状腺激素 D. PRL
E. 生长激素
24. 在肺源性心脏病治疗中可引起碱中毒的药物是
A. 呼吸兴奋剂 B. 袢利尿剂
C. 强心剂 D. 镇静剂
E. 血管扩张剂
25. 心脏骤停发生时最常见的心电图表现是
A. 室性停搏 B. 窦性停搏
C. 无脉电活动 D. 心房颤动
E. 心室颤动
26. 能改善稳定型心绞痛患者临床预后的药物是
A. 速效救心丸
B. 硝苯地平
C. 单硝酸异山梨酯
D. 硝酸甘油
E. 阿司匹林
27. 转复长 QT 间期所致尖端扭转型室速的最适宜药物是
A. 肾上腺素 B. 利多卡因
C. 普罗帕酮 D. 硫酸镁
E. 胺碘酮
28. Froment 征主要用于检查
A. 手部肌腱损伤情况
B. 手指末梢血运情况
C. 神经损伤情况
D. 神经损伤后恢复情况
E. 血管损伤情况
29. 属于弥漫性结缔组织病的疾病是
A. 强直性脊柱炎 B. 痛风性关节炎
C. 类风湿关节炎 D. 未分化脊柱关节病
E. 纤维肌痛综合征
30. 心室肌有效不应期的长短主要取决于
A. 动作电位 0 期去极化的速度
B. 动作电位 1 期的长短



- C. 动作电位 2 期的长短
D. 动作电位 3 期的长短
E. 阈电位水平的高低
31. 弥漫性硬化性肾小球肾炎的肾脏表现为
A. 大红肾
B. 颗粒性固缩肾
C. 大白肾
D. 蚤咬肾
E. 瘢痕性固缩肾
32. 刺激小肠黏膜释放胆囊收缩素的作用最强的物质是
A. 盐酸
B. 蛋白质分解产物
C. 脂酸钠
D. 脂肪
E. 糖类
33. 属于抑癌基因的是
A. Rb
B. ras
C. mys
D. c - erbB - 2
E. sis
34. 急性肺水肿最特异的临床表现是
A. 肺动脉瓣区第二心音亢进
B. 心尖区收缩期杂音
C. 咳大量粉红色泡沫痰
D. 左肺底湿啰音
E. 气促、发绀
35. 血管疾病时伴发的精神障碍主要表现为
A. 幻觉
B. 妄想
C. 抑郁
D. 焦虑、紧张
E. 思维迟钝
36. Beck 三联征是指
A. 血压突然下降, 颈静脉显著怒张, 心音低钝遥远
B. 血压突然下降, 颈静脉显著怒张, 心音增强
C. 血压突然下降, 颈静脉显著塌陷, 心音低钝遥远
D. 血压突然下降, 颈静脉显著塌陷, 心音增强
E. 血压突然升高, 颈静脉显著怒张, 心音低钝遥远
37. 胸腔积液的乳酸脱氢酶与血清乳酸脱氢酶比值 > 0.6, 常提示
A. 癌性胸腔积液
B. 结核性胸腔积液
C. 良性胸腔积液
D. 渗出性胸腔积液
E. 漏出性胸腔积液
38. 与急性梗阻性化脓性胆管炎实验室检查结果不符合的是
A. 碱性磷酸酶升高
B. 尿胆红素阳性
C. 尿胆原升高
D. 血清结合胆红素升高
E. 白细胞计数升高
39. 局限性胸痛, 按压后疼痛加重, 提示病变主要累及的部位是
A. 邻近胸膜肺组织
B. 胸壁软组织
C. 脏层胸膜
D. 肋间神经
E. 壁层胸膜
40. 成人巨大睾丸鞘膜积液, 最佳治疗措施是
A. 睾丸鞘膜翻转
B. 鞘膜囊全部切除
C. 等待自行吸收消退
D. 内环处高位结扎鞘状突
E. 鞘膜积液穿刺抽液
41. 有关低血糖症的论述, 正确的是
A. 口服 α -葡萄糖糖苷酶抑制剂易发生低血糖
B. 低血糖可伴有精神症状
C. 部分 2 型糖尿病可表现为低血糖
D. 胰岛素瘤较少出现空腹低血糖
E. 腺垂体功能减退低血糖时血胰岛素升高
42. 骨盆直肠窝脓肿最主要的特点是
A. 排尿困难
B. 肛周持续性剧痛
C. 肛周红肿明显
D. 全身中毒症状严重
E. 排便疼痛 - 缓解 - 便后再痛
43. 机体维生素 B₁₂ 缺乏最常见的病因是
A. 摄入减少
B. 吸收障碍
C. 需要量增加
D. 利用障碍
E. 排出增加
44. 急性阑尾炎早期出现脐周疼痛是由于
A. 胃肠道反射性痉挛
B. 内脏神经反射
C. 内脏功能紊乱
D. 壁腹膜炎刺激
E. 脏腹膜炎刺激
45. 急性血吸虫病虫卵结节中浸润的细胞主要是
A. 中性粒细胞
B. 嗜酸性粒细胞
C. 嗜碱性粒细胞
D. 浆细胞
E. T 淋巴细胞
46. 胃印戒细胞癌的组织学类型属于
A. 腺癌
B. 鳞癌
C. 鳞腺癌
D. 未分化癌
E. 类癌

47. 下列疾病治疗后最易继发肛痿的是
 A. 肛周脓肿 B. 内痔
 C. 外痔 D. 混合痔
 E. 肛裂
48. 假性粒细胞减少是由于
 A. 免疫性破坏过多 B. 分布异常
 C. 释放障碍 D. 无效造血
 E. 骨髓造血干细胞异常
49. 鹿角形结石引起泌尿道的病理生理改变, 最严重的后果是
 A. 尿路梗阻
 B. 尿路感染
 C. 尿路上皮恶变
 D. 肾积水
 E. 尿毒症
50. 与动静脉血栓形成及反复流产相关的自身抗体是
 A. 抗 SSA 抗体 B. 抗核抗体
 C. 抗 Sm 抗体 D. 抗 dsDNA 抗体
 E. 抗心磷脂抗体
51. 胆碱酯酶复活剂的药理作用不包括
 A. 提高全血胆碱酯酶活性
 B. 恢复被抑制的胆碱酯酶活性
 C. 恢复已经老化的胆碱酯酶的活性
 D. 与磷酸化胆碱酯酶中的磷形成结合物
 E. 减轻烟碱样症状
52. 直肠手术后肛门失禁的主要原因是术中损伤了
 A. 肛管内括约肌 B. 肛管外括约肌
 C. Treitz 肌 D. 排便控制中枢
 E. 肛管直肠环
53. 右手环指远端缺损骨外露, 下列哪种方法不适采用
 A. 缩短指骨, 缝合皮肤 B. 中厚皮片植皮
 C. 带蒂皮瓣移植 D. 推进皮瓣移植
 E. 鱼际皮瓣转位
54. 符合扩张型心肌病临床表现的是
 A. 患者血压明显升高, 查体: BP 200/130mmHg, 眼底出血渗出、视盘水肿, 实验室检查: 肾功能不全
 B. 患者血压明显升高, 伴有剧烈头痛、呕吐、抽搐
 C. 患者平日有心悸、胸痛、劳力时气促、起立或运动时眩晕, 查体: 胸骨左缘第 3~4 肋间可闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音, 屏气时杂音增强
 D. 患者 1 周前出现发热, 全身无力, 现自觉心悸、胸闷, 查体: 心率 120 次/分, 偶闻及室性期前收缩, 实验室检查: 心肌肌酸激酶、肌钙蛋白增高
 E. 患者气急, 端坐呼吸, 查体: 心脏扩大, 听诊可闻及第四心音奔马律, 双下肢水肿, 超声心动图: 左心室腔明显扩大
55. 下列选项与肺癌无关的是
 A. 吸烟 B. 职业致癌因子
 C. 电离辐射 D. 饮酒
 E. 饮食与营养

A2 型选择题 (56—125 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

56. 男, 66 岁。陈旧性广泛前壁心肌梗死 5 年, 活动后胸闷、心悸、气短 2 年, 近 1 周出现夜间阵发性呼吸困难。查体: 端坐呼吸, BP 160/90mmHg, P 120 次/分。P₂ 亢进, 心脏各瓣膜区未闻及杂音。双肺底可闻及细湿啰音, 双肺散在哮鸣音。腹平软, 肝脾肋下未触及, 双下肢无水肿。空腹血糖 4.2mmol/L。心电图: V₁ ~ V₆ 导联 ST 段压低 0.05 ~ 0.1mV。血清肌钙蛋白正常。该患者心功能分级为
 A. Killip 分级 II 级 B. Killip 分级 III 级
 C. Killip 分级 IV 级 D. NYHA 分级 III 级
 E. NYHA 分级 IV 级
57. 女, 7 岁。摔倒时右手撑地, 即出现右肘部疼痛肿胀, 桡动脉搏动减弱。局部检查明显压痛, 有骨摩擦音, 肘前方可扪及骨折断端。伤后有垂腕表现, 可能是
 A. 肌损伤 B. 正中神经损伤
 C. 桡神经损伤 D. 尺神经损伤
 E. 缺血性肌挛缩
58. 男, 20 岁。反复左侧腰部胀痛 4 年余。B 超见左肾重度积水, 左输尿管显示不清。总肾功能正常,

- 尿常规:RBC(-),WBC(5~10)/HP。静脉尿路造影(IVU)检查示左肾显影不清晰,右肾正常。为明确病变的部位,最常用的检查方法是
- A. 尿路平片(KUB) B. 放射性核素肾显像
C. B超 D. 逆行肾盂造影
E. CT平扫
59. 男,42岁。性欲减退、阳痿4年,近1年轻度头痛。头颅MRI检查发现高2.6cm垂体大腺瘤、压迫视神经交叉、浸润左侧海绵窦。第二天晨取血查垂体及其靶腺功能后接受了 γ -刀垂体外照射放射治疗。5天后化验报告血睾酮水平0.7mmol/L,FSH及LH均<2mIU/L(垂体-性腺轴功能减低),血PRL、GH、ACTH及TSH、 T_3 、 T_4 水平均无特殊,符合垂体无功能性大腺瘤。本例垂体腺瘤治疗
- A. 采用 γ -刀放射治疗是合理的选择
B. 用睾酮类药物替代治疗后再放射治疗
C. 首选溴隐亭等多巴胺激动剂治疗
D. 手术治疗、术后加用放射治疗
E. 无功能性垂体腺瘤可暂不处理观察1~2年
60. 女,70岁。3小时前因情绪激动突发极度气急,咳嗽,咳粉红色泡沫痰,出冷汗,焦虑不安。既往COPD史18年,高血压病26年。查体:T36.3℃,P120次/分,R34次/分,BP220/130mmHg,神志模糊,端坐位,口唇发绀,无颈静脉怒张,双肺可闻及细湿啰音及哮鸣音,心率120次/分,律齐,心尖区可闻及舒张早期奔马律及2/6级收缩期杂音,腹软,双下肢无水肿。血气分析:pH7.28,PaO₂60mmHg,PaCO₂60mmHg。该患者突发气急的最可能原因是
- A. 肺动脉栓塞
B. COPD合并右心衰竭
C. 高血压合并肺部感染
D. COPD急性加重
E. 高血压合并急性左心衰竭
61. 男,46岁。因腹胀、乏力、纳差3天来诊。12年前体检发现HBsAg阳性,HBeAg阳性,ALT正常,口服中药断续治疗,有长期大量饮酒史。家中母亲及2个兄弟均为乙肝患者。查体:神志清楚,面色晦暗,无明显黄染,肝肋下未触及,脾肋下3cm。腹水征(+).实验室检查:ALT50U/L,HBVDNA 2×10^5 copy/ml。最重要的治疗药物是
- A. 核苷(酸)类似物 B. 胸腺肽
C. 丹参 D. 甘草酸制剂
E. 干扰素
62. 女,48岁。皮肤黄染进行性加重1个月,8天前发现小便呈浓茶样,近几天大便呈灰白色。查体:T36.9℃,皮肤巩膜黄染,腹软,右上腹可触及肿大的胆囊,无压痛,无反跳痛。该患者手术治疗后第3天发生上腹剧烈疼痛,腹腔引流量明显增加,引流液淀粉酶15000U/L。患者最有可能发生的并发症是
- A. 胰瘘 B. 急性胰腺炎
C. 肠系膜血栓形成 D. 肠痿
E. 胆痿
63. 女,48岁。酗酒后7小时出现中上腹疼痛,放射至两侧腰部,伴恶心、呕吐。查体:腹部有压痛、肌紧张及两侧腰腹部出现蓝棕色斑,BP75/55mmHg,P110次/分。对诊断困难者应进一步采取
- A. 剖腹探查
B. 内镜逆行胰胆管造影(ERCP)检查
C. 抗感染治疗下严密观察
D. 抗休克治疗
E. 腹腔穿刺
64. 男,34岁。上腹不适、纳差4年。体重减轻,乏力7个月。查体:贫血貌,上腹部轻压痛,Hb86g/L,MCV115fl,胃镜检查示胃体皱襞稀疏,黏膜血管透见。该患者发生贫血最可能的机制是
- A. 维生素缺乏 B. 慢性消化道失血
C. 铁吸收障碍 D. 蛋白质吸收障碍
E. 内因子缺乏
65. 男,62岁。颈部肿块5月,生长快,无疼痛。查体:甲状腺右叶直径3.3cm的肿块,质硬,边界不清,吞咽时活动度小。如术中冰冻切片报告为良性肿瘤,而行患侧甲状腺大部切除,术后石蜡切片报告为甲状腺乳头状癌。下一步的治疗首选
- A. 外放射治疗
B. 重新手术,行甲状腺患侧峡部全切,对侧大部切除
C. 放射性¹³¹I治疗
D. 口服甲状腺干制剂治疗
E. 化疗
66. 女,62岁。反复咳嗽、咳痰27年,心悸、气促,下肢间歇性水肿4年,病情加重伴畏寒、发热1周入院。查体:T38℃,呼吸急促,口唇发绀,双肺叩诊过清音,中下肺闻及湿啰音,心率110次/分,心律齐,无杂音,双下肢重度水肿。主要治疗措施应为
- A. 祛痰与止咳

- B. 解痉与平喘
C. 低浓度持续吸氧
D. 给予利尿剂和强心剂
E. 控制感染与改善呼吸功能
67. 男, 37 岁。发热、咳黄痰 9 天, 水肿伴恶心、呕吐、呼吸困难 1 周, 1 天前突发抽搐昏迷。既往 IgA 肾病 6 年。查体: BP 180/110mmHg, 贫血貌, 深大呼吸, 双中下肺野闻及湿啰音, 心率 120 次/分。双下肢水肿。Hb 68g/L, Scr 1 325 μ mol/L。患者意识障碍最可能的原因是
- A. 高血压脑病 B. 低钙血症
C. 尿毒症脑病 D. 贫血
E. 脑血管病
68. 女, 25 岁, 农村村民。与邻居发生口角, 被对方打了一耳光, 患者走回家中, 取一菜刀追赶对方, 被石头绊倒, 当即神志不清, 牙关紧闭, 双手握拳, 四肢僵硬, 呼之不应, 40 分钟后遂来急诊, 尚未清醒。检查结果未见异常, 此时应做的处理是
- A. 持续低流量给氧 B. 输液支持
C. 心电监护 D. 暗示治疗
E. 电抽搐治疗
69. 女, 24 岁。反复皮肤紫癜 1 个月, 加重并腹痛 2 天。查体: 四肢皮肤散在紫癜, 心肺未见异常, 腹平软, 脐周轻压痛, 无反跳痛和肌紧张, 肝脾肋下未触及, 肠鸣音 6 次/分。临床诊断为过敏性紫癜。根据目前的临床资料, 首选考虑最可能的临床类型是
- A. 单纯型 B. 肾型
C. 混合型 D. Schonlein 型
E. Henoch 型
70. 男, 24 岁。发热、咳嗽 3 天后出现肉眼血尿, 1 天后肉眼血尿消失, 但 6 周后尿沉渣镜检查 (RBC 20 ~ 30 高倍镜), 以变形红细胞为主, 尿蛋白阴性。查体未见异常, BP 130/80mmHg, 血肌酐正常, 抗核抗体 (ANA)、抗中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA) 均阴性, C₃ 正常。父母及哥哥体健。最可能临床诊断为
- A. 急性肾小球肾炎
B. 急进性肾小球肾炎
C. 慢性肾小球肾炎
D. 隐匿性肾小球肾炎
E. 肾病综合征
71. 女, 28 岁。因大面积烧伤住院治疗 1 天, 上腹痛 1 天, 4 小时排柏油便 5 次, 量约 300g。查体: T 37.5 $^{\circ}$ C, P 108 次/分, R 18 次/分, BP 110/70mmHg。实验室检查: Hb 82g/L, WBC 11 \times 10⁹/L。首先考虑的治疗措施是
- A. 输血
B. 静脉应用质子泵抑制剂
C. 静脉应用止血药
D. 口服胃黏膜保护剂
E. 静脉应用 H₂ 受体拮抗剂
72. 男, 28 岁。会阴部不适, 双侧睾丸疼痛 1 年。社区医院按“前列腺炎”治疗, 效果不明显。近期症状加重, 出现血精。查体: 睾丸正常, 左侧附睾尾部肿大, 质地偏硬, 左侧输精管增粗, 呈“串珠状”改变。直肠指检前列腺略大, 有大小不等的结节, 无压痛。最可能的诊断是
- A. 前列腺癌 B. 附睾输精管炎
C. 精囊炎 D. 慢性前列腺炎
E. 生殖系结核
73. 女, 58 岁。头部棍击伤, 无昏迷史及意识障碍, 无颅骨骨折, 2 个月后发现颅内高压症状。最可能的诊断是
- A. 慢性硬膜外血肿
B. 多发颅内血肿
C. 慢性硬膜下血肿
D. 急性颅内血肿
E. 脑震荡后遗症
74. 男, 26 岁。车祸伤及头部, 伤后出现左侧鼻唇沟变浅, 鼻出血, 左耳听力下降, 左外耳道流出淡血性液体。诊断首先考虑
- A. 颅前窝骨折 B. 颅中窝骨折
C. 颅后窝骨折 D. 左颞骨骨折
E. 脑震荡
75. 男, 22 岁。临床诊断 1 型糖尿病, 给予胰岛素治疗后, 患者经常于清晨 3 ~ 4 点出现手抖, 大汗, 饥饿感, 空腹血糖 11mmol/L, 尿糖 (++++), 尿酮体 (++++), 夜间尿糖阳性。应采取的措施是
- A. 减少晚餐的热量
B. 增加睡前中效胰岛素用量
C. 加用双胍类药物
D. 减少睡前胰岛素用量
E. 后夜加餐
76. 急性心肌梗死患者, 疑有早期心源性休克, 末梢循环改变, BP 90/70mmHg (12/9.3kPa), 尿比重 1.016,

- 中心静脉压 13cmH₂O。治疗时应首选
- A. 肾上腺素 B. 低分子右旋糖酐
C. 西地兰 D. 硝普钠
E. 硝苯地平
77. 女,32 岁。双下肢水肿 2 周。查体:BP 130/80mmHg, 双下肢凹陷性水肿。尿常规:尿蛋白(+++), 红细胞(++)。血浆白蛋白 27g/L, Scr 77μmol/L。尿蛋白定量 3.7g/d。肾活检示肾小球系膜轻度增生,系膜区可见免疫复合物沉积。最可能的病理诊断
- A. 局灶阶段性肾小球硬化
B. 系膜毛细血管性肾小球肾炎
C. 微小病变性肾病
D. 膜性肾病
E. 系膜增生性肾小球肾炎
78. 女,45 岁。发现风湿性心脏病 10 余年。查体:双侧颊部皮肤呈紫红色,心界向左扩大,心腰膨隆,心率 96 次/分;心尖部可闻及开瓣音及舒张期隆隆样杂音。该患者查体还可能发现的其他阳性体征是
- A. 肺动脉瓣区舒张早期杂音
B. 胸骨左缘第 3 肋间收缩期杂音
C. 第二心音减弱
D. 第一心音减弱
E. 第二心音逆分裂
79. 女,28 岁。结婚 5 年未孕,自月经初潮起即 35~60 天行经一次。毛发浓密,面部痤疮明显,身高 158cm,体重 76kg。最可能的诊断是
- A. Asherman 综合征 B. 闭经泌乳综合征
C. 多囊卵巢综合征 D. 对抗性卵巢综合征
E. 特纳综合征
80. 男,44 岁。因胆道梗阻,并发休克入院。使用去甲肾上腺素升压,血压不易维持,波动较大,应用氢化可的松后血压升并维持平稳。治疗 3 天时,患者出现精神失常,躁狂。患者出现精神失常,躁狂,因氢化可的松
- A. 提高中枢神经的兴奋性
B. 加速蛋白质的分解代谢
C. 减少脑组织对葡萄糖的利用
D. 过量引起感染的扩散
E. 增强升压药的作用
81. 男,5 岁。低热、干咳 1 周,加重 3 天,呈刺激性干咳,夜眠不安。查体:T 38℃,双肺呼吸音粗,未闻及啰音,心腹未见异常,WBC 11 × 10⁹/L, N 0.70, ESR 40mm/h,胸部 X 线片示右下肺呈云雾状薄片影。其最可能的诊断是
- A. 大叶性肺炎
B. 支气管肺炎
C. 支原体肺炎
D. 腺病毒肺炎
E. 嗜酸粒细胞肺炎
82. 男,60 岁。因咳嗽,咳黄痰 4 天就诊。查体:主动脉瓣区粗糙的收缩期杂音。超声心动图示主动脉瓣狭窄,左室射血分数 0.55,心电图检查正常。请问对该患者哪一项处置方法不恰当
- A. 抗生素
B. 化痰药物
C. 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)
D. 定期做超声心动图
E. 胸部 X 线片检查
83. 男,23 岁。腹痛、脓血便、发热 3 个月。大便 8 次/天, T 39℃。粪镜检及培养未见病原体。结肠镜检查示结肠弥漫分布的糜烂及浅溃疡。病理学提示重度慢性炎症。左氧氟沙星联合甲硝唑治疗 1 周症状无缓解。最适宜的治疗药物是
- A. 泼尼松 B. 柳氮磺吡啶
C. 硫唑嘌呤 D. 美沙拉嗪
E. 美沙拉嗪联合美沙拉嗪栓
84. 男,4 岁。2 周前曾患上感冒,目前不规则发热,易倦,脸色略苍白,查体发现心率增快,心尖部第一心音减弱,并可闻及早搏,心电图检查:PR 间期延长,ST 段下移,实验室检查:C-反应蛋白增高。下列哪项检查可以帮助确诊
- A. 抗透明质酸酶 B. 谷草转氨酶
C. 血沉 D. 心脏 X 线片检查
E. 肌酸磷酸激酶(CK)
85. 炎热夏季的某一天,气压很低,强烈阳光照射着交通繁忙的城市,一些居民突然出现了不同程度的眼睛红肿、流泪、咽痛、喘息、咳嗽、呼吸困难、头痛、胸闷等症状。导致出现这些症状可能的原因
- A. CO 急性中毒 B. 煤烟型烟雾
C. 光化学烟雾 D. 附近火山喷发烟雾
E. 某种传染病流行
86. 男,70 岁,摔倒后右肩部着地受伤,肩部肿胀,疼痛,肩关节活动障碍。X 线片示右侧肱骨外髁颈骨皮质连续性中断,无明显移位。首选的治疗方

法是

- A. 三角巾悬吊贴胸位固定
B. 石膏外固定
C. 切开复位内固定
D. 小夹板外固定
E. 尺骨鹰嘴骨牵引 + 夹板固定
87. 男, 63 岁。干咳、呼吸困难 12 天, 逐渐加重, 现不能平卧, 无发热。查体: R 24 次/分, BP 85/70mmHg, 端坐位, 颈静脉怒张, 双肺呼吸音清, 心浊音界向两侧扩大, 心率 108 次/分, 律齐, 心音低而遥远, 心脏各瓣膜区未闻及杂音, 奇脉。心电图示: 窦性心动过速, 各导联 QRS 波低电压。该患者最关键的治疗措施是
- A. 静脉滴注抗生素 B. 静脉滴注硝酸甘油
C. 口服美托洛尔 D. 心包穿刺
E. 静脉注射呋塞米
88. 男, 46 岁。右颈部无痛性淋巴结肿大 4 个月, 伴上腹疼痛, 食欲不振, 发热盗汗, 体重减轻。行剖腹探查见胃与胰头及腹膜有粘连, 周围有多个肿大的淋巴结, 病理检查为非霍奇金淋巴瘤, T 细胞来源。临床分期属
- A. II_B B. III_A
C. III_B D. IV_A
E. IV_B
89. 女, 66 岁。2 小时前跌倒时手掌着地受伤。查体: 右腕明显肿胀, 压痛 (+), 侧面观呈“银叉样”畸形。最可能的诊断是
- A. Galeazzi 骨折 B. Colles 骨折
C. Chance 骨折 D. Monteggia 骨折
E. Smith 骨折
90. 男, 35 岁。低热伴咳嗽 3 周, 咳少量白痰。使用多种抗生素治疗无效。胸部 X 线片示右下叶背段斑片状影, 有多个不规则空洞, 无液平面。为明确诊断, 应首先进行的检查是
- A. 痰涂片革兰染色 B. 痰涂片抗酸染色
C. 支气管镜 D. 痰真菌培养
E. 胸部 CT
91. 男, 50 岁。不慎跌倒摔伤左肩。以右手托左肘部来诊。头向左倾。查体: 左肩下沉, 左上肢功能障碍。胸骨柄至左肩峰连线中点隆起, 并有压痛。其可能的诊断是
- A. 肩关节脱位 B. 锁骨骨折
C. 肱骨外科颈骨折 D. 肩胛骨骨折
E. 肱骨解剖颈骨折
92. 女, 10 岁。发热、头痛、呕吐 3 天, 烦躁不安 1 天, 于 2 月 22 日入院。查体: T 39.7°C, BP 130/80mmHg, 神志清, 精神差, 全身散在瘀点、瘀斑, 颈抵抗 (+), Kernig 征 (+), Babinski 征 (+)。实验室检查: WBC $20 \times 10^9/L$, N 0.90。脑脊液检查: 压力 240mmH₂O, 外观浑浊, WBC $1300 \times 10^6/L$, 蛋白 1.5g/L, 糖 1.5mmol/L, 氯化物 100mmol/L。最可能的诊断是
- A. 钩端螺旋体病 B. 中毒型细菌性痢疾
C. 流行性乙型脑炎 D. 结核性脑膜炎
E. 流行性脑脊髓膜炎
93. 女, 16 岁。因发热、乏力、刷牙时牙龈出血 6 天入院。查体: T 38.7°C, 牙龈肿胀, 胸骨压痛 (+), 双下肢小腿出现散在出血点及瘀斑。血常规: Hb 82g/L, WBC $10.4 \times 10^9/L$, PLT $30 \times 10^9/L$; 骨髓增生极度活跃, 原始细胞占 0.60, POX 染色呈弱阳性, 非特异性酯酶染色阳性, 可被 NaF 抑制。该患者原始细胞最可能的免疫表型是
- A. CD₁₄⁺ B. CD₄₁⁺
C. CD₈⁺ D. CD₃⁺
E. CD₄⁺
94. 女, 59 岁。1 年前日常活动后出现胸骨后疼痛, 2~3 次/天, 近 3 月发作次数增多, 6~7 次/天, 轻微活动也能诱发, 发作时心电图 ST 段呈一过性水平压低。应诊断为
- A. 稳定性心绞痛
B. 不稳定性心绞痛
C. 心内膜下心肌梗死
D. 中间综合征
E. 变异型心绞痛
95. 男, 52 岁。常规体检胸部 X 线片示双肺纹理增粗紊乱。既往体健, 吸烟 20 余年。行肺功能检查示 FEV₁/FVC 68.5%, FEV₁ 占预计值的 68%。支气管舒张试验 FEV₁ 改善 2.5% (30ml)。该患者首先考虑的诊断是
- A. 支气管扩张
B. 慢性阻塞性肺疾病
C. 阻塞性肺气肿
D. 支气管哮喘
E. 慢性支气管炎
96. 女, 60 岁。发热伴腰痛 3 天。既往糖尿病病史 10 年。查体: T 38.7°C, 右肾区叩击痛 (+)。血常规:

WBC $11.5 \times 10^9/L$, N 0.86; 尿常规: 蛋白(+), 糖(+), 沉渣镜检 RBC (8~10)/HP, WBC (25~30)/HP。对明确诊断最有意义的检查是

- A. 肾穿刺活检
B. 尿找病理细胞
C. 清洁中断尿培养 + 药敏试验
D. 泌尿系 B 超
E. 尿相差显微镜检查
97. 女, 75 岁。间断餐后上腹痛伴嗝气 37 年, 无反酸, 曾行胃镜及病理检查提示重度萎缩性胃炎。近期出现乏力及消瘦。胃镜检查示: 胃角巨大溃疡, 周边不规则隆起, 中心有较大血凝块附着, 其余部位无出血病变。行手术治疗。术后病理最可能为
- A. 胃淋巴瘤 B. 胃间质瘤
C. 胃癌 D. 胃溃疡
E. 胃结核
98. 女, 62 岁。2 年来久站或长时间行走时, 觉左下腹部胀痛不适。查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛, 立位左腹股沟韧带下方内侧突起半球形肿物, 平卧时可缩小, 咳嗽时无明显冲击感, 压迫内环后肿物仍可复出。该患者最适宜的手术方法是
- A. Shouldice 法疝修补术
B. McVay 法疝修补术
C. Bassini 法疝修补术
D. Halsted 法疝修补术
E. Ferguson 法疝修补术
99. 女, 4 岁。水肿 1 周。尿中有泡沫, 尿量减少。查体: T 36.7°C, P 120 次/分, R 25 次/分, BP 90/60mmHg。眼睑水肿, 双下肢凹陷性水肿。双肺呼吸音粗, 未闻及啰音。心前区未闻及杂音。腹膨隆, 移动性浊音(+). 尿常规: 尿蛋白(+++). 尿沉渣镜检: RBC (0~3)/HP, WBC (0~3)/HP。血清白蛋白 20g/L, 胆固醇 8.7mmol/L。以下治疗方式不合适的是
- A. 给予氢氯噻嗪利尿
B. 给予泼尼松治疗
C. 给予青霉素抗感染
D. 少盐饮食
E. 降脂治疗
100. 女, 63 岁。人工膝关节置换术后膝关节周围加压包扎。1 天后发现左足不能背屈。跖屈正常, 足

背动脉搏动正常。最可能的原因是

- A. 腓总神经损伤 B. 坐骨神经损伤
C. 深静脉血栓 D. 胫神经损伤
E. 骨筋膜室综合征
101. 男, 26 岁。右侧阴囊增大不适 1 年。检查肿块约 2.0 × 2.5cm 大小, 有囊性感, 无压痛, 平卧位不消失, 透光试验阳性。双侧睾丸、附睾可清楚触及, 大小位置正常。应诊断为
- A. 睾丸鞘膜积液 B. 睾丸肿瘤
C. 腹股沟疝 D. 精索鞘膜积液
E. 阴囊橡皮肿
102. 男, 58 岁。突发胸痛伴大汗 3 小时, 有吸烟史。首选的检查是
- A. 胸部 X 线片 B. 心肌核磁显影
C. 冠状动脉 CT 造影 D. 心电图
E. 超声心动图
103. 女, 62 岁。间断活动时憋喘 1 年半, 近期加重, 重体力活动即感喘憋, 有夜间憋醒。既往高血压病 10 年余, 糖尿病 5 年余。查体: BP 150/100mmHg, 双肺呼吸音清。心率 78 次/分, 律齐。患者经药物治疗症状好转, 为改善预后需要长期使用的药物是
- A. 洋地黄类药物
B. 肾上腺素能受体激动剂
C. 磷酸二酯酶抑制剂
D. 利尿剂
E. 血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI)
104. 男, 25 岁, 工人。发热、干咳 2 个月。发病时胸部 X 线片示肺纹理增多, 先后使用青霉素、头孢菌素抗感染治疗 20 天余症状未见好转。查体: T 39.8°C, 消瘦, 双侧颈部可触及多个成串小淋巴结, 双肺未闻及干湿啰音。PPD 试验(-), 胸部 X 线片示双肺弥漫分布直径约 1.8mm 的小结节影。该患者最可能的诊断是
- A. 真菌性肺炎 B. 病毒性肺炎
C. 过敏性肺炎 D. 急性粟粒性肺结核
E. 细菌性肺炎
105. 女, 66 岁。有冠心病、高血压、糖尿病病史。近 1 个月调整用药为阿司匹林、比索洛尔、辛伐他汀、二甲双胍。近 3 天双下肢无力及疼痛, 双侧足背动脉搏动一致。实验室检查: 肌酸激酶 (CK) 2 200U/L, 心肌肌钙蛋白 (cTn) 10.01ng/ml, 血肌酐 (BUN) 368μmol/L。出现双下肢无力及疼痛

的最可能原因是

- A. 糖尿病足 B. 主动脉夹层
C. 间歇性跛行 D. 横纹肌溶解
E. 腰椎间盘突出症
106. 男,31岁。2天前突发胸壁背部痛继而下肢无力、麻木、排尿困难,无视物成双、饮水呛咳、吞咽困难。起病前1周有“感冒”病史。查体:T 36.8℃, R 18次/分,P 75次/分。双下肢肌张力减低,腱反射消失,病理反射(-)。最可能的诊断是
A. 吉兰巴雷综合征
B. 髓内肿瘤
C. 髓外肿瘤
D. 急性脊髓炎
E. 颈椎病
107. 某企业职工因为冠心病在某三甲医院住院7天,产生医药费用9000元。出院结算时,医院先扣除自费项目1200元,在剩下的7800元中,扣除起付标准800元后,对剩余部分医疗费用的7000元,由统筹基金按90%的比例给予报销,其余的10%由该职工本人支付。这7000元的支付方式属于
A. 封顶线 B. 共同付费
C. 起付比例 D. 自费线
E. 起付线
108. 女,1岁。发热伴咳嗽3天,口周稍青紫。用鼻前庭导管吸氧。氧流量应为
A. 0.5~1L/min B. 1.5~2L/min
C. 2.5~3L/min D. 3.5~4L/min
E. 4.5~5L/min
109. 男,46岁。2小时前不慎摔倒,右腕部疼痛,无法行走。X线片示右股骨颈中段骨折并有短缩完全移位,Pauwels角55°。该患者股骨颈骨折的类型是
A. 外展型骨折
B. Garden I型骨折
C. Garden III型骨折
D. 内收型骨折
E. Garden II型骨折
110. 女,25岁。发热12天,弛张热,伴恶寒,关节痛。体检:皮肤瘀点,Osler结节,心脏有杂音,考虑为感染性心内膜炎。确诊的直接证据来自
A. 血液学检查
B. X线和心电图检查
C. 超声心动图检查
D. 免疫学检查
E. 组织学和细菌学检查
111. 男,25岁。1周前右足底被铁钉刺伤,未作清创处理。近日,感头痛、咬肌紧张酸胀,诊断为破伤风。其发病机制中错误的是
A. 破伤风杆菌产生的内毒素引起症状
B. 痉挛毒素是引起症状的主要毒素
C. 溶血毒素引起组织局部坏死和心肌损害
D. 破伤风是一种毒血症
E. 毒素也可影响交感神经
112. 女,28岁。右拇指活动弹响伴疼痛半年,加重伴不能主动伸直7天。查体:T 36.8℃,P 70次/分,R 18次/分,BP 110/60mmHg,未见皮疹,心肺腹未见异常。右第1掌指关节掌面可触及黄豆大小质硬结节,压痛明显,被动屈伸可触及结节移动感。最可能的诊断为
A. 狭窄性腱鞘炎
B. 骨软骨瘤
C. 类风湿关节炎
D. 骨关节炎
E. 腱鞘囊肿
113. 女,44岁。16天前头痛,恶心、呕吐3次,伴低热,问话不答,独自发呆,卧床不起,抽搐2次。查体:BP 140/90mmHg,下肢肌张力增高,右侧Babinski征(+),脑电图示:弥漫性δ波以额颞为主,有阵发性尖波发放。首选的治疗手段
A. 心理治疗
B. 中药治疗
C. 抗病毒治疗与对症治疗
D. 抗抑郁药物
E. 电击治疗
114. 女,11岁。发热、头痛、呕吐3天,嗜睡半天,于8月5日入院。既往体健。查体:T 38.6℃,P 112次/分,R 20次/分,BP 130/75mmHg。神志不清,皮肤未见出血点,心肺未见异常,腹软,压痛及反跳痛(-),肝脾肋下未触及,颈抵抗(+),双侧Babinski征(+)。实验室检查:WBC $12.4 \times 10^9/L$,N 0.70,L 0.30。腰穿脑脊液检查压力 200mmH₂O,WBC $170 \times 10^6/L$,单核 0.66,多核 0.34,蛋白 11g/L,糖 42mmol/L,氯化物 115mmol/L。最有助于确诊的检查是
A. 血清特异性IgM抗体

- B. 脑脊液涂片找细菌
 C. 脑脊液培养
 D. 血培养
 E. 结核菌素试验
115. 女, 64 岁。反复咳嗽、咳痰 22 年, 气短 6 年。患者长期使用吸入糖皮质激素及支气管舒张剂治疗, 近 1 周症状控制欠满意, 联合使用某药物治疗。此后出现排尿困难。该患者近来增加的药物最可能是
- A. 茶碱类
 B. M 受体拮抗剂
 C. β_2 受体激动剂
 D. 口服糖皮质激素
 E. 祛痰治疗
116. 女, 47 岁。9 个月前骑电动车时摔倒, 上腹部被车把撞伤并疼痛, 经治疗后缓解。7 个月前觉上腹部逐渐隆起, 伴上腹饱胀, 近日来常恶心、呕吐。查体: 上腹部可触及直径约 10cm 包块, 无肌紧张、压痛、反跳痛。影像学检查提示该患者上腹部 10 × 10cm 囊性肿物, 最有可能的诊断是
- A. 腹部后血肿
 B. 膈疝
 C. 肝左叶囊肿
 D. 胰腺假性囊肿
 E. 十二指肠憩室
117. 女, 28 岁。发热伴寒战 3 天, 肉眼血尿 1 天, 无尿频、尿痛。查体: 右肾区叩痛 (+)。尿常规: 尿蛋白 (+), RBC (30 ~ 40)/HP。WBC (20 ~ 30)/HP, 管型 (3 ~ 5)/LP。其管型最可能是
- A. 透明管型 B. 蜡样管型
 C. 白细胞管型 D. 颗粒管型
 E. 上皮细胞管型
118. 女, 45 岁。上腹胀痛 12 年, 常伴烧心, 多在餐后约 50 分钟发作, 1 ~ 2 小时可自行缓解。秋冬及冬春季症状明显。胃镜下黏膜活检组织 Worthin - Starry 银染色阳性, 提示细菌感染。这种致病菌的特点不包括
- A. 尿素酶试验阳性
 B. 至少需质子泵抑制剂加两种抗生素治疗
 C. 培养时需要加入 5% ~ 10% 羊血或马血
 D. 革兰染色阳性
 E. 培养 3 ~ 7 天可见针尖大小的菌落
119. 男, 60 岁。面色苍白、乏力 13 个月, 牙龈出血 1 月余。实验室检查: Hb 64g/L, WBC $2.4 \times 10^9/L$, PLT $35 \times 10^9/L$, 骨髓检查: 增生明显活跃, 原始细胞 16%, 可见到 Auer 小体, 铁染色检查示细胞外铁 (+++), 环状铁粒幼细胞占 12%, 诊断骨髓增生异常综合征 (MDS)。根据 FAB 分型最可能的类型是
- A. RA 型 B. RAS 型
 C. RAEB 型 D. RAEB - t 型
 E. CMML 型
120. 男, 62 岁。持续胸痛 4 小时, 突然出现头晕。查体: BP 95/65mmHg, 心率 32 次/分, 心律齐。心电图示: II、III、aVF 导联 ST 段弓背向上抬高 0.3mV, $V_1 \sim V_5$ 导联 ST 段压低 0.2mV, QRS 波群时限 0.14 秒。该患者最可能出现的心律失常是
- A. 二度窦房传导阻滞
 B. 完全性右束支传导阻滞
 C. 三度房室传导阻滞
 D. 心房扑动
 E. 窦性心动过缓
121. 男, 25 岁。因原发性甲状腺功能亢进症在气管内插管全麻下行甲状腺双侧次全切术, 术后清醒拔出气管插管后患者出现呼吸困难, 伴有失音, 无手足麻木。查体: T 37.4℃, P 91 次/分, R 27 次/分, BP 130/70mmHg, 面红无发绀, 颈部不肿, 引流管通畅, 有少许血液流出。引起该患者呼吸困难最可能的原因是
- A. 喉上神经损伤
 B. 伤口出血
 C. 甲亢危象
 D. 双侧喉返神经损伤
 E. 甲状旁腺损伤
122. 女, 64 岁。进食梗噎 2 月余。胃镜检查: 距门齿 30 ~ 32cm 处食管后壁肿物, 黏膜表面破溃, 距门齿 38 ~ 40cm 处黏膜粗糙、隆起, 两处活检均为高分化鳞癌。心、肺及肝功能正常。未见其他部位转移征象。最佳治疗方案是
- A. 二线药物化疗
 B. 静脉营养支持
 C. 食管癌放射治疗
 D. 食管癌根治术
 E. 胃造瘘肠内营养
123. 女, 63 岁。突发性心前区疼痛 3 小时, 既往有高血脂症和吸烟史, 无高血压和出血性疾病史。查体:

BP 150/90mmHg。双肺呼吸音清,心率 88 次/分,律齐。心电图示:Ⅱ、Ⅲ和 aVF 导联 ST 段下斜型压低 0.2mV, $V_1 \sim V_6$ 导联 ST 段弓背向上抬高 0.3~0.5mV。该患者最关键的治疗是

- A. 吸氧
- B. 口服硝苯地平控释片
- C. 再灌注治疗
- D. 口服速效救心丸
- E. 口服血管紧张素转换酶抑制剂

124. 男,32 岁。搬重物时突然出现腰背部疼痛伴右下肢放射痛 2 小时。查体:下腰部压痛,右下肢直腿抬高试验(+),右侧足背外侧感觉减弱,右足趾跖屈肌力减弱,右侧跟腱反射减弱,Babinski 征

(-)。该患者疾病可能受累的节段是

- A. L_{4-5}
- B. $L_5 \sim S_1$
- C. L_{2-3}
- D. L_{1-2}
- E. L_{3-4}

125. 男,37 岁。面容变丑 12 年,鞋子号码从 41 增加到 43,近半年明显出汗和体力欠佳,并有明显口渴、多饮、勃起功能障碍。查体:BP 160/100mmHg。为明确诊断首选的检查是

- A. T_3 、 T_4 、TSH
- B. FSH、LH
- C. 胰岛素低血糖兴奋试验
- D. 葡萄糖生长激素抑制试验
- E. OGTT 试验

A3/A4 型选择题(126—137 题)

答题说明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(126—128 题共用题干)

男,30 岁。因发热、面色苍白伴牙龈出血 1 周入院。入院次日起出现皮肤多处片状瘀斑血尿。实验室检查:HB 80g/L, WBC $2.0 \times 10^9/L$, PLT $50 \times 10^9/L$, 血浆纤维蛋白原 0.8g/L。骨髓检查:有核细胞增生极度活跃,细胞浆颗粒粗大的早幼粒细胞占 85%。

126. 患者出血的首要原因是
- A. 异常早幼粒细胞浸润血管壁
 - B. 血小板减少
 - C. 血小板减少伴功能异常
 - D. 凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏
 - E. 弥散性血管内凝血(DIC)
127. 首选的治疗方案应为
- A. 小剂量阿糖胞苷
 - B. 柔红霉素加阿糖胞苷
 - C. DA 方案+小剂量肝素
 - D. 高三尖杉酯碱加阿糖胞苷
 - E. 全反式维甲酸+肝素
128. 获得完全缓解后的治疗策略是
- A. 化疗与全反式维甲酸交替治疗
 - B. 单用全反式维甲酸维持治疗
 - C. 定期联合化疗
 - D. 中剂量阿糖胞苷强化治疗
 - E. 停药,定期随诊

(129—131 题共用题干)

女,2 岁。发热伴咳嗽 6 天,加重伴呼吸困难 1 天,曾予青霉素治疗 3 天。查体:T 39.1℃,嗜睡,精神反应差,躯干可见散在红色斑丘疹,呼吸急促,双肺可闻及中小水泡音。血常规:WBC $22 \times 10^9/L$, N 0.90, L 0.10。胸部 X 线片示双肺斑片影、肺大泡。

129. 首先考虑的诊断是
- A. 腺病毒肺炎
 - B. 金黄色葡萄球菌肺炎
 - C. 肺炎支原体肺炎
 - D. 呼吸道合胞病毒肺炎
 - E. 肺炎链球菌肺炎
130. 患儿住院后,经治疗病情曾一度好转,但今天起病情又突然加重,出现高热及呼吸困难。查体:T 39.5℃,R 60 次/分。烦躁不安,可见鼻翼扇动及三凹征,面色苍白,唇周发绀。右上肺叩诊鼓音,右下肺叩诊呈浊音,右肺呼吸音低。心率 140 次/分。心音有力,律齐。肝脾无肿大。此时应首先考虑的是
- A. 中毒性脑病
 - B. 心力衰竭
 - C. 脓气胸
 - D. 真菌感染
 - E. 中毒性心肌炎

131. 此时有效的进一步治疗措施是

- A. 使用强心剂
- B. 改用其他抗生素
- C. 胸腔闭式引流
- D. 使用脱水剂
- E. 改用抗真菌药

(132—134 题共用题干)

女, 59 岁。高热、寒战 4 天, 意识模糊 1 天。既往体健。查体: T 39.2℃, P 120 次/分, R 22 次/分, BP 80/50mmHg, 皮肤散在出血点和瘀斑, 双肺未见异常, 心率 120 次/分, 律齐, 腹软, 肝肋下 0.5cm, 脾肋下及边。实验室检查: Hb 100g/L, WBC $25.3 \times 10^9/L$, 血培养: 大肠埃希菌生长, PT 18 秒(正常对照 13 秒), INR 2.1, 血纤维蛋白原定量 108g/L。诊断为大肠埃希菌败血症, 可能合并 DIC。

132. 下述检查对确诊 DIC 意义不大的是

- A. 复查血纤维蛋白原定量
- B. 复查血小板数
- C. 血小板功能
- D. APTT
- E. FDP 测定

133. 下列能反映 DIC 纤溶情况的检查是

- A. 血纤维蛋白原测定
- B. 凝血因子 VIII 测定
- C. PC、PS 测定
- D. AT-III 测定
- E. D-二聚体测定

134. 本例确诊 DIC, 需立即进行下列治疗, 除了

- A. 抗感染
- B. 抗休克
- C. 肝素抗凝
- D. 抗纤溶

E. 输新鲜冰冻血浆

(135—137 题共用题干)

女, 22 岁。突发腹痛 12 小时。腹痛呈持续性, 先以脐部为主, 后固定于右下腹, 逐渐加重, 伴恶心, 无呕吐。查体: T 37.5℃, P 100 次/分, R 22 次/分, BP 110/70mmHg。痛苦面容, 双肺未闻及啰音, 心律齐。腹软, 右下腹压痛, 无反跳痛, Murphy 征阴性, 肝脾肋下未触及, 肠鸣音减弱。血常规: Hb 120g/L, WBC $13 \times 10^9/L$, N 0.85, PLT $200 \times 10^9/L$ 。拟行手术治疗。

135. 如腰大肌试验阳性, 则术中阑尾最可能的位置是

- A. 盆位
- B. 回肠前位
- C. 盲肠后位
- D. 盲肠下位
- E. 回肠后位

136. 如该患者为妊娠期, 以下处理不正确的是

- A. 手术切口需偏高
- B. 围手术区应加用黄体酮
- C. 临产期可行剖宫产同时切除阑尾
- D. 常规放置引流管
- E. 术后使用广谱抗生素

137. 【假设信息】该患者术后 10 天, 排便、排尿频繁, 伴里急后重感。T 38.5℃, 直肠指诊在直肠前壁触及有波动感的包块, 触痛明显。最主要的治疗方法是

- A. 充分引流
- B. 温盐水灌肠
- C. 应用抗生素
- D. 热水坐浴
- E. 物理透热

B1 型选择题 (138—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题, 每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(138—140 题共用题干)

- A. 依那普利
- B. 美托洛尔

- C. 氢氯噻嗪
- D. 特拉唑嗪
- E. 氨氯地平

138. 高血压合并双侧肾动脉狭窄的患者不宜使用的降压药为
139. 糖尿病合并高血压的患者首选的降压药物为
140. 高血压合并窦性心动过速的患者首选的降压药物为

(141—142 题共用备选答案)

- A. 膝关节
- B. 肘关节
- C. 前臂
- D. 上臂
- E. 大腿

141. 最容易发生损伤性骨化的部位是
142. 最容易发生骨筋膜室综合征的部位是

(143—146 题共用备选答案)

- A. 乙酰胆碱合成和释放减少
- B. 自身抗体破坏而使乙酰胆碱受体数目减少
- C. 乙酰胆碱酯酶活力抑制使乙酰胆碱作用过度延长
- D. 因缺乏酶或载体不能产生足够的 ATP
- E. 终板电位下降而引起去极性阻断

143. 氨基糖苷类药物中毒和 Lambert - Eaton 综合征时肌无力的发病机制是

144. 周期性瘫痪的发病机制是
145. 重症肌无力的发病机制是
146. 线粒体肌病的发病机制是

(147—148 题共用备选答案)

- A. 肾上腺素试验
- B. 凝血活酶生成及纠正试验
- C. D - 二聚体测定
- D. 毛细血管脆性试验
- E. 血小板聚集试验

147. 确诊血友病的检查是
148. 检查是否存在纤溶亢进的检查是

(149—150 题共用备选答案)

- A. 直肠息肉形成
- B. 脾脏白色锥形病灶
- C. 回盲部肠腔狭窄
- D. 胃壁溃疡形成
- E. 肝脏肿大

149. 慢性肺淤血可引起的脏器改变是
150. 肺外结核病最常引起的形态改变是

第三单元

A1 型选择题(1—55 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 原发性肺结核和继发性肺结核均可见的病理类型是
A. 慢性纤维空洞型肺结核
B. 浸润性肺结核
C. 结核球
D. 局灶性肺结核
E. 粟粒性肺结核
- 若测得某物质的肾清除率为 80ml/min,则可认为肾小管对该物质
A. 必定能重吸收,但不能确定能否分泌
B. 必定能分泌,但不确定能否重吸收
C. 必定能重吸收,也必定能分泌
D. 必定不能重吸收,也必定不能分泌
E. 能否重吸收和分泌都不能确定
- 提示非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征患者预后不良最有价值的线索是
A. 最近 48 小时症状反复发作
B. 发作时血压下降
C. 血肌钙蛋白水平增高
D. 发作时间超过 30 分钟
E. 有静息胸痛发作
- 主要作用机制为控制支气管哮喘气道炎症的药物是
A. H_1 受体拮抗剂
B. 长效 β_2 受体激动剂
C. M 受体拮抗剂
D. 白三烯受体调节剂
E. 茶碱
- 由红细胞膜异常引起的贫血性疾病是
A. 蚕豆病
B. 不稳定血红蛋白病
C. 遗传性球形细胞增多症
D. 镰状细胞贫血
E. 地中海贫血
- 双侧四肢远端出现手套袜子样麻木,病变的定位多在
A. 神经丛
B. 神经末梢
C. 脊髓后角
D. 神经干
E. 脊髓后根
- 由免疫机制引起中性粒细胞减少的疾病是
A. 假性粒细胞减少
B. Felty 综合征
C. 低增生性白血病
D. 巨幼细胞贫血
E. 骨髓增生异常综合征
- 位于脊髓后索内侧传导下部躯干及下肢深感觉的是
A. 脊髓丘脑束
B. 皮质脊髓束
C. 楔束
D. 薄束
E. 内侧丘系
- 上消化道出血诱发肝性脑病的主要机制是
A. 引起失血性休克
B. 肠道细菌作用下产氨及其他毒物
C. 脑组织缺血缺氧
D. 血液苯乙胺和羟乙胺增加
E. 破坏血脑屏障
- 下列各项不属于放射诊疗分类的是
A. 放射治疗
B. 核医学
C. 医学影像学

- D. 介入放射学
E. X 射线影像诊断
11. 介水传染病是指
A. 以水为传播媒介的急性传染病
B. 饮用水或接触过受病原体污染的水体而传播的疾病
C. 由致病菌污染水体而引起的传染病
D. 饮用受病原体污染的水而导致暴发流行的传染病
E. 饮用受重金属污染的水而造成的急性中毒
12. 病毒性肝炎患者肝小叶周边部界板肝细胞的灶性坏死称为
A. 点状坏死
B. 碎片状坏死
C. 桥接坏死
D. 大片坏死
E. 嗜酸性坏死
13. 系统性红斑狼疮的心血管损害中, 最多见的是
A. 心肌炎
B. 心内膜炎
C. 心包炎
D. 心功能不全
E. 心律失常
14. 医患关系的本质特征是
A. 具有互利性质的经济关系
B. 具有买卖性质的依附关系
C. 具有协作性质的买卖关系
D. 具有依附性质的非平等关系
E. 具有契约性质的信托关系
15. 医疗机构对其医疗废物暂时储存的时间不得超过
A. 1 天
B. 2 天
C. 3 天
D. 4 天
E. 5 天
16. 引起慢性肾功能不全的最常见继发性肾脏病是
A. 乙肝相关性肾炎
B. 淀粉样变肾病
C. 糖尿病肾病
D. 良性肾小动脉硬化
E. 系统性红斑狼疮
17. 普通型流行性脑脊髓膜炎临床分期不包括
A. 恢复期
B. 败血症期
C. 前驱期
D. 脑膜炎期
E. 发热期
18. 按手术期限, 下列属于限期手术的是
A. 慢性阑尾炎切除术
B. 直肠癌根治术
C. 完全性肠梗阻造瘘术
D. 可复性股疝修补术
E. 急性上消化道穿孔修补术
19. 心导管检查右心室血氧含量高于右心房的先心病是
A. 房间隔缺损
B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 肺动脉狭窄
20. 艾滋病患者肺部机会性感染最常见的病原体是
A. 白色念珠菌
B. 结核杆菌
C. 疱疹病毒
D. 巨细胞病毒
E. 肺孢子菌
21. 耻骨骨折不易出现
A. 血尿
B. 会阴部瘀斑
C. 坐骨神经损伤
D. 骨盆挤压试验阳性
E. 骨盆分离试验阳性
22. 小儿重症肺炎出现严重腹胀, 最可能的原因是
A. 低钙血症
B. 消化不良
C. 低钾血症
D. 低钠血症
E. 中毒性肠麻痹
23. 单侧隐睾手术治疗应在
A. 2 岁以前
B. 3~6 岁
C. 7~10 岁
D. 青春期
E. 婚后影响生育时



24. 严重心力衰竭时,治疗频发室性期前收缩首选的药物是
- A. 胺碘酮
 - B. 索他洛尔
 - C. 多巴酚丁胺
 - D. 氟卡尼
 - E. 普罗帕酮
25. 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系是
- A. 骨盆轴
 - B. 胎方位
 - C. 胎先露
 - D. 胎产式
 - E. 胎姿势
26. 容易见到角化珠的癌可以确定为
- A. 分化好的鳞癌
 - B. 基底细胞癌
 - C. 移行细胞癌
 - D. 分化差的鳞癌
 - E. 分化差的腺癌
27. 位于后纵隔脊柱旁肋脊区内最常见的纵隔肿瘤是
- A. 胸腺瘤
 - B. 心包囊肿
 - C. 畸胎瘤
 - D. 神经源性肿瘤
 - E. 淋巴瘤
28. 对于3岁以下儿童股骨干骨折的治疗,正确的叙述是
- A. 可以接受骨折断端有2cm以内的缩短
 - B. 常采用切开复位内固定治疗
 - C. 常采用骨牵引治疗
 - D. 可以接受轻度的旋转移位
 - E. 应与成人骨折的治疗原则一致
29. 以下疾病最常出现尿白细胞管型的是
- A. 急性肾盂肾炎
 - B. 微小病变型肾病
 - C. IgA 肾病
 - D. 急性肾小管坏死
 - E. 急性肾小球肾炎
30. 关于星形细胞瘤的描述,错误的是
- A. 肿瘤多呈浸润性生长
 - B. 可分为纤维型、原浆型、肥胖细胞型
 - C. 主要位于灰质内
 - D. 实性者无明显边界
 - E. 可不限于一个脑叶
31. 预防偏头痛发作的药物是
- A. 托吡酯
 - B. 卡马西平
 - C. 乙琥胺
 - D. 小剂量阿司匹林
 - E. 消炎药
32. 下列关于急性硬膜外血肿特点的叙述,不正确的是
- A. 幕上急性硬膜外血肿以颞部多见
 - B. 伤后即出现“中间清醒期”
 - C. 大多数合并颅骨骨折
 - D. 好发于青壮年
 - E. 中间清醒期常有躁动不安
33. 胃食管反流病的主要发病机制不包括
- A. 夜间胃酸分泌过多
 - B. 下食管括约肌压力降低
 - C. 异常的食管下括约肌(LES)一过性松弛
 - D. 胃排空异常
 - E. 食管廓清能力下降
34. 反映肝纤维化的血清学指标是
- A. 直接胆红素
 - B. 白蛋白
 - C. 胆碱酯酶
 - D. 丙氨酸氨基转移酶
 - E. IV型胶原(CIV)
35. 下列进展期胃癌的临床表现中,最常见的是
- A. 贫血
 - B. 呕血
 - C. 黑便
 - D. 腹胀
 - E. 腹痛
36. 下列细胞中能分泌降钙素的是
- A. 甲状腺滤泡细胞
 - B. 甲状旁腺细胞
 - C. 腺垂体细胞
 - D. 神经垂体细胞
 - E. 甲状腺滤泡旁细胞
37. 血管外溶血时,红细胞破坏的最主要的场所是
- A. 心脏
 - B. 脾
 - C. 肝

- D. 肾
E. 骨髓
38. 语音震颤减弱见于
A. 肺炎
B. 肺梗死
C. 肺脓肿
D. 空洞性肺结核
E. 肺气肿
39. 锥体外系损害常见的症状是
A. 感觉障碍
B. 肌张力障碍
C. 视觉障碍
D. 平衡障碍
E. 痛性麻痹
40. 属于激素冲击治疗的适应证是
A. 新月体肾炎
B. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
C. 系膜增生性肾小球肾炎
D. 局灶节段性肾小球硬化
E. 急性间质性肾炎
41. 下列属于由内分泌疾病而引起尿量增多的原因是
A. 摄水过多
B. 急性肾衰多尿期
C. 应用利尿剂
D. 中枢性尿崩症
E. 慢性肾盂肾炎
42. 不符合电烧伤特点的是
A. 皮肤的损伤轻微,而全身性损伤较重
B. 主要损害心脏,引起血流动力学改变
C. 可发生电休克,甚至心跳呼吸骤停
D. 有“入口”和“出口”,均为Ⅲ度烧伤
E. 深部损伤范围不超过皮肤“入口”处
43. 下列属于特异性感染的是
A. 背部痈
B. 疖病
C. 急性淋巴结炎
D. 急性乳腺炎
E. 淋巴结结核
44. 下列切口不宜放置纱条引流的是
A. 腹壁切口感染
B. 脓性指头炎切开
C. 掌中间隙脓肿切开
D. 体表脓肿切开
E. 乳腺癌改良根治术
45. 活动期膀胱结核,可出现
A. 持续性尿失禁
B. 压力性尿失禁
C. 急迫性尿失禁
D. 假性尿失禁
E. 容量性尿失禁
46. 恶性肿瘤种植性转移到盆腔,最多见的是
A. 胃癌
B. 肝癌
C. 胰腺癌
D. 胆管癌
E. 胆囊癌
47. 手术创伤术后禁食期间,患者机体代谢变化为
A. 蛋白分解减少,糖异生减少,脂肪分解减少
B. 蛋白分解增加,糖异生减少,脂肪分解增加
C. 蛋白分解增加,糖异生增加,脂肪分解增加
D. 蛋白分解增加,糖异生减少,脂肪分解减少
E. 蛋白分解减少,糖异生增加,脂肪分解减少
48. 慢性胃炎最主要的病因是
A. 刺激性食物
B. 化学损伤
C. HP 感染
D. 药物损伤
E. 物理损伤
49. 回肠肠痿患者所用的肠内营养制剂应该是
A. 以肽类为主
B. 以脂类为主
C. 增加维生素
D. 减少糖类
E. 增加纤维素
50. 深Ⅱ度烧伤损伤深度已达
A. 皮下脂肪层
B. 表皮浅层
C. 表皮生发层和真皮乳头层
D. 皮肤全层和肌肉
E. 真皮深层
51. 属于惰性淋巴瘤的是
A. 边缘区淋巴瘤
B. 间变性大细胞淋巴瘤
C. Burkitt 淋巴瘤

- D. 弥漫性大 B 细胞淋巴瘤
E. 套细胞淋巴瘤
52. 继发性肝癌一般不会发生变化的指标是
A. 丙氨酸氨基转移酶
B. 碱性磷酸酶
C. 谷氨酸氨基转移酶
D. 白蛋白
E. 甲胎蛋白(AFP)
53. 下列疾病中最少发生急性肝衰竭的是
A. 药物性肝病
B. 慢性乙型肝炎
C. 右半肝切除术后
D. 非酒精性脂肪性肝病
E. 四氯化碳中毒

54. 治疗 ARDS 最有效的措施是
A. 应用呼气末正压通气(PEEP)
B. 持续高浓度吸氧
C. 持续低浓度吸氧
D. 积极给予对症支持治疗
E. 早期应用糖皮质激素
55. 急性心肌梗死时不宜溶栓治疗的情况是指同时伴有
A. BP 160/100mmHg
B. 6 个月前腔隙性脑梗死
C. 主动脉夹层
D. 2 周前曾行桡动脉穿刺
E. 萎缩性胃炎 1 年

A2 型选择题(56—112 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

56. 男,60 岁。头晕、乏力伴腰痛 3 个月。血常规: Hb 70g/L, WBC $6.1 \times 10^9/L$, PLT $120 \times 10^9/L$, ESR 107mm/h,血清蛋白电泳见 M 蛋白带。尿蛋白(+).骨髓细胞学检查:幼稚浆细胞占 0.43。腰椎 X 线片示第 2、3 椎体压缩性骨折。最可能的诊断是
A. 反应性浆细胞增多症
B. 多发性骨髓瘤
C. 骨转移癌
D. 慢性肾小球肾炎
E. 霍奇金淋巴瘤
57. 女,17 岁。被人撞伤腹部,伤痛 7 小时,尿少 2 小时。查体:BP 68/50mmHg,意识模糊,面色苍白,四肢厥冷,脉搏细速,全腹压痛,有肌紧张,反跳痛(+),移动性浊音(+).该患者目前的病情为
A. 神经源性休克
B. 心源性休克
C. 过敏性休克
D. 感染性休克
E. 低血容量性休克
58. 女,47 岁。因白带多持续 7 个月,性交后出血 8 天就诊。宫颈刮片病理:宫颈鳞癌,浸润深度 7mm,肉眼见癌灶最大直径 $\leq 4\text{cm}$ 。若要清扫淋巴结,下

列哪组不是清扫范围

- A. 髂外
B. 腹股沟浅
C. 髂总
D. 髂内
E. 闭孔
59. 女,47 岁。肝区疼痛 4 个月,无发热。右肋下触及肝脏,质硬,表面有直径 5cm 结节,无触痛。既往慢性乙型肝炎病史 12 年。为确认诊断最有意义的检查是
A. 腹部 CT
B. 穿刺活检
C. 选择性肝动脉造影
D. 腹部 B 超
E. 腹部 MRI
60. 《执业医师法》规定,在医疗、预防、保健机构中试用期满 1 年,具有以下学历者,可以参加执业医师资格考试
A. 高等学校医学专业本科以上学历
B. 高等学校医学专业专科学历
C. 取得助理执业医师执业证书后,具有高等学校医学专科学历
D. 中等专业学校医学专业学历



- E. 取得助理执业医师执业证书后,具有中等专业学校医学专业学历
61. 患者经抗肿瘤治疗后尿检发现大量葡萄糖和氨基酸,推测其肾单位受损部位是
- 近端小管
 - 肾小球
 - 集合管
 - 髓祥升支粗段
 - 远端小管
62. 急性肾功能衰竭伴高钾血症患者,心率40次/分。应首先采取的治疗措施是
- 静脉点滴5%碳酸氢钠
 - 静脉点滴10%葡萄糖+胰岛素
 - 口服降钾树脂
 - 静脉注射10%葡萄糖酸钙
 - 血液透析
63. 女,38岁。4年来每于餐后40分钟出现上腹胀、疼痛,持续约2小时后可自行缓解,常有反酸、暖气,偶有大便颜色发黑。近期行上消化道X线钡剂造影提示胃窦小弯侧1cm大小壁外龛影,边缘光滑。该患者若手术治疗,常采用的术式是
- 胃大部切除术(毕Ⅱ式吻合)
 - 胃大部切除术(毕Ⅰ式吻合)
 - 高选择性迷走神经切断术
 - 全胃切除术
 - 选择性迷走神经切断术
64. 女,73岁。突发上腹痛13小时,伴寒战、发热。既往因十二指肠溃疡行胃大部切除毕Ⅱ式吻合术。查体:T 39.7℃,P 110次/分,BP 80/50mmHg,皮肤、巩膜黄染,右上腹及剑突下肌紧张,压痛、反跳痛(+).WBC $17 \times 10^9/L$ 。腹部B超示:胆总管扩张,下段受肠气影响观察不清。该患者首选的手术方式是
- 胆肠吻合术
 - 胆囊切除术
 - 胆总管切开引流术
 - 胆囊造瘘术
 - 经内镜十二指肠乳头切开术
65. 女,23岁。头晕、心悸、乏力2个月。查体:贫血貌,浅表淋巴结未触及肿大,巩膜轻度黄染,心肺未见异常,腹平软,肝肋下1cm,脾肋下3cm。实验室检查:HB 74g/L,RBC $2.4 \times 10^{12}/L$,WBC $8.0 \times 10^9/L$,PLT $153 \times 10^9/L$,网织红细胞0.12,Coombs 试验(+).患者最可能的诊断是
- 自身免疫性溶血性贫血
 - 巨幼细胞贫血
 - Evans 综合征
 - 地中海贫血
 - 缺铁性贫血
66. 男,26岁。腰背及腹部挤压伤后1小时。查体:P 96次/分,BP 140/80mmHg。痛苦貌,腹部膨隆,轻压痛,无反跳痛,肠鸣音弱,腰部部可见瘀斑。急症剖腹探查见后腹膜完整,腹膜后见 $9 \times 9 \times 2\text{cm}$ 血肿,观察其大小无变化。该患者术后的治疗中最重要的
- 纠正水电平衡紊乱
 - 防治感染
 - 防治肝肾功能障碍
 - 纠正贫血
 - 纠正低蛋白血症
67. 男,45岁。风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄9年,进行性活动耐力减低,近1年来,每于剧烈运动中发生晕厥。无高血压、糖尿病、高脂血症病史。查体:BP 100/70mmHg。心率75次/分,律齐,主动脉瓣区可闻及收缩期喷射性杂音。超声心动提示左心室增大,LVEF(左室射血分数)43%,主动脉瓣瓣口面积 0.9cm^2 ,平均压力阶差60mmHg,跨瓣峰速度 5.3m/s 。对该患者最恰当的处置是
- 每天口服单硝酸异山梨酯
 - 晕厥时硝酸甘油急救
 - 避免竞技性运动,其他体力活动不受限制
 - 口服阿托伐他汀
 - 主动脉瓣置换术
68. 女,30岁。颈前肿胀1周,伴低热。查体:甲状腺Ⅱ度肿大,发硬,无结节,基础代谢率为+30%。实验室检查:ESR 30mm/h,甲状腺24小时摄 ^{131}I 量为人体总量的20%。该患者最可能的诊断是
- 原发性甲亢
 - 地方性甲状腺肿
 - 甲状腺癌
 - 亚急性甲状腺炎
 - 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
69. 一例无主女尸,剖检发现死者两肾体积对称性缩小,重量减轻各为100g,质地硬,皮质变薄,表面呈细颗粒状。肾切片观察,均有细动脉透明变性,肾小球纤维化等改变。此患者生前可能患的疾病是

- A. 慢性肾盂肾炎
 B. 良性高血压病
 C. 急性肾小球肾炎
 D. 急性药物性间质性肾炎
 E. 急性肾盂肾炎
70. 女, 48 岁。右腿车轮碾伤 2 小时。查体: T 37.2°C, P 145 次/分, R 28 次/分, BP 89/55mmHg。神情淡漠, 面色苍白, 口唇干燥。两肺呼吸音清。腹软, 无压痛。右小腿中部开放性外伤, 伤口近端在院外已用止血带缚扎 30 分钟, 伤口无明显渗血。足背动脉搏动弱。此时该患者处理措施, 错误的是
- A. 补充血容量
 B. 放开止血带, 以免远端肢体缺血
 C. 做好术前准备, 急诊手术
 D. 备血
 E. 中心静脉置管
71. 女, 72 岁。脑血管病后遗症患者, 左侧肢体偏瘫, 行动不便, 2 周前一次进餐后出现气短, 咳嗽后气短逐渐好转, 但咳嗽持续存在, 近 3 天来出现发热, 咳少量黄痰。查体: 左上胸廓轻度塌陷, 左上肺叩诊呈浊音, 语音共振减弱, 呼吸音明显减弱。造成患者上述情况最可能原因是
- A. 阻塞性肺炎
 B. 肺结核
 C. 支气管炎
 D. 肺动脉栓塞
 E. 气胸
72. 男, 19 岁。近 1 个月来乏力明显, 周身酸痛, 四肢皮肤瘀斑, 血红蛋白由 110g/L 降至 60g/L, WBC $1.7 \times 10^9/L$, N 25%, L 75%, PLT $15 \times 10^9/L$ 。为明确诊断, 下列哪项检查是不必要的
- A. 网织红细胞计数
 B. 骨髓穿刺
 C. Ham 试验
 D. 骨髓活检
 E. 血红蛋白电泳
73. 女, 22 岁。1 型糖尿病患者。糖尿病病史 8 年, 平时应用混合胰岛素治疗(短效加长效), 分别在早餐前和晚餐前皮下注射。近 2 周监测血糖发现空腹血糖在 13.2 ~ 16.7mmol/L, 中餐前 8.0mmol/L, 晚餐前 7.6mmol/L, 临睡前 5.1mmol/L, 为了良好地控制空腹血糖。应选择下列哪项措施
- A. 可能是黎明现象, 可在晚餐前增加长效胰岛素剂量
 B. 可能是晚餐前胰岛素用量不足, 可增加晚餐前胰岛素剂量
 C. 可能是 Somogyi 现象, 应减少晚餐前胰岛素剂量
 D. 可能是 Somogyi 现象, 应先测定凌晨 1 ~ 2 时血糖, 然后调整胰岛素剂量
 E. 应减少晚餐的进餐量
74. 男, 12 岁。因发热 8 天, 抗生素治疗无效入院。查体: 球结膜充血, 口唇皲裂, 杨梅舌, 颈部淋巴结肿大, 全身可见多形性红斑。临床治愈出院后 2 个月猝死于家中, 其最可能的死因是
- A. 心肌炎
 B. 脑栓塞
 C. 脑出血
 D. 心包炎
 E. 冠状动脉瘤破裂
75. 男, 62 岁。外伤致右腕部疼痛、肿胀 1 小时。既往体健, 无糖尿病病史。查体: T 36.8°C, P 70 次/分, R 18 次/分, BP 100/60mmHg, 心肺腹未见异常, 右腕部疼痛、肿胀、活动受限。X 线片示桡骨下端骨皮质不连续, 对位对线良好, 并有嵌插。最恰当的治疗措施是
- A. 皮牵引
 B. 中药活血化瘀
 C. 切开复位内固定
 D. 骨牵引
 E. 手法复位外固定
76. 女, 68 岁。高血压 13 年, 规律服用氢氯噻嗪和卡托普利降压, 近 4 天来腹泻, 呈稀水样便, 尿量 300 ~ 400ml/d, 实验室检查: Scr 158 μ mol/L, BUN 19mmol/L, 尿渗透压 600mOsm/kg · H₂O。患者出现上述异常检测结果的最可能原因是
- A. 急性间质性肾炎
 B. 肾后性梗阻
 C. 药物不良反应
 D. 急性肾小管坏死
 E. 血容量减低
77. 女, 1 个月。出生体重 3.4kg, 呕吐 1 周。生后 3 周左右开始溢乳, 逐日加重呈喷射性呕吐, 奶汁带凝块, 不含胆汁。查体: 体重 3.4kg, 皮肤轻度黄染, 前囟稍凹, 心肺无异常, 上腹部蠕动波, 右季肋下肿块, 质较硬, 光滑, 移动。最可能的原因是
- A. 喂养不当

- B. 胃食管反流
C. 幽门痉挛
D. 先天性肥厚性幽门狭窄
E. 胃扭转
78. 男, 18岁。因食过多橘子造成血中胡萝卜素增高, 患者出现的皮肤黏膜黄染。首先常见于
A. 手掌、足底
B. 巩膜
C. 口腔黏膜
D. 躯干
E. 耳后
79. 小儿, 体重 7kg, 身高 62 厘米, 会抬头, 能独坐一会, 不会爬, 会发单音, 萌牙 1 枚。为判断骨骼发育年龄, 最有临床意义的 X 线拍片部位是
A. 膝部
B. 左手指
C. 左手掌
D. 踝部
E. 左手腕
80. 女, 50 岁。因患短肠综合征, 予全胃肠外营养 (TPN) 治疗。应用 1 周时, 患者出现昏迷, 但尿内无酮体。患者既往曾有空腹血糖高 (11mmol/L)。此病的发病机制是由于
A. 内源性胰岛素分泌不足
B. 等渗性脱水
C. 输液导管细菌滋生
D. 肝功能损害
E. 肾功能损害
81. 女, 27 岁。因上腹部突发刀割样剧痛 1 小时急诊入院。查体: 强迫体位, 板状腹, 全腹压痛、反跳痛、肌紧张, 以右上腹为著, 肝浊音界减小, 肠鸣音减弱。若行诊断性腹腔穿刺, 穿刺液性质最可能是
A. 草绿色、透明
B. 血性恶臭
C. 血性、无臭、淀粉酶含量高
D. 稀脓性略带臭气
E. 黄色、浑浊、含胆汁或食物残渣
82. 男, 48 岁。高处坠落伤 7 小时, 伤后未排尿。查体: 神志清, BP 80/55mmHg, 血氧饱和度 (SaO₂) 90%, 颈部、背部、腰部、胸部无压痛, 心率 122 次/分, 腹部无压痛、肌紧张, 上肢感觉活动正常, 骨盆分离挤压试验 (+), 髋关节活动受限, 大腿见多处皮肤擦伤并有沙粒污染, 下肢感觉运动正常。入院后首先要进行的处理是
A. 立即留置导尿
B. 临时固定骨盆
C. 立即清创, 防止创面感染
D. 立即开通静脉补液通路
E. 立即完相关检查, 明确诊断
83. 男, 24 岁。施工时右大腿开放伤, 未发现骨折, 行简单的创口缝合。2 天后感伤部包扎过紧, 疼痛剧烈, 患肢肿胀明显, 缝合处血性液体渗出多, 恶臭。导致这种感染最主要的原因是
A. 伤口包扎过紧
B. 未应用广谱抗生素
C. 初次缝合创面止血不充分
D. 未行静脉营养
E. 第一次清创不彻底
84. 女, 64 岁。上腹痛 3 周。既往高血压病史 13 余年, 反复心前区疼痛发作 3 个月, 口服阿司匹林 100mg/d。上消化道 X 线钡剂造影: 胃角切迹壁外龛影, ¹³C 尿素呼气试验阳性。最适宜的治疗药物是
A. 雷尼替丁
B. 多潘立酮
C. 枸橼酸铋钾
D. 奥美拉唑
E. 氢氧化铝
85. 男, 35 岁。因车祸 3 小时急诊入院, 经抢救后生命体征平稳, 神志清醒。现出现下腹部疼痛, 不能排尿 4 小时。查体: 下腹部叩诊呈浊音, 直肠指检可触及直肠前方饱满, 前列腺尖端浮动感。X 线片示骨盆骨折 (耻骨下支断裂)。最可能的诊断是
A. 肾损伤
B. 前尿道损伤
C. 输尿道损伤
D. 后尿道损伤
E. 膀胱破裂
86. 男婴, 5 个月。50 天前诊断为化脓性脑膜炎, 抗生素治疗 4 周后病情平稳出院。近 1 周患儿出现烦躁哭闹、呕吐, 家长发现头颅进行性增大, 前囟饱满扩大, 头皮静脉扩张, 头颅 CT 示脑室系统扩大。最可能的诊断是
A. 硬脑膜下积液
B. 脑积水

- C. 脑囊肿
D. 抗利尿激素异常分泌综合征
E. 脑室管炎
87. 男, 8 岁。水肿伴尿少 3 天。病前 12 天有“上感”病史。查体: BP 130/90mmHg, 眼睑及颜面水肿, 双下肢轻度水肿, Hb 100g/L。尿常规: 沉渣镜检: RBC (20~30)/HP, WBC (3~5)/HP, 尿蛋白试验 (PRO) (++)。该患儿最可能的诊断是
- A. 泌尿系统感染
B. 慢性肾小球肾炎急性发作
C. 急进性肾小球肾炎
D. 肾炎型肾病综合征
E. 急性链球菌感染后肾炎
88. 女, 27 岁。右侧上肢及颈部沸水烫伤 5 小时。查体: T 37.6°C, P 100 次/分, R 20 次/分, BP 130/90mmHg, 意识清楚, 右侧上肢及颈部红肿明显, 大量水疱, 基底发红, 疼痛明显。该患者皮肤烧的深度和分度是
- A. 浅 II 度中度烧伤
B. 深 II 度轻度烧伤
C. 深 II 度重度烧伤
D. 浅 II 度轻度烧伤
E. 深 II 度中度烧伤
89. 男, 23 岁, 农民。发热、头痛、恶心呕吐 3 天。查体: T 37.9°C, BP 60/40mmHg, 脉搏细速, 躯干有瘀点, 双肾区叩击痛。检查血常规: WBC $30 \times 10^9/L$, N 0.80, L 0.10, PLT $50 \times 10^9/L$, 尿蛋白 (++)。诊断为
- A. 流行性脑脊髓膜炎
B. 败血症, 感染性休克
C. 肾综合征出血热
D. 钩端螺旋体病
E. 传染性单核细胞增多症
90. 男, 68 岁。间断发热 1 个月, 咳血伴进行性少尿 10 天。查体: BP 165/100mmHg, 双中下肺可闻及湿啰音, 双下肢水肿。尿常规: RBC (40~50)/HP, 尿蛋白 (++)。Scr $455 \mu\text{mol/L}$, BUN 18.5mmol/L , B 超示双肾增大。ANA (-), 抗中性粒细胞胞浆抗体阳性。最可能的诊断是
- A. 急进性肾小球肾炎 II 型
B. 急进性肾小球肾炎 III 型
C. 急进性肾小球肾炎
D. IgA 肾病
E. 急进性肾小球肾炎 I 型
91. 女, 60 岁。乏力、消瘦, 伴大便次数增多 3 个月。查体: 面色苍白, 腹平软, 右侧腹部可触及直径约 6cm 包块。实验室检查: Hb 80g/L, 粪隐血 (+)。最可能的诊断是
- A. 十二指肠癌
B. 胆囊癌
C. 阑尾类癌
D. 升结肠癌
E. 胰头癌
92. 男, 72 岁。右腹股沟区可复性肿物 18 年。查体: P 70 次/分, R 18 次/分, BP 160/110mmHg。糖尿病病史 10 年, 口服降糖药治疗, 空腹血糖近 1 个月来维持在 $6.2 \sim 8.9 \text{mmol/L}$ 。吸烟 30 余年, 20~30 支/天。欲行右腹股沟无张力疝修补术, 围手术期处理错误的是
- A. 术前戒烟 2 周
B. 练习床上排便
C. 术前应用胰岛素降低血糖
D. 术前禁食 12 小时
E. 口服降压药控制血压
93. 女, 26 岁。低热, 便秘、腹泻交替 4 年。查体: 右下腹 $5 \times 6 \text{cm}$ 肿块, 质中等, 较固定, 轻压痛。最有可能是
- A. 结肠癌
B. 肠结核
C. 克罗恩病
D. 溃疡性结肠炎
E. 肠血吸虫病
94. 男, 48 岁。胃癌根治术后第 7 天, 出现上腹剧烈疼痛, 逐渐加重, 伴恶心、呕吐、腹胀。查体: 腹膜刺激征 (+), 腹腔引流管引流出咖啡色浑浊液体。腹部 B 超示腹腔积液。最可能的诊断是
- A. 急性梗阻性化脓性胆管炎
B. 肠系膜血管缺血性疾病
C. 急性胆囊炎
D. 吻合口瘘
E. 急性胰腺炎
95. 女, 67 岁。大量呕血、黑便 18 小时。既往有胃溃疡病史 23 年, 曾有多次出血史。查体: P 126 次/分, BP 86/50mmHg。神情紧张, 烦躁, 手足湿冷, 腹软, 上腹部压痛 (+), 肠鸣音亢进。血常规: Hb 90g/L, 血细胞比容 0.30。心电图示窦性心动

- 过速。经急诊胃镜发现胃角切迹大溃疡,活动出血明显,决定行胃大部切除术,为达到治疗效果,至少应切除胃的
- 30%左右
 - 50%左右
 - 80%左右
 - 40%左右
 - 60%左右
96. 女,30岁。反复便秘、腹痛10年。便前腹痛、腹部不适,便后缓解;工作紧张时症状加重。无便血及消瘦。睡眠差。最有可能的诊断是
- 肠易激综合征
 - 克罗恩病
 - 肠结核
 - 结肠癌
 - 溃疡性结肠炎
97. 男,62岁。左胸痛5天,胸闷、气促2天。查体:双下肺呼吸音粗,心率108次/分, $P_2 > A_2$ 。胸部X线片示左下肺透亮度增加。对明确诊断最有价值的是
- CT肺动脉造影(CTPA)
 - 胸部高分辨CT
 - 心电图
 - D-二聚体
 - 超声心动图
98. 女,12岁。左膝外伤后当晚出现寒战、高热,短暂谵妄。查体:T 39.3℃,左膝局部肿胀、疼痛明显,浮髌试验阳性。实验室检查:WBC $14.0 \times 10^9/L$, N 0.85, ESR 75mm/h。X线检查未见明显异常。首先考虑的诊断是
- 恶性骨肿瘤
 - 类风湿关节炎
 - 急性骨髓炎
 - 关节结核
 - 急性化脓性膝关节炎
99. 女,44岁。右乳房外上象限4×4cm肿块,距乳头距离5cm,可推动,但是患者双手叉腰时肿块活动度明显受限,右腋窝未扪及肿大淋巴结。该患者最佳的定性诊断方法是
- 粗针穿刺活检
 - 钼靶X线片检查
 - 切取活检
 - 近红外线扫描
 - 细针穿刺细胞学检查
100. 女,44岁。反复喘息发作5年,近2天来症状加重,每天夜间均有发作。查体:双肺哮鸣音,心率80次/分,FEV₁/FVC 60%。治疗方案应采取的是
- 口服氨茶碱及沙丁胺醇
 - 口服泼尼松及氨茶碱
 - 静脉点滴氨茶碱,口服泼尼松
 - 吸入糖皮质激素,必要时吸入沙丁胺醇
 - 静脉点滴氢化可的松,必要时吸入沙丁胺醇
101. 女,42岁。因左腰部阵发性绞痛,辗转不安,伴恶心,疼痛发作时剧烈难以忍受,排尿不适2小时余急诊来院,既往有类似发作史,曾经诊断泌尿系统结石。检查:左肾区明显叩痛,尿常规:RBC 48个/HP。下一步应首先给患者如何处理最合适
- 立即行排泄性尿路造影
 - 急诊行B超检查
 - 急诊核素肾图检查
 - 取清洁中段尿做尿培养
 - 立即应用镇痛和解痉剂
102. 女,54岁。车祸致骨盆骨折,脾破裂,脾切除术后胃瘫,给予静脉输入25%葡萄糖400ml和其他液体,术后11天患者出现皮肤、巩膜黄染,并进行性加重,化验血糖20.3mmol/L。出现黄疸的最可能的原因是
- 复合伤导致肝功能失代偿
 - 糖代谢紊乱导致肝功能损害
 - 电解质紊乱导致肝功能损害
 - 药物中毒导致肝功能损害
 - 输血所致血管内溶血
103. 男,60岁。乙型肝炎病史12年,近日出现呕血、柏油样便,继之神志恍惚来诊。查体:BP 80/50mmHg,巩膜黄染,言语不清,定向力丧失,计算能力下降,幻觉出现,睡眠时间倒错,有扑翼震颤,肌张力增高,脑电图异常,Hb 40g/L,pH 7.48,血清钾2.8mmol/L,血氨升高。如患者出现狂躁不安可给予的药物是
- 吗啡
 - 水合氯醛
 - 哌替啶
 - 副醛
 - 异丙嗪

104. 男, 24 岁。7 个月前无诱因缓慢出现左胸电击样疼痛, 夜间加重。4 个月前左下肢进行性无力, 过 1 个月右下肢无力, 排尿困难。查体: 双上肢正常, 左下肢肌力 3 级、右下肢 4 级, 肌张力增高, 腱反射亢进, 双 Babinski 征 (+), 双乳头以下感觉减退。最可能的诊断是
- A. 脊髓压迫症
B. 急性脊髓炎
C. 运动神经元病
D. 急性脊髓灰质炎
E. 吉兰巴雷综合征
105. 男, 60 岁。于 1 天内逐渐出现右侧上下肢无力及讲话不能。神经系统检查: 右侧偏瘫, 右侧偏身感觉减退, 右侧偏盲, 失语。临床诊断为脑血栓形成。闭塞的血管是
- A. 左侧大脑中动脉主干
B. 左侧大脑中动脉豆纹动脉
C. 左侧椎动脉
D. 左侧颈外动脉
E. 右侧大脑中动脉豆纹动脉
106. 女, 20 岁, 大学生。来院前 40 分钟在上体育课时感头痛后即有呕吐, 随后有抽搐发作, 旋即昏迷。病前体健, 无感冒史, 来院急诊时仍有抽搐发作。体检: 双瞳孔尚等, 直径大约 2.0mm, 光反应迟钝, 颈有抵抗, Kernig 征 (+)。此时下列治疗措施中最适宜的是
- A. 抗癫痫药物应用
B. 抗纤溶药物应用
C. 降颅压药物应用
D. 绝对卧床休息
E. 扩血管药物应用
107. 女, 29 岁。关节疼痛 1 年, 皮肤散在瘀点 2 个月伴月经过多就诊。实验室检查: 红细胞沉降率 100mm/h, 抗“O”正常, Hb 86g/L, PLT $51 \times 10^9/L$, ANA 呈颗粒型阳性, 尿检: 尿蛋白 (+++), 确诊为 SLE。在估计预后时, 下列哪项说法不正确的是
- A. 反复发作关节炎常引起关节畸形和关节周围肌肉萎缩
B. 反复癫痫样发作及有器质性脑病表现者预后不佳
C. 肾脏病理是弥漫增殖型表现者, 预后不佳
D. 早期诊断和有效治疗 SLE 10 年生存率可

- 达 90%
- E. 妊娠可加重病情, 因此育龄妇女应避免孕
108. 男, 62 岁。4 年前曾行直肠癌根治术, 近 4 个月右上腹及背部胀痛, 无发热, 大便正常。查体: 锁骨上未触及肿大淋巴结, 腹平软, 未触及肿物, 肝肋下未触及。实验室检查: WBC $10 \times 10^9/L$, AFP 无升高。腹部 B 超示: 肝右叶多个实性占位, 最大直径约 3cm。首先应考虑的诊断是
- A. 阿米巴肝脓肿
B. 肝血管瘤
C. 多发肝囊肿
D. 原发性肝癌
E. 肝转移癌
109. 女, 38 岁。突发上腹剧痛 5 天, 加重伴发热 2 天。查体: T 38°C, BP 76/50mmHg。面色苍白, 嗜睡, 脉搏细速, 尿少, 中上腹压痛 (+), 伴反跳痛, 上腹部可触及肿块, 不活动。B 超示胰腺周围液性包块, 直径 11cm。实验室检查: 尿淀粉酶 10 000U/L, WBC $18 \times 10^9/L$ 。引起该患者感染的致病菌最可能是
- A. 肠球菌
B. 大肠埃希菌
C. 结核杆菌
D. 溶血性链球菌
E. 白色念珠菌
110. 某护士在给一位乙型肝炎病毒 (HBV) 携带者注射时, 不慎被患者用过的针头刺伤手指。为预防乙型肝炎病毒感染, 应首先采取的措施是
- A. 注射抗生素
B. 注射丙种球蛋白
C. 注射乙型肝炎疫苗
D. 注射 HBIG
E. 注射 α -干扰素
111. 男, 52 岁。门静脉高压症食管胃底静脉曲张破裂出血, 给予三腔管压迫止血及快速输血输液治疗, 出血停止。此时, 心率 150 次/分, BP 90/70mmHg, 中心静脉压 20cmH₂O, 提示该患者最可能是
- A. 血容量不足
B. 肝性脑病
C. 心功能不全
D. 容量血管过度扩张
E. 容量血管过度收缩



112. 女, 32岁。餐后突发右上腹及剑突下痛, 放射到右肩及后背部, 2小时后疼痛剧烈, 伴恶心, 并吐出所进食物, 仍不缓解, 急诊就医。数年“胃病”史及胆石症历史, 间有胆绞痛发作。查体: 痛苦面容, T 37.2°C, R 28次/分, 浅快, 心律齐。全腹胀, 上腹肌紧张, 压痛反跳痛(+)。移动性浊音(±), 实验室检查: WBC $12 \times 10^9/L$, Hb 125g/L,

尿淀粉酶 400U (温氏法正常值 32μ)。下列初步诊断中, 不可能的是

- A. 胃十二指肠溃疡穿孔
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胃肠炎

A3/A4 型选择题 (113—133 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(113—115 题共用题干)

男, 64岁。突发上腹阵发性绞痛 3 小时, 短时间内寒战、高热, 小便呈浓茶样, 随后嗜睡。查体: T 39.6°C, P 128次/分, R 30次/分, BP 80/50mmHg。神志不清, 躁动, 巩膜黄染, 右上腹肌紧张, 有压痛和反跳痛。

113. 导致该患者所患疾病最可能的病因是

- A. 胆管肿瘤
- B. 胆管结石
- C. 胆管蛔虫
- D. 胆管狭窄
- E. 胆管畸形

114. 以下非手术治疗措施中, 错误的是

- A. 持续吸氧
- B. 联合使用足量抗生素
- C. 纠正水、电解质紊乱
- D. 输注 2 个单位红细胞
- E. 禁食、胃肠减压

115. 急症手术最有效的手术方式是

- A. 胆总管切开减压术
- B. 腹腔镜胆囊切除术
- C. 胆囊造瘘术
- D. 胆总管空肠吻合术
- E. 胆总管十二指肠吻合术

(116—117 题共用题干)

女, 47岁。间断腹泻 6 年, 加重 4 个月。大便每天 4~5 次, 脓血便, 纳差, 体重减轻 7kg。口服左氧氟沙星治疗 2 周后, 复查粪便常规: 白细胞、红细胞满视野, 隐血(+)。血常规: Hb 100g/L, WBC $4.5 \times 10^9/L$, PLT $215 \times 10^9/L$ 。

116. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 腹部 B 超
- B. 血清肿瘤标志物
- C. 腹部 CT
- D. 结肠镜
- E. 下消化道 X 线钡剂造影

117. 最有可能的诊断是

- A. 肠道菌群失调
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 肠易激综合征
- D. 细菌性痢疾
- E. 结肠癌

(118—119 题共用题干)

男, 48岁。腹痛伴腹胀 1 天, 暴饮暴食后突然剧烈上腹痛, 之后出现腹胀, 停止排气、排便。查体: T 38.2°C, P 120次/分, R 25次/分, BP 135/73mmHg。腹部明显膨隆, 双侧腰部皮下瘀斑, 全腹肌紧张, 压痛和反跳痛(+), 肠鸣音消失。实验室检查: 血清淀粉酶 $180U/L$, WBC $17 \times 10^9/L$ 。

118. 关于该患者的肠外营养支持, 正确的是

- A. 各种营养成分应单瓶输注
- B. 以外周静脉输注为主
- C. 在肠外营养时, 可同时应用生长激素
- D. 加入谷氨酰胺以保护肠黏膜屏障
- E. 加入白蛋白作为肠外营养的氮源

119. 关于该患者的肠内营养支持, 正确的原则是

- A. 血清淀粉酶恢复正常后即可以实施肠内营养
- B. 在该患者病程中都不能肠内营养
- C. 早期以肠内营养为主

- D. 肠功能恢复后尽早实施肠内营养
- E. 生命体征平稳后方可实施肠内营养

(120—122 题共用题干)

女婴,8 个月。因发热 2 天,抽搐 2 次,伴呕吐,吃奶量减少,喜哭,易怒就诊。母乳喂养。查体:精神差,前囟饱满,心肺腹无异常发现,肌张力增高,脑脊液检查:外观混浊,WBC $1\ 000 \times 10^6/L$,中性粒细胞为主,糖 1mmol/L ,氯化物 107mmol/L ,蛋白质 2.0g/L 。

120. 最可能的诊断是

- A. 病毒性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 隐球菌性脑膜炎
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 中毒性脑病

121. 针对病因,首选的治疗药物是

- A. 阿昔洛韦
- B. 异烟肼
- C. 甘露醇
- D. 头孢曲松
- E. 氯康唑

122. 如合并硬膜下积液,积液量较大,颅内压明显增高,应选择硬膜下穿刺放出积液,每次每侧放液量为

- A. 21 ~ 25ml
- B. 31 ~ 50ml
- C. < 15ml
- D. 15 ~ 20ml
- E. 26 ~ 30ml

(123—124 题共用题干)

男,35 岁。工地施工人员。因施工时骨盆被重物挤压入院。查体:BP 90/50mmHg,P 120次/分,面色苍白,下腹部有压痛。Hb 110g/L。X 线片示髌骨线性骨折。经补液治疗,生命体征平稳,但仍无尿,留置尿管仅有 50ml 尿液流出,淡红色。全腹部膨胀,移动性浊音阳性。

123. 首先应行的检查是

- A. 腹腔动脉造影
- B. B 超
- C. CT
- D. 膀胱造影
- E. 尿道造影

124. 治疗应选择

- A. 继续临床观察

B. 剖腹探查行膀胱修补术

C. 耻骨上膀胱造瘘术

D. 尿道修补术

E. 腹穿抽吸腹水治疗

(125—126 题共用题干)

男,35 岁。发现阴囊肿胀、肿块 3 个月余,近 3 个月来有所增大,结婚 4 年未生育。体检:双侧附睾尾均可扪及不规则硬结,与阴囊皮肤粘连,胸片示左肺陈旧性结核病灶。

125. 最可能的诊断为

- A. 睾丸结核
- B. 附睾结核
- C. 附睾肿瘤
- D. 慢性附睾炎
- E. 附睾精液囊肿

126. 最有效的治疗措施是

- A. 抗生素
- B. 加强营养、卧床休息
- C. 理疗
- D. 抗结核药物
- E. 局部热敷

(127—129 题共用题干)

男,23 岁。发热 2 周,T $38 \sim 39^{\circ}\text{C}$,检查皮肤散在紫癜,颈部及腋下可触及 $0.5 \times 1.5\text{cm}$ 大小淋巴结 5 ~ 6 个,脾肋下 3cm,Hb 85g/L,WBC $10 \times 10^9/L$,PLT $25 \times 10^9/L$ 。

127. 对诊断帮助最大的检查

- A. 血细菌培养
- B. 白细胞分类
- C. 胸部 X 线片
- D. 骨髓象检查
- E. 血小板抗体测定

128. 此患者在治疗 3 周后,出现高热、头痛、呕吐,Kernig 征(+),应采取治疗方案

- A. 应用广谱抗生素
- B. 链霉素、雷米封、利福平联合治疗
- C. 化疗 + 鞘内注射 MTX
- D. 肾上腺糖皮质激素 + 先锋霉素
- E. 输血小板

129. 此患者在发烧头痛呕吐第二天作脑脊液检查,最可能的发现为

- A. 脑脊液中性粒细胞增高
- B. 细菌培养阳性

- C. 脑脊液发现结核杆菌
- D. 脑脊液蛋白量显著增高、糖定量减低
- E. 脑脊液白血细胞增多

(130—131 题共用题干)

男,52岁。双下肢僵硬乏力2年,双上肢乏力肌萎缩半年。体检:双手大小鱼际肌萎缩,可见肌纤维震颤,四肢痉挛性肌张力增高,四肢肌力4级,骶阵挛阳性,踝阵挛阳性,双侧 Babinski 征(+)。

130. 帮助诊断的首选检查是

- A. 腰穿脑脊液检查
- B. 肌电图检查
- C. 脊髓 CT
- D. 脊髓 MRI
- E. 叶酸及维生素 B₁₂ 测定

131. 病变累及的解剖结构是

- A. 上运动神经元
- B. 下运动神经元
- C. 皮质脊髓束
- D. 脊髓前角
- E. 上、下运动神经元

B1 型选择题 (134—150 题)**答 题 说 明**

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(134—135 共用备选答案)

- A. 乙琥胺
- B. 地西洋
- C. 氯丙嗪
- D. 苯妥英钠
- E. 异丙嗪

134. 治疗脊髓损伤引起肌强直的药物是

135. 治疗癫痫大发作和局限性发作的药物

(136—137 共用备选答案)

- A. 罗格列酮
- B. 吡格列酮
- C. 阿卡波糖
- D. 格列齐特
- E. 二甲双胍

136. 促进胰岛素分泌的药物是

137. 延缓肠道碳水化合物吸收的药物是

(132—133 题共用题干)

男,28岁。间断咳嗽、咳痰带血1个月,乏力、纳差伴尿少、水肿1周。实验室检查:WBC $8.6 \times 10^9/L$, Hb 90g/L,尿蛋白(++),尿沉渣镜检:RBC (8~10)/HP, Scr 268 $\mu\text{mol/L}$, BUN 22.6mmol/L,抗肾小球基底膜抗体(+),ANCA 阴性。

132. 其肾脏最可能的病理类型为

- A. 膜增生性肾小球肾炎
- B. 新月体性肾小球肾炎
- C. 系膜增生性肾小球肾炎
- D. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
- E. 膜性肾病

133. 最可能的免疫病理所是

- A. 无或仅微量免疫复合物
- B. IgG 和 C₃ 呈颗粒状沉积于系膜区及毛细血管壁
- C. IgG、IgA、IgM、C₃ 呈多部位沉积
- D. IgG 和 C₃ 呈细颗粒状沿毛细血管壁沉积
- E. IgG 和 C₃ 呈线条状沉积于毛细血管壁

(138—140 共用备选答案)

- A. IgA
- B. IgD
- C. IgE
- D. IgG
- E. IgM

138. 唯一能通过胎盘的免疫球蛋白是

139. 脐带血中水平增高,提示宫内感染的免疫球蛋白是

140. 与机体抗寄生虫免疫有关的免疫球蛋白是

(141—142 共用备选答案)

- A. 白血病
- B. 结肠癌
- C. 甲状腺癌
- D. 肺癌
- E. 乳腺癌

141. 携带缺陷基因 BRCA - 1 者易患的疾病是

142. 适用 Dukes 分期的疾病是

(143—144 共用备选答案)

- A. 前列腺增生
- B. 慢性前列腺炎
- C. 前列腺结核
- D. 前列腺结石
- E. 前列腺癌

143. 前列腺明显增大,质地硬如鹅卵石

144. 输精管可及串珠样结节

(145—146 共用备选答案)

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 窦性心动过速
- D. 阵发性室上性心动过速
- E. 持续性室性心动过速

145. 突然发作突然终止,按摩颈动脉窦可终止发作,最可能的是

146. 最易引起血流动力学异常的是

(147—148 共用备选答案)

- A. 多为有吸烟嗜好的青年女性
- B. 患踝关节过度背伸试验阳性
- C. 多有复发性游走性浅静脉炎病史
- D. 患肢足背动脉搏动正常
- E. 多合并高血压、高脂血症、糖尿病

147. 血栓闭塞性脉管炎的临床特点是

148. 动脉硬化性闭塞症的临床特点是

(149—150 共用备选答案)

- A. 列兵样排列
- B. 形成管状结构
- C. 形成乳头状结构
- D. 有角化珠
- E. 有假菊形团结构

149. 最符合高分化鳞癌组织学特点的是

150. 最符合肺小细胞癌组织学特点的是

第四单元

A1型选择题(1—71题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 吉兰巴雷综合征 (GBS) 的脑脊液蛋白 - 细胞分离是指

 - A. 蛋白正常, 细胞数正常
 - B. 蛋白增高, 细胞数正常
 - C. 蛋白增高, 细胞数降低
 - D. 蛋白降低, 细胞数增高
 - E. 蛋白正常, 细胞数增高
2. 有关无症状性脑梗死的描述, 不正确的是

 - A. 无明显体征
 - B. 病因多是动脉粥样硬化
 - C. 多位于非功能区
 - D. MRI 易见脑室旁的白质高信号
 - E. 可引起血管性认知障碍
3. 孕妇尿中与胎儿胎盘单位功能关系密切的激素是

 - A. 雌二醇
 - B. 雌三醇
 - C. 雌酮
 - D. 孕酮
 - E. 睾酮
4. 可引起先天性婴儿畸型的常见病毒是

 - A. 风疹病毒
 - B. 麻疹病毒
 - C. 狂犬病毒
 - D. 髓灰质炎病毒
 - E. EB 病毒
5. 金黄色葡萄球菌肺炎的主要临床特点是

 - A. 肺部体征出现较早, 易引起肺脓肿、肺大疱
 - B. 体温一般不高, 喘憋为主, 肺部听诊有哮鸣音
 - C. 多为稽留热肺部体征出现晚
 - D. 嗜酸细胞增高
 - E. X 线片示肺部片状阴影呈云雾状或游走性
6. 不属于糖皮质激素 (GCS) 类药物抗体克作用机制的是

 - A. 增强心肌收缩力
 - B. 抑制炎性细胞因子释放
 - C. 中和细菌外毒素
 - D. 扩张痉挛收缩的血管
 - E. 稳定溶酶体膜
7. 女方原因实施体外受精 - 胚胎移植技术, 可能产生伦理问题不包括

 - A. 辅助生殖所生的孩子的父母如何定位
 - B. 代孕技术是否允许
 - C. 精子、卵子、胚胎是否商品化
 - D. 对胎儿进行非医学目的的性别鉴定
 - E. 婴儿与亲代关系模糊
8. 观察铁剂治疗缺铁性贫血最先开始恢复

 - A. 细胞内含铁酶活性
 - B. 血清铁蛋白增加
 - C. 血红蛋白上升
 - D. 红细胞数上升
 - E. 网织红细胞上升
9. 制备洗涤红细胞的主要目的是

 - A. 去除血小板
 - B. 去除红细胞碎片
 - C. 去除细菌
 - D. 去除白细胞
 - E. 去除血浆蛋白
10. 含铜宫内节育器 (IUD) 的主要作用机制不包括

 - A. 影响子宫内膜细胞糖原代谢和雌激素摄入
 - B. 使宫颈黏液稠厚不利于精子穿透
 - C. 铜离子使精子头尾分离不得获能
 - D. 使受精卵运行速度与子宫内膜发育不同步
 - E. 压迫局部子宫内膜产生炎症反应

11. 下列关于 PPD 的说法,最准确的是
- A. 凡是 PPD 试验阴性可排除结核病
 - B. PPD 试验阳性可肯定有结核病
 - C. 粟粒型肺结核 PPD 试验有时可呈阳性
 - D. 初次感染结核菌后 2 周 PPD 试验呈阳性
 - E. 卡介苗接种成功 PPD 试验呈强阳性
12. 每克营养物质供能最高的是
- A. 矿物质
 - B. 蛋白质
 - C. 膳食纤维
 - D. 糖类
 - E. 脂类
13. 不符合小儿先天性肥厚型幽门狭窄临床特点的是
- A. 呕吐物含胆汁
 - B. 多于生后 2~4 周发病
 - C. 右季肋区下可触及橄榄样肿块
 - D. 少数患者有黄疸
 - E. 常见左向右的胃蠕动波
14. 安静状态下,小儿肺活量为
- A. 20~40ml/kg
 - B. 40~60ml/kg
 - C. 50~70ml/kg
 - D. 60~80ml/kg
 - E. 80~100ml/kg
15. 用药物可能治愈的先天性心脏病是
- A. 法洛四联症
 - B. 动脉导管未闭
 - C. 房间隔缺损
 - D. 室间隔缺损
 - E. 大血管部分转位
16. Asherman 综合征与哪项有关
- A. 垂体
 - B. 下丘脑
 - C. 子宫
 - D. 卵巢
 - E. 无正确选项
17. 产后出血最常见的原因是
- A. 胎盘植入
 - B. 血小板减少
 - C. 子宫收缩乏力
 - D. 胎盘嵌顿
 - E. 胎盘粘连

18. 最容易引起枕骨大孔疝的颅内占位性病变是
- A. 颞叶肿瘤
 - B. 侧脑室肿瘤
 - C. 第二脑室肿瘤
 - D. 鞍区肿瘤
 - E. 第四脑室肿瘤
19. 急性乳腺炎的病因不包括
- A. 乳头内陷
 - B. 乳汁过多
 - C. 乳管不通
 - D. 乳房淋巴管阻塞
 - E. 婴儿吸乳少
20. 较常出现杵状指(趾)的呼吸系统疾病是
- A. 慢性支气管炎
 - B. 阻塞性肺气肿
 - C. 支气管哮喘
 - D. 支气管扩张症
 - E. 支原体肺炎
21. 肾脏在胎儿期合成较多的激素是
- A. $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$
 - B. 前列腺素
 - C. 促红细胞生成素
 - D. 肾素
 - E. 利钠激素
22. 下列关于女性外阴解剖结构的描述,正确的是
- A. 前庭大腺位于大阴唇后部,被球海绵体肌覆盖
 - B. 阴道前庭有尿道外口、阴道口和肛门
 - C. 处女膜的表面上皮为柱状上皮
 - D. 阴蒂分为阴蒂头和阴蒂脚 2 部分
 - E. 大阴唇的外侧为皮肤,内侧为黏膜
23. 频发的周期性麻痹应选的治疗是
- A. 胸腺摘除
 - B. 乙酰唑胺
 - C. 泼尼松
 - D. 吡啶斯的明
 - E. 卡马西平
24. 与牛乳相比,母乳的优点是
- A. 乳糖含量少
 - B. 含饱和脂肪酸多
 - C. 钙磷比为 1:2
 - D. 酪蛋白含量少
 - E. 铁吸收率大于 30%



25. 不符合神经症共同特点的是
- 常有一定的易感素质
 - 与心理社会因素有关
 - 一般社会功能相对完好
 - 可有相应的器质性病变
 - 一般没有精神病性症状
26. 正常小儿前囟闭合的时间为
- 6~12个月
 - 1~1.5岁
 - 1.5~2岁
 - 2~2.5岁
 - 2.5~3岁
27. 多囊卵巢综合征(PCOS)的主要内分泌活动异常不包括哪项
- 胰岛素抵抗
 - 雄激素水平低
 - 促性腺激素分泌异常
 - 高胰岛素血症
 - PRL水平高
28. 重度先兆子痫孕妇血液生化改变不包括
- 尿酸增高
 - 尿素氮增高
 - 血浆蛋白降低
 - 二氧化碳结合力升高
 - 血小板计数降低
29. 子宫内膜异位症大多数位于盆腔内,最常侵犯的部位是
- 子宫骶骨韧带
 - 输卵管
 - 子宫直肠陷凹
 - 子宫膀胱陷凹
 - 卵巢
30. 子宫腺肌病和下列哪项因素密切相关
- 慢性子宫内膜炎
 - 多次分娩
 - 人工流产
 - 多次妊娠
 - 以上均是
31. 青春期无排卵性功血的病因是
- 卵泡对垂体激素反应不良
 - 卵泡分泌雌激素不足
 - 排卵前FSH峰无法形成
 - 雌激素对LH正反馈尚未建立
 - 雌激素对LH负反馈机制尚未成熟
32. 机体发生创伤后,营养状况的评估指标中不包括的是
- 血小板测定
 - 体重
 - 白蛋白测定
 - 皮褶厚度
 - 淋巴细胞测定
33. 引起继发性再生障碍性贫血最常见的病因是
- 药物及化学物质
 - 物理因素
 - 病毒感染
 - 细菌感染
 - 营养因素
34. 下运动神经元瘫痪的体征是
- 无明显肌萎缩
 - 以整个肢体瘫痪为主
 - 神经传导速度正常
 - 腱反射亢进
 - 常有皮肤营养障碍
35. 属于卵巢性索间质肿瘤的是
- 畸胎瘤
 - 无性细胞瘤
 - 颗粒细胞瘤
 - 卵黄囊瘤
 - 卵巢甲状腺囊肿
36. 无合并症的老年单纯收缩期高血压患者首选的降压药物是
- 钙通道阻滞剂
 - 血管紧张素转换酶抑制剂
 - 中枢交感神经抑制剂
 - β 受体阻滞剂
 - 血管紧张素II受体阻滞剂
37. 以下哪种疾病是人类唯一能生存的单体综合征
- 特纳综合征(Turner综合征)
 - 先天性曲细精管发育不全综合征(Klinefelter综合征)
 - 21-三体综合征
 - 18-三体综合征
 - 13-三体综合征
38. 不属于孤独症临床表现的是
- 语言发育障碍

- B. 缺乏与他人交往的技巧
C. 婴儿期就可能表现出缺乏面部表情和眼神交流
D. 要求环境固定不变, 拒绝变化
E. 可以使用手势、摇头、点头等体态语言表达自己的需求
39. 急性骨髓炎在骨膜下或骨髓内抽得脓液后, 最关键的治疗措施是
A. 多次抽脓并注入抗生素
B. 进行脓液细菌培养及药敏试验, 据结果调整用药
C. 联合使用大量抗生素
D. 局部引流
E. 局部固定防止病理性骨折
40. 心肌梗死后附壁血栓引起的脑血管疾病最常见的是
A. 蛛网膜下腔出血
B. 脑血栓形成
C. 脑栓塞
D. 脑出血
E. 脑动脉炎
41. 为预防风湿热复发, 长效青霉素注射时间至少持续
A. 3 年
B. 1 年
C. 5 年
D. 2 年
E. 4 年
42. 孕妇缺碘可引起
A. 贫血
B. 妊高征
C. 流产
D. 糖尿病
E. 结核病
43. 艾里克森认为, 以“获得繁殖感而避免停滞感, 体验关怀的实现”的阶段是
A. 学龄期
B. 青年期
C. 成年早期
D. 成年中期
E. 成年晚期
44. 下列关于人初乳的描述, 正确的是
A. 糖含量最高
B. 脂肪含量最少而蛋白质含量最多
C. 蛋白质含量较低
D. 脂肪含量最高
E. 蛋白质、糖及脂肪含量均最低
45. 妊娠 10 周后, 雌激素的主要来源是
A. 胎儿 - 胎盘单位
B. 胎儿肾上腺皮质
C. 子宫平滑肌
D. 胎盘合体滋养细胞
E. 卵巢黄体
46. 下列哪项不属于遗传性肾小球疾病
A. 生后 1 月因先天性梅毒感染所致的肾病综合征
B. 生后 2 月发生的先天性肾病综合征
C. Alport 综合症
D. 家族性复发性血尿
E. 甲 - 骸骨综合症
47. 母亲孕期吸烟对母亲或胎儿造成的影响不包括
A. 自然流产率增加
B. 胎儿死亡率增加
C. 低体重儿
D. 胎儿畸形
E. 新生儿死亡
48. 平静吸气时, 参与呼吸动作的最主要的肌肉是
A. 膈肌和肋间内肌
B. 膈肌和斜角肌
C. 膈肌和肋间外肌
D. 斜角肌和胸锁乳突肌
E. 膈肌和胸锁乳突肌
49. 小儿生理性贫血发生的时期是在出生后
A. 4~5 个月
B. 7~8 个月
C. 1 个月内
D. 6~7 个月
E. 2~3 个月
50. 在雌、孕激素作用下, 出现周期性变化最显著的是
A. 子宫内膜
B. 宫颈上皮
C. 输卵管黏膜
D. 阴道黏膜
E. 卵巢生发上皮
51. 受损后造成软腭、咽喉部肌肉麻痹的神经核是
A. 三叉神经运动核
B. 面神经核

- C. 疑核
D. 下泌涎核
E. 迷走神经背核
52. 有关小儿肠道菌群建立的论述, 正确的是
A. 肠道菌群受食物成分影响
B. 母乳喂养以大肠杆菌为主
C. 出生 >24 小时后肠道开始出现细菌
D. 肠道菌群可以合成维生素 D
E. 人工喂养者以双歧杆菌为主
53. 骨盆底组织分为
A. 1 层
C. 3 层
E. 5 层
B. 2 层
D. 4 层
54. 特殊类型上感疱疹性咽峡炎的病原菌为
A. 合胞病毒
B. 流感病毒
C. 柯萨奇 A 组病毒
D. 腺病毒 3 型
E. 鼻病毒
55. 关于枕前位的分娩机制的叙述, 正确的是
A. 胎头进入骨盆入口时呈俯屈状态
B. 下降动作贯穿在整个分娩过程中
C. 下降动作呈连续性
D. 俯屈动作完成后, 胎头以枕额径通过产道
E. 胎头颅骨最低点达骨盆最大平面时出现内旋转动作
56. 关于子宫内膜异位症的叙述, 正确的是
A. 多发生于初潮前
B. 生育少、生育晚的女性发病少于多次生育者
C. 发病与社会经济状况无关
D. 约 25% 患者无明显不适
E. 该病对孕激素不敏感
57. 经前期综合征的精神症状不包括
A. 情绪波动
B. 易激惹
C. 心悸
D. 孤独
E. 注意力不集中
58. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症的典型症状中, 喉痉挛多见于哪个年龄段
A. 学龄期儿童
B. 青春期
C. 婴儿
D. 幼儿
E. 学龄前期儿童
59. 有功能的垂体腺瘤最常见的是
A. ACTH 瘤
B. TSH 瘤
C. GH 瘤
D. PRL 瘤
E. FSH/LH 瘤
60. 下列哪项不是卵巢瘤的并发症
A. 蒂扭转
B. 囊肿破裂
C. 红色变性
D. 感染
E. 恶性变
61. 卵巢库肯勃瘤最常见的原发部位为
A. 肺
B. 子宫
C. 肝脏
D. 膀胱
E. 胃肠道
62. 引起产褥感染的病原体, 不常见的是
A. 铜绿假单胞菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 衣原体
D. 支原体
E. 大肠杆菌
63. 原发性宫缩乏力与假临产的鉴别要点是
A. 肌注哌替啶能否抑制宫缩
B. 胎头是否入盆
C. 收缩时腹部触摸子宫硬度不同
D. 宫口是否已扩张
E. 能否引起下腹痛
64. 慢性排斥反应中, 移植物的血管病变特点是
A. 血管内膜纤维化
B. 血管肌层肥厚
C. 血管外膜纤维组织增生
D. 血管壁纤维性坏死
E. 血管壁玻璃样变性
65. 反复短暂性脑缺血发作治疗应选用
A. 低分子右旋糖酐
B. 阿司匹林

- C. 低分子肝素
D. 重组人纤维酶原激活剂(r-Pa)
E. 巴曲酶
66. 最易与陈旧性宫外孕相混淆的疾病是
A. 急性阑尾炎
B. 输卵管卵巢囊肿
C. 稽留流产
D. 卵巢黄体破裂
E. 子宫穿孔
67. 疑为子宫内膜不规则脱落时诊刮的时间应选在
A. 月经来潮 6 小时内
B. 月经期 2~3 天
C. 月经期 5~6 天
D. 月经干净 3~7 天
E. 月经干净 10~14 天
68. 新生儿寒冷损伤综合征的皮肤硬肿最早出现在
A. 小腿
B. 大腿
C. 躯干
D. 臀部
E. 面部
69. 在急性胰腺炎发病机制中,与胰腺组织坏死和溶血关系密切的酶是
A. 脂肪酶
B. 磷脂酶 A₂
C. 弹力蛋白酶
D. 糜蛋白酶
E. 胰蛋白酶
70. 首先考虑功能性消化不良的临床表现是
A. 吞咽困难
B. 上腹痛伴贫血
C. 反复反酸、烧心伴胸痛
D. 突发上腹刀割样疼痛向腰背部放射
E. 间断餐后上腹部胀痛伴嗝气,不影响睡眠
71. 下列关于孕妇生殖道感染沙眼衣原体的叙述,正确的是
A. 新生儿血清沙眼衣原体 IgG 阳性,表明有宫内感染
B. 产道感染少见
C. 影响胎儿易患结膜炎、肺炎
D. 核酸扩增试验是诊断沙眼衣原体感染的金标准
E. 喹诺酮类药物有显效

A2 型选择题 (72—114 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方格涂黑。

72. 男婴,12 个月。腹泻 4 天,加重 3 天。暗红色水样便每天 10 余次,量多,腥臭,伴高热、呕吐、少尿。查体:精神萎靡,呈嗜睡状,前囟眼窝凹陷,皮肤弹性差,心音较低钝,腹胀,肝脾不大。实验室检查:粪便镜检有大量脓血细胞,血钠 135mmol/L,血钾 3.5mmol/L。对该患儿最不适合的处理是
A. 使用止泻剂
B. 选用有效的抗生素
C. 使用微生态制剂
D. 继续饮食
E. 使用肠黏膜保护剂
73. 女,38 岁。4 年内抽搐发作 23 余次。发作为无诱因的口角和右上肢抽搐,意识尚清,但不能对答,约 5~10 秒后意识丧失伴全身抽搐。持续 30 秒后,逐渐停止。事后不能回忆发作过程。发作
期间的神经系统检查和常规脑电图检查未见异常。针对该患者的治疗首选药物是
A. 氯硝西泮
B. 苯妥英钠
C. 苯巴比妥
D. 乙琥胺
E. 卡马西平
74. 女,70 岁。头痛、精神异常、左侧肢体无力 6 天,加重伴呕吐 1 天。4 个月前有头部外伤史。查体:BP 106/95mmHg,神志清楚,双侧视神经盘水肿,左侧肢体肌力 4 级。最需要鉴别的疾病是
A. 精神疾病
B. 脑炎
C. 高血压脑出血
D. 脑梗死



E. 脑肿瘤

75. 女, 30岁。因输卵管妊娠破裂出血1小时急诊入院。怀孕4次, 自然流产3次, 顺产1胎。术前查Hb 75g/L, 术中输注悬浮红细胞5单位。术后第1天复查Hb 100g/L。术后第7天出现皮肤、巩膜黄染, 发热, T 38.5℃, Hb 70g/L。该患者可能发生的输血不良反应是
- 输血性肝炎
 - 过敏反应
 - 细菌污染反应
 - 非溶血性发热性反应
 - 迟发性溶血反应
76. 女, 33岁。发热4天, 少尿1天, 于12月12日入院。查体: BP 60/30mmHg, 神志清, 球结膜充血、水肿, 双腋下有出血点, 实验室检查: WBC $24 \times 10^9/L$, PLT $50 \times 10^9/L$, 尿蛋白(+++)。为明确诊断应进行的检查是
- 肥达-外斐试验
 - 尿培养
 - 血清汉坦病毒特异性抗体检测
 - 咽拭子培养
 - 钩端螺旋体显微凝集试验
77. 女婴, 9个月。持续高热, 频咳, 精神萎靡4天, 近2天气促加重, 今抽搐3次, 全身性发作, 嗜睡。查体: T 40℃, R 54次/分, 心率148次/分, 双肺少量湿啰音, 左下肺闻及管状呼吸音, 肝肋下1cm, 白细胞计数明显升高。X线片示大小不等的片状病灶或融合性病灶, 以两肺下野及右上肺多见。若患儿突然发生少尿, 尿钠40mmol/L, 尿沉渣出现棕色颗粒。最有可能出现的情况是
- 败血症
 - 心力衰竭
 - 肾前性少尿
 - 尿路梗阻
 - 急性肾衰
78. 女, 25岁。1个月前分娩后出现失眠、心情烦躁。近12天加重, 认为自己很笨, 没有能力带好小孩, 怕小孩夭折, 觉得丈夫不再喜欢自己了, 猜疑丈夫有外遇, 整天以泪洗面, 称不想活了, 甚至要带着孩子一起去死, 遂入院治疗。患者经治疗后, 情绪逐渐好转, 近5天先兴奋、容易激动, 好管闲事, 自我感觉良好, 称将来要成为中国女首富, 丈夫根本不配不上自己。目前可换用的治疗方案是
- 非典型抗精神药 + 抗抑郁药物
 - 抗抑郁药物 + 苯二氮卓类药物
 - 电抽搐治疗 + 抗抑郁药物
 - 心境稳定剂 + 非典型抗精神药
 - 心境稳定剂 + 抗抑郁药物
79. 男, 44岁。大面积烧伤10天。3天来常寒战、高热, 呈间歇热, 四肢厥冷、发绀, 尿量明显减少, 很快发生血压下降、休克。最可能的原因是
- 革兰阳性细菌脓毒血症
 - 革兰阴性细菌脓毒血症
 - 真菌性脓毒血症
 - 厌氧菌性脓毒血症
 - 二重感染
80. 女, 3岁。因呕吐、频繁水样便4天伴发热, 于11月5号入院。14小时无尿。查体: T 38.2℃, 颜面苍白, 皮肤弹性差, 眼窝凹陷, 心肺听诊无异常, 腹稍胀, 肝脾无肿大, 膝腱反射未引出, 四肢末端厥冷。实验室检查: 血钠140mmol/L。首先应该补充的液体是
- 1/2张含钠液
 - 1/3张含钠液
 - 2/3张含钠液
 - 1/4张含钠液
 - 2:1等张含钠液
81. 男, 5岁。发热伴腹痛1天, 抽搐2次, 呕吐4次。查体: T 41℃, BP 60/30mmHg, 面色苍白, 四肢湿冷, 呼吸急促, 心率快, 腹平软, 脐周压痛, 肠鸣音活跃。脑膜刺激征阴性。该疾病的发病机制中, 起主要作用的是
- 小儿神经系统发育不健全
 - 细菌外毒素
 - 细菌内毒素
 - 小儿免疫功能不完善
 - 细菌致热原
82. 女, 61岁。腹胀、食欲不振4月余。G₃P₃。自消化内科转来。查体: 腹部膨隆, 移动性浊音(+). 妇科检查: 阴道后穹隆可触及散在结节, 无触痛, 子宫后位, 大小正常, 子宫左后方可触及质硬包块, 约6×6cm大小, 边界不清。血CA₁₂₅ 1865U/ml。首先应考虑的诊断是
- 卵巢上皮性癌
 - 无性细胞瘤
 - 盆腔炎性包块

- D. 转移性卵巢肿瘤
E. 子宫内膜异位症
83. 女, 23 岁。停经 50 天, 阴道少量流血 6 天, 偶有腹痛, 无发热、腹泻。平素月经规律。查体: T 36.7°C, P 80 次/分, BP 120/65 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及啰音。心律齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音, 腹软, 无压痛。妇科检查: 宫颈软, 宫体稍大且软, 附件无异常。血常规: Hb 128 g/L, WBC $7.5 \times 10^9/L$, PLT $160 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是
- A. 先兆流产
B. 子宫内膜炎
C. 子宫肌瘤
D. 异位妊娠破裂
E. 功能失调性子宫出血
84. 初产妇, 25 岁。8 天前在家中经阴道分娩, 产后血性恶露持续时间长, 无异味。突然出血增多 1 天, 无寒战、高热。查体: 子宫如妊娠 3 个月大, 质软, 压痛不明显, 宫口松, 能容 2 指。其阴道流血最可能的原因是
- A. 子宫脱垂
B. 子宫内膜炎
C. 子宫颈裂伤
D. 蜕膜残留
E. 胎盘、胎膜残留
85. 女, 34 岁。已婚 6 年, 月经规律, 3 年前有一次人工流产。男方精液检查正常。HSG 检查提示双侧输卵管近端阻塞。为促进生育, 首选的处理方案是
- A. 人工授精 (AI)
B. 腹腔镜手术
C. 卵细胞质内单精子注射 (ICSI)
D. 体外受精胚胎移植 (IVF - ET)
E. 应用促排卵药物
86. 男婴, 4 个月。今晨突然面肌、口角及眼角抽动约 1 分钟, 抽后精神好, 不发热、不吐。冬季出生, 混合喂养未加辅食。查体: 体重 6 kg, 会笑, 前囟平, 有枕秃, 双侧 Babinski 征 (+)。最可能的诊断及进一步检查是
- A. 败血症做血培养
B. 癫痫做脑电图
C. 中枢神经系统感染做腰穿
D. 维生素 D 缺乏性手足抽搐症查血钙
E. 低血糖查血糖
87. 女, 60 岁。不规则阴道流血 14 个月余。有高血压、糖尿病病史 4 年。BMI 29, B 超示宫腔内 2.0×2.5 cm 占位性病变, 有丰富血流, 血流阻力指数为 0.36。如宫腔内膜活检确诊后, 首选的治疗措施是
- A. 生物治疗
B. 手术治疗
C. 激素治疗
D. 化学药物治疗
E. 放射治疗
88. 女, 27 岁。葡萄胎清宫术后 1 年, 阴道流血 12 天。妇科检查: 阴道口处见一直径 3 cm 紫蓝色结节, 子宫稍大, 质软, 双侧附件正常。胸部 X 线片未见异常。尿妊娠试验 (+)。阴道病灶组织病理检查见成对高度增生滋养细胞, 无绒毛结构。最有可能的诊断
- A. 绒毛膜癌
B. 子宫内膜异位症
C. 葡萄胎
D. 侵蚀性葡萄胎
E. 阴道癌
89. 患儿诊断为易位型 21 - 三体综合征, 其父正常, 其母为 D/G 平衡易位。则二胎风险率为
- A. 10%
B. 20%
C. 1%
D. 100%
E. 50%
90. 女, 1 岁。阵发性哭闹, 呕吐 10 小时, 黏液血便 1 次。查体: T 37.8°C, 精神差, 明显腹胀, 右下腹可触及肿物, 压痛 (+)。最可能的诊断是
- A. 小儿急性阑尾炎
B. 先天性巨结肠
C. 胃肠炎
D. 急性肠套叠
E. 肠系膜淋巴结炎
91. 初产妇, 26 岁, 足月妊娠。宫口开全 1 小时 20 分尚未分娩。阴道检查: 头先露, 宫口开全, 胎头位于坐骨棘水平下 3 cm, 枕左横位 (LOT), 胎膜已破, 羊水清, 胎心率 145 次/分, 估计胎儿体重 3.1 kg。正确的处理应是
- A. 行剖宫产术
B. 缩宫素静脉滴注
C. 等待阴道自然分娩

- D. 徒手将胎头枕部转向前方,然后阴道分娩
E. 行产钳助产术
92. 男婴,3天。因嗜睡1天来诊。足月产,有窒息史。查体:R 30次/分,面色发绀,前囟饱满紧张,心率90次/分,心音低钝,四肢肌张力差,拥抱反射消失。最可能的诊断是
- A. 新生儿低血糖
B. 新生儿缺氧缺血性脑病
C. 新生儿肺透明膜病
D. 胎粪吸入综合征
E. 新生儿湿肺
93. 女,36岁,已婚。闭经8个月。查子宫稍小。肌注黄体酮20mg连用3天,未见撤药性流血,再给予己烯雌酚1mg连服20天,后3天加用安宫黄体酮10mg,出现撤药性流血。本例应诊断为
- A. 子宫性闭经
B. I度闭经
C. II度闭经
D. 垂体性闭经
E. 下丘脑性闭经
94. 女,1岁。间断高热1周,眼结膜充血,口唇皲裂伴出血,草莓舌,肛周皮肤发红,血常规示:白细胞及中性粒细胞增多,血沉增快,诊断为川崎病。以下哪项表现不可能出现在该患儿症状中
- A. 胆囊炎
B. 无菌性脑膜炎
C. 颈部淋巴结肿大
D. 腹痛、呕吐及腹泻
E. 肝大
95. 患儿,胎龄43周。呼吸困难,皮肤及指甲羊粪粪染,经吸纯氧治疗后,右上肢经皮血氧维持在85%左右,左下肢经皮血氧维持在65%左右,动脉血气分析提示代谢性酸中毒、低氧血症。根据患儿的临床表现,考虑患儿最可能是
- A. 新生儿肺炎
B. 颅内出血
C. 新生儿呼吸窘迫综合征
D. 先天性心脏病
E. 肺动脉高压
96. 女,24岁,经产妇。经阴道分娩后74小时,自觉乳房胀痛发热。查体:T 37.8℃,下腹部阵发性疼痛伴阴道少许流血。正确的处理是
- A. 应用抗生素
B. 口服镇痛剂
C. 局部理疗
D. 排空乳房
E. 静脉滴注缩宫素
97. 女,24岁,未婚。继发性闭经8个月。妇科检查:子宫附件未见异常。每天肌肉注射黄体酮20mg,连用5天,停用后出现阴道出血。再静脉滴注促性腺激素释放激素(GnRH)100ug后45分钟,血清LH增高3倍。导致该患者闭经的病变部位应在
- A. 下丘脑
B. 腺垂体
C. 神经垂体
D. 卵巢
E. 子宫
98. 女,29岁,体重60kg。因烧伤后2小时入院。查体:BP 86/63mmHg, P 130次/分,脉搏细弱,面色苍白,口渴感明显,双下肢(包括双足、臀部、双大小腿)及会阴区布满大小不等的水疱,小部分创面呈焦黄色,无水疱。伤后8小时内补液应为
- A. 3 515ml
B. 3 915ml
C. 2 715ml
D. 3 115ml
E. 2 315ml
99. 女,30岁。反复发作性头痛4年。每次发作前均有2小时左右烦躁,饥饿感,随之自觉出现一眼异彩,持续约40分钟,缓解后出现头痛,并常以眼症状对侧出现。头痛呈钻痛,搏动性,往往有恶心、呕吐,持续4~5小时后进入睡眠可缓解。考虑为
- A. 头痛型癫痫
B. 丛集性头痛
C. 普通型头痛
D. 特殊犁头痛
E. 典型偏头痛
100. 一健康儿童体检结果为:身高115cm。体重20kg,尚未开始换牙,腕部骨化中心数为7个。按照小儿生长发育的一般规律,其最可能的年龄是
- A. 6岁
B. 8岁
C. 4岁
D. 5岁
E. 7岁

101. 男,5岁。生后发现口唇青紫,活动后加剧。平时喜蹲踞,哭时有突发呼吸急促、青紫加重,严重时伴晕厥。曾1年内晕厥4次,均于清晨或哭吵后发作,经2~3分钟自行恢复。今晨又出现晕厥,持续5分钟即来急诊。查体:T 37.1℃,P 100次/分,R 22次/分,BP 82/55mmHg。神志不清,双肺听诊未见异常,胸骨左缘第2~4肋间闻及3/6级收缩期杂音,无震颤,肺动脉第二心音减弱。口唇青紫,指、趾甲青紫,杵状指、趾,颈软。神经系统查体无异常。下列抢救措施中不合适的是
- 静脉滴注碳酸氢钠
 - 静脉注射普萘洛尔
 - 皮下注射吗啡
 - 取胸膝位
 - 口服普萘洛尔
102. 女,56岁。阴道脱出肿物2年。妇科检查:阴道前壁膨出,宫颈光滑,用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外。该患者应诊断为阴道前壁膨出和子宫脱垂
- Ⅱ度轻型
 - Ⅰ度重型
 - Ⅰ度轻型
 - Ⅱ度重型
 - Ⅲ度
103. 男,3岁。智能落后,表情呆滞,眼距宽,眼裂小,鼻梁低,口半张,舌伸出口外,皮肤细嫩,肌张力低下,左侧通贯手。最可能的诊断是
- 21-三体综合征
 - 软骨发育不良
 - 先天性甲状腺功能减低症
 - 佝偻病
 - 苯丙酮尿症
104. 女,24岁。停经60天,阵发腹痛伴多量阴道流血1天。妇科检查:子宫5周妊娠大小,宫口开,有血液不断流出。处理首选的是
- 立即清宫
 - 立即抗感染
 - 按摩子宫
 - 输血
 - 剖腹探查
105. 女婴,足月产。生后2天出现皮肤轻度黄染,吃奶好,无发热。肝脾不大,脐无分泌物,血清总胆红素170mmol/L,血型母A女O。应考虑为
- 新生儿溶血病
 - 新生儿败血症
 - 新生儿肝炎
 - 生理性黄疸
 - 新生儿胆道闭锁
106. 女,2岁。发热伴咳嗽、气促6天。自出生后喂养困难,生长发育落后,多次患肺炎。查体:T 38.2℃,P 120次/分,R 50次/分。消瘦,呼吸急促,双肺可闻及细湿啰音,胸骨左缘上方闻及粗糙响亮的收缩期杂音。腹软,肝肋下3cm,质中,脾肋下未触及,手指甲床可见毛细血管搏动。该患儿最可能罹患的心脏病是
- 动脉导管未闭
 - 房间隔缺损
 - 法洛四联症
 - 肺动脉瓣狭窄
 - 室间隔缺损
107. 男,28岁。4天前受惊吓后突然不语不动,不吃不喝,肢体僵硬,口中唾液外流,不知主动吐出,晚间自己到厨房找吃的。患者3年前曾有凭空闻语、捡食垃圾等怪异行为,持续1个月好转。患者最可能的诊断是
- 分离(转换)性障碍
 - 急性应激障碍
 - 脑器质性精神障碍
 - 精神分裂症
 - 妄想性障碍
108. 女,65岁。绝经13年,因阴道反复流血5个月就诊。查体:肥胖,一般情况好,BP 150/105mmHg。妇科检查:阴道少许血液,宫颈光滑,子宫正常大,双附件正常。最可能的诊断是
- 子宫颈癌
 - 老年性子官内膜
 - 子官内膜息肉
 - 老年性阴道炎
 - 子官内膜癌
109. 女,27岁。人工流产术出现血压下降,心率减慢,面色苍白。应考虑诊断为
- 人工流产综合征
 - 子官穿孔
 - 栓塞
 - 漏吸
 - 吸宫不全

110. 女, 60岁。子宫内膜癌术后9天。病理示: 低分化子宫内膜样腺瘤, 浸及深肌层, 淋巴结无转移, 手术病理分期 I_B。既往高血压7年, 行高血压药物控制后血压(120~130)/(70~80) mmHg。该患者首选的处理是
- 中药治疗
 - 生物治疗
 - 放射治疗
 - 随访观察
 - 孕激素治疗
111. 女, 2岁。发热9天, 皮疹3天入院。外院抗生素治疗7天无效。查体: T 39.1℃, 烦躁不安, 全身淡红色斑丘疹, 双眼结膜充血, 口唇鲜红、干裂、草莓舌, 右颈淋巴结蚕豆大, 质硬, 有压痛。双肺呼吸音粗, 心率130次/分, 腹软, 肝、脾无肿大, 指、趾端硬性肿胀。实验室检查: WBC $20 \times 10^9/L$, N 0.76, L 0.24, PLT $420 \times 10^9/L$, 血沉 120 mm/h, 血培养(-)。首选的治疗措施是
- 丙种球蛋白+糖皮质激素
 - 对症治疗, 观察
 - 丙种球蛋白+阿司匹林
 - 阿司匹林+糖皮质激素
 - 青霉素
112. 女, 16岁。右胫骨近端疼痛3个月, 呈进行性加重。X线片示右胫骨干骺端骨膜反应, 呈日光射线形态。最可能的诊断是
- 骨肉瘤
 - 骨巨细胞瘤
 - 骨软骨瘤
 - 骨结核
 - 骨囊肿
113. 女, 2岁。高热5天, 精神差, 频繁咳嗽, 阵发性喘憋。查体: 鼻翼扇动, 吸气性凹陷, 两肺叩诊浊, 呼吸音减低, 双肺闻及少量中湿啰音。WBC $9.0 \times 10^9/L$ 。胸部X线片示双肺片状密度较淡阴影。最可能的诊断是
- 金黄色葡萄球菌肺炎
 - 呼吸道合胞病毒肺炎
 - 腺病毒肺炎
 - 肺炎支原体肺炎
 - 肺炎链球菌肺炎
114. 经产妇, 30岁。现妊娠35周。查体: BP 120/80 mmHg, 宫底35cm, 胎心率138次/分。空腹血糖6.3 mmol/L, 尿糖(+). 2年前因妊娠8个月死胎行引产术。经控制饮食2周后, 空腹血糖6.1 mmol/L, 胎心率138次/分, 无应激试验无反应型。此时最恰当的措施是
- 左侧卧位
 - 间断吸氧
 - 自行胎动计数
 - 立即终止妊娠
 - 胎儿生物物理评分

A3/A4型选择题(115—137题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(115—117题共用题干)

女, 35岁, 初产妇。妊娠36周, 血压升高1个月, 持续腹痛伴阴道少量流血3小时。查体: T 36℃, P 120次/分, R 28次/分, BP 90/60 mmHg, 神志清楚, 全身水肿。子宫硬如板状, 胎方位不清, 胎心未闻及, 宫口2cm, S⁻²。

115. 该患者最可能的诊断是
- 妊娠合并急性胰腺炎
 - 胎盘早剥
 - 子宫破裂
 - 前置胎盘
 - 临产

116. 最有效的处理措施

- 硫酸镁抑制宫缩
- 人工破膜引产
- 缩宫素引产
- 立即剖宫产
- 镇静止痛

117. 该患者最可能发生的并发症
- A. 心力衰竭
 - B. 子痫
 - C. HELLP 综合征
 - D. DIC
 - E. 产褥感染

(118—120 题共用题干)

男,65 岁。发现高血压病 23 年,慢性支气管炎病史 8 年。活动后心悸、气短 2 年,突发喘憋 3 小时。查体:端坐位, BP 190/110mmHg, R 30 次/分, P 108 次/分, 心界向左侧扩大, 双肺可闻及哮鸣音, 双肺底有较密集的中小水泡音。

118. 该患者突然喘憋的最可能病因是
- A. 支气管哮喘
 - B. 慢性支气管炎急性发作
 - C. 慢性肺源性心脏病
 - D. 急性心源性哮喘
 - E. 肺动脉栓塞
119. 进一步心脏听诊发现心率 127 次/分, 心律不齐。心电图示 P 波消失, 代之以 f 波, 心室律绝对不规则, QRS 波群形态正常。该患者心律不齐的最可能诊断是
- A. 室性期前收缩
 - B. 心房颤动
 - C. 阵发性室性心动过速
 - D. 阵发性室上性心动过速
 - E. 二度 I 型房室传导阻滞

120. 该患者目前治疗宜首选

- A. 硝普钠
- B. 氨茶碱
- C. 西地兰
- D. 卡维地洛
- E. 普罗帕酮

(121—122 题共用题干)

某农药厂灌装车间发生 5 位工人集体中毒事件, 主要临床表现为: 眼痛、流泪, 手部有瘙痒、烧灼等异常感觉; 2 例严重病例有呼吸困难、流涎、腹痛和轻度意识障碍。现场调查结果: 车间无通风排毒设备, 工人均未戴防护手套和口罩, 中午均在食堂集体就餐。

121. 最可能的中毒原因是

- A. 有机磷农药
- B. 氨基甲酸酯类农药
- C. 拟除虫菊酯类农药

- D. 有机氯与拟除虫菊酯混配农药
- E. 化学性食物中毒

122. 应采取的治疗措施是

- A. 阿托品
- B. 胆碱酯酶复能剂
- C. 对症治疗
- D. 阿托品加胆碱酯酶复能剂
- E. 阿托品加胆碱酯酶复能剂加对症治疗

(123—124 题共用题干)

女,26 岁。原发不孕进行性痛经 4 年。妇科检查: 子宫大小正常、后倾、欠活动, 后壁有 2 个黄豆大小痛性结节, 右侧附件可扪及直径约 2.8cm 大小的囊性包块、不活动, 左侧附件增厚。

123. 其诊断考虑为

- A. 慢性盆腔炎
- B. 结核性盆腔炎
- C. 子宫内膜异位症
- D. 双侧附件炎性包块
- E. 卵巢恶性肿瘤

124. 其处理应首选

- A. 双侧附件切除术
- B. 卵巢子宫内膜病灶切除术
- C. GnRH- α 治疗
- D. 雄激素治疗
- E. 根治术

(125—128 题共用题干)

女,32 岁。在乘车时, 急刹车导致右膝前方受到撞击, 出现右髌剧痛, 髌关节运动障碍, 处于屈曲、内收、内旋畸形状态。

125. 应诊断为

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨粗隆间骨折
- C. 股骨粗隆下骨折
- D. 髌关节后脱位
- E. 髌关节前脱位

126. 可能出现哪些合并损伤

- A. 坐骨神经
- B. 股神经
- C. 闭孔神经
- D. 胫神经
- E. 腓总神经

127. 应首先选择的治疗方法是

- A. Hippocrates 法

- B. Kocher 法
- C. Bigelow 法
- D. 骨牵引
- E. 皮牵引

128. 该患者治疗 4 周后,自行下地负重行走,正常活动,可能发生
- A. 关节强直
 - B. 关节周围组织损伤
 - C. 习惯性关节脱位
 - D. 股骨头缺血性坏死
 - E. 髋关节周围创伤性骨化

(129—130 题共用题干)

女,36 岁。患十二指肠溃疡,择期经上腹正中切口行胃大部切除术,并置切口内乳胶片引流。

129. 一般拔除引流片的时间为

- A. 术后 1~2 天
- B. 术后 3~4 天
- C. 术后 5~6 天
- D. 术后 7~8 天
- E. 术后 9~10 天

130. 正常情况下,该患者拆线时间应为术后

- A. 术后 3~4 天
- B. 术后 5~6 天
- C. 术后 7~9 天
- D. 术后 10~12 天
- E. 术后 12 天以上

(131—133 题共用题干)

男,42 岁。因车祸致头部外伤伴昏迷 1 小时入院。查体:P 55 次/分,R 12 次/分,BP 170/100mmHg,右侧顶枕部头皮血肿,GCS 评分 7 分,左侧瞳孔直径 2mm,右侧肢体偏瘫,头颅 CT,左颞叶脑内高密度影,体积约 60ml。左额、颞底面广泛斑点状高密度影致同侧脑室受压,中线向右移位 1.5cm。

131. 最可能诊断是

- A. 外伤性脑积水
- B. 急性硬脑膜外血肿
- C. 急性硬脑膜下血肿
- D. 脑挫裂伤伴脑内血肿
- E. 脑震荡

132. 可能的损伤机制是

- A. 加速性损伤
- B. 挥鞭伤

- C. 挤压伤
- D. 切线性损伤
- E. 减速性损伤

133. 最适宜采取的治疗措施是

- A. 绝对卧床休息
- B. 腰椎穿刺释放脑脊液
- C. 大量应用激素
- D. 脑室外引流
- E. 急诊开颅手术

(134—135 题共用题干)

女,25 岁。阴道分泌物增多伴外阴瘙痒 3 天。妇科检查:阴道黏膜充血,后穹窿有大量稀薄、黄绿色、泡沫状、有臭味分泌物。

134. 该患者最可能的诊断是

- A. 细菌性阴道病
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 子宫内膜炎
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 外阴阴道假丝酵母菌病

135. 关于该患者的治疗,不正确的是

- A. 需全身治疗
- B. 应排除其他性传播疾病
- C. 常采用唑类抗真菌药物
- D. 性伴侣应同时治疗
- E. 对密切接触的毛巾、内裤等应高温消毒

(136—137 题共用题干)

女,45 岁。体检结果显示:BP 180/100mmHg,体重 68kg,身高 160cm (BMI = 26.6),甘油三酯 4.5mmol/L,胆固醇 5.1mmol/L。

136. 该患者营养状况判断为

- A. 肥胖
- B. 严重肥胖
- C. 消瘦
- D. 超重
- E. 正常

137. 对该患者进行非药物饮食要注意严格控制

- A. 高糖类食物摄入
- B. 胆固醇和脂肪摄入
- C. 胆固醇摄入
- D. 总热能和脂肪摄入
- E. 蛋白质摄入

B1 型选择题 (138—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(138—139 题共用备选答案)

- A. 呼吸兴奋剂
- B. 袈利尿剂
- C. 强心剂
- D. 镇静剂
- E. 血管扩张剂

138. 容易引起 II 型呼衰加重的药物是
139. 在肺源性心脏病治疗中可引起碱中毒的药物是

(140—141 题共用备选答案)

- A. 5 天
- B. 21 天
- C. 7 天
- D. 10 天
- E. 14 天

140. 麻疹合并肺炎时应隔离至出疹后
141. 接触麻疹的易感者需检疫观察的时间是

(142—144 题共用备选答案)

- A. 结核性脑膜炎
- B. 中毒性脑病
- C. 病毒性脑病
- D. 隐球菌性脑膜炎
- E. 化脓性脑膜炎

142. 上述疾病中,易侵犯颅神经,尤其是面神经的是
143. 上述疾病中,脑脊液墨汁染色阳性的是
144. 上述疾病中,易出现硬膜下积液的是

(145—146 题共用备选答案)

- A. 司坦唑醇
- B. 糖皮质激素
- C. 抗淋巴细胞球蛋白
- D. 环孢素
- E. 脾切除术

145. 温抗体型自身免疫性溶血性贫血的治疗首选
146. 原发性免疫性血小板减少症的治疗首选

(147—148 题共用备选答案)

- A. 人类乳头瘤病毒
- B. 苍白密螺旋体
- C. 单纯疱疹病毒
- D. 钩端螺旋体
- E. 淋病奈瑟菌

147. 扁平湿疣的病原体是
148. 尖锐湿疣的病原体是

(149—150 题共用备选答案)

- A. 阿奇霉素
- B. 青霉素
- C. 多西环素
- D. 氧氟沙星
- E. 头孢曲松

149. 孕妇感染梅毒首选的治疗药物是
150. 孕妇生殖道感染沙眼衣原体首选的治疗药物是

