

## 临床助理笔试考试网友回忆版-8月19日下午

1、Barret 食管是指下列哪一种

- A、食管鳞状上皮增生
- B、黏膜固有层乳头向表面延伸
- C、上皮层内中性粒细胞和淋巴细胞浸润
- D、黏膜糜烂或溃疡形成
- E、食管下段的复层鳞状上皮被单层柱状上皮所替换

【答案】E

2、男，60岁。进行性吞咽困难4月余。无反酸、暖气、腹痛，无发热。发病以来体重无明显变化。查体：T36.5℃，P80次/分，R18次/分，BP120/80mmHg。浅表淋巴结未触及。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹软，无压痛。胃镜：食管中段可见隆起病变，累及食管全周，长约4cm，伴不规则溃疡形成，黏膜粗糙、质硬、易出血。行活组织病理检查，最可能的结果是

- A. 平滑肌瘤
- B. 鳞癌
- C. 腺癌
- D. 淋巴瘤
- E. Barrett 食管

【答案】B

【解析】患者老年男性，进行性吞咽困难4月余。胃镜：食管中段可见隆起病变，累及食管全周，长约4cm，伴不规则溃疡形成，黏膜粗糙、质硬、易出血，考虑是食管癌，我国90%的食管癌为鳞状细胞癌，少数为腺癌，食管腺癌多与Barrett食管相关，该患者无胃食管反流病史。

3、男，62岁。上腹痛10天。既往高血压病史10余年，反复心前区疼痛发作2个月，口服阿司匹林100mg/日、降压药物、他汀类降脂药等治疗。查体：T

36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率齐, 腹软, 无压痛。上消化道 X 线钡剂造影: 胃角切迹壁外龛影。13C 尿素呼气试验阴性。最适宜的治疗药物是

- A. 氢氧化铝
- B. 雷尼替丁
- C. 枸橼酸铋钾
- D. 多潘立酮
- E. 奥美拉唑

【答案】E

4、女, 60 岁。晨起后突感右上肢无力, 持物掉落, 伴言语不利, 休息半小时后缓解。既往有高血压、糖尿病病史。查体: 未见脑神经异常, 四肢运动、感觉及共济运动正常。最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 低血糖
- C. 高血压脑病
- D. 癫痫单纯性部分性发作
- E. 短暂性脑缺血发作

【答案】E

5、体内氨的主要去路是

- A 合成谷氨酰胺
- B 合成尿素
- C. 生成铵盐
- D. 生成非必需氨基酸
- E. 参与嘌呤、嘧啶合成

【正确答案】B

- A. Cushing 溃疡
- B. 胃溃疡
- C. Curling 溃疡
- D. 食管腐蚀性溃疡
- E. 十二指肠溃疡

6 最易发生癌变的溃疡是

【答案】B

7 烧伤患者发生的溃疡是

【答案】C

8、医疗机构从业人员的职业价值目标是

- A. 大医精诚
- B. 以患者为中心
- C. 人道行医
- D. 为人民健康服务
- E. 救死扶伤

【正确答案】D

9、医生劝患者“你应该参加一些晨间锻炼”，这种医患关系属于

- A 主动-被动型
- B. 指导-合作型
- C. 共同参与型
- D. 强制-被动型
- E. 指导-参与型

【正确答案】B

10、疫苗接种记录保存年限不少于

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

【正确答案】E

11、中医典籍中有“天人合一”“天人相应”的观点。该观点所反映的医学模式为

- A. 神灵主义医学模式
- B. 整体医学模式
- C. 生物医学模式
- D. 生物-心理-社会医学模式
- E. 自然哲学医学模式

【正确答案】E

12、早期动脉粥样硬化病变最早进入动脉内膜的细胞是

- A. 红细胞
- B. 淋巴细胞
- C. 脂肪细胞
- D. 嗜中性粒细胞
- E. 巨噬细胞

【答案】 E

13、流行病学研究的三种基本方法包括

- A. 观察法、实验法和数理法
- B. 描述性研究、病例对照研究和队列研究
- C. 描述性研究、实验研究和数学模型
- D. 病例对照研究、队列研究和实验研究
- E. 现况研究、病例对照研究和实验研究

【正确答案】 A

14、“无论是致病、治疗，还是预防和康复都应应将人视为一个整体，需要考虑各方面因素的交互作用，而不能机械地将他们分割开”。此观点所反映的医学模式是

- A. 自然哲学的医学模式
- B. 生物-心理-社会医学模式
- C. 神灵主义的医学模式
- D. 机械论医学模式
- E. 生物医学模式

【正确答案】 B

15、患者经抗肿瘤治疗后尿检发现大量葡萄糖和氨基酸。推测其肾单位受损部位是

- A. 近端小管
- B. 肾小球
- C. 集合管
- D. 髓祥升支粗段
- E. 远端小管

【答案】 A

【解析】 癌症患者经抗肿瘤治疗可能会造成肾损伤，题中患者尿检发现了大量葡萄糖和氨基酸，而葡萄糖和氨基酸都是在近端小管被重吸收的，故推测该患者的肾单位受损部位是近端小管（A对）

16、女，30岁。腹痛、腹泻伴急后重3天。最初为稀便，2天后为粘黏脓血便，

偶见片状灰白色膜状物排出。此病变最可能的炎症类型是

- A. 纤维素性炎
- B. 变质性炎
- C. 出血性炎
- D. 浆液性炎
- E. 化脓性炎

【正确答案】 A

17、公共卫生监测的种类繁多，最普遍的是

- A. 死因监测
- B. 症状监测
- C. 传染病监测
- D. 公共卫生监测
- E. 行为及行为危险因素监测

【正确答案】 C

18、经产妇，27岁，32周妊娠，昨日夜晚突然出现无痛性阴道流血，最可能的诊断是

- A. 前置胎盘
- B. 羊水过多
- C. 胎盘早剥
- D. 先兆子宫破裂
- E. 子宫破裂

【正确答案】 A

19、某孕妇，妊娠31周，无痛性阴道流血4次，检查发现，胎心在正常范围，子宫无压痛，阴道流血量少于月经量，正确的护理措施是

- A. 卧床休息，左侧卧位
- B. 肛查，了解宫口有无开大
- C. 阴道检查
- D. 缩宫素引产
- E. 输血

【正确答案】 A

- A. 心尖区舒张中晚期隆隆样杂音
- B. 心尖区全收缩期吹风样杂音
- C. 胸骨左缘第3肋间舒张早期哈气样杂音
- D. 胸骨右缘第2肋间3级以上喷射性收缩期杂音
- E. 胸骨左缘功能性收缩期杂音

20、二尖瓣狭窄听诊为【正确答案】 A

21、二尖瓣关闭不全的听诊【正确答案】B

【解析】二尖瓣狭窄：心尖区舒张期隆隆样杂音。二尖瓣关闭不全：收缩期吹风样杂音。

22、内脏性幻觉与内感性不适最主要区别是

- A. 躯体内部产生异样感觉
- B. 定位是否准确
- C. 二者临床诊断意义较大
- D. 多见于精神分裂症
- E. 多见于躯体形式障碍

【正确答案】B

【解析】内脏性幻觉属于知觉障碍，是指患者感到躯体内部某一部位或某脏器的异常体验，如肠扭转、肝破裂等，部位及性质比较明确，常与疑病妄想、虚无妄想及被害妄想等伴随存在，多见于精神分裂症及抑郁症。内感性不适属于感觉障碍，是躯体内部产生的各种不舒服或难以忍受的异样感觉，如蚁爬感、牵拉感等，部位常不明确，性质模糊甚至多变，多见于各类神经症。定位是否准确是二者最主要区别，正确答案是B

23、患者女，72岁，10年前出现四肢疼痛，呈游走性，以夜间为著。后逐渐出现关节畸形，功能受限。家族史：其母病逝于骨肉瘤。查体：体温正常。头颅无畸形，五官端正。心、肺查体无异常。双肘关节、膝关节、髌关节畸形，功能受限。四肢肌力正常，肌张力降低。入院后查血、尿常规(-)，肝功能：ALP186U/L，肾功能正常。X线示双肘关节、膝关节、髌关节关节腔破坏，关节脱位。颅脑X线平片未见异常。考虑诊断为畸形性骨炎，给予对症治疗后，患者疼痛症状基本缓解，复查ALP恢复正常。关于手术治疗畸形性骨炎的主要适应证，下列正确的是

- A 所有的病理性骨折
- B. 严重关节炎
- C. 非负重骨的严重畸形
- D. 药物治疗无效者
- E. 骨痛

【正确答案】B