

第一单元

A1/A2 型选择题

1. 不属于精神分裂症常见症状的是
 - A. 阳性症状
 - B. 冲动行为
 - C. 记忆力减退
 - D. 阴性症状
 - E. 情感症状
2. TIA 持续时间通常为
 - A. 24 小时内
 - B. 12 小时内
 - C. 2 小时内
 - D. 30 分钟内
 - E. 48 小时内
3. 节律性饥饿痛常见于
 - A. 胃溃疡
 - B. 十二指肠球部溃疡
 - C. 复合性溃疡
 - D. 肠易激综合征
 - E. 胃癌
4. 提示急性出血坏死性胰腺炎的临床表现为
 - A. 持续性剧烈左上腹疼痛
 - B. 血、尿淀粉酶显著增高
 - C. 重度黄疸
 - D. Cullen 征阳性
 - E. 呕吐后腹痛不缓解
5. 临床预防服务的对象主要是
 - A. 患者
 - B. 健康人
 - C. 无症状的“患者”
 - D. 患者和无症状的“患者”
 - E. 健康人和无症状的“患者”
6. 单纯性下肢静脉曲张行大隐静脉高位结扎的绝对禁忌证是
 - A. Perthes 试验阳性
 - B. 曲张静脉破裂
 - C. 交通支瓣膜功能不全
 - D. 浅静脉瓣膜功能不全
 - E. 深静脉瓣膜功能不全
7. 高血压并发 2 型糖尿病患者首选的治疗药物是
 - A. 钙通道阻滞剂
 - B. 噻嗪类利尿剂
 - C. β 受体阻滞剂
 - D. 醛固酮受体拮抗剂
 - E. 血管紧张素转化酶抑制剂
8. 胃肠道恶性肿瘤经血行转移，常见的部位是
 - A. 肝
 - B. 脑
 - C. 肾
 - D. 骨
 - E. 肺
9. 在体循环和肺循环中，数值基本相同的是
 - A. 脉压
 - B. 收缩压
 - C. 舒张压
 - D. 心排血量
 - E. 外周阻力
10. 治疗癫痫大发作及局限性发作的首选药物是
 - A. 苯妥英钠
 - B. 丙戊酸钠
 - C. 氯硝西洋
 - D. 乙琥胺
 - E. 地西洋
11. 对青霉素治疗无效的病原微生物是
 - A. 革兰氏阳性球菌
 - B. 革兰氏阳性杆菌
 - C. 革兰氏阴性球菌
 - D. 铜绿假单胞菌
 - E. 梅毒螺旋体

12. 防治支气管哮喘发作最有效的方法是

- A. 预防肺部感染
- B. 脱离变应原
- C. 长期口服糖皮质激素
- D. 长期吸入沙丁胺醇
- E. 长期吸入糖皮质激素

13. 假膜性炎渗出物中的特征成分是

- A. 浆膜
- B. 浆液
- C. 黏液
- D. 纤维蛋白
- E. 坏死的黏膜上皮细胞

14. 亚急性感染性心内膜炎一般不出现的临床表现是

- A. 贫血
- B. 脾肿大
- C. Roth 斑
- D. 环形红斑
- E. 心脏瓣膜区杂音

15. 正常人腹部触诊时，不能触及的结构是

- A. 胰腺
- B. 骶骨岬
- C. 横结肠
- D. 腰椎椎体
- E. 带粪块的乙状结肠

16. 属于伪膜性炎的是发生于

- A. 肺的纤维素性炎
- B. 肠黏膜的纤维素性炎
- C. 胸膜的纤维素性炎
- D. 腹膜的纤维素性炎
- E. 心包膜的纤维素性炎

17. 诊断支气管哮喘最有价值的依据是

- A. 临床表现及体征
- B. 呼吸功能检查
- C. 胸部 X 线检查
- D. 血常规检查

E. 血气分析

18. 关于病毒性心肌炎的体征，不正确的是

- A. 第一心音增强
- B. 心脏增大
- C. 心率增快与体温升高不相称
- D. 舒张期奔马律
- E. 可有各种心律失常

19. 肛裂的临床特点主要是

- A. 肛门部坠胀感
- B. 肛门疼痛伴血便
- C. 无痛性便血
- D. 肛门旁分泌物
- E. 粪便上附有新鲜血液

20. 在心理治疗的同时，与临床医师配合使用药物治疗，这体现了心理治疗的

- A. 灵活原则
- B. 综合原则
- C. 整体性原则
- D. 发展性原则
- E. 个性化原则

21. 在医患关系中，比较适合共同参与模式的患者是

- A. 智障患者
- B. 昏迷患者
- C. 婴幼儿患者
- D. 长期慢性病患者
- E. 精神病患者发作期

22. 支气管哮喘急性发作早期的动脉血气特征是

- A. 代谢性碱中毒
- B. 代谢性酸中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 混合性酸碱失衡

23. 对腹膜刺激作用最轻的物质是

- A. 血液

- B. 胰液
- C. 胃液
- D. 肠液
- E. 胆汁

24. 改善急性左心衰竭症状最有效的药物是

- A. 利尿剂
- B. 洋地黄
- C. β 受体阻滞剂
- D. 钙通道阻滞剂
- E. 血管紧张素转化酶抑制剂

25. 《艾滋病防治条例》明确规定，艾滋病病毒感染者及其家属享有的合法权利范围包括

- A. 婚姻、就业、就医、休假
- B. 婚姻、就业、就医、娱乐
- C. 婚姻、就业、就医、入学
- D. 就业、就医、休假、生育
- E. 就业、就医、娱乐、入学

26. 最能说明肝硬化患者已存在门静脉高压的表现是

- A. 脾大
- B. 腹水
- C. 痔核形成
- D. 门静脉增宽
- E. 食管胃底静脉曲张

27. 患者表现平静，客观面对患病现实，关注自身疾病，遵行医嘱，所体现的患者角色行为类型为

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为减退
- C. 角色行为异常
- D. 角色行为冲突
- E. 角色行为适应

28. 有严重输血过敏反应病史的患者，若要纠正贫血应输注

- A. 全血
- B. 辐照红细胞
- C. 洗涤红细胞

- D. 悬浮红细胞
- E. 去白细胞的红细胞

29. 对糖皮质激素最为敏感的肾病综合征病理类型是

- A. 局灶节段性肾小球硬化
- B. 系膜毛细血管性肾炎
- C. 系膜增生性肾炎
- D. 脂性肾病
- E. 膜性肾病

30. 医生在治疗疾病的过程中，“只见疾病，不见人”，说明医生只注重了

- A. 技术水平的交往
- B. 非技术水平的交往
- C. 执业水平的交往
- D. 语言水平的交往
- E. 非语言水平的交往

31. 直肠指检不易发现的病变是

- A. 肛瘘
- B. 盆腔脓肿
- C. 内痔
- D. 肛管直肠癌
- E. 直肠息肉

32. 病毒性肝炎时，肝细胞最常见的灶性坏死属于

- A. 坏疽
- B. 液化性坏死
- C. 干酪性坏死
- D. 嗜酸性坏死
- E. 凝固性坏死

33. 最不适合手术治疗的肺癌病理类型是

- A. 腺癌
- B. 类癌
- C. 小细胞癌
- D. 大细胞癌
- E. 鳞状细胞癌

34. 缺氧引起呼吸加深加快的原因是

- A. 肺牵张反射

2020 年临床助理历年真题

- B. 刺激呼吸肌
- C. 刺激外周化学感受器
- D. 刺激中枢化学感受器
- E. 直接刺激呼吸中枢

35. 慢性右心衰竭的特征性临床表现是

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 水肿
- C. 肝脏肿大
- D. 肝颈静脉反流征
- E. 咳粉红色泡沫样痰

36. 下列食物中，铁的良好来源是

- A. 鱼
- B. 动物肝脏
- C. 大豆
- D. 小麦
- E. 蛋黄

37. 高位肠梗阻早期的典型临床表现是

- A. 呕吐粪样物
- B. 呕吐频繁但腹胀不明显
- C. 胃肠减压时胃液极少
- D. 腹胀明显但呕吐次数较少
- E. 腹部平片示“阶梯状”液平面

38. 下列疾病中，属于食物中毒的是

- A. 暴饮暴食导致急性胃肠炎
- B. 吃生鱼片导致肝吸虫病
- C. 不洁饮食导致病毒性甲肝
- D. 吃霉变玉米导致“醉谷病”
- E. 长期过量食用腌制食品导致胃癌

39. 有助于扩张型心肌病与慢性肺源性心脏病鉴别的是

- A. 右心室扩大
- B. 右心衰竭
- C. 呼吸困难
- D. 咳嗽咳痰
- E. B 型超声检查示全心增大

40. 慢性肺源性心脏病降低肺动脉高

压的首选治疗是

- A. 强心剂
- B. 氧疗
- C. 利尿剂
- D. 呼吸兴奋剂
- E. 支气管舒张剂

41. 慢性肾小球肾炎的肉眼特征是

- A. 多囊肾
- B. 瘢痕肾
- C. 颗粒性固缩肾
- D. 大红肾
- E. 大白肾

42. 属于白三烯调节剂的支气管哮喘控制性药物是

- A. 沙美特罗
- B. 沙丁胺醇
- C. 倍氯米松
- D. 异丙托溴铵
- E. 孟鲁司特

43. 属于影响行为的倾向因素的是

- A. 资源
- B. 态度
- C. 法律
- D. 奖励
- E. 政策

44. 目前临床上常用的戒烟药物是

- A. 阿托品
- B. 吗啡贴片
- C. 阿司匹林
- D. 肾上腺素
- E. 尼古丁贴片

45. 吗啡的主要适应证为

- A. 分娩镇痛
- B. 颅脑外伤疼痛
- C. 哺乳期妇女镇痛
- D. 诊断未明的急腹症疼痛
- E. 急性严重创伤、烧伤所致疼痛

46. 与幽门螺杆菌感染关系最密切的

疾病是

- A. 慢性胃炎
- B. 胃癌
- C. 急性胃炎
- D. 胃食管反流病
- E. 功能性消化不良

47. 医德修养的根本途径和方法是坚持

- A. 学习医德榜样人物
- B. 学习医德理论知识
- C. 医疗卫生保健实践
- D. 加强政治思想教育
- E. 经常性批评和自我批评

48. 门静脉高压症的主要临床表现是

- A. 肝掌
- B. 蜘蛛痣
- C. 肝病面容
- D. 腹水
- E. 男性乳房发育

49. 能以不衰减的形式沿可兴奋细胞膜传导的电活动是

- A. 静息膜电位
- B. 锋电位
- C. 终板电位
- D. 感受器电位
- E. 突触后电位

50. 最不易愈合的骨折是

- A. 内踝骨折
- B. 肱骨髁上骨折
- C. 桡骨远端骨折
- D. 股骨颈骨折
- E. 股骨髁间骨折

51. 痛最常发生的部位是

- A. 腿部
- B. 背部
- C. 面部
- D. 腰部
- E. 胸部

52. 阿司匹林最常见的不良反应是

- A. 胃肠道反应
- B. 水杨酸反应
- C. 过敏反应
- D. Reye 综合征
- E. 出血倾向

53. 氨基酸的主要生理作用是

- A. 合成核酸
- B. 合成尿素
- C. 合成糖原
- D. 合成胆固醇
- E. 合成蛋白质

54. 按照居民门牌号, 机械地每隔 4 户抽取 1 户的抽样方法是

- A. 系统抽样
- B. 多级抽样
- C. 整群抽样
- D. 分层抽样
- E. 单纯随机抽样

55. 支气管扩张症患者出现咯血时, 一般不主张使用

- A. 抗生素
- B. 镇咳药
- C. 云南白药
- D. 介入治疗
- E. 垂体后叶素

56. 长期应用糖皮质激素后, 突然停药所产生的反跳现象是由于患者

- A. 对糖皮质激素产生耐药性
- B. 对糖皮质激素产生了依赖或病情未能完全控制
- C. 肾上腺皮质功能减退
- D. 肾上腺皮质功能亢进
- E. ACTH 分泌增加

57. 地塞米松的临床应用不包括

- A. 风湿性心脏病
- B. 骨质疏松
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 过敏性紫癜

E. 感染中毒性休克

58. 患者, 男, 32 岁。因患再生障碍性贫血需要输血, 当输入红细胞悬液约 200ml 时, 突然畏寒、发热, 呕吐 1 次, 尿呈酱油样, 血压 75/45mmHg。该患者最有可能的输血不良反应(并发症)是

- A. 非溶血性发热性输血反应
- B. 溶血性输血反应
- C. 变态反应
- D. 细菌污染反应
- E. 循环超负荷

59. 患者, 男, 56 岁。咳嗽伴痰中带血 2 周。胸部 X 线片及 CT 检查发现右肺上叶周围型结节。痰细胞学检查示:鳞癌可能性大。该患者首选的治疗是

- A. 免疫治疗
- B. 手术治疗
- C. 化学药物治疗
- D. 介入治疗
- E. 放射治疗

60. 患者, 女, 60 岁。反复咳脓痰伴间断少量咯血 10 余年, 大咯血 3 天入院。查体:右下肺可闻及固定湿啰音。胸片示右下肺纹理增重, 可见卷发影。最可能的诊断是

- A. 支气管扩张症
- B. 肺癌
- C. 肺炎
- D. 肺结核
- E. 慢性支气管炎

61. 某患者, 因支气管哮喘住院治疗 10 余天, 今晨突感左上胸短暂刺痛, 逐渐感呼吸困难, 不能平卧。心率 120 次/分, 律不齐, 左肺呼吸音减弱。对此患者首先应考虑并发了下列何种情况

- A. 支气管哮喘急性发作
- B. 心绞痛
- C. 自发性气胸
- D. 肺不张

E. 急性心力衰竭

62. 患者, 女, 32 岁。发作性喘息 3 年, 加重 1 天。查体:R28 次/分, 口唇发绀, 双肺满布哮鸣音, 心率 120 次/分, 律齐, 未闻及杂音。院外使用氨茶碱、特布他林治疗, 效果不佳。目前对该患者除吸氧外, 应首先给予的治疗措施为

- A. 糖皮质激素静脉滴注
- B. 二丙酸倍氯米松雾化吸入
- C. 5%碳酸氢钠静脉滴注
- D. 无创通气
- E. 联合应用抗生素静脉滴注

63. 患者, 女, 18 岁。对雷雨天气感到恐惧, 每逢雷雨则逃至楼下角落藏匿。她认为雷电交加、暴雨倾盆最为恐惧;大雨次之;阴天最轻。医师在教会她放松技术后, 让她先想象阴天, 当无紧张时再升级想象下雨, 如有紧张感, 则要她重复放松, 直至想象通过全部恐惧情景。然后进行实景暴露, 消除对雷雨的回避行为。这种治疗方法是

- A. 系统脱敏疗法
- B. 冲击疗法
- C. 厌恶疗法
- D. 生物反馈疗法
- E. 松弛疗法

64. 患者, 女, 48 岁。半年前发现左乳外上象限有一无痛性肿块, 近期生长较快, 直径约 4cm。术后病理检查:肿块呈灰白色, 质地柔韧, 无包膜, 界限不清。光镜下瘤细胞大小一致, 异型性较小, 呈单行串珠状排列。病理诊断应为乳腺

- A. 粉刺癌
- B. 小叶原位癌
- C. 导管内原位癌
- D. 浸润性小叶癌
- E. 浸润性导管癌

65. 患者, 男, 28 岁。反复中上腹痛 5

年，疼痛多发生于饥饿时及夜间，进食可缓解，常反酸、嗝气。近 2 天大便呈柏油样，觉头昏、乏力。查体：上腹轻压痛，肠鸣音活跃。最可能的诊断是

- A. 胃溃疡并出血
- B. 十二指肠溃疡并出血
- C. 胃癌并出血
- D. 急性糜烂出血性胃炎
- E. 门静脉高压食管胃底曲张静脉破裂出血

66. 患者，男，30 岁。突发上腹剧痛 3 小时，怀疑消化道穿孔，无休克表现。为明确诊断，首选的检查方法是

- A. 腹腔诊断性穿刺
- B. 立位腹部 X 线平片
- C. CT 检查
- D. B 型超声检查
- E. 胃肠 X 线钡剂造影检查

67. 患者，男，56 岁。咳嗽、胸闷、憋气 2 天，持续不缓解。查体：左侧肺部呼吸运动减低，叩诊呈鼓音，呼吸音明显减低。胸部 X 线片示左肺萎陷，压缩约 90%。该患者最有效的治疗措施是

- A. 胸腔穿刺排气
- B. 解痉平喘
- C. 低流量吸氧
- D. 呼吸机辅助呼吸
- E. 胸腔闭式引流

68. 患者，男，25 岁。腹痛、脓血便、发热 2 个月。大便 10 次/日，体温 39.0℃。粪便镜检及培养未见病原体。结肠镜检查示结肠弥漫分布的糜烂及浅溃疡。病理学提示重度慢性炎症。左氧氟沙星联合甲硝唑治疗 1 周症状无缓解。此时最适宜的治疗药物是

- A. 泼尼松
- B. 柳氮磺吡啶
- C. 硫唑嘌呤
- D. 美沙拉嗪

E. 美沙拉嗪联合奥沙拉嗪

69. 患者，男，40 岁。周期性上腹痛 1 年，傍晚常呕吐酸酵宿食。查体：消瘦，上腹稍膨隆，偶见胃型，有振水音。最可能的诊断是

- A. 胃窦癌
- B. 急性胃扩张
- C. 幽门梗阻
- D. 胃溃疡
- E. 十二指肠壅积征

70. 患者，女，66 岁。体检发现血压高，无不适，其父亲于 49 岁时死于急性心肌梗死。查体：血压 155/100mmHg。实验室检查：血清总胆固醇 5.90mmol/L，尿蛋白 240mg/d。该患者高血压的诊断应为

- A. 1 级，高危
- B. 2 级，高危
- C. 2 级，很高危
- D. 1 级，中危
- E. 1 级，很高危

71. 患者，女，35 岁。右乳腺癌改良根治术后，腋窝淋巴结 20 枚中有 2 枚癌转移，浸润性导管癌，直径 1.5cm，ER 和 PR 检查均为阴性。首选的辅助治疗方法是

- A. 骨髓移植
- B. 化疗
- C. 口服三苯氧胺
- D. 胸壁和腋窝放疗
- E. 双侧卵巢切除术

72. 患者，男，56 岁。十二指肠溃疡出血 2 天，提示上消化道出血仍未停止的征象是

- A. 肠鸣音 5 次/分
- B. 血压 90/60mmHg
- C. 血尿素氮增高
- D. 排暗红色血便
- E. 尿量增加

73. 患者。女，55 岁。左乳房红肿、增大 1 个月，进展较快，无疼痛、发热。查体：左乳房红肿，局部温度略高，发硬，但未触及包块，左腋窝有肿大淋巴结，稍硬，活动度好，无压痛。血常规正常。最可能的诊断是

- A. 乳腺增生症
- B. 急性乳腺炎
- C. 乳房结核
- D. 导管内乳头状瘤
- E. 炎性乳腺癌

74. 精神障碍患者王某有危害他人安全的危险情形，但其监护人对医疗机构做出需要住院治疗的诊断结论有异议，不同意对患者实施住院治疗，并在收到诊断结论之日起规定期限内向其他具有合法资质的医疗机构提出了再次诊断的要求。该期限是

- A. 3 日
- B. 7 日
- C. 10 日
- D. 15 日
- E. 30 日

75. 患者张某家在农村，曾与城市姑娘恋爱，但是该姑娘的父母看不起张某，逼女儿与张某断绝关系。张某失恋后十分自卑。医师王某为张某做心理治疗时，了解了张某的经历，就经常与自己的家人谈论张某的情况。该医师违背了心理治疗的哪项道德要求

- A. 具备帮助别人的诚意
- B. 尊重患者，保护隐私
- C. 关心患者，开拓进取
- D. 减轻痛苦，加速康复
- E. 具备高度的责任心和良好的专业素质

76. 患者，女，60 岁，因突发右上腹痛 8 小时入院。查体：体温 38.5℃，心率 90 次/分，血压 110/80mmHg，右上腹压痛、肌紧张、反跳痛，WBC $16 \times 10^9/L$ 。B 型超声提示胆囊增大，壁厚，内有结

石多个，胆总管直径 1.2cm，拟行急诊手术。此患者应选择的手术方式是

- A. 胆囊切除术
- B. 胆囊切除加胆总管探查术
- C. 胆囊造瘘术
- D. 胆肠吻合术
- E. PTCD

77. 患者，女，31 岁。低热、乏力伴腹胀 3 个月。查体：腹部膨隆，腹壁柔韧感，有压痛和轻反跳痛，移动性浊音阳性，腹水为渗出液。为明确诊断，最有价值的检查是

- A. 腹部 B 型超声
- B. 胃肠道钡剂检查
- C. 红细胞沉降率
- D. 腹水细菌培养
- E. 腹腔镜检查

78. 患者，男，55 岁。乙型肝炎肝硬化病史 15 年。昨天突发呕血量约 2000ml，输入红细胞悬液 1600ml 后血压仍不能维持稳定，若继续内科治疗，则下一阶段输入的血液制品应首选

- A. 红细胞悬液
- B. 浓缩红细胞
- C. 洗涤红细胞
- D. 新鲜冰冻血浆
- E. 冷沉淀

79. 患者，男，56 岁。每日饮白酒 250g，已有 10 年，近日出现腹胀、乏力来院就诊，诊断为肝硬化。最重要的治疗措施是

- A. 戒酒
- B. 利尿剂
- C. 护肝药物
- D. 补充营养
- E. 抗病毒治疗

80. 患者，女，30 岁。足月顺产，卧床 2 周后开始下床活动，自觉左下肢疼痛。查体：左小腿肿胀，皮肤发绀，皮温高，表浅静脉曲张，沿左股静脉走行区有

明显压痛。最可能的诊断是

- A. 急性右心衰竭
- B. 急性全心衰竭
- C. 血栓性股静脉炎
- D. 左下肢深静脉血栓形成
- E. 左股动脉栓塞

81. 某医生为了帮助患者戒烟, 在患者每次吸烟后给他服用某种能引起恶心、呕吐的药物, 这样反复多次以后, 患者就不再想吸烟了。这种治疗方法称为

- A. 冲击疗法
- B. 系统脱敏疗法
- C. 厌恶疗法
- D. 松弛疗法
- E. 生物反馈

82. 患者, 男, 70 岁。健康体检时 B 型超声发现胆囊内有一直径约 0.8cm 结石, 随体位活动。口服法胆囊造影示胆囊显影, 充盈缺损不明显。既往无胃病史, 无胆囊炎发作史, 无心脏病、糖尿病病史。目前的治疗建议是

- A. 观察、随诊
- B. 溶石疗法
- C. 中药排石
- D. 择期行胆囊切除术
- E. 择期行腹腔镜胆囊切除术

83. 患者, 男, 40 岁。发热、咽痛伴牙龈出血半个月。浅表淋巴结和脾脏轻度肿大。实验室检查: 外周血 Hb60g/L, WBC $25 \times 10^9/L$, Plt $42 \times 10^9/L$, 血涂片红细胞形态正常。骨髓增生活跃, 其中原始细胞占 75%。细胞化学染色示 PAS 阴性, NSE 阳性, 部分能被氟化钠抑制。患者的首选治疗方案是

- A. IA 方案
- B. DVP 方案
- C. ABVD 方案
- D. 伊马替尼
- E. 维 A 酸

84. 患者, 男, 42 岁。平素无不适。体检时发现血压 120/80mmHg, 心率 80 次/分, 律不齐。心电图示偶发室性期前收缩。超声心动图示心脏结构功能正常。目前该患者最适宜的处置是

- A. 暂不治疗, 随诊
- B. 口服索他洛尔
- C. 口服美托洛尔
- D. 口服胺碘酮
- E. 射频消融术

85. 患者, 女, 55 岁。里急后重伴排便不尽感 5 个月, 大便带血近 1 个月。查体: T $36.5^{\circ}C$, P80 次/分, R18 次/分, BP120/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率 80 次/分, 心律齐, 腹软, 无压痛。直肠指诊: 膝胸位, 进指 6cm, 于直肠右侧壁触及柔软光滑有蒂包块。对于诊断最有意义的检查是

- A. 经直肠 B 型超声
- B. 经阴道 B 型超声
- C. 盆腔 CT
- D. 结肠镜
- E. 结肠 X 线钡灌肠检查

86. 患者, 男, 30 岁。胃溃疡穿孔行胃大部切除术后 5 天, 出现右上腹钝痛及发热, 最高体温 $38.5^{\circ}C$ 。腹部 X 线透视见右侧膈肌升高, 随呼吸活动受限, 肋膈角模糊。最可能的诊断是

- A. 胃排空障碍
- B. 膈下脓肿
- C. 急性细菌性肝脓肿
- D. 吻合口瘘
- E. 急性胆囊炎

87. 患者, 男, 24 岁。反复中上腹疼痛 3 年, 常于精神紧张及季节变化时加重, 伴反酸, 服用抑酸药物可缓解疼痛。患者最可能的诊断是

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠球部溃疡
- C. 胃泌素瘤
- D. 球后溃疡

E. 慢性胃炎

88. 患者, 男, 45 岁。肝硬化病史 5 年。3 天前突然呕吐鲜血 200ml, 继之黑便入院。近日郁闷不乐。查体: 扑翼样震颤阳性。下列处理措施中, 不正确的是

- A. 不宜给予高蛋白饮食
- B. 口服乳果糖
- C. 口服甲硝唑及新霉素
- D. 若有躁动可给予冬眠合剂
- E. 有便秘者给予稀醋酸灌肠

89. 患者, 男, 40 岁。1 年来进行性心悸、气短、腹胀及下肢水肿, 既往体健。体检: 血压 130/65mmHg, 心界向两侧扩大, 心尖搏动及第一心音减弱, 心尖区闻及 2/6 级收缩期杂音, 两肺底湿啰音, 颈静脉明显怒张, 肝大, 腹水征(+), 下肢水肿。心电图示完全性右束支及左前分支阻滞。患者最可能的诊断是

- A. 风湿性二尖瓣关闭不全
- B. 扩张型心肌病
- C. 缩窄性心包炎
- D. 冠心病伴乳头肌断裂
- E. 肥厚型心肌病

90. 患者, 女, 55 岁。间断腹泻 5 年, 黏液脓血便 3~4 次/天, 伴左下腹部疼痛、口服甲硝唑及利复星治疗无明显好转。查体: 左下腹部压痛(+). 最可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 慢性细菌性痢疾
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 结肠癌
- E. 缺血性肠病

91. 患者, 男, 40 岁, 8 小时前开始上腹剧烈疼痛。查体: 上腹部有压痛。此时对确诊价值不大的检查是

- A. 血淀粉酶
- B. 尿淀粉酶

- C. 心电图
- D. 腹部 X 线平片
- E. 腹部 B 型超声

92. 对酒瘾患者使用“戒酒硫”, 此药的作用是只要患者体内有乙醛积聚, 就会引起恶心、呕吐、呼吸急促、出汗、胸痛等痛苦症状。此种治疗方法属于

- A. 代币疗法
- B. 脱敏疗法
- C. 冲击疗法
- D. 厌恶疗法
- E. 放松训练

93. 患者, 男, 32 岁。十二指肠溃疡病史 1 年, 口服药物治疗, 因 12 小时前呕吐鲜血来诊, 血压为 80/50mmHg, 输血 1000ml 后血压仍有波动。查体: 贫血貌, 剑突下压痛、腹软。此患者最适宜的治疗方法是

- A. 快速补液、输血
- B. 静脉注射止血药
- C. 胃镜电凝止血
- D. 急诊剖腹手术
- E. 应用血管活性药物

94. 患者, 男, 54 岁。乙型肝炎病史 20 年。近 2 年来双下肢水肿, 现因上消化道出血 1 天急诊入院。查体: 皮肤轻度黄染, 前胸壁有蜘蛛痣, 脾肋下 3cm。若该患者行肝脏穿刺活组织检查, 其典型的病理改变为

- A. 肝细胞再生
- B. 肝细胞大片坏死
- C. 肝细胞水肿
- D. 假小叶形成
- E. 肝细胞脂肪变性

95. 梁某的姐姐因患子宫脱垂在某医院接受手术治疗, 术后第 3 天突然死亡。梁某对死因提出质疑, 要求复印其姐姐的全部病历资料。医院工作人员依据《医疗事故处理条例》提供了

其有权复印的病历资料。以下病历资料中可复印的是

- A. 住院志
- B. 病程记录
- C. 上级医师查房记录
- D. 会诊意见
- E. 死亡病例讨论记录

96. 为探讨新生儿黄疸的病因，某研究者选择了 150 例确诊为新生儿黄疸的病例，同时选择了同期同医院没有黄疸的新生儿 150 例。然后查询产妇的分娩记录，了解分娩及产后的各种暴露情况，这种研究方法

- A. 实验研究
- B. 病例对照研究
- C. 队列研究
- D. 临床随访
- E. 现况调查研究

97. 王某是某社区卫生服务中心的医师，他在接诊一名前来就诊的肥胖“感冒”患者时，除开了一些治疗感冒的药物之外，还询问了患者的家庭情况，同时为其测量血压、称体重，嘱其有规律地进行体力活动、减轻体重。该医师的做法属于

- A. 临床治疗服务
- B. 临床预防服务
- C. 健康危险度评估
- D. 三级预防服务
- E. 社区卫生服务

98. 患者，男，25 岁。心悸、气短 2 个月，发热 1 周。查体： $T38.6^{\circ}\text{C}$ ，睑结膜有瘀点，足底可见紫红色结节，有压痛。心率 100 次/分，主动脉瓣区闻及舒张期叹气样杂音。尿常规：少量蛋白。最可能的诊断是

- A. 上呼吸道感染
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 风湿热
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 亚急性感染性心内膜炎

99. 10 岁男孩。右侧阴囊肿大 2 年。晨起变小，活动后增大。查体：右侧阴囊肿大，可触及囊性感，挤压时缩小，缩小后睾丸可触及正常大小。透光试验阳性。最可能的诊断是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 睾丸鞘膜积液
- C. 精索鞘膜积液
- D. 交通性鞘膜积液
- E. 精索静脉曲张

100. 患者，女，35 岁。因扁桃体炎复发到医院就诊，医师给他开了价格昂贵的头孢他啶，患者要求改为上次发病时有效而便宜的青霉素。但医师不耐烦地说：“你是医师，还是我是医师？”该医师明显违背了医学伦理学中的

- A. 有利原则
- B. 公益原则
- C. 公正原则
- D. 尊重原则
- E. 生命价值原则

101. 患者，男，55 岁。间断上腹疼痛 3 年。胃镜示胃小弯有一直径 2cm 的溃疡，活检未见癌细胞。使用 H₂ 受体阻滞剂治疗 6 个月溃疡仍未愈合。此时正确的治疗措施是

- A. 重复药物治疗
- B. 溃疡局部切除
- C. 毕 I 式胃大部切除
- D. 毕 II 式胃大部切除
- E. 迷走神经切断术+幽门成形术

102. 已知某地 30 岁正常成年男性的平均收缩压为 120mmHg。从该地随机抽取 30 名 30 岁正常成年男性，测得其平均收缩压为 115mmHg。115mmHg 与 120mmHg 不同的原因是

- A. 样本例数太少
- B. 抽样误差
- C. 总体均数不同
- D. 系统误差

E. 个体差异太大

103. 患者，男，40 岁，体重 70kg。因右股骨头坏死拟定于下月行手术治疗。门诊查体：一般情况好，血压 130/85mmHg，心肺腹(-)。实验室检查：RBC $5.0 \times 10^9/L$ ，WBC $4.6 \times 10^9/L$ ，Plt $200 \times 10^9/L$ ，出凝血时间正常。患者 2 年前曾因右股骨颈骨折行牵引治疗。若手术中需要输血，则首选的输血策略是

- A. 输悬浮红细胞
- B. 输浓缩血小板
- C. 输新鲜冰冻血浆
- D. 输去白细胞的红细胞
- E. 自体输血

104. 患者，男，30 岁。间断胸痛、气促 4 个月，B 型超声检查诊断为梗阻性肥厚型心肌病，宜选用的治疗药物是

- A. 硝酸甘油
- B. 普萘洛尔
- C. 地高辛
- D. 螺内酯
- E. 维拉帕米

105. 患者，男，65 岁。间断胸痛、气促 3 个月。心电图检查有病理性 Q 波，可以除外的疾病是

- A. 扩张型心肌病
- B. 肥厚型心肌病
- C. 病毒性心肌炎
- D. 亚急性心包炎
- E. 冠心病

106. 患者，男，35 岁。反复咳嗽、咳脓痰 10 年，间断咯血，痰量约 40ml/d。体检：杵状指(+)，左下肺背部闻及湿啰音。胸部 X 线片示两下肺纹理紊乱。最可能的诊断是

- A. 支气管扩张症
- B. 慢性支气管炎
- C. 慢性肺脓肿
- D. 肺结核

E. COPD

107. 在塌方现场挖出一位伤员，烦躁不安，面部发绀，剧烈咳嗽，吸气呈三凹征，右胸壁压痛及反常呼吸，右股骨干骨折端外露。该伤员的首要紧急处理措施是

- A. 清创包扎固定股骨骨折
- B. 张力性气胸行胸腔穿刺
- C. 清理口腔及呼吸道异物
- D. 加压包扎，固定浮动胸壁
- E. 环甲膜穿刺术

108. 王某为市一医院法定传染病报告人。周五晚上急诊室值班医师告知他有 4 名同班同学确诊为“急性细菌性病疾”。因为是周末，王某当时没有上报，等到下周一正常上班后才上报。根据《传染病防治法》的规定，卫生行政部门对王某的处理应是

- A. 行政罚款
- B. 行政降级
- C. 责令改正
- D. 开除公职
- E. 追究刑事责任

109. 某产妇住院分娩，分娩过程中由于助产士操作错误，造成产妇大出血死亡。根据相关法律法规，其家属所采取的行为不恰当的是

- A. 要求院方就患者的死因给出合理的解释
- B. 要求家属在场的情况下封存病历
- C. 要求该助产士先行赔付
- D. 要求将尸体冰存在医院停尸房，待 5 天后进行尸检
- E. 要求进行医疗事故鉴定

110. 患者，男，60 岁。唇部疔肿 3 天，如脓头被挤破，最可能发生的危险是

- A. 眼球化脓性感染
- B. 脑内脓肿
- C. 面颈部蜂窝织炎
- D. 上颌骨骨髓炎

E. 化脓性海绵状静脉窦炎

111. 患者，女，28 岁。心悸、甲状腺肿大，伴有轻度呼吸不畅，压迫感，首次妊娠 5 个月余，确诊为原发性甲状腺功能亢进症，最有效的治疗方法是

- A. ¹³¹I 治疗
- B. 口服丙硫氧嘧啶
- C. 口服普萘洛尔
- D. 甲状腺大部切除
- E. 终止妊娠

112. 患者，男，67 岁。高血压 20 年，同时伴有 2 型糖尿病 5 年，尿蛋白(+)，选择最佳的降压药物为

- A. α 受体阻滞剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. 钙拮抗剂
- D. 利尿剂
- E. ACEI

113. 患者，男，60 岁。急性化脓性阑尾炎行阑尾切除术后 8 小时，感下腹部胀痛，躁动不安，未解小便。根据病史，首先应考虑的原因是

- A. 腹腔内出血
- B. 急性膀胱炎
- C. 尿潴留
- D. 腹腔脓肿
- E. 肠蠕动未恢复

114. 患者，男，60 岁。因扩张型心肌病、心脏扩大、心功能 IV 级、心电图监测呈频发室性期前收缩伴阵发性室性心动过速而来院。对该患者治疗应首选的方法是

- A. 静脉滴注胺碘酮
- B. 静脉推注利多卡因
- C. 静脉推注美托洛尔
- D. 静脉推注普罗帕酮
- E. 同步直流电复律

115. 在一项涉及 60 多个国家关于吸烟

与急性心肌梗死关系的病例对照研究中，为表示吸烟与心肌梗死的关联强度，可使用的指标是

- A. 发病率
- B. 患病率
- C. 相对危险度
- D. 比值比
- E. 标化死亡率

116. 患者，男，30 岁。患消化性溃疡 2 年余，经常反复发作，曾用过多种药物治疗。下列用过的治疗药物中，属于保护胃黏膜的药物是

- A. 法莫替丁
- B. 奥美拉唑
- C. 多潘立酮
- D. 西沙必利
- E. 米索前列醇

117. 患者，男，60 岁。吸烟 45 年，咳嗽 1 个月，偶有血痰，伴乏力、低热。查体：左胸饱满，语颤减弱，叩诊浊音，左中下肺呼吸音消失。该患者最可能的诊断是左侧

- A. 肺不张
- B. 胸腔积液
- C. 大叶性肺炎
- D. 肺大疱
- E. 胸膜增厚

A3/A4 型选择题

(118~119 题共用题干)

患者，女，42 岁。参加宴会后突发中上腹持续性疼痛伴恶心、呕吐 8 小时来诊，既往无胃病史。查体：T38.0℃，巩膜无黄染，上腹偏左有压痛及轻度肌紧张，肝浊音界正常，Murphy 征阴性，肠鸣音正常。

118. 最可能的诊断是

- A. 急性肠梗阻
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 消化性溃疡穿孔

119. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 尿淀粉酶
- B. 血淀粉酶
- C. 血脂肪酶
- D. 腹部超声
- E. 腹部平片

(120~121 题共用题干)

患者, 男, 29 岁。尿频、尿急、尿痛 2 年, 症状加重时有终末血尿, 小便 6~10 次/日。尿沉渣检查: 脓细胞(+++), 红细胞(++). 尿液普通细菌培养(-)。腹部平片未见明显异常。

120. 患者最可能的诊断是

- A. 慢性膀胱炎
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 肾癌
- D. 肾结核
- E. 尿道炎

121. 对该患者治疗方案的选择有决定性意义的检查是

- A. 尿沉渣涂片抗酸染色检查
- B. 尿结核杆菌培养
- C. 尿路平片
- D. 静脉尿路造影
- E. 肾脏 MRI 检查

(122~123 题共用题干)

患者, 女, 32 岁。尿频、尿急、尿痛进行性加重半年, 抗生素治疗不见好转, 且伴有右侧腰部胀痛及午后潮热。122. 对诊断具有决定性意义的尿液检查是

- A. 尿相差显微镜检
- B. 尿蛋白定量
- C. 尿普通细菌培养
- D. 尿沉渣找抗酸杆菌
- E. 尿细胞学检查

123. 若经上述检查获得确诊, 则对制订治疗方案最有价值的下一步检查是

- A. B 型超声

- B. CT
- C. MRI
- D. IVU
- E. 核素扫描

(124~125 题共用题干)

患者, 男, 71 岁。间断咳嗽、咳痰 20 余年, 加重伴喘憋 1 周。近 2 天出现嗜睡。查体: 意识模糊, 口唇发绀, 球结膜水肿, 双肺满布哮鸣音, 双下肢水肿。

124. 该患者出现意识障碍最主要的机制是

- A. 心源性休克
- B. 电解质紊乱
- C. 肺性脑病
- D. 感染中毒性脑病
- E. 脑出血

125. 患者经吸氧治疗后呼吸困难进一步加重。血气分析示: pH7.10, PaO₂65mmHg, PaCO₂102mmHg。查体: 昏睡, 口唇发绀, 双肺散在干湿性啰音。此时, 应首选的治疗措施是

- A. 糖皮质激素静脉滴注
- B. 大剂量利尿剂静脉滴注
- C. 呼吸兴奋剂静脉滴注
- D. 静脉应用广谱抗生素
- E. 机械通气

(126~128 题共用题干)

患者, 女, 55 岁。1 周前无意中发现右乳腺外上象限肿块, 大小约 3cm×3cm×4cm, 边界不清, 局部皮肤凹陷, 右腋窝未触及肿大淋巴结。

126. 该患者最可能的诊断是

- A. 乳腺纤维腺瘤
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺囊性增生症
- D. 乳腺肉瘤
- E. 乳腺结核

127. 若最后确诊为上述疾病, 患者希望保留乳腺, 则术后必不可少的治疗

是

- A. 内分泌治疗
- B. 放射治疗
- C. 化学治疗
- D. 生物治疗
- E. 中医中药治疗

128. 术后病理免疫组化结果显示 HER2 强阳性，其后续治疗首选

- A. 三苯氧胺
- B. CMF 方案化疗
- C. CAF 方案化疗
- D. 曲妥珠单抗
- E. 阿那曲唑

(129~130 题共用题干)

患者，男，55 岁。发现高血压 5 年，近 1 个月出现喘憋、夜间憋醒、下肢水肿，双肺可闻及湿啰音。心电图示陈旧性前壁心肌梗死，胸片提示心影增大。

129. 该患者最可能的诊断是

- A. 冠心病左心衰竭
- B. 冠心病右心衰竭
- C. 冠心病全心衰竭
- D. 高血压收缩性心力衰竭
- E. 高血压舒张性心力衰竭

130. 为明确诊断，首选的实验室检查是测定

- A. 肝功能
- B. 肾功能
- C. 血电解质
- D. 血浆脑钠肽
- E. 血浆肌钙蛋白

B1 型选择题

(131~132 题共用备选答案)

- A. 格列本脲
- B. 罗格列酮
- C. 格列齐特
- D. 格列喹酮
- E. 瑞格列奈

131. 合并轻度肾功能不全的糖尿病患

者常首选

132. 以餐后高血糖为主的糖尿病患者首选

(133~134 题共用备选答案)

- A. 奇脉
- B. 水冲脉
- C. 交替脉
- D. 无脉症
- E. 滑脉

133. 慢性左心衰竭的常见临床表现为

134. 主动脉瓣关闭不全的常见临床表现为

(135~136 题共用备选答案)

- A. 维拉帕米
 - B. 硝苯地平
 - C. 尼莫地平
 - D. 地尔硫草
 - E. 普尼拉明
135. 治疗变异型心绞痛首选的钙通道阻滞剂是

136. 治疗脑血管痉挛首选的钙通道阻滞剂是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 肢体缺血坏死
- B. 骨筋膜室综合征
- C. 骨折延迟愈合
- D. 重要神经损伤
- E. 重要血管损伤

137. 胫骨上 1/3 骨折易导致

138. 胫骨中下 1/3 骨折易导致

(139~140 题共用备选答案)

- A. 神经纤维瘤
- B. 软骨母细胞瘤
- C. 骨母细胞瘤
- D. 成熟畸胎瘤
- E. 髓母细胞瘤

2020 年临床助理历年真题

139. 属于恶性肿瘤的是

140. 含有两个胚层以上成分的肿瘤是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 4 天
- B. 5~6 天
- C. 7~9 天
- D. 10~12 天
- E. 14 天

141. 减张缝合的拆线时间是术后

142. 背部手术后的拆线时间是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 消化性溃疡急性穿孔
- B. 急性阑尾炎穿孔
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 结核性腹膜炎
- E. 外伤性脾破裂

143. 腹腔穿刺液呈草黄色，静置后易凝固，常见于

144. 腹腔穿刺液呈血性，臭味较重，常见于

(145~146 题共用备选答案)

- A. 半年
- B. 1 年
- C. 2 年
- D. 3 年
- E. 5 年

145. 申请个体行医的执业医师，须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满一定年限，该年限是

146. 中止医师执业活动一定年限后，申请重新执业的，应当重新注册，该年限是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 全社会参与原则
- B. 公开透明原则
- C. 生命神圣的原则

D. 最优化原则

E. 随机对照原则

147. 临床诊疗的医学道德原则之一是

148. 预防医学的道德原则之一是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 甲苯磺丁脲
- B. 氯磺丙脲
- C. 格列齐特
- D. 格列喹酮
- E. 格列本脲

149. 合并肾功能不全的糖尿病患者常首选

150. 为了减轻或延缓糖尿病血管并发症的发生常首选

第二单元

A1/A2 型选择题

1. 妊娠末期发现跨耻征阳性，最大可能为

- A. 中骨盆狭窄
- B. 骨盆出口狭窄
- C. 漏斗型骨盆
- D. 扁平骨盆
- E. 女型骨盆

2. 小儿肾病综合征最常见的电解质紊乱是

- A. 低钠血症
- B. 高钾血症
- C. 低氯血症
- D. 高钙血症
- E. 低镁血症

3. 妊娠合并心脏病的最常见类型是

- A. 先天性心脏病
- B. 风湿性心脏病
- C. 围产期心肌病
- D. 贫血性心脏病
- E. 妊娠期高血压疾病性心脏病

4. 最易出现骨折特有体征的骨折是
- A. 裂缝骨折
 - B. 嵌插骨折
 - C. 青枝骨折
 - D. 腰椎压缩性骨折
 - E. 完全性骨折
5. 易发生延迟愈合的是
- A. 肱骨髁上骨折
 - B. 股骨颈骨折
 - C. 股骨干骨折
 - D. 腓骨上端骨折
 - E. 胫骨下 1/3 骨折
6. 轻型和重型婴儿腹泻的主要鉴别点是有无
- A. 发热及呕吐
 - B. 腹泻次数 > 10 次/日
 - C. 体温 > 38.5℃
 - D. 脑膜刺激征
 - E. 水、电解质紊乱和酸碱失衡
7. 遗忘综合征的表现不包括
- A. 智能相对完好
 - B. 意识障碍
 - C. 近事记忆障碍
 - D. 虚构
 - E. 定向力障碍
8. 唐氏综合征最常伴发畸形的器官是
- A. 心
 - B. 消化道
 - C. 呼吸道
 - D. 肾
 - E. 生殖器
9. 提示上运动神经元损害最有意义的体征是
- A. 瘫痪肌肉不萎缩
 - B. 病理征阳性
 - C. 腱反射减弱
 - D. 浅反射正常
 - E. 肌张力正常
10. 小儿第 1 颗恒牙长出的年龄一般为
- A. 4 岁
 - B. 5 岁
 - C. 6 岁
 - D. 7 岁
 - E. 8 岁
11. 绒毛膜癌最常继发于
- A. 早产
 - B. 自然流产
 - C. 葡萄胎
 - D. 异位妊娠
 - E. 正常分娩
12. 缺铁性贫血患儿服用铁剂后, 最早的治疗反应是
- A. 烦躁等精神症状减轻
 - B. 网织红细胞计数增加
 - C. 血红蛋白增加
 - D. 骨髓铁染色恢复正常
 - E. 皮肤苍白改善
13. 对化疗效果最好的肿瘤是
- A. 原发性卵巢癌
 - B. 卵巢转移癌
 - C. 子宫颈癌
 - D. 子宫内膜癌
 - E. 绒毛膜癌
14. 水痘最常见的并发症为
- A. 败血症
 - B. 肺炎
 - C. 脑炎
 - D. 心肌炎
 - E. 皮肤继发细菌感染
15. 判断糖尿病患者长期血糖控制程度的常用指标是
- A. 空腹血糖
 - B. 餐后血糖
 - C. OGTT
 - D. 糖化血红蛋白测定
 - E. 血浆胰岛素含量测定

16. 手外伤创面的现场急救处理, 最简单有效的止血方法是

- A. 外用止血粉
- B. 局部加压包扎
- C. 腕部扎止血带
- D. 前臂扎止血带
- E. 上臂上段扎止血带

17. 常引起肾绞痛泌尿系统结石为

- A. 肾盂结石
- B. 肾盏结石
- C. 输尿管结石
- D. 膀胱结石
- E. 尿道结石

18. 慢性肾炎的治疗目的是

- A. 消除尿红细胞
- B. 消除管型尿
- C. 消除轻微蛋白尿
- D. 改善营养状况
- E. 防止或延缓肾功能恶化

19. 不支持急性脑器质性精神障碍诊断的症状是

- A. 幻视
- B. 错觉
- C. 注意涣散
- D. 意识清晰
- E. 定向障碍

20. 乳牙最晚于何时出齐

- A. 1 岁
- B. 2 岁
- C. 3 岁
- D. 4 岁
- E. 5 岁

21. 常作为尿路感染筛查试验的是

- A. 尿沉渣镜检
- B. 尿白细胞排泄率
- C. 尿细菌培养
- D. 硝酸盐还原试验
- E. 静脉尿路造影

22. 上尿路结石的血尿特点是

- A. 无痛性肉眼血尿
- B. 活动后镜下血尿
- C. 初始血尿
- D. 终末血尿
- E. 全程血尿

23. 外阴阴道念珠菌病最主要传染途径是

- A. 血行传染
- B. 直接传染
- C. 间接传染
- D. 内源性传染
- E. 性交传染

24. 0.9%NaCl 和 10%GS 对人体内液来说性质是

- A. 前低后高
- B. 前等后高
- C. 都等
- D. 都高渗
- E. 都低渗

25. 枕前位分娩胎头经俯屈动作后, 开始进行内旋转的部位在

- A. 骨盆入口平面
- B. 中骨盆平面
- C. 骨盆出口平面
- D. 骨盆最大平面
- E. 骨盆底

26. 早期梅毒首选的治疗药物是

- A. 林可霉素
- B. 青霉素
- C. 红霉素
- D. 氯霉素
- E. 庆大霉素

27. 子宫破裂的典型临床表现是

- A. 肉眼血尿
- B. 病理性缩复环
- C. 痉挛性狭窄环
- D. 持续性下腹剧痛

2020 年临床助理历年真题

- E. 在腹壁下可清楚扪及胎体
28. 有助于确定新生儿缺氧缺血性脑病损害严重程度和判断预后的检查首选
- A. 脑氢质子磁共振波谱
 - B. 头颅 CT
 - C. 头颅 MRI
 - D. 脑电图
 - E. 颅脑超声检查
29. 当某一感官处于功能状态时, 另一感官出现幻觉, 此现象是
- A. 功能性幻觉
 - B. 内脏性幻觉
 - C. 假性幻觉
 - D. 反射性幻觉
 - E. 原始性幻觉
30. 唐氏综合征的特殊面容畸形不包括
- A. 眼裂小眼距宽
 - B. 双眼外眦上斜
 - C. 鼻梁低平
 - D. 常张口伸舌
 - E. 四肢细长
31. 小儿热性惊厥最常见的病因是
- A. 上呼吸道病毒感染
 - B. 上呼吸道细菌感染
 - C. 下呼吸道病毒感染
 - D. 下呼吸道细菌感染
 - E. 肠道细菌感染
32. 头颅 MRI 检查无异常发现的脑血管疾病是
- A. TIA
 - B. 脑血栓形成
 - C. 脑栓塞
 - D. 脑出血
 - E. 蛛网膜下腔出血
33. Froment 征主要用于检查
- A. 手部肌腱损伤情况
 - B. 手指末梢血运情况
 - C. 神经损伤情况
 - D. 神经损伤后恢复情况
 - E. 血管损伤情况
34. 苯丙酮尿症一旦确诊应立即治疗, 饮食治疗至少应持续至
- A. 学龄前
 - B. 10 岁
 - C. 15 岁
 - D. 青春期
 - E. 终身
35. 颅脑对冲伤最常见的损伤部位是
- A. 枕叶
 - B. 额颞叶
 - C. 小脑
 - D. 顶叶
 - E. 脑干
36. 患高血压的育龄期妇女, 宜选用的避孕方法是
- A. 安全期避孕
 - B. 皮下埋置缓释剂
 - C. 阴茎套
 - D. 复方短效口服避孕药
 - E. 复方长效避孕针
37. 不协调性宫缩乏力的叙述, 正确的是
- A. 比协调性宫缩乏力多见
 - B. 宫收缩而无力
 - C. 强镇静剂疗效显著
 - D. 较少发生胎儿窘迫
 - E. 产妇多无不适感觉
38. 与前置胎盘发生无关的是
- A. 妊娠期高血压疾病
 - B. 双胎妊娠
 - C. 多次刮宫
 - D. 胎盘面积过大
 - E. 受精卵滋养层发育迟缓
39. 正常足月儿的皮肤外观特点是

2020 年临床助理历年真题

- A. 肤色苍白，皮下脂肪丰满
B. 肤色稍黄，皮下脂肪少
C. 肤色红润，皮下脂肪少
D. 肤色红润，皮下脂肪丰满
E. 肤色稍黄，毳毛少
40. 前列腺癌筛查最常用的方法是
A. 前列腺穿刺
B. 盆腔 CT
C. 盆腔 MRI
D. 直肠指检
E. 前列腺特异性抗原检测
41. 潜伏性感染的临床特征不包括
A. 一般不引起显性感染
B. 其病原体易排出体外
C. 并不是每种传染病都存在
D. 水痘病毒常为潜伏性感染
E. 在人体免疫功能下降时可引起显性感染
42. 分离性抽搐与癫痫大发作的区别在于
A. 发作时间的长短
B. 意识是否完全丧失
C. 有无角弓反张
D. 有无节律性肢体抽动
E. 是否突然发作
43. 手术创伤后，机体代谢的变化特点是
A. 糖利用率增加
B. 易发生低血糖
C. 糖异生过程减少
D. 尿氮排泄增加
E. 脂肪分解受抑制
44. 右心室心肌梗死致低血压最关键的治疗措施是
A. 利尿
B. 控制心室率
C. 扩张冠状动脉
D. 强心
E. 补充血容量
45. 入睡前幻觉属于
A. 内脏幻觉
B. 幻视觉
C. 幻嗅觉
D. 幻触觉
E. 幻味觉
46. 不属于神经症性障碍的疾病是
A. 恐惧症
B. 广泛性焦虑障碍
C. 强迫障碍
D. 抑郁症
E. 惊恐障碍
47. 替代婴儿母乳的食物是
A. 配方米粉
B. 配方奶粉
C. 鲜牛奶
D. 鸡蛋
E. 全脂奶粉
48. 思维形式障碍不包括
A. 思维散漫
B. 病理性赘述
C. 内心被揭露
D. 语词新作
E. 思维化声
49. 乳腺癌的癌细胞浸润皮下淋巴管，可出现的临床表现为
A. 酒窝征
B. 橘皮样变
C. 乳头凹陷
D. 卫星结节
E. 手臂白色水肿
50. 关于神经症，正确的叙述是
A. 多数伴有人格障碍
B. 多在强烈心理刺激下发病
C. 症状的特异性较差
D. 一般缓慢起病
E. 患者的社会功能不受影响

51. 小儿急性肾炎出现严重循环充血时, 治疗首选

- A. 强心剂和血管扩张剂
- B. 利尿剂和血管扩张剂
- C. 强心剂和脱水剂
- D. 腹膜透析
- E. 限制钠、蛋白质摄入

52. 临床上, 清除体内尚未被吸收毒物的常用方法不包括

- A. 催吐
- B. 洗胃
- C. 导泻
- D. 灌肠
- E. 血液灌流

53. 骨盆直肠间隙脓肿最主要的特点是

- A. 排尿困难
- B. 肛周持续性剧痛
- C. 排便疼痛——缓解——便后再痛
- D. 全身中毒症状严重
- E. 肛周红肿明显

54. 胺臭味试验阳性的外阴炎是

- A. 滴虫阴道炎
- B. 细菌性阴道病
- C. 萎缩性阴道炎
- D. 非特异性外阴炎
- E. 外阴阴道念珠菌病

55. 狭窄性腱鞘炎最常发生的部位是

- A. 肘部
- B. 手指和腕关节
- C. 肩部
- D. 趾部
- E. 踝关节

56. 肠外营养中心静脉插管常选用的静脉不包括

- A. 颈内静脉
- B. 股静脉
- C. 锁骨下静脉
- D. 头静脉

E. 贵要静脉

57. 凝血障碍所致的出血特点是

- A. 女性多见
- B. 皮肤紫癜多见
- C. 关节腔出血多见
- D. 内脏出血偶见
- E. 月经过多常见

58. 节律与胎心率一致的声音是

- A. 腹主动脉音
- B. 子宫血流杂音
- C. 脐带杂音
- D. 胎动音
- E. 肠蠕动音

59. 围产儿预后相对较好的臀先露是

- A. 单臀先露
- B. 混合臀先露
- C. 单足先露
- D. 单膝先露
- E. 双膝先露

60. 需要常规对性伴侣进行治疗的女性生殖系统炎症是

- A. 萎缩性阴道炎
- B. 细菌性阴道病
- C. 外阴阴道念珠菌病
- D. 滴虫阴道炎
- E. 子宫颈肥大

61. 经产妇, 41 岁, 继发性痛经 2 年, 逐渐加重。查体: 子宫后倾, 球形增大、质硬, 附件未见异常。最可能的诊断是

- A. 子宫腺肌病
- B. 子宫内膜异位症
- C. 子宫肌瘤
- D. 妊娠子宫
- E. 子宫肌炎

62. 患者, 女, 25 岁。四肢无力 5 天, 无尿便障碍, 无发热。查体: 四肢肌力 I 级, 四肢远端痛觉减退, 腱反射减弱,

病理反射(-)。腰椎穿刺检查结果正常。该患者最可能的诊断是

- A. 急性脊髓炎
- B. 周期性瘫痪
- C. 吉兰-巴雷综合征
- D. 重症肌无力
- E. 脊髓灰质炎

63. 患者，男，50岁。体重60kg，行胃癌根治术，其术后每日需要的合理热量为

- A. 750kcal
- B. 1500kcal
- C. 1650kcal
- D. 1950kcal
- E. 2500kcal

64. 患者，男。车祸伤及头部，伤后出现左侧鼻唇沟变浅，鼻出血，左耳听力下降，左外耳道流出淡红色血性液体。诊断首先考虑

- A. 颅前窝骨折
- B. 颅中窝骨折
- C. 颅后窝骨折
- D. 左颞骨骨折
- E. 脑震荡

65. 患者，男，32岁。腹泻3个月，大便每日7~10次，稀便，无脓血、黏液。查体：肛门周围有疱疹。粪便镜检偶可见白细胞。患者7年前曾到泰国打工3年。为明确诊断，最重要的检查是

- A. 纤维结肠镜检查
- B. 血清抗HIV
- C. 血清EBV IgM抗体
- D. 粪便培养
- E. 血清CMV IgM抗体

66. 患者，男，18岁。右示指甲沟炎加剧1周，发热，指头剧烈肿胀、跳痛，最正确的处置是

- A. 热盐水浸泡，每次30分钟
- B. 全身应用抗生素
- C. 患指局部注射抗生素

- D. 患指侧面纵行切开
- E. 患指指头做鱼口状切开

67. 患者，男，20岁。精神分裂症。4个月前开始感到同事在窃窃私语地议论他，大街上不认识他的人也用特殊眼光看他，电视上的新闻报道每天也在说他，为此不敢出门，不敢看电视。该临床表现属于

- A. 被害妄想
- B. 关系妄想
- C. 错觉
- D. 幻觉
- E. 恐惧

68. 5岁患儿，从1岁半开始反复咳嗽、喘息，冬季明显加重，尤以夜间及活动后为甚。每年发作7~8次，每次持续4~6周，曾给予头孢菌素等治疗无效。其母有“慢性支气管炎”病史。患儿24小时PEF变异率为25%，舒张试验FEV1增加30%。最可能的诊断是

- A. 支气管炎
- B. 支气管异物
- C. 支气管淋巴结结核
- D. 支气管哮喘
- E. 间质性肺炎

69. 已婚女性，26岁。平素月经规律，现停经2个月，恶心、呕吐1周，昨日突发心悸、气促。查体：P120次/分，体格瘦小，口唇发绀、杵状指，双肺底少许湿啰音，心前区闻及粗糙的双期杂音。妇科B型超声检查提示早孕。该患者的合适处理为

- A. 立即终止妊娠
- B. 边控制心力衰竭边行吸宫术
- C. 控制心力衰竭后剖宫取胎
- D. 控制心力衰竭后行人工流产
- E. 如心力衰竭得以控制可以继续妊娠

70. 患者，男，30岁。头部外伤5小时收入院，拟诊为脑挫裂伤，其特点不包括

- A. 可无意识障碍
- B. 意识障碍可为突出表现
- C. 腰穿脑脊液常为血性
- D. 多有中间清醒期
- E. 常需 CT 扫描检查确诊

71. 患者，男，55 岁。阵发性腹痛、腹胀、无排气、排便 2 天。2 年前曾因急性化脓性阑尾炎行阑尾切除。查体：腹部膨隆，可见肠型，腹软无压痛，肠鸣音亢进。腹部 X 线片可见中下腹部小肠有数个液气平面，盲肠、升结肠肠腔扩张。最可能的诊断为

- A. 机械性肠梗阻
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 高位小肠梗阻
- D. 低位小肠梗阻
- E. 绞窄性肠梗阻

72. 婴儿，日龄 10 天。近 4 天吃奶不好，不发热，哭声弱。查体：反应差，黄疸明显，四肢发凉，皮肤有花纹，脉搏细弱，肝肋下 3cm，脐部有少许脓性分泌物。末梢血 WBC $15 \times 10^9/L$ ，NO. 75。该患婴最可能的诊断是新生儿

- A. 肺炎
- B. 肝炎
- C. 败血症
- D. 病理性黄疸
- E. 溶血病

73. 30 岁妇女，左下腹肿块 5 年。妇科检查：子宫正常大小，左侧可触及 5cm \times 5cm \times 6cm 大小之囊性肿物，在解大便后突然感到左下腹持续性疼痛，拒按。患者的恰当处理是

- A. 应用广谱抗生素及止痛剂
- B. 行腹腔穿刺以明确诊断
- C. 行腹腔镜检查以明确诊断
- D. 行剖腹探查术
- E. 行阴道后穹窿穿刺以明确诊断

74. 患者，男，40 岁。左下肢静脉迂曲 5 年。近 1 年来出现足靴区轻度肿胀、

皮肤脱屑、瘙痒、色素沉着、皮炎、湿疹等营养性改变。其治疗首选

- A. 弹力绑带包扎
- B. 硬化剂注射
- C. 手术治疗
- D. 物理治疗
- E. 抗感染治疗

75. 患者，男，50 岁。反复肛旁红肿、溃破、流脓 1 年，可自愈但不久又发作。最可能的诊断是

- A. 内痔
- B. 肛裂
- C. 肛周脓肿
- D. 肛瘘
- E. 直肠脱垂

76. 患者，男，20 岁。车祸致左肩外伤半小时。查体：血压 120/80mmHg，左锁骨中外 1/3 处明显畸形，局部肿胀明显，淤血，桡动脉搏动触不到，手部发凉，皮肤苍白。正确的治疗措施是

- A. 骨折手法复位，“8”字绷带外固定
- B. 骨折手法复位，石膏托外固定
- C. 牵引治疗，功能锻炼
- D. 手术切开复位，内固定，同时探查臂丛神经
- E. 手术探查受损血管并修复，骨折复位内固定，加适当外固定

77. 患者，男，50 岁，重体力劳动工人。腰腿痛 2 年，向左下肢放射，咳嗽、打喷嚏时疼痛加重。查体：腰部活动明显受限，并向左侧倾斜，直腿抬高试验阳性。病程中无低热、盗汗、消瘦等症状。该患者最可能的诊断是

- A. 腰肌劳损
- B. 腰椎结核
- C. 腰椎间盘突出症
- D. 强直性脊柱炎
- E. 腰椎椎管狭窄症

78. 患者，女，43 岁。体检时 X 线示右上肺约 1.5cm 钙化灶，下一步检查为

2020 年临床助理历年真题

- A. 随访检查
- B. 增强 CT
- C. 经胸穿刺活检
- D. 开胸活检
- E. 纤维镜检查

79. 患者，女，36 岁。今日晨练时突发喘气、胸闷 1 小时。查体：端坐呼吸，口唇发绀，双肺叩诊过清音，呼吸音减弱，未闻及哮鸣音及湿啰音，心率 120 次/分。血气分析：PaO₂50mmHg，PaCO₂30mmHg。该患者首先考虑的诊断是

- A. 急性左心衰竭
- B. 急性肺栓塞
- C. 哮喘急性发作
- D. 气胸
- E. 肺癌

80. 8 个月男孩，腹泻、咳嗽、发热 3 天。大便 9~10 次/日，为水样便，无腥臭味，尿少。查体：体温 38.2℃，前囟凹陷，口腔黏膜干燥，哭无泪，皮肤弹性欠佳，咽红，双肺未闻及湿啰音。最可能的诊断是

- A. 细菌性痢疾
- B. 真菌性肠炎
- C. 侵袭性大肠埃希菌肠炎
- D. 轮状病毒肠炎
- E. 金黄色葡萄球菌肠炎

81. 患者，男 5 岁。发热、咳嗽一周，加重 3 天。患儿剧烈咳嗽，曾用头孢噻肟钠治疗 3 天无效。查体 T39.2℃，一般情况好，双肺呼吸音粗糙，未闻及啰音。胸部 X 线片示右下肺片状阴影。该患儿最可能的诊断为

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
- B. 肺炎克雷伯菌肺炎
- C. 呼吸道合胞病毒肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 腺病毒肺炎

82. 患者，女，32 岁。药物流产后 3 天，

左下腹痛伴发热 2 天。妇科检查：阴道脓性分泌物，宫颈举痛，子宫饱满，压痛(+)，右附件区明显压痛。最可能的诊断是

- A. 卵巢巧克力囊肿破裂
- B. 急性阑尾炎
- C. 卵巢黄体破裂
- D. 异位妊娠破裂
- E. 急性盆腔炎

83. 14 岁女孩，月经紊乱，经期长短不一 4 个月余。肛门指诊：子宫正常大小，双侧附件(-)，最可能的诊断为

- A. 黄体功能不全
- B. 黄体萎缩不全
- C. 黏膜下子宫肌瘤
- D. 子宫内膜息肉
- E. 无排卵性功能失调性子宫出血

84. 无明显自觉症状的小儿原发型肺结核的治疗首选

- A. 异烟肼+链霉素
- B. 异烟肼+利福平
- C. 异烟肼+吡嗪酰胺
- D. 利福平+乙胺丁醇
- E. 利福平+链霉素

85. 患者，女，30 岁。继发性不孕伴痛经 3 年。妇科检查：宫颈光滑，子宫后位，正常大小，粘连固定，经阴道后穹隆扪及触痛结节。应诊断为

- A. 慢性盆腔炎
- B. 子宫内膜异位症
- C. 卵巢癌
- D. 子宫腺肌病
- E. 盆腔淤血症

86. 患儿，女，3 岁。发热伴皮疹 2 天。查体：全身可见散在斑疹、丘疹、疱疹和结痂，向心性分布。最可能的诊断是

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 水痘

- D. 幼儿急疹
- E. 手足口病

87. 4 个月女婴。冬季出生，足月顺产，单纯牛奶喂养，未添加辅食。近半个月来较烦躁，夜间哭闹不安，多汗。查体：体重 6kg，有颅骨软化。最可能的诊断是

- A. 营养不良
- B. 亚临床维生素 A 缺乏症
- C. 维生素 D 缺乏性佝偻病
- D. 婴儿肠痉挛
- E. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症

88. 患者，男，60 岁。2 小时前不慎跌倒，手掌着地。伤后肩部疼痛、肿胀、活动受限。查体：Dugas 征阳性。该患者肩部的典型畸形为

- A. 肩关节屈曲外展
- B. 肩关节屈曲外旋
- C. 方肩
- D. 肩过度后伸
- E. 肩过度膨隆

89. 患儿，男，1 岁。咳嗽 1 天，发热 3 小时，T39.3℃，就诊过程中突然双眼上翻，肢体强直，持续 1 分钟。查体：咽红，心、肺、腹及神经系统无异常，半年前也有相同病史。最可能的诊断是

- A. 癫痫
- B. 低钙惊厥
- C. 中毒性脑病
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 高热惊厥

90. 患者，男，15 岁，学生。近 1 年来，每次进教室门时必须在门口心里默念三遍“我须认真听讲”，才进教室，而且必须左脚先进。如果错了，必须退出重走，患者痛苦不已。该患者最可能的诊断是

- A. 精神分裂症
- B. 抑郁症

- C. 焦虑障碍
- D. 强迫障碍
- E. 分离性障碍

91. 一小儿体重 7kg，身高 65cm，头围 42cm，乳牙 2 枚，能独坐一会儿，不能听懂自己的名字。此小儿的年龄最可能是

- A. 9 个月
- B. 8 个月
- C. 7 个月
- D. 6 个月
- E. 5 个月

92. 初产妇，28 岁，妊娠 39 周。规律宫缩 10 小时，胎心 140 次/分，枕左后位。肛门检查了解胎头下降程度，最常用的骨性标记是

- A. 骶岬
- B. 坐骨棘
- C. 坐骨结节
- D. 骶窝
- E. 耻骨联合

93. 6 岁男孩，水肿 1 个月。查体：血压 110/70mmHg，高度水肿，尿蛋白定量 2.5g/d，血清白蛋白 15g/L，BUN5.4mmol/L。最可能的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 单纯型肾病综合征
- C. 肾炎型肾病
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾炎

94. 患者，男，68 岁。家属发现其昏迷不醒。查体：口唇呈樱桃红色，呼出气中有酒味。瞳孔正常大小。血压 100/60mmHg，心率 105 次/分。血液 COHb 浓度 49%。急诊头颅 CT 正常。患者昏迷的可能原因是

- A. 脑出血
- B. 一氧化碳中毒
- C. 酒精中毒
- D. 安眠药中毒

E. 有机磷农药中毒

95. 8 个月女婴，方颅，肋串珠，血磷降低，血清碱性磷酸酶升高，最可能的诊断是

- A. 维生素 D 依赖性佝偻病
- B. 营养性维生素 D 缺乏性佝偻病
- C. 家族低磷性佝偻病
- D. 慢性肾脏疾病
- E. 低磷血症

96. 患者，男，30 岁。B 型超声发现右肾盂结石，大小 2.0cm×1.5cm，合并轻度肾积水。首选的治疗方法是

- A. 体外冲击波碎石
- B. 肾盂切开取石
- C. 多饮水+药物治疗
- D. 经皮肾镜碎石
- E. 服用中药排石

97. 产褥妇，现产后 3 天，出现急性腹痛伴发热 2 天，腹部包块增大，曾诊断“子宫肌瘤”。患者应考虑的诊断是

- A. 产褥感染
- B. 子宫肌瘤囊性变
- C. 子宫肌瘤玻璃样变
- D. 子宫肌瘤红色样变
- E. 子宫肌瘤恶性变

98. 患儿，男，3 岁。痉挛性咳嗽、低热 1 个月。查体：精神好，卡介苗接种瘢痕阳性，双肺呼吸音粗糙，未闻及干湿啰音及哮鸣音。血常规：WBC $5.6 \times 10^9/L$ ，N0.36，L0.64。胸部 X 线片示右肺门阴影增大。初步诊断为

- A. 病毒性肺炎
- B. 细菌性肺炎
- C. 原发型肺结核
- D. 继发性肺结核
- E. 支气管异物

99. 患者，男，24 岁。近 3 个月来觉得疲乏无力，早醒，食欲下降，工作效率明显低下，感觉头脑迟钝，不愿多

说话，觉得度日如年，认为前途暗淡，有轻生念头。体格检查无明显异常。该患者最可能的诊断是

- A. 焦虑症
- B. 抑郁发作
- C. 精神分裂症
- D. 神经衰弱
- E. 分离性障碍

100. 患者，男，30 岁。右小腿疼痛 2 天伴发热。查体：右小腿皮肤片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边界清楚，隆起，皮温增高。最可能的诊断是

- A. 疖
- B. 痈
- C. 急性蜂窝织炎
- D. 丹毒
- E. 急性淋巴结炎

101. 29 岁妇女，第一胎产后出血 1000ml，产后无乳汁分泌。现产后 12 个月尚未月经来潮，自觉畏寒，全身乏力，毛发脱落明显。患者应诊断为

- A. 下丘脑性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 卵巢性闭经
- D. 子宫性闭经
- E. 肾上腺性闭经

102. 患儿，男，1 岁半。消瘦，近 5 个月体重不增。查体：体重 7kg，腹壁皮下脂肪消失，头发干枯，心肺未见异常，腹软。应警惕的最严重的并发症是

- A. 支气管肺炎
- B. 维生素缺乏症
- C. 自发性低血糖症
- D. 腹泻病
- E. 营养性贫血

103. 患者，女，25 岁。近半年来每于人多处即感紧张，胸闷、心慌、大汗淋漓，因此害怕出门，外出时必须有人陪同。该患者最可能的诊断是

- A. 社交焦虑障碍
- B. 恐惧症
- C. 惊恐障碍
- D. 广泛性焦虑障碍
- E. 疑病障碍

104. 患者，男，45 岁。因急性肠梗阻 3 天入院，诉舌干，乏力，不能坐起。查体：P120 次/分，BP70/60mmHg，眼窝凹陷，皮肤干燥、松弛。尿比重 1.025。最可能的诊断为

- A. 高渗性缺水
- B. 等渗性缺水
- C. 低渗性缺水
- D. 缺钠性休克
- E. 继发性缺水

105. 患者，男，45 岁。今天工作时突然神志不清，左侧肢体瘫痪，诊断为脑栓塞。下列哪种情况最易并发脑血管意外

- A. 充血性心力衰竭
- B. 高血压伴动脉粥样硬化
- C. 扩张型心肌病
- D. 二尖瓣狭窄伴心房颤动
- E. 二尖瓣关闭不全伴心房颤动

106. 患者，男，24 岁。既往有脑外伤病史。近期工作紧张，白天经常出现口角至侧面部抽搐，每天发作 2~3 次，每次发作 30 秒至 1 分钟，发作时意识清晰。患者最可能的诊断是

- A. 失神发作
- B. 强直性发作
- C. 部分运动性发作
- D. 复杂部分性发作
- E. 部分性继发全面性发作

107. 患者，男，16 岁。头部被网球击伤，受伤时昏迷 5 分钟后清醒，2 小时后出现头痛伴呕吐 2 次。急诊室检查：神志清楚，躁动，轻度颈抵抗，右额轻度表皮挫伤。最可能的诊断是

- A. 急性硬脑膜下血肿

- B. 急性硬脑膜外血肿
- C. 脑内血肿
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑膜炎

108. 患者，男，44 岁。10 年前体检时发规 HBsAg 阳性，当时 ALT 反复升高，未进行抗病毒治疗。3 周前劳累后出现食欲下降、尿黄、明显乏力，症状逐渐加重，出现腹胀、尿量减少入院。查体：神志清楚，反应迟钝，扑翼样震颤阳性，心肺检查未见异常，腹部膨隆，无压痛及反跳痛，移动性浊音阳性。实验室检查：ALT176U/L，TBI1432 $\mu\text{mol/L}$ ，凝血酶原活动度 32%。最可能的诊断是

- A. 急性黄疸型肝炎
- B. 急性重型乙型肝炎
- C. 慢性乙型肝炎
- D. 慢性重型乙型肝炎
- E. 乙型肝炎肝硬化，失代偿期

109. 患者，男，20 岁。腹部挫伤、腹痛 1 小时。查体：T37.8°C，R20 次/分，P78 次/分，BP120/90mmHg。局部皮肤有擦伤痕迹，此处腹部压痛明显，伴肌紧张，无反跳痛。此时的处理原则是

- A. 禁食，补液，留院观察
- B. 急诊剖腹探查
- C. 腹部 CT 检查
- D. 使用镇静镇痛剂
- E. 早期联合使用抗生素

110. 4 个月婴儿，出生体重 3.3kg，母乳喂养。腹泻 2 个月，大便 3~6 次/天，稀水状或糊状，无脓血，食欲佳，精神好。用中西药治疗腹泻无明显好转。有湿疹，体重 6.2kg。最可能的诊断为

- A. 过敏性腹泻
- B. 迁延性腹泻
- C. 轮状病毒腹泻
- D. 生理性腹泻
- E. 霉菌性腹泻

111. 患者, 男, 40 岁。头部左颞侧摔伤 4 小时。体检: 昏迷状态, 左瞳孔散大。X 线摄片示左颞骨骨折线跨过脑膜中动脉。患者应首先考虑

- A. 急性硬膜下血肿
- B. 急性硬膜外血肿
- C. 脑内血肿
- D. 脑挫伤
- E. 脑震荡

112. 初产妇, 28 岁, 妊娠 41 周, 临产 5 小时。胎头高浮, 胎心 138 次/分, 宫口开大 2cm。6 小时后破膜, 立即听诊胎心音, 减慢至 80 次/分。患者首先应考虑的是

- A. 胎膜早破
- B. 脐带脱垂
- C. 胎盘早剥
- D. 前置胎盘
- E. 胎盘功能不良

113. 患者, 男, 15 岁。突发四肢无力 2 天。查体: 四肢肌力 2 级, 肌张力低, 腱反射消失, 病理征未引出, 无明显感觉障碍, 双侧腓肠肌握痛。最可能的诊断是

- A. 重症肌无力
- B. 周期性瘫痪
- C. 吉兰-巴雷综合征
- D. 多发性肌炎
- E. 急性脊髓炎

114. 患者, 女, 60 岁。高温天气户外活动 4 小时, 出现口渴、尿少, 突然晕倒。最可能的原因是

- A. 稀释性低钠血症
- B. 等渗性缺水
- C. 急性肾衰竭
- D. 高渗性缺水
- E. 低渗性缺水

115. 患婴, 男, 1 天, 足月顺产。因呕血 1 次入院。半天前无明显诱因呕血 1

次, 量约 5ml。查体: 神志清, 全身皮肤可见数个出血点, 心、肺、腹无明显异常, 原始反射正常, 脐带残端少许渗血。血小板 $100 \times 10^9/L$, 患婴最可能的诊断是

- A. Rh 溶血病
- B. 新生儿败血症
- C. 血小板减少性紫癜
- D. 新生儿颅内出血
- E. 新生儿坏死性结肠炎

116. 患者, 女, 48 岁。左腕部玻璃切割伤 1 小时, 表现为左腕部掌侧斜行切口, 深达肌层, 左手呈爪状畸形, 拇指对掌功能丧失, 手指浅感觉丧失。患者损伤的神经可能是

- A. 正中神经
- B. 尺神经及桡神经
- C. 桡神经及正中神经
- D. 尺神经及正中神经
- E. 尺神经

117. 患者, 男, 20 岁。1 小时前跌倒时腕关节屈曲, 手背着地受伤。伤后腕关节肿胀、疼痛。该患者最可能的诊断为

- A. Colles 骨折
- B. Smith 骨折
- C. Barton 骨折
- D. 舟状骨骨折
- E. 尺骨远端骨折

118. 患者, 男, 25 岁。坐位乘车时因急刹车右膝前方受到撞击, 出现右髌关节剧痛, 活动障碍。右下肢屈曲、内收、内旋畸形。右足背麻木, 背屈无力。该患者可能的合并伤是

- A. 坐骨神经损伤
- B. 股神经损伤
- C. 闭孔神经损伤
- D. 胫神经损伤
- E. 腓总神经损伤

119. 患者, 男, 30 岁。3 个月来出现

颈部、腹股沟淋巴结肿大，伴顽固性腹泻，每天 10 余次稀便，体重下降约 10kg。3 年前在国外居住期间因手术输血 400ml，术后无特殊不适。为明确诊断，应首选的检查是

- A. 淋巴结活检
- B. 骨髓检查
- C. 全套肿瘤标志物
- D. 纤维结肠镜检查
- E. 抗 HIV+CD4+T 细胞计数

120. 患儿，男，1 岁。生长落后、智能发育迟缓。刚会独坐，不会站立。查体：身高 60cm，表情呆滞，眼距宽，鼻梁低平，眼外眦上斜，四肢短，手指短粗，小指内弯，四肢肌张力低下。最可能的诊断是

- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 蛋白质-能量营养不良
- C. 苯丙酮尿症
- D. 唐氏综合征
- E. 维生素 D 缺乏性佝偻病

A3/A4 型选择题

(121~123 题共用题干)

患者，女，31 岁。产后 5 个月，哺乳期，阴道不规则流血半月余，胸闷、咳嗽 10 天。妇科检查：宫颈前唇有一个 2cm×1cm×1cm 的紫蓝色结节，子宫如 50 天妊娠大小，质软，无压痛。双侧附件区各触及囊性包块，均约 6cm×5cm×5cm 大小，表面光滑。胸部 X 线片示双肺中下部多发棉絮状阴影。

121. 最可能的诊断是

- A. 侵蚀性葡萄胎
- B. 胎盘残留
- C. 肺癌
- D. 绒毛膜癌
- E. 卵巢肿瘤

122. 对诊断意义最大的辅助检查是

- A. 腹部 CT 检查
- B. 盆腔 B 型超声检查
- C. 胸腔镜检查

- D. 血清 HCG 测定
- E. 血、尿常规检查

123. 首选的治疗方案是

- A. 卵巢肿瘤切除术
- B. 放射治疗
- C. 清宫术
- D. 化学治疗
- E. 子宫切除

(124~126 题共用题干)

患者，男，24 岁，突然意识不清，跌倒，全身强直数秒钟后抽搐，咬破舌。2 分钟后抽搐停止。醒后活动如常。

124. 首先应考虑的疾病是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 癫痫
- E. 脑栓塞

125. 应进一步做的检查是

- A. 头颅 X 线片
- B. 脑电图
- C. 脑脊液检查
- D. 脑血管造影
- E. 经颅超声多普勒(TCD)

126. 该患者首选治疗药物是

- A. 降颅压药
- B. 溶栓治疗
- C. 止血药
- D. 扩血管药
- E. 抗癫痫药

(127~128 题共用题干)

患者，女，24 岁，秘书。1 个月前由于工作失误受到领导当众批评，患者感到委屈，出现失眠，早醒，对前途悲观失望，整天闷闷不乐，很少与人交往。近 1 周来，一反常态，出现兴奋话多，说终于战胜了自己，自我感觉好，自我评价高，说领导批评她是因为嫉妒她的才能，不认为自己有病。

2020 年临床助理历年真题

127. 该患者最可能的诊断为

- A. 抑郁症
- B. 躁狂症
- C. 双相情感障碍
- D. 精神分裂症
- E. 分离(转换)性障碍

128. 该患者的首选治疗药物是

- A. 氯氮平
- B. 利培酮
- C. 喹硫平
- D. 奥氮平
- E. 碳酸锂

(129~130 题共用题干)

患者, 男, 65 岁。高血压病史 15 年。演讲时突发头痛、呕吐、右侧偏瘫。头颅 CT 检查示左基底节区高密度阴影。

129. 该患者最可能的诊断是

- A. 基底节区出血
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 脑梗死
- D. 脑血栓形成
- E. 脑动脉瘤破裂

130. 若患者在行头颅 CT 检查时突然昏迷, 左侧瞳孔散大, 上睑下垂, 对光反射消失, 此时急需的处理措施是

- A. 静脉滴注 20% 甘露醇
- B. 静脉滴注酚磺乙胺
- C. 静脉滴注硝普钠
- D. 气管插管, 机械通气
- E. 急诊开颅手术

B1 型选择题

(131~132 题共用备选答案)

- A. 36cm
- B. 40cm
- C. 46cm
- D. 50cm
- E. 56cm

131. 足月新生儿出生时的身长平均为

132. 1 岁时小儿的头围约是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 厌氧菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 铜绿假单胞菌

133. 引起胆源性肝脓肿的常见致病菌是

134. 引起急性乳腺炎的常见致病菌是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 地西洋
- B. 苯巴比妥
- C. 苯妥英钠
- D. 水合氯醛
- E. 硫喷妥钠

135. 小儿热性惊厥的止惊治疗首选

136. 癫痫持续状态的急救处理首选

(137~138 题共用备选答案)

- A. 低血糖
- B. 乳酸酸中毒
- C. 胃肠反应
- D. 肝损害
- E. 肾损害

137. 口服降糖药格列喹酮的主要不良反应是

138. 口服降糖药阿卡波糖的常见不良反应是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 初乳
- B. 过渡乳
- C. 成熟乳
- D. 晚乳
- E. 全程乳

139. 乳汁中免疫球蛋白含量最高的是

140. 乳汁中脂肪含量最高的是

2020 年临床助理历年真题

(141~142 题共用备选答案)

- A. 1 日
- B. 3 日
- C. 1 周
- D. 2 周
- E. 6 周

141. 中年女性急性肾盂肾炎抗生素治疗的疗程一般为

142. 孕妇急性膀胱炎抗生素治疗的疗程一般为

(143~144 题共用备选答案)

- A. 脑出血
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 短暂性脑缺血发作

143. 头颅 CT 检查无异常发现

144. 头颅 CT 检查提示脑实质内高密度病灶

(145~146 题共用备选答案)

- A. 钟情妄想
- B. 嫉妒妄想
- C. 关系妄想
- D. 非血统妄想
- E. 被害妄想

145. 患者无中生有地坚信自己的配偶对自己不忠诚, 另有外遇, 属于

146. 患者认为周围人的谈话是在影射自己, 别人的咳嗽都是针对自己的, 属于

(147~148 题共用备选答案)

- A. 极化
- B. 去极化
- C. 复极化
- D. 超极化
- E. 反极化

147. 安静时细胞两侧存在电位差的状态, 称为

148. 细胞受刺激兴奋时, 膜电位负值减小, 称为

(149~150 题共用备选答案)

- A. 指定传染病的检查
- B. 严重传染病的检查
- C. 新生儿疾病筛查
- D. 新生儿遗传病筛查
- E. 新生儿性病筛查

149. 属于婚前医学检查的是

150. 属于母婴保健技术服务是

答案

第一单元

1. 答案:C

解析:精神分裂症患者对时间、空间和人物一般能进行正确的定向,意识通常是清晰的,一般无记忆力减退(C错,为本题正确答案)。精神分裂症的常见症状:①阳性症状(A对);②激越症状:冲动行为(冲动攻击与暴力行为)(B对)和自杀;③阴性症状(D对);④焦虑、抑郁症状;⑤自知力:自知力缺乏。

2. 答案:D

解析:短暂性脑缺血发作(TIA)是颈动脉或椎-基底动脉系统发生短暂性血液供应不足,引起局灶性脑缺血导致突发的、短暂性、可逆性神经功能障碍。发病无先兆,一般无意识障碍,可反复发作,每次持续数分钟,通常在30分钟内(D对)完全恢复,超过2小时常遗留轻微神经功能缺损表现或CT及MRI显示脑组织缺血征象,但一般在24小时内完全恢复,且无后遗症。

3. 答案:B

解析:节律性上腹饥饿痛与夜间痛,多考虑为十二指肠球部溃疡(B对)。胃溃疡(A错)主要表现为餐后痛,1~2小时后缓解。复合性溃疡(C错)临床表现多不典型,幽门狭窄、梗阻发生率高。肠易激综合征(D错)主要与精神、饮食等因素有关,腹痛以下腹和左下腹多见,排便或排气后缓解。胃癌(E错)多表现为中老年人+上腹痛N年+腹痛无规律+体重减轻+多种药物治疗无效。

4. 答案:D

解析:出血坏死性胰腺炎胰腺组织大片出血坏死,渗出的血液可通过腹膜后途径渗入皮下组织,导致皮肤呈现青紫色,若瘀斑出现在脐周,则称Cullen征(D对)。水肿性胰腺炎和出血坏死性胰腺炎均会有炎性渗出物及不等量胰液外渗,刺激腹膜,引起上腹痛并向左腰部放射(A错)。胰腺炎本身合并胰腺组织损伤、坏死均会有血、

尿淀粉酶显著升高(B错)。胰腺炎本身一般不引起黄疸(C错),但如果合并结石或肿大的胰头压迫胆总管可出现黄疸。在两类胰腺炎早期均可出现频繁而剧烈的呕吐且呕吐后疼痛不缓解(E错)。

5. 答案:E

解析:临床预防服务是指由医务人员在临床场所对健康者或无症状“患者”的健康危险因素进行评价,实施个性化的预防干预措施来预防疾病和促进健康。由概念可知其服务对象为健康者和无症状“患者”(E对)。

6. 答案:A

解析:深静脉通畅试验又称Perthes试验(A对),用于检查深静脉是否通畅,是决定原发性下肢静脉曲张能否手术的关键检查。检查方法如下:患者站立,在患肢大腿上1/3处扎止血带,阻断大隐静脉回流,然后嘱患者交替伸屈膝关节10~20次,以促进下肢血液回流。若活动后浅静脉曲张更加明显,张力增高,甚至胀痛,即为阳性,说明深静脉阻塞,禁忌做大隐静脉高位结扎术。Trendelenburg试验(D错)又称大隐静脉瓣膜功能试验。检查方法如下:病人平卧,抬高患肢使静脉排空,在大腿根部扎止血带,阻断大隐静脉,然后让病人站立,10秒内释放止血带。若出现自上而下的静脉逆向充盈,即为阳性,提示瓣膜功能不全。Pratt试验(C错)又称交通静脉瓣膜功能试验。检查方法如下:病人仰卧,抬高下肢,在大腿根部扎上止血带,然后从足趾向上至腘窝缠缚第一根弹力绷带,再自止血带处向下,缠绕第二根弹力绷带;让病人站立,一边向下解开第一根弹力绷带,一边向下缠缚第二根弹力绷带。若在两绷带之间出现曲张静脉,即意味该处有瓣膜功能不全的交通静脉。曲张静脉破裂(B错)为下肢静脉曲张的并发症,处理应先止血以后再做手术治疗。

7. 答案:E

解析:ACEI(血管紧张素转化酶抑制剂)类降压药(E对),其可抑制交感-肾素-血管紧张素-醛固酮系统,扩张外周血管而降低血压;还可改善胰岛素抵抗、减少尿蛋白形成,因此特别适合糖尿病合并高血压的患者。钙通道阻滞剂(A错),对血脂、血糖等无明显影响,可用于糖尿病伴高血压患者,但一般不作为首选。噻嗪类利尿剂、醛固酮受体拮抗剂(B、D错),可使血脂、血糖、尿酸升高,故两者都不适合用于糖尿病合并高血压的患者。 β 受体阻滞剂(C错),能增加胰岛素抵抗,还可能掩盖和延长低血糖反应。

8. 答案:A

解析:胃肠道恶性肿瘤常经门静脉转移至肝(A对),也可转移到肺、脑及骨等器官(B、C、D、E错误)。

9. 答案:D

解析:左右两心室的输出量基本相等(D对),成人在安静状态下,搏出量约为70ml(80~90ml)。右心室搏出量与左心室大致相等,但肺动脉平均压仅约主动脉平均压的1/6,故右心室做功量也仅约左心室的1/6(A、B、C、E错误)。

10. 答案:A

解析:治疗癫痫大发作和局限性发作的药物苯妥英钠(A对)。丙戊酸钠(B错)是全面性发作,尤其是GTCS(全身强直阵挛性癫痫发作)合并典型失神发作的首选药,也用于部分性发作。乙琥胺(D错)为临床治疗癫痫小发作(失神性发作)的首选药,对其他类型癫痫无效。氯硝西洋、地西洋(C、E错)是治疗癫痫持续状态的首选药物。

11. 答案:D

解析:青霉素属于 β -内酰胺类抗生素,可用于治疗敏感的 G^+ 球菌和杆菌、 G^- 球菌及螺旋体(A、B、C、E对)所致的感染。铜绿假单胞菌为 G^- 杆菌,不在青霉素敏感范围内,故选D。

12. 答案:B

解析:脱离并长期避免接触危险因素是防治哮喘最有效的方法(B正确)。

13. 答案:D

解析:假膜性炎指发生于黏膜的纤维素性炎,因渗出的纤维素、中性粒细胞和坏死黏膜组织以及病原菌等在黏膜表面形成一层灰白色“假膜”而得名(D正确)。

14. 答案:D

解析:环形红斑(D错)一般多见于风湿热,亚急性感染性心内膜炎可见发热、心脏杂音(E选项)、周围体征(C选项)、脾大(B选项)、贫血(A选项)等表现。正确答案选D。

15. 答案:A

解析:胰腺(A对)位于腹膜后部,位置深而质软,正常情况下不能触及,当胰腺病变时,则可在上腹部出现体征。正常腹部可触到的结构有腹直肌肌腹及腱划、腰椎椎体(D错)及骶骨岬(B错)、乙状结肠粪块(E错)、横结肠(C错)和盲肠等。形体消瘦及腹壁薄软者,在脐附近中线位常可触到骨样硬度的肿块,自腹后壁向前突出,此即腰椎椎体(D错)或骶骨岬(B错)。正常较瘦的人,于上腹部可触及一中间下垂的横行条索,腊肠样粗细,光滑柔软,滑行触诊时可推动,即为横结肠(C错)。正常乙状结肠用滑行触诊法常可触及,内存粪便时更加明显(E错)。

16. 答案:B

解析:纤维蛋白性炎症(纤维素性炎)易发生于黏膜、浆膜和肺组织。肠黏膜(B对)发生的纤维素性炎称为假膜性炎,常见的有细菌性痢疾。心包膜(E错)、胸膜(C错)、腹膜(D错)可发生纤维素性炎,为浆膜性纤维素性炎,而不发生假膜性炎。肺组织发生的纤维素性炎(A错)亦不产生假膜。

17. 答案:A

解析:根据支气管哮喘的诊断标准,符合典型临床表现和体征+客观检查标准中任意一条可知最有价值的依据为临床表现和体征(A正确)。其中B选项迷惑性较大,应了解呼吸功能检查为支气管哮喘首选的辅助检查。血气分

析(E选项)为危重患者首选辅助检查。

18. 答案:A

解析:病毒性心肌炎多数患者发病前1~3周有病毒感染前驱症状,如发热、全身无力,随后可以有心悸,胸闷、胸痛、呼吸困难,甚至晕厥、猝死,查体常有心律失常(E对),以房性与室性早搏及房室传导阻滞最为多见。心率可增快且与体温升高不相称(C对)。X线可见心影扩大(B对)。听诊可闻及第三、第四心音或奔马律(D对),部分病人可于心尖部闻及收缩期吹风样杂音,第一心音常低钝(A错)。

19. 答案:B

解析:肛裂的典型临床表现是便秘、出血和疼痛(便后周期疼痛)(B对)。肛门口坠胀感常见于肛周脓肿;无痛性血便、粪便上附有新鲜血液常见于内痔;肛门旁分泌物常见于肛瘘等(A、C、D、E错)

20. 答案:C

解析:心理治疗的基本原则有信赖性原则、整体性原则、发展性原则、个性化原则、中立性原则、保密性原则。灵活原则(A错)、综合原则(B错)均不是心理治疗的原则。发展性原则(D错)这一原则是指在心理治疗过程中,治疗者要以发展的眼光看待病人的问题,不仅在问题的分析上和本质把握上,而且在问题的解决和效果的预测上都要具有发展的观念。个性化原则(E错)这一原则是指在心理治疗过程中,治疗者既要注意病人与同类问题的人的共同表现和一般规律,又不能忽视每个病人自身的具体情况,不能千篇一律地处理问题。

21. 答案:D

解析:共同参与型指医患双方共同制定并实施诊断方案,适合长期慢性疾病病人(D对)和心理疾病病人。主动被动型指医师主动命令,病人被动服从,适合难以表述自己主观意见的病人,如麻醉、严重外伤昏迷的病人等。指导合作型是指在医疗活动中,医患双

方具有一定的主动性,但仍以医务人员为主,适合于急性感染期病人。

22. 答案:D

解析:支气管哮喘的主要临床表现为反复发作的喘息、气急、胸闷或咳嗽等症状,在发作早期,机体可出现缺氧,并且由于过度通气可使PaCO₂下降,pH上升,表现为呼吸性碱中毒(D对)。若病情进一步恶化,呼吸肌疲劳,肺通气量不足,才可出现PaCO₂上升,pH下降即呼吸性酸中毒(C错)。

23. 答案:A

解析:胃肠道、胆道等空腔脏器破裂可刺激腹膜,引起弥漫性腹膜炎。胃液中大量的胃酸、胃蛋白酶,胆汁中的胆盐、卵磷脂、胆色素以及胰液中的各种消化酶可对腹膜产生强烈的刺激作用;肠液(主要指小肠液)的主要成分为碱性黏液,此外,还含有少量消化酶,对腹膜的刺激作用较弱;血液的主要成分各种血细胞、离子及白蛋白,对腹膜的刺激作用微弱。综上,胃液(C错)、胆汁(E错)和胰液(B错)对腹膜的刺激作用最强,肠液(D错)次之,血液(A对)最轻。

24. 答案:A

解析:改善急性左心衰竭症状最有效的药物应为利尿剂(A对),多采用呋塞米(速尿)静脉注射,其除了利尿外,其还可扩张静脉,有利于肺水肿的缓解。洋地黄(B错)(包含毛花苷C)最适合用于有快速心室率的心房颤动并心室扩大伴左心室收缩功能不全者,不是改善急性左心衰竭症状最有效的药物。钙离子拮抗剂(D错)可降低心肌细胞内钙浓度,改善心肌主动舒张功能,降低血压,改善左室早期充盈,减轻心肌肥厚,多用于舒张性心力衰竭的治疗。β受体阻滞剂(C错)可抑制交感神经,激活对心力衰竭代偿的不利作用,多用于慢性心力衰竭的治疗,禁用于急性左心衰竭。血管紧张素转换酶抑制剂(E错)通过抑制ACE减少血管紧张素II生成而抑制RAAS,也可通过

降低心衰患者神经-体液代偿机制的不利影响，改善心室重塑，多用于慢性心衰的治疗。

25. 答案:C

解析:艾滋病病人及其家属享有的婚姻、就业、就医、入学等合法权益受法律保护(C对)。

26. 答案:E

解析:最能说明肝硬化病人已存在门脉高压的表现是食管胃底静脉曲张(E对)。腹水(B错)是肝功能减退和门脉高压的共同结果，是肝硬化失代偿期最突出的临床表现。门静脉增宽(D错)是门静脉压力升高的间接表现。脾大(A错)是肝硬化门静脉高压较早出现的体征，但不是最有价值的体征。痔核形成(C错)表明侧支循环开放，但较食管静脉曲张少见。

27. 答案:E

解析:角色理论是用角色的概念来研究人的社会行为的一种理论，包括角色期望，角色扮演和角色冲突等多个方面。角色行为适应(E对)是指病人与病人角色的期望基本符合，如题中承认自己患病，客观面对患病现实，关注自身疾病，遵行医嘱，主动采取各种措施促进恢复健康。角色行为冲突(D错)指多种社会地位和多种角色集于一人时产生的内部冲突，如当医务人员患病，既承担患者的角色又承担医务人员的角色时造成内部冲突。角色行为减退(B错)指个体进入病人角色后，由于某种原因放弃了病人角色去承担其他角色的活动。角色行为异常(C错)是指病人无法承受患病的压力与挫折，对病人的角色产生厌倦、悲观、绝望等，由此导致的角色行为异常。角色行为缺如(A错)指病人未能进入病人角色，不承认自己是病人，题中患者关注自身疾病，积极治疗。

28. 答案:C

解析:有输血后严重过敏反应病史，应选择血液成分是洗涤红细胞(C对)。悬浮红细胞(D错)适用于急慢性贫血。

29. 答案:D

解析:局灶节段性肾小球硬化 50%病例对糖皮质激素治疗敏感。系膜毛细血管性肾炎激素和细胞毒性药物仅在部分儿童病例有效。系膜增生性肾炎 50%以上病例对糖皮质激素治疗敏感。脂性肾病 90%病例对糖皮质激素治疗敏感。膜性肾病 60%~70%的早期病人对糖皮质激素治疗敏感。故选 D。

30. 答案:A

解析:只看重疾病而非病人即只重视技术。

31. 答案:C

解析:内痔是肛垫的支持结构、静脉丛及动静脉吻合支发生病理性改变或移位。直肠指诊时不易检出(C对)。

32. 答案:B

解析:病毒性肝炎中，肝细胞的灶性坏死即碎片状坏死，是溶解性坏死的类型之一，而溶解性坏死是由严重的细胞水肿发展而来，属于液化性坏死，因此肝细胞的灶性坏死属于液化性坏死。凝固性坏死是指当蛋白质变性凝固且溶酶体酶水解作用较弱时，坏死区所呈现的灰黄、干燥、质实的状态。干酪样坏死是坏死程度更为彻底的特殊类型凝固性坏死。坏疽是指局部组织大块坏死并继发腐败菌感染，可分为干性、湿性和气性等类型。

33. 答案:C

解析:小细胞癌为神经内分泌起源，恶性程度高，生长快，很早可出现淋巴和血行转移。其对放射和化学治疗虽较敏感，但可迅速耐药，预后差。由此可知选项 C 正确。

34. 答案:C

解析:化学感受器是指其适宜刺激为 O₂、CO₂ 和 H⁺ 等化学物质的感受器。根据所在部位不同，化学感受器分为外周化学感受器和中枢化学感受器两种。外周化学感受器位于颈动脉体和主动脉体，在动脉血 PO₂ 降低、PCO₂ 或 H⁺ 浓度升高时受到刺激，反射性引起呼吸中枢兴奋。缺氧引起呼吸加深

加快的原因是刺激外周化学感受器(C对),但其对呼吸中枢的直接作用是抑制。中枢化学感受器位于延髓外侧部浅表部位,其生理性刺激是脑脊液和局部细胞外液中的 H^+ 浓度。肺牵张反射是由肺扩张或肺萎陷引起吸气抑制或吸气兴奋的反射。

35. 答案:D

解析:肝颈静脉反流征阳性(D对)是指当右心衰竭引起肝淤血肿大时用手压迫肿大肝脏可使颈静脉怒张更明显。其发生机制是因压迫淤血的肝脏使回心血量增加,已充血右心房不能接受回心血液而使颈静脉压被迫上升所致,多见于右心衰竭体循环瘀血。水肿(B错)可见于多种疾病例如:肝源性、肾源性等。其余(A、E选项错)均为左心衰表现。

36. 答案:B

解析:铁的良好来源是动物肝脏(B对)。

37. 答案:B

解析:高位小肠梗阻的呕吐发生早而频繁,腹胀不明显(B对);低位小肠梗阻的腹胀明显,呕吐出现晚而次数少,并可吐粪样物;结肠梗阻与低位小肠梗阻的临床表现很相似。X线检查有助于鉴别,低位小肠梗阻,扩张的肠袢在腹中部,呈“阶梯状”排列,结肠梗阻时扩大的肠袢分布在腹部周围,可见结肠袋,胀气的结肠阴影在梗阻部位突然中断,盲肠胀气最显著。

38. 答案:D

解析:食物中毒是指食用了被有毒、有害物质污染的食品或者食用了含有毒、有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。食物中毒属于食源性疾病,它不包括因暴食暴饮而引起的急性胃肠炎(A)、食源性肠道传染病(C)、寄生虫病(B)和食物过敏,也不包括因一次大量或长期少量多次摄入某些有毒、有害物质而引起的以慢性中毒为主要特征(如致畸、致突变、致癌)的疾病(E)。D选项正确。

39. 答案:E

解析:扩张型心肌病超声早期可仅表现为左心室轻度扩大,后期各心腔均扩大,以左心室扩大为著。慢性肺源性心脏病超声显示以肺动脉干和右心室扩大为主:①右心室流出道内径 $\geq 30\text{mm}$;②右心室内径 $\geq 20\text{mm}$;③右心室前壁厚度 $\geq 5\text{mm}$ 或前壁搏动幅度增强;④左、右心室内径比值 < 2 ;⑤右肺动脉内径 $\geq 18\text{mm}$ 或肺动脉干 $\geq 20\text{mm}$;⑥右室流出道/左房内径 > 1.4 ;⑦肺动脉瓣曲线出现肺动脉高压征象者。

40. 答案:B

解析:肺血管阻力增加的功能性因素肺血管收缩在低氧性肺动脉高压的发生中起着关键作用。缺氧、高碳酸血症和呼吸性酸中毒使肺血管收缩、痉挛,其中缺氧是肺动脉高压形成最重要的因素。因此纠正缺氧,舒张肺血管可明显降低肺动脉压(B对)。

41. 答案:C

解析:慢性肾小球肾炎为不同类型肾小球肾炎发展的终末阶段。病变特点是大量肾小球发生玻璃样变和硬化,又称慢性硬化性肾小球肾炎。肉眼观,双肾体积缩小,表面呈弥漫性细颗粒状。切面皮质变薄,皮、髓质界限不清。肾盂周围脂肪增多。慢性肾炎的大体病变称为继发性颗粒性固缩肾(C对)。

42. 答案:E

解析:白三烯(LT)调节剂:通过调节LT的生物活性而发挥抗炎作用,同时也具有舒张支气管平滑肌的作用,可用于轻度哮喘。常用半胱氨酰LT受体拮抗剂,如扎鲁司特或孟鲁司特(E对)。不良反应通常较轻微,主要是胃肠道症状,少数有皮疹、血管性水肿、转氨酶升高,停药后可恢复正常,尤其适用于合并过敏性鼻炎的患者。

43. 答案:B

解析:影响健康行为的因素可归纳为以下三类:①倾向因素:为行为改变提供理由或动机的先行因素。它通常先于行为,是产生某种行为的动机或愿

望, 或诱发产生某行为的因素, 包括知识、信念、价值观、态度(B对)及自信心、以及现有技能, 自我效能等;

②促成因素: 是指允许行为动机或愿望得以实现的先行因素, 即实现或达到某行为所必需的技术和资源, 包括干预项目、服务、行为和环境改变的必需资源、行为改变所需的新技能等。如健康食品的供应情况、保健设施、医务人员、诊所等资源; 医疗费用、诊所的距离、交通工具、个人保健技术; 政府的重视与支持、法律、政策等; ③强化因素: 是指对象实施某行为后所得到的加强或减弱该行为的因素。

44. 答案:E

解析: 尼古丁替代疗法类药物是常用的戒烟药物, 现有剂型包括咀嚼胶、贴片、吸入剂、喷雾剂、含片等, 因此, 尼古丁贴片是目前临床常用的戒烟药物(E对)。

45. 答案:E

解析: 吗啡具有强大的镇痛作用, 对绝大多数急性痛和慢性痛的镇痛效果良好, 尤其是严重创伤、烧伤、手术等引起的剧痛(E对)和晚期癌症疼痛。但是颅脑外伤(B错)常导致颅内压增高, 是使用吗啡的禁忌症。在疾病未诊断明确前, 慎用吗啡(D错), 导致掩盖病情而延误诊断。吗啡对抗缩宫素对子宫的兴奋作用而延长产程, 且能通过胎盘屏障或经乳汁分泌, 抑制新生儿和婴儿呼吸, 故禁用于分娩止痛(A错)和哺乳期妇女止痛(C错)。

46. 答案:A

解析: 慢性胃炎是指由多种病因引起的慢性胃黏膜炎症病变, 临床常见。其患病率一般随年龄增长而增加, 特别是中年以上更为常见。Hp感染是最常见的病因(A对)。

47. 答案:C

解析: 医德修养是指医务人员按照社会所倡导的医德理念及其规范, 在医德实践中进行自我教育、自我评价、自我锻炼和自我陶冶的过程及其所达

到的医德境界。医德修养来源于医疗实践, 又服务于实践, 因此医德修养要坚持医疗卫生保健实践(C对)。

48. 答案:D

解析: 肝硬化主要表现为肝功能减退和门静脉高压两类表现。肝功能减退可表现为全身症状、消化系统症状、出血倾向、黄疸、内分泌失调等。内分泌失调表现多样, 如雌激素灭活减少可表现为男性乳房发育、肝掌、蜘蛛痣(A、B、E错)等; 促皮质素释放因子受抑, 肾上腺皮质功能减退, 促黑素细胞激素增加, 呈现出肝病面容(C错)。门静脉高压症主要表现为腹水(D对)、门-腔侧支循环开放、脾功能亢进及脾大。

49. 答案:B

解析: 静息电位是细胞在安静状态时膜内外的电位差, 不能够传导(A错)。锋电位是动作电位的主要组成部分, 具有“全或无”特性, 可进行不衰减传导(B对)。终板电位、感受器电位和突触后电位均为局部电位, 局部电位以电紧张的方式向周围扩布, 为衰减性传导(C、D、E错)。

50. 答案:D

解析: 常见的容易发生缺血性骨坏死的骨折有股骨头下骨折(属股骨颈骨折)(D对)和腕舟状骨骨折。股骨头下骨折时, 由于股骨头主要供血动脉(髂外动脉)中断, 仅剩小凹动脉的少量血供, 故不易愈合, 易发生缺血性坏死。其余选项中骨折区域血供丰富, 故均不易发生缺血性坏死。

51. 答案:B

解析: 疔的病变是多个相邻毛囊及其周围组织同时发生急性细菌性化脓性炎症, 常从毛囊底部开始向皮下组织蔓延, 再向外周扩散, 多个毛囊同时发生感染, 病变范围较大, 累计皮下及深层皮下组织, 继而发生皮肤血运障碍直至坏死, 多好发于皮肤较厚的部位, 如项部和背部(B对)。

52. 答案:A

解析:阿司匹林不良反应:胃肠道反应;凝血障碍;水杨酸反应;过敏反应。其中胃肠道症状(A对)是阿司匹林最常见的不良反应,较常见的症状有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等。

53. 答案:E

解析:氨基酸为蛋白质的基本合成单位,其主要生理作用是合成蛋白质(E对)。

54. 答案:A

解析:系统抽样(A对)指在总体的抽样框架中按照研究对象已有的某种顺序(如学生证号、门牌号等)机械地每隔若干距离抽取一个观察对象的抽样方法。

55. 答案:B

解析:少量咯血,多以安慰患者、消除紧张、卧床休息为主,可用氨基己酸、氨甲苯酸(止血芳酸)、酚磺乙胺(止血敏)、卡络柳钠(安络血)等药物止血。在大咯血时,患者突然停止咯血,并出现呼吸急促、面色苍白、口唇发绀、烦躁不安等症状时,常为咯血窒息,应及时抢救。置患者头低足高 45° 的俯卧位,同时拍击健侧背部,保持充分体位引流,尽快使积血和血块由气管排出,或直接刺激咽部以咳出血块(B错)。有条件时可进行气管插管,硬质支气管镜吸引或气管切开。因此选择B选项。

56. 答案:B

解析:长期应用糖皮质激素后,突然停药所产生的反跳现象,导致原病复发或加重,原因是患者对糖皮质激素产生了依赖或病情未能完全控制(B对)。糖皮质激素不易产生耐药性(A错)。过量地使用激素会造成医源性肾上腺皮质功能亢进(C错)。长期应用糖皮质激素治疗,可反馈性抑制垂体-肾上腺皮质轴致肾上腺皮质萎缩,导致肾上腺皮质功能减退(D错)和ACTH分泌减少(E错),若突然减药或减量过快,可引起肾上腺功能不全或危象,表现为恶心、呕吐、乏力、低血压和休克等,

需要及时抢救。

57. 答案:B

解析:地塞米松的临床应用:①严重感染或炎症;②免疫相关疾病;③抗休克治疗;④血液病;⑤局部应用;⑥替代治疗等。其中免疫相关疾病中包括自身免疫疾病如严重风湿热、风湿性心脏病(A对)、风湿性及类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮(C对)、自身免疫性贫血和肾病综合征等。抗休克治疗中包括感染中毒性休克(E对)、过敏性休克和低血容量性休克。血液病中包括再生障碍性贫血、粒细胞减少症、血小板减少症和过敏性紫癜(D对)等。而长期大剂量应用引起的不良反应包括:①医源性肾上腺皮质功能亢进;②诱发或加重感染;③消化系统并发症;④心血管系统并发症;⑤骨质疏松(B错,为本题正确答案)、肌肉萎缩、伤口愈合迟缓等;⑥糖尿病;⑦其他。

58. 答案:B

解析:患者中青年男性,输血后出现畏寒、发热、呕吐、酱油尿等症状,且血压为75/45mmHg(提示出现休克),其最可能出现的输血不良反应为溶血性输血反应(B对)。溶血反应是输血最严重的并发症,输入少量异型血即可发生,典型表现为呈酱油色的血红蛋白尿。非溶血性发热性输血反应(A错)也可表现为畏寒、发热,但血压多无变化、不出现酱油样尿;变态反应(C错)表现为皮肤局限性和全身性瘙痒和荨麻疹,严重者可出现休克,但一般不出现畏寒、发热,无酱油样尿;细菌污染反应(D错)重者可在输入后立即出现寒战、高热、内毒素性休克和DIC,也可出现血红蛋白尿,但其发生率不高;循环超负荷(E错)常见于心功能低下、老年及幼儿,常由于输血过多或速度过快引发,表现为突发心率加快,呼吸急促,发绀或血性泡沫痰,肺水肿等。

59. 答案:B

解析:患者可能患有鳞癌,咳嗽伴痰中

带血 2 周, X 线片及 CT 示右肺上叶周围型结节, 考虑可能为早期周围型肺癌。本题未提及有淋巴转移征象, 默认一般情况良好, 故该患者首选的治疗是手术治疗(B 对), 切除癌变肺叶。免疫治疗(A 错)、化学药物治疗(C 错)、放射治疗(E 错)仅作为一般辅助治疗措施, 不是该患者的首选治疗方案。肺不属于实质性脏器, 不宜介入治疗(D 错)。

60. 答案:A

解析:患者为老年女性, 反复咳嗽、咳脓痰、咯血(为支气管扩张的典型表现), 右下肺可闻及固定湿啰音, 可见卷发影, 均提示支气管扩张。故最可能的诊断为支气管扩张(A 对)。肺癌(B 错)常多为无痰或少痰的刺激性干咳, 不会有反复咳嗽、咳脓痰、咯血 10 余年的病史。肺结核(D 错)咳嗽较轻, 干咳或少量粘液, 有全身症状、午后低热和盗汗等结核中毒症状。慢性支气管炎(E 错)缓慢起病, 病程长, 反复急性发作而病情加重, 主要症状为咳嗽、咳痰或伴有喘息, 无咯血症状。肺炎主要症状为咳嗽、咳痰、胸痛伴发热, 一般无咯血。

61. 答案:C

解析:自发性气胸(C 对)起病前有的患者可能有持重物、屏气、剧烈体力活动等诱因, 但大多数患者在正常活动或安静休息时发生, 偶有在睡眠中发病者。大多数起病急骤, 患者突感一侧胸痛, 针刺样或刀割样, 持续时间短暂, 继之胸闷和呼吸困难, 可伴有刺激性咳嗽, 系气体刺激胸膜所致。少数患者可发生双侧气胸, 以呼吸困难为突出表现。大量气胸时, 气管向健侧移位, 患侧胸部隆起, 呼吸运动与触觉语颤减弱, 叩诊过清音或鼓音, 心或肝浊音界缩小或消失, 听诊呼吸音减弱或消失。

62. 答案:A

解析:重度至危重度:持续雾化吸入 SABA, 联合雾化吸入短效抗胆碱药、

激素混悬液以及静脉茶碱类药; 吸氧; 尽早静脉应用激素(A 对), 待病情得到控制和缓解后改为口服给药。注意维持水、电解质平衡, 纠正酸碱失衡, 当 pH < 7.20 且合并代谢性酸中毒时, 应适当补碱。经过上述治疗, 临床症状和肺功能无改善甚至继续恶化者, 应及时给予机械通气治疗, 其指征主要包括呼吸肌疲劳、PaCO₂ ≥ 45mmHg、意识改变(需进行有创机械通气)。此外, 应预防呼吸道感染等。

63. 答案:A

解析:此题患者可以诊断为特定恐怖症, 首选方法是系统脱敏疗法(A 对)。治疗师帮助患者建立与不良行为反应相对抗的松弛条件反射, 然后在接触引起这种行为的条件刺激中, 将习得的放松状态用于抑制焦虑反应, 使不良行为逐渐消退(脱敏), 最终使不良行为得到矫正。厌恶疗法(C 错)主要用于露阴癖、恋物癖、酒精依赖和强迫症等。生物反馈疗法(D 错)对多种与社会心理应激有关的心身疾病都有较好疗效, 如紧张性头痛、血管性头痛等。

64. 答案:D

解析:患者中年女性, 体检发现左乳肿块, 直径 4cm, 病理检查:无包膜, 边界不清(恶性肿块), 呈单行串珠状排列, 诊断为浸润性小叶癌(D 对)。导管原位癌(C 错)导管扩张明显, 癌细胞局限于导管内, 导管基膜完整。小叶原位癌(B 错)多累及双侧乳腺, 常为多中心性, 局限在小叶的末梢导管和腺泡。浸润性导管癌(E 错)癌细胞排列成巢状, 团索状, 在纤维间质中浸润生长。

65. 答案:B

解析:十二指肠溃疡的疼痛多发生在两餐之间, 持续至下一次进餐后缓解, 呈疼痛一进餐一缓解的规律, 又称空腹腹痛, 口服制酸药物、抑酸药物或稍进食物后疼痛可缓解。年轻男性, 黑便, 饥饿及夜间痛, 进食缓解, 考虑十二指肠溃疡出血(B 对)。食管胃底静

脉曲张破裂有肝脏病史，无饥饿痛，无进食缓解现象(E 错)。急性糜烂性出血性胃炎出血量少，无饥饿痛，无进食缓解现象(D 错)。胃癌出血无饥饿痛，无进食缓解现象(C 错)。胃溃疡出血为进食痛，无进食缓解现象(A 错)。

66. 答案:B

解析:青年男性患者，突发上腹剧痛，考虑消化道穿孔。为明确诊断，首选的检查方法是立位腹部X线平片(B对)。消化道穿孔时，大量气体进入腹腔，在腹部X线平片上表现为膈下新月状阴影(阳性率约为80%)。该患者无休克表现，应首选立位腹部X线平片，若发现膈下游离气体即可确诊。消化道穿孔早期腹腔诊断性穿刺多为阴性，故不作为首选(A错)。CT(C错)、B超检查(D错)主要用于实质性脏器损伤的诊断，对空腔脏器穿孔的诊断价值不大。消化道穿孔时，禁忌行X线胃肠钡餐检查，以免钡剂从穿孔处溢入腹腔，加重病情(E错)。

67. 答案:E

解析:患者为老年男性，咳嗽、胸闷、憋气2天，持续不缓解，左侧呼吸运动减低，叩诊呈鼓音，呼吸音明显减低(为气胸的典型表现)，胸部X线片示左肺萎陷，压缩约90%，根据其临床表现和辅助检查，可诊断为气胸，由于患者压缩程度较重，因此最有效的治疗措施为胸腔闭式引流(E对)。呼吸机辅助呼吸(D错)为ARDS以及呼吸衰竭患者的治疗措施。低流量吸氧(C错)为长期慢性缺氧患者的给氧方式。胸腔穿刺排气(A错)适用于较小量气胸，肺萎缩小于20%，呼吸困难较轻，心肺功能尚好的闭合性气胸患者。解痉平喘(B错)用于支气管哮喘的治疗，但对于气胸的治疗效果不明显。

68. 答案:A

解析:青年男性患者，有腹痛、脓血便、发热，大便10次/日(>6次/日)。粪镜检及培养未见病原体，结肠镜检查示结肠弥漫分布的糜烂及浅溃疡，病理

学提示重度慢性炎症。结合上述临床表现及实验室检查，溃疡性结肠炎(重度活动期)可能性大，应予泼尼松治疗(A对)。柳氮磺吡啶(B错)适用于轻、中度患者；巯唑嘌呤(C错)可用于对激素治疗效果不佳或缓解期患者；美沙拉嗪(D错)是由乙基纤维素包裹的5-氨基水杨酸，适用于轻、中度患者，其灌肠剂适用于病变局限在直肠及乙状结肠者，美沙拉嗪联合奥沙拉嗪(E错)适用于病变局限在直肠者。

69. 答案:C

解析:中年男性患者，上腹痛1年，常呕吐酸酵宿食，查体上腹可见胃型，可闻及振水音(提示幽门梗阻)，结合患者病史和体查，应考虑为消化性溃疡合并幽门梗阻(C对)。

70. 答案:C

解析:66岁老年妇女(65岁以上女性，是高血压患者的心血管危险因素)，血压高，其父49岁死于急性心肌梗死(心血管病家族史，一级亲属发病年龄男性<55岁，为高血压患者的心血管危险因素)。查体:血压155/100mmHg(收缩压155mmHg属于1级高血压，舒张压100mmHg属于2级高血压，当收缩压和舒张压分属于不同分级时，以较高的级别作为标准，故该患者属于2级高血压，高血压(1~3级)是心血管危险因素)。实验室检查:血清总胆固醇5.90mmol/L(血清总胆固醇(TC)≥5.7mmol/L(220mg/dl)，是高血压患者的心血管危险因素)，尿蛋白240mg/24h(尿微量白蛋白30~300mg/24h，提示靶器官损害)。综上，该患者具有≥3个其他危险因素或靶器官损害，结合2级高血压，可诊断该患者高血压为2级，很高危(C对)。

71. 答案:B

解析:浸润性乳腺癌伴腋淋巴结转移者是应用辅助化疗的指征。对腋淋巴结阴性者是否应用辅助化疗尚有不同意见。一般认为腋淋巴结阴性而有高危复发因素者，诸如原发肿瘤直径大

于 2cm, 组织学分级差, 雌、孕激素受体阴性, 癌基因表皮生长因子受体 2 (HER2) 有过度表达者, 适宜应用术后辅助化疗。该患者淋巴结转移阳性, 合并雌、孕激素受体阴性应辅助化疗 (B 正确)。

72. 答案:C

解析:判断出血是否停止:由于肠道内积血需经约 3 日才能排尽, 故黑便 (D 错) 不提示继续出血。下列情况应考虑有消化道活动出血:①反复呕血, 或黑粪 (血便) 次数增多, 肠鸣音活跃 (>5 次/分) (A 错); ②周围循环状态经充分补液及输血后未见明显改善, 或虽暂时好转而又恶化 (B 错); ③血红蛋白浓度、红细胞计数与血细胞比容继续下降; ④补液与尿量足够 (E 错) 的情况下, 血尿素氮持续或再次升高 (C 对)。该题目并未明确说明患者当前状态, 认为合理治疗情况下选项 C 为正确选项。

73. 答案:E

解析:中年女性患者 (乳腺癌好发年龄段), 左乳房红肿、增大 1 个月, 进展较快 (提示恶性病变), 无疼痛、发热 (提示非感染性疾病)。查体:左乳房红肿, 局部温度略高, 发硬 (炎症样表现); 左腋窝无痛性淋巴结肿大 (提示病变侵犯淋巴结); 血常规正常 (提示非感染性疾病)。综合该患者的病史、查体及实验室检查, 诊断考虑炎性乳腺癌 (E 对)。乳腺增生症 (A 错) 多发于中年妇女, 主要表现为乳房胀痛及肿块, 无腋窝淋巴结肿大。急性乳腺炎 (B 错) 多见于产后哺乳期妇女, 主要表现为乳房疼痛, 局部红肿、发热, 并有寒战、高热、脉快等感染中毒症状, 外周血白细胞升高。乳房结核 (C 错) 多见于 20~40 岁妇女, 病程较长, 进展缓慢, 早期表现为乳房内一个或数个无痛性结节, 与周围组织分界不清。导管内乳头状瘤 (D 错) 多见于 40~45 岁经产妇, 主要表现为无痛性乳头血性溢液, 无乳房红肿及腋窝淋巴结肿大。

74. 答案:A

解析:依照规定要求再次诊断的, 应当自收到诊断结论之日起 3 日内向原医疗机构或者其他具有合法资质的医疗机构提出。承担再次诊断的医疗机构应当在接到再次诊断要求后指派 2 名初次诊断医师以外的精神科执业医师进行再次诊断, 并及时出具再次诊断结论。

75. 答案:B

解析:保密性原则要求治疗者尊重病人的权利和隐私。由于心理治疗的特殊性和病人对治疗者的高度信任, 他们常常把自己从不被人知道的隐私暴露出来, 这些隐私可能涉及到个人在社会中的名誉和前途, 或牵扯到与其他人的矛盾和冲突, 若得不到保护和尊重, 会造成恶劣影响。题目中医师王某经常与自己的家人谈论张某的情况, 没有做到尊重患者, 保护隐私, 故选择 B 选项。

76. 答案:B

解析:老年女性, 右上腹压痛、肌紧张、反跳痛 (腹膜刺激征), WBC $16 \times 10^9/L$ (提示存在炎症感染)。B 超提示胆囊增大壁厚, 内有结石多个 (可坠入胆道引起胆道梗阻), 胆总管直径 1.2cm (直径 >1cm, 胆总管增粗, 提示存在胆道梗阻)。该患者诊断考虑胆囊结石、慢性胆囊炎急性发作、胆管结石, 应行胆囊切除术加胆总管探查术 (B 对 A 错)。临床上行胆囊切除时, 胆总管探查指征为:胆总管存在梗阻; 术中证实胆总管存在病变; 胆总管扩张, 直径超过 1cm, 胆囊壁明显增厚, 发现胰头肿物; 胆囊结石小, 有可能通过胆囊管进入胆总管。胆囊造瘘术及 PTCD 仅能部分减轻胆道压力, 达不到根治胆总管结石的目的 (C、E 错)。单纯行胆肠吻合术未能处理病变的胆囊 (D 错)。

77. 答案:E

解析:中青年女性患者, 低热、乏力 (结核毒血症状) 伴腹胀 3 个月。查体:腹壁柔韧感 (结核性腹膜炎的典型体征),

有压痛和轻反跳痛，移动性浊音阳性（腹水阳性）。腹水为渗出液（结核性腹膜炎引起腹水为渗出液）。综合患者病史、体检与腹水检查，考虑诊断为结核性腹膜炎，腹腔镜检查结合病理活检（E 对）对其有确诊价值。腹部 B 型超声（A 错）仅能用于诊断患者是否有腹腔积液，对腹腔积液病因的诊断没有特异性。胃肠道钡剂检查（B 错）可发现肠粘连、肠结核、肠痿、肠腔外肿块等征象，对结核性腹膜炎无确诊价值。血沉（C 错）增高可见于多种疾病，如急性炎症、白血病、结缔组织病及结核病的活动期，不具有特异性，不能确诊结核性腹膜炎。结核性腹膜炎的腹水普通细菌培养结果为阴性，结核分枝杆菌培养的阳性率很低（D 错）。

78. 答案:D

解析:新鲜冰冻血浆(FFP)中含有全部凝血因子和血浆蛋白,主要用于纠正止血功能异常。FFP 和 FP 二者皆适用于多种凝血因子缺乏症、肝胆疾病引起的凝血障碍和大量输库存血后的出血倾向(D 对)。

79. 答案:A

解析:该患者每日饮白酒 250g,已有 10 年,现诊断为肝硬化,考虑酒精性肝硬化可能性大,故应立即戒酒(A 对)。

80. 答案:D

解析:青年女性患者,足月顺产(产后血液常处于高凝状态)后 2 周开始下床活动(长时间卧床可使下肢静脉血液缓慢),觉左下肢痛,肿胀(提示栓塞位置较高),左下肢皮肤略发绀,皮温高,表浅静脉曲张,沿左股静脉走行区有明显压痛(下肢深静脉血栓形成的典型表现)(D 对 E 错)。血栓性股静脉炎(C 错)与血栓性大隐静脉炎为静脉的急性非化脓性炎症,病变静脉区呈红肿条索状,疼痛及压痛明显,局部皮肤温度升高。

81. 答案:C

解析:厌恶疗法是行为疗法的一种,通过轻微的惩罚来消除适应不良行为,

主要适应症是露阴癖、恋物癖、酒精依赖、强迫症等。本例中,患者每次吸烟后给他服用某种能引起恶心、呕吐的药物,这样反复多次以后,吸烟和厌恶体验建立一定的条件联系,使得患者一产生吸烟的想法就会产生厌恶体验,从而放弃强迫症状,这种方法是厌恶疗法(C 对)。系统脱敏疗法(B 错)是治疗师帮助患者建立与不良行为反应相对抗的松弛条件反射,然后在接触引起这种行为的条件刺激中,将习得的放松状态用于抑制焦虑反应,使不良行为逐渐消退(脱敏),最终使不良行为得到矫正。冲击疗法(A 错)是让病人一下子面对最高等级惧怕的情况,甚至过分地与惧怕的情况接触。由于惧怕刺激的“泛滥性”的来临,个体面对过分的惧怕刺激,恐怖反应可能会逐渐减轻,甚至最终消失。

82. 答案:A

解析:老年男性患者,体检发现直径 0.8cm 的单发胆囊结石,无相关临床症状及并发症,胆囊造影显示其功能正常,结石数量少、直径小,胆囊壁无钙化、无息肉、不增厚,建议观察、随诊(A 对)。溶石疗法(B 错)、中药排石(C 错)、择期行胆囊切除术(D 错)、择期行腹腔镜胆囊切除术(E 错)均为胆囊结石治疗方式,不适用于患者。

83. 答案:A

解析:中年男性患者,咽痛伴牙龈出血半个月。浅表淋巴结和脾脏轻度肿大。实验室检查:外周血 Hb60g/L(男性正常值:120~160g/L),WBC $25 \times 10^9/L$ (正常值 $4 \sim 10 \times 10^9$),Plt $42 \times 10^9/L$,血涂片红细胞形态正常。骨髓增生活跃,其中原始细胞占 75%。细胞化学染色示 PAS 阴性(排除急淋),NSE 阳性(考虑急单白血病),急性单核细胞白血病(M5)最常用的化疗方案为 IA(A 对)或 DA。

84. 答案:A

解析:室性期前收缩是一种常见的心律失常,正常人与各种心脏病患者均

可发生，正常人发生室性期前收缩的机会随年龄的增长而增加。常见于高血压、冠心病、心肌病、风湿性心肌病与二尖瓣脱垂患者。对于无症状的室性期前收缩，患者一般并无器质性心脏病，且室性期前收缩并不会增加此类患者发生心脏病死亡的危险性，此时无需药物治疗(B、C、D 错)，采取去除诱因和病因的治疗措施即可，包括避免诱发因素如吸烟、咖啡、应激等，也可嘱咐患者定期复查，观察病情变化(A 对)。射频消融术(E 错)主要用于治疗快速性心律失常，如房性心律失常及房室折返性心律失常。

85. 答案:D

解析:经直肠指诊发现患者直肠侧壁有有蒂包块，诊断的意义在于明确包块性质，最有意义的检查是结肠镜(D 对)，可通过直接观察包块情况，必要时取组织活检以确定诊断。超声:包括经阴道B超(B 错)和经直肠B超(A 错)、结肠X线钡灌肠检查(E 错)、盆腔CT(C 错)等影像学检查属于间接成像，同时也无相应技术可以明确包块性质，对诊断意义不大。

86. 答案:B

解析:青年男性患者，因胃溃疡穿孔行胃大部切除术，术后5天出现右上腹疼痛、发热(提示感染)，腹部X线透视见右侧膈肌升高，随呼吸活动受限，肋膈角模糊(提示膈下脓肿)，结合患者病史和影像学检查，最可能的诊断是右侧膈下脓肿(B 对)。胃大部切除术后，病人多处于平卧位，此时膈下部位最低，腹腔内的渗出液易积聚于此形成脓肿。胃排空障碍(A 错)即术后胃瘫，常发生在流质饮食改为半流质时，表现为上腹饱胀感、恶心、呕吐，呕吐物为含胆汁的胃液。急性细菌性肝脓肿(C 错)起病较急，主要表现为寒战、高热、肝区疼痛和肝肿大，伴恶心、呕吐、食欲减退。吻合口瘘(D 错)主要表现为腹痛，腹部压痛、反跳痛和腹肌紧张等腹膜刺激症状。急性胆囊炎

(E 错)表现为右上腹绞痛或持续性疼痛伴阵发加剧，疼痛向右肩放射，右上腹局部压痛、反跳痛。

87. 答案:B

解析:消化道溃疡典型症状为上腹痛，性质可有钝痛、灼痛、胀痛、剧痛、饥饿样不适。特点:①慢性过程，可达数年或10余年;②反复或周期性发作，发作期可为数周或数月，发作有季节性，典型者多在季节变化时发生，如秋冬和冬春之交发病;③部分病人有与进餐相关的节律性上腹痛，餐后痛多见于GU，饥饿痛或夜间痛、进餐缓解多见于DU;④腹痛可被抑酸或抗酸剂缓解。其中十二指肠溃疡多见于青年人，胃溃疡多见于老年人，本病例为24岁男性，考虑十二指肠溃疡可能性大，故选B。

88. 答案:D

解析:肝硬化患者应给予抗生素(C 对)预防和控制感染，当患者发生肝性脑病出现烦躁、抽搐时禁用鸦片类、巴比妥类、苯二氮草类镇静剂(D 错，为本题正确答案)，可试用异丙嗪、氯苯那敏(扑尔敏)等抗组胺药。其他保持大便通畅，可给予乳果糖(B 对)，以保证每日排软便2~3次。注意防治便秘可给予稀醋酸灌肠(E 对)。门体分流对蛋白不能耐受者应避免大量蛋白质饮食(A 对)。警惕低血糖，血糖低于正常时予以纠正。故选D。

89. 答案:B

解析:患者中年男性，气短，双肺底可闻及湿性啰音(提示左心衰竭)，颈静脉怒张，肝大，双下肢水肿(提示右心衰竭)，心尖部可闻及2/6级收缩期杂音(提示左心室扩大导致的相对性二尖瓣关闭不全)，心界向两侧扩大(扩张型心肌病典型体征)，综合患者的病史、临床表现和体格检查，该患者最可能的诊断是扩张型心肌病(B 对)。风湿性二尖瓣关闭不全(A 错)患者多有风湿热病史，且多在年幼时发病，并伴有相应瓣膜区的改变。缩窄性心包

炎(C 错)主要特征为心包增厚和室间隔抖动征,一般不会出现心界向两侧扩大等体征。冠心病伴乳头肌断裂(D 错)典型表现为与劳力、运动相关的心绞痛等心肌缺血症状。肥厚型心肌病(E 错)心界一般不大或仅左室增大,主要特征为心室不对称肥厚而无心室腔增大,典型杂音为胸骨左缘第 3~4 肋间较粗糙的喷射性收缩期杂音。

90. 答案:C

解析:溃疡性结肠炎是一种结肠和直肠慢性非特异性炎症性疾病,病变局限于大肠黏膜及黏膜下层,多位于乙状结肠和直肠,也可延伸至降结肠,甚至整个结肠。病程漫长,常反复发作。症状以腹泻为主,排出含有血、脓和黏液的粪便,常伴有阵发性结肠痉挛性疼痛,并里急后重,排便后可获缓解。抗生素治疗无效。

91. 答案:B

解析:尿淀粉酶(B 错,为本题正确答案)于起病后 24 小时开始升高;该患者腹痛 8 小时,尿淀粉酶检查无意义。

92. 答案:D

解析:厌恶疗法是行为疗法的一种,通过轻微的惩罚来消除适应不良行为,主要适应症是露阴癖、恋物癖、酒精依赖、强迫症等。D 选项正确。

93. 答案:D

解析:中年男性患者,有十二指肠溃疡病史、呕血,应诊断为上消化道大出血。患者十二指肠溃疡病史较长,呕血后血压降至 80/50mmHg(休克),及时进行扩容输血后,血压仍有波动,说明快速补液、输血(A 错)治疗无效,患者体内仍在出血,难以纠正休克。此时,该患者应在进行输血等保守治疗措施的同时,积极进行急诊剖腹手术(D 对),纠正休克。抗休克治疗应立足于综合治疗,静脉注射止血药(B 错)、胃镜电凝止血(C 错)、应用血管活性药物(E 错)为保守治疗,而该患者上消化道出血快、出血量大,保守治疗难以去除病因,效果不佳,故其不是最适

宜的治疗方法。

94. 答案:D

解析:男性患者,54 岁。乙型肝炎病史 20 年。近 2 年来双下肢水肿。查体:皮肤轻度黄染,前胸壁有蜘蛛痣,脾肋下 3cm,考虑肝硬化。假小叶(D 对)是由纤维间隔包绕再生结节或将残留肝小叶重新分割形成,是肝硬化特征性病理表现。肝细胞坏死、炎细胞浸润、肝细胞水肿变性可见于肝炎、肝硬化及多种肝脏疾病中,不具有典型代表性(A、B、C、E 错)。

95. 答案:A

解析:根据《医疗事故处理条例》规定,患者有权查阅、复印或者复制自己的客观性病历资料,包括门诊病历、住院志(A 对)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理资料、护理记录以及国务院卫生行政部门规定的其他病历资料。

96. 答案:B

解析:病例对照研究是选择患有和未患有某特定疾病的人群分别作为病例组和对照组,调查各组人群过去暴露于某种或某些可疑危险因素的比例或水平,通过比较各组之间暴露比例或水平的差异,判断暴露因素是否与研究的疾病有关联及其关联程度大小的一种观察性研究方法(B 对)。

97. 答案:B

解析:临床预防服务是指医务人员在临床场所对“健康者”和无症状“患者”的健康危险因素进行评价,实施个性化的预防干预措施来预防疾病和促进健康。临床预防服务的提供者是临床医务人员,服务的地点是在临床场所,服务对象是健康和无症状“患者”(B 对)。

98. 答案:E

解析:青年男性患者。心悸、气短 2 个月,发热 1 周。查体:睑结膜有瘀点,足底可见紫红色结节,有压痛(为亚急

性感染性心内膜炎周围体征), 心率 100 次/分, 主动脉瓣区闻及舒张期叹气样杂音, 考虑亚急性感染性心内膜炎(E 对)。上呼吸道感染(A 错)主要症状为咳嗽、咳痰、胸痛伴发热, 一般无瓣膜杂音等症状。余选项均不符合该病例表现。

99. 答案:D

解析: 睾丸鞘膜积液(B 错)呈球形或卵圆形, 表面光滑, 有弹性和囊样感, 无压痛, 一般触不到睾丸和附睾。透光试验阳性。若积液为脓性、血性或乳糜性, 则透光试验为阴性。精索鞘膜积液(C 错)可表现为一个或多个囊肿, 呈椭圆形、梭形或哑铃形, 沿精索而生长, 其下方可扪及正常睾丸、附睾, 若牵拉同侧睾丸, 可见囊肿随之上下移动。超声检查呈液性暗区, 如为睾丸鞘膜积液, 则与睾丸有明显分界。交通性鞘膜积液(D 对), 立位时阴囊肿大, 卧位时积液流入腹腔, 鞘膜囊缩小或消失, 睾丸可触及。睾丸鞘膜积液应与睾丸肿瘤和腹股沟斜疝相鉴别, 睾丸肿瘤为实性肿块, 质地坚硬, 病侧睾丸有沉重感, 掂量时如秤砣, 透光试验呈阴性。腹股沟斜疝(A 错)的病侧阴囊, 有时可见肠型、闻及肠鸣音, 平卧位时阴囊内容物可回纳, 咳嗽时内环处有冲击感, 透光试验亦呈阴性。

100. 答案:D

解析: 医学伦理学原则有: 有利原则、不伤害原则、尊重原则、公正原则等。医师不耐烦地说: “你是医师, 还是我是医师?” 是对患者的不尊重。这种做法违背了医学伦理学基本原则中的尊重原则(D 对)。

101. 答案:C

解析: 胃十二指肠溃疡手术适应证: 胃十二指肠溃疡保守治疗无效或者并发穿孔、出血、幽门梗阻、癌变者。胃溃疡首选术式是胃大部切除术(毕 I 式吻合)(C 对); 胃大部切除术(毕 II 式吻合)(D 错)是高位胃溃疡可选术式;

迷走神经切除术(E 错)是较大高位胃溃疡切除后成形较为困难且有造成贲门狭窄可能时的可选术式。

102. 答案:B

解析: 由抽样产生的误差叫做抽样误差, 由于它的存在, 抽样误差的统计量和总体参数是有差异的。

103. 答案:E

解析: 为了节约库存血, 减少输血反应和疾病传播, 国家鼓励自体输血。自体输血适应症包括: ①择期手术病人估计术中出血量较大需要输血者; ②有异体输血反应者; ③稀有血型或配血困难者; ④边远地区供血困难者。本患者股骨颈骨折需手术, 预计术中出血量较大, 其一般情况良好, 但存在多种红细胞抗体, 交叉配血试验无法配上相容性血液, 符合自体输血一、三条, 因此应采用贮存式自身输血(E 对)。

104. 答案:B

解析: 普萘洛尔(B 对)为 β 受体拮抗剂, 可使心肌收缩力减弱, 心输出量减少, 从而使肥厚型梗阻性心肌病的杂音减弱。硝酸甘油(A 错)为扩血管药物, 可减轻心脏后负荷而使杂音增强; 地高辛(C 错)为正性肌力药物, 可增加心肌收缩力而杂音增强。

105. 答案:D

解析: 心包炎心电图主要表现为: ①除 aVR 和 V1 导联以外的所有常规导联可能出现 ST 段呈弓背向下型抬高; ②一至数日后, 随着 ST 段回到基线, 逐渐出现 T 波低平及倒置; ③常有窦性心动过速。积液量较大的情况可以出现 QRS 电交替(D 对)。其余选项均可出现病理性 Q 波。

106. 答案:A

解析: 患者为中青年女性, 同时出现咳嗽、咯血、杵状指和肺部局限性湿啰音症状, 在呼吸系统疾病一般可见于支扩或者肺癌。肺部局限性啰音是由于肿块堵塞局部支气管, 仅出现在肺癌早期, 而杵状指则由于慢性缺氧出

现在肺癌晚期，因此本例最可能的疾病是支气管扩张(A对)。慢性支气管炎(B错)虽然可出现咳嗽、咳痰，局部啰音等，但一般不会出现杵状指。肺结核(D错)常见症状为咳嗽、咳痰，1/3的患者有咯血，并且一般伴有全身症状如发热、盗汗等，但是杵状指少见。肺脓肿(C错)一般全身症状严重，典型症状为大量咳痰、高热，虽然也会出现咯血，杵状指等症状，但其起病急，全身症状严重，通常啰音遍布全肺，X线可见气液平面。

107. 答案:C

解析:应首先保证呼吸功能，因此选C选项。

108. 答案:C

解析:任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。该医师未能及时上报，予以责令改正(C对)处理。

109. 答案:C

解析:参见《医疗事故处理条例》第十六条:发生医疗事故争议时，死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。第十八条:患者死亡，医患双方当事人不能确定死因或者对死因有异议的，应当在患者死亡后48小时内进行尸检;具备尸体冻存条件的，可以延长至7日。尸检应当经死者近亲属同意并签字。A、B、D、E均为合理要求。

110. 答案:E

解析:上唇部疔或痈，如果遭受到挤压，病原菌可经过内眦静脉、眼静脉(面部静脉无静脉瓣)进入颅内海绵状静脉窦，引起化脓性海绵状静脉窦炎(E对)，可有寒战、高热、头痛、呕吐、昏迷甚至死亡，病情严重，死亡率极高。

111. 答案:D

解析:甲状腺功能亢进症的手术指征为:①继发性甲亢或高功能腺瘤;②中

度以上的原发性甲亢;③腺体较大，伴有压迫症状，或胸骨后甲状腺肿等类型甲亢;④抗甲状腺药物或¹³¹I治疗后复发者或坚持长期用药有困难者;⑤妊娠早、中期的甲亢病人。凡具有上述指征者，应考虑手术治疗，并可以不终止妊娠。该患者诊断考虑为结节性甲状腺肿继发甲亢，存在手术治疗的指征，最有效的治疗方法为手术治疗(D对)。

112. 答案:E

解析:ACEI(E对)类降压药，其可抑制交感-肾素-血管紧张素-醛固酮系统，扩张外周血管而降低血压;还可改善胰岛素抵抗、减少尿蛋白形成，因此特别适合于高血压合并糖尿病的患者。 β 受体阻滞剂(B错)，能增加胰岛素抵抗，还可能掩盖和延长降糖过程中的低血糖症。利尿剂(D错)可影响血脂、血糖、血尿酸代谢。故两者都不适合用于糖尿病合并高血压的患者。 α 受体阻滞剂(A错)，通过降低动脉血管阻力，增加静脉容量来降低血压，因其副作用较多，目前不主张单独使用。钙通道阻滞剂(C错)，对血脂、血糖等无明显影响，可用于糖尿病伴高血压患者，但一般不作为首选。

113. 答案:C

解析:下腹部手术后8小时，感下腹部胀痛，躁动不安，未解小便，应考虑为术后尿潴留(较常见)。主要因支配膀胱的副交感神经纤维很细，对局麻药很敏感，阻滞恢复较晚，即使皮肤感觉恢复，仍可发生尿潴留。下腹部或肛门、会阴手术后切口疼痛以及病人不习惯卧床排尿等因素也可引起尿潴留(C对)。

114. 答案:A

解析:器质性心脏病合并心功能不全者原则上只处理心脏本身疾病，不必应用治疗室性期前收缩的药物。若症状明显，可选用 β 受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂和胺碘酮(A对B、D、E错)等。胺碘酮是广谱抗心律

失常药，对心房扑动、心房颤动、室上性心动过速和室性心动过速有效(A对)。美托洛尔(C错)拮抗 β 受体，可降低自律性、减慢房室结传导；临床治疗各种严重室性心律失常，维持心房颤动患者的窦性心率。

115. 答案:D

解析:病例对照研究采用比值比(OR, 也称比数比、优势比或交叉乘机比)来估计暴露与疾病之间的关联强度。

116. 答案:E

解析:保护胃黏膜的药物包括铋剂、弱碱性抗酸药、米索前列醇等(E对)。

117. 答案:B

解析:左胸饱满,语颤减弱,叩诊浊音,左中下肺呼吸音消失为典型胸腔积液体征(B对),其余选项均不会出现这些体征。

118. 答案:D

解析:急性胰腺炎常在饱餐和饮酒后突然发作,表现为急性腹痛,常较剧烈,且腹痛多位于左上腹,部分患者可有恶性、呕吐、轻度发热的症状。患者中年女性,参加宴会后突发中上腹持续性疼痛伴恶心、呕吐,发热,上腹偏左有压痛及轻度肌紧张,巩膜无黄染,Murphy征阴性,患者临床表现与急性胰腺炎相符,故患者最可能的诊断为急性胰腺炎(D对)。急性肠梗阻早期有腹痛、呕吐、腹胀、排气排便停止,且肠鸣音亢进(A错)。急性阑尾炎表现为转移性右下腹痛、发热、恶心、呕吐,体检右下腹固定压痛、反跳痛、肌紧张、肠鸣音减弱或消失(B错)。急性胆囊炎主要表现为右上腹部疼痛,常在夜间发作,放射到右肩、肩胛和背部,伴恶心、呕吐、厌食等消化道症状,10%~20%可出现黄疸,Murphy征阳性(C错)。消化性溃疡穿孔表现突发上腹部剧痛,呈“刀割样”,伴有恶心、呕吐,严重者可有血压下降,腹式呼吸减弱或消失,全腹压痛、反跳痛明显,可出现典型的“板状腹”体征,X线检查可见膈下新月状游离气

体影(E错)。

119. 答案:B

解析:患者发病8小时,血淀粉酶于起病后2~12小时开始增高,故为明确诊断,首选的检查是血淀粉酶(B对)。血脂肪酶起病后24~72小时开始升高,故患者发病8小时,血脂肪酶还未升高(C错)。尿淀粉酶与胰腺炎起病后12~24小时开始升高,故患者发病8小时,尿淀粉酶还未升高(A错)。腹部B超(D错)虽对急性胰腺炎诊断有一定价值,但易受胃肠气体干扰,故不常用于急性胰腺炎的诊断。腹部平片(E错)不用于急性胰腺炎的辅助检查,常用于诊断消化道穿孔、肠梗阻、骨折等疾病的辅助检查。

120. 答案:D

解析:肾结核常发生于20~40岁的青壮年,男性较女性多见。随着病情的发展,可出现典型的临床表现,尿频、尿急、尿痛是肾结核的典型症状之一,血尿是肾结核的重要症状,常为终末血尿(D对)。

121. 答案:D

解析:静脉尿路造影(IVU)可以了解分侧肾功能、病变程度与范围,对肾结核治疗方案的选择必不可少。早期表现为肾盏边缘不光滑如虫蛀状,随着病变进展,肾盏失去杯形,不规则扩大或模糊变形。

122. 答案:D

解析:青年女性患者,进行性膀胱刺激症状(提示可能有泌尿系感染),经抗生素治疗不见好转(提示为特异性感染),伴有右侧腰部胀痛及午后潮热(结核中毒典型表现),结合患者病史和临床表现,该患者最可能的诊断为肾结核,为明确诊断,最有价值的检查是尿沉渣找结核杆菌(D对)。尿相差显微镜(A错)主要用于区别肾小球源性和肾小管源性血尿。尿蛋白定量(B错)主要用于肾病综合征的诊断。肾结核为特异性细菌感染,尿普通细菌培养(C错)常为阴性,故对该病诊断价值

不大。尿细胞学检查(E 错)主要用于泌尿系肿瘤的筛查。

123. 答案:D

解析:静脉尿路造影(IVU)可以了解分侧肾功能、病变程度与范围,对肾结核治疗方案的选择必不可少。早期表现为肾盏边缘不光滑如虫蛀状,随着病变进展,肾盏失去杯形,不规则扩大或模糊变形。

124. 答案:C

解析:患者老年男性,71岁。间断咳嗽、咳痰20余年(慢性阻塞性肺疾病),加重伴憋喘1周,近2天出现嗜睡(COPD急性加重期)。查体:意识模糊,口唇发绀,双肺布满哮鸣音,双下肢水肿,说明患者COPD病情恶化,处于急性加重期,出现意识模糊,肺性脑病(C对)可因高CO₂导致呼吸系统受到抑制,加重脑缺氧,出现意识障碍。感染中毒性脑病(D错)可以出现意识障碍,但并不是COPD急性加重期出现意识障碍最主要机制。COPD急性加重期可以因缺氧导致机体代谢紊乱,出现电解质紊乱(B错),但并不是意识障碍的原因。脑出血(E错)可以出现意识障碍,但是本题提示为COPD患者,出现病情加重导致出现的意识障碍,与脑出血无直接关系。

125. 答案:E

解析:患者经吸氧治疗后呼吸困难进一步加重(普通吸氧无明显改善)。血气分析示pH7.10(正常值7.35~7.45),PaO₂65mmHg(正常值95~100mmHg),PaCO₂102mmHg(正常值40mmHg)。查体:昏睡,口唇发绀,双肺散在干湿性啰音。考虑患者为肺性脑病,II型呼吸衰竭,代谢性酸中毒合并呼吸性酸中毒。患者情况严重,已出现意识障碍,符合机械通气(E对)的指征。肺性脑病一般不适用糖皮质激素静脉滴注(A错)。呼衰在合并心衰时,一线治疗为控制感染,改善通气,心衰一般能得到改善;若仍有水肿、少尿,可适当使用利尿剂以消除水肿,减少右心前

负荷。大剂量利尿剂静脉滴注(B错)会导致有效血容量减少,可能加重组织缺氧,且使痰液粘稠,不易排出。肺源性心脏病应慎用呼吸兴奋剂静脉滴注(C错),呼吸兴奋剂适用于呼吸中枢受抑制和呼吸肌疲劳引起的呼吸衰竭。当病人呼吸困难加重,咳嗽伴痰量增加、有脓性痰时,应依据病人所在地常见病原菌及其药物敏感情况积极选用抗生素治疗,故不选静脉应用广谱抗生素(D错),且该患者已出现严重呼吸衰竭、心力衰竭、肺性脑病表现,当务之急是改善通气

126. 答案:B

解析:乳腺癌常见于绝经期妇女,表现为乳房肿块,边界不清,易侵犯肌肉,皮肤表面可见扩张的静脉。该患者右乳腺外上象限肿块,边界不清,局部皮肤凹陷,可诊断为乳腺癌(B对)。

127. 答案:B

解析:保留乳房的乳腺癌切除术只完整切除了肿块、清扫了腋淋巴结,并没有切除乳房,为预防局部复发及肿瘤残留,术后必须辅以放射治疗。

128. 答案:D

解析:靶向治疗:通过转基因技术制备的曲妥珠单抗(D对)对HER2过度表达的乳腺癌病人有良好效果,可降低乳腺癌病人术后的复发转移风险,提高此病生存期。

129. 答案:C

解析:患者中老年男性,喘憋、夜间憋醒、双肺可闻及细湿啰音(左心衰竭导致肺循环淤血的典型表现);双下肢水肿(右心衰竭导致体循环淤血的典型表现),由此判断该患者为全心衰竭(C对)。

130. 答案:D

解析:脑钠肽是心衰诊断、病人管理、临床事件风险评估中的重要指标,临床上常用BNP及NT-proBNP(D对)。未经治疗者若脑钠肽水平正常可基本排除心衰诊断,已接受治疗者脑钠肽水平高则提示预后差,但左心室肥厚、

心动过速、心肌缺血、肺动脉栓塞、慢性阻塞性肺疾病(COPD)等缺氧状态、肾功能不全、肝硬化、感染败血症、高龄等均可引起脑钠肽升高,因此其特异性不高。

131. 答案:D

解析:格列喹酮(D对)可作为糖尿病合并肾功能不全的首选。格列吡嗪、格列齐特和格列喹酮作用较温和,较适用于老年人;轻度肾功能减退时几种药物均仍可使用,中度肾功能减退时宜使用格列喹酮,重度肾功能减退时格列喹酮也不宜使用。

132. 答案:E

解析:格列奈类适应证:较适合于 T2DM 早期餐后高血糖阶段或以餐后高血糖为主的老年人。

133. 答案:C

解析:交替脉系节律规则而强弱交替的脉搏。一般认为系左室收缩力强弱交替所致,为左室心力衰竭的重要体征之一。

134. 答案:B

解析:主动脉瓣关闭不全患者左心室收缩压升高,舒张期时由于主动脉瓣关闭不全,主动脉血反流入左心室,使血压迅速降低,脉压差增大,脉搏骤起骤落,形成水冲脉。

135. 答案:B

解析:硝苯地平(B对)是变异性心绞痛首选药、抗高血压、抗心力衰竭。

136. 答案:C

解析:血管平滑肌的肌浆网的发育较差,血管收缩时所需要的 Ca^{2+} 主要来自细胞外,故血管平滑肌对钙通道阻滞剂很敏感,其中对脑血管具有较强扩张作用的钙拮抗药是尼莫地平,可选择性舒张脑血管平滑肌,明显减轻脑血管痉挛,增加脑血流量,改善脑组织的血液循环,其脂溶性好,可有效的治疗脑血管痉挛、脑缺血(尤其脑卒中早期使用)及蛛网膜下隙出血。

137. 答案:E

解析:胫骨上 1/3 骨折,可致胫后动脉

损伤,引起下肢严重血液循环障碍,甚至缺血坏死。

138. 答案:C

解析:胫骨的营养血管从胫骨干上、中 1/3 交界处进入骨内,中、下 1/3 的骨折使营养动脉损伤,使得供应下 1/3 段胫骨的血液循环显著减少;同时因下 1/3 段胫骨几乎无肌附着,由胫骨远端获得的血液循环很少,故下 1/3 段骨折愈合较慢,容易发生骨折延迟愈合。

139. 答案:E

解析:有些肿瘤的形态类似发育过程中的某种幼稚细胞或组织,称为“母细胞瘤”,良性者如骨母细胞瘤;恶性者如神经母细胞瘤、髓母细胞瘤和肾母细胞瘤等。

140. 答案:D

解析:成熟畸胎瘤是最常见的生殖细胞肿瘤,镜下可见肿瘤由三个胚层的各种成熟组织构成。

141. 答案:E

解析:一般头、面、颈部在术后 4~5 日拆线;下腹部、会阴部在术后 6~7 日拆线;胸部、上腹部、背部、臀部手术 7~9 日拆线;四肢手术 10~12 日拆线(近关节处可适当延长);减张缝线 14 日拆线。

142. 答案:C

解析:胸部、上腹部、背部、臀部手术 7~9 日拆线。

143. 答案:D

解析:草绿色、透明的腹腔穿刺液常见于结核性腹膜炎;血性、恶臭常见于绞窄性肠梗阻;血性、无臭、淀粉酶含量高的腹腔穿刺液常见于急性胰腺炎;腹腔穿刺液呈稀脓性略带臭气提示合并厌氧菌感染。

144. 答案:C

解析:血性、恶臭常见于绞窄性肠梗阻。

145. 答案:E

解析:申请个体行医的执业医师,须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满 5 年,并按照国家有关规定办理

审批手续, 未经批准, 不得行医。

146. 答案:C

解析:《执业医师法》规定, 中止医师执业活动 2 年以上以及不予注册情形的, 申请重新执业, 应当依法重新注册。

147. 答案:D

解析:医务人员应严格地遵守治疗伦理及其有效、择优和自主三项准则。

148. 答案:A

解析:预防医学的道德原则包括:①全社会参与原则; ②社会公益原则; ③社会公正原则。

149. 答案:D

解析:格列喹酮(D 对)可作为糖尿病合并肾功能不全的首选。格列吡嗪、格列齐特和格列喹酮作用较温和, 较适用于老年人; 轻度肾功能减退时几种药物均仍可使用, 中度肾功能减退时宜使用格列喹酮, 重度肾功能减退时格列喹酮也不宜使用。

150. 答案:C

解析:格列齐特可降低血小板的黏附性和聚集性, 刺激纤溶酶原合成, 减少凝血和血管栓塞的发生, 故为了减轻或延缓糖尿病血管并发症, 磺酰脲类中首选格列齐特(C 对)。甲苯磺丁脲(A 错)、氯磺丙脲(B 错)为第一代磺酰脲类, 现已很少应用。格列喹酮(D 错)可作为糖尿病合并肾功能不全的首选。

第二单元

1. 答案:D

解析:若胎头高于耻骨联合前平面, 表示头盆明显不称, 称胎头跨耻征阳性。扁平骨盆是指骨盆入口平面前后径狭窄。故跨耻征阳性最大可能为扁平骨盆(D 对)。

2. 答案:A

解析:低钠血症、感染、低钾血症、肾静脉血栓形成、低钙血症都属于肾病综合症的并发症, 由此可知 A 对。

3. 答案:A

解析:妊娠合并心脏病主要分为结构异常性心脏病、功能异常性心脏病和妊娠期特有心脏病三类。以结构异常性心脏病为主, 其中先天性心脏病(A 对)占 35~50%。

4. 答案:E

解析:有些骨折如裂缝骨折(A 错)、青枝骨折(C 错)、嵌插骨折(B 错)、脊柱骨折(D 错)及骨盆骨折, 不出现骨折特有体征。

5. 答案:E

解析:胫骨的营养血管从胫骨干上、中 1/3 交界处进入骨内, 中、下 1/3 的骨折使营养动脉损伤, 使得供应下 1/3 段胫骨的血液循环显著减少; 同时因下 1/3 段胫骨几乎无肌附着, 由胫骨远端获得的血液循环很少, 故下 1/3 段骨折愈合较慢, 容易发生骨折延迟愈合。

6. 答案:E

解析:轻型腹泻主要表现为胃肠道症状而无明显的全身症状。重型腹泻有较重的胃肠道症状并有明显的脱水、电解质紊乱、酸碱失衡和全身中毒症状。

7. 答案:B

解析:遗忘综合征又称为柯萨可夫综合征, 患者无意识障碍, 智能相对完好, 主要表现为近事记忆障碍、定向力障碍和虚构, 故选 B 选项。

8. 答案:A

解析:唐氏综合征患者 50% 的患儿伴有先天性心脏病, 其次是消化道畸形。先天性甲状腺功能减退症和急性淋巴细胞白血病的发生率明显高于正常人群, 免疫功能低下, 易患感染性疾病。如存活至成人期, 则常在 30 岁以后即出现老年性痴呆症状。

9. 答案:B

解析:上运动神经元瘫痪也称痉挛性瘫痪, 是由于上运动神经元即大脑皮质运动区神经元及其发出的下行纤维病变所致。其临床表现有:肌力减弱、

肌张力增高(E 错)、腱反射活跃或亢进(C 错)、浅反射减退或消失(D 错)、病理反射阳性(B 对)、无或轻度失用性肌萎缩(A 错)。

10. 答案:C

解析:小儿 6 岁左右萌出第一颗恒牙(第一恒磨牙,在第二乳磨牙之后,又称为 6 龄齿);6~12 岁阶段乳牙逐个被同位恒牙替换,其中第 1、2 前磨牙代替第 1、2 乳磨牙,此期为混合牙列期;12 岁萌出第二恒磨牙;约在 18 岁以后萌出第三恒磨牙(智齿),也有终生第三恒磨牙不萌出者。第一恒磨牙萌出较早,常被家长忽视,更应注意保护。

11. 答案:C

解析:绒毛膜癌可发生于性腺或其他组织的多潜能细胞。绝大多数与妊娠有关,约 50%继发于葡萄胎,25%继发于自然流产,20%发生于正常分娩后,5%发生于早产和异位妊娠等。20 岁以下和 40 岁以上女性为高危年龄,发病和年龄密切相关,提示该肿瘤较可能发生自非正常的受精卵,而不是来自绒毛膜上皮。

12. 答案:A

解析:口服铁剂治疗有效的缺铁性贫血患者于 12~24 小时后细胞内含铁酶活性开始恢复,精神症状减轻,食欲好转。网织红细胞于用药 2~3 日最先上升,服药后 5~7 天达高峰,1~2 周后血红蛋白浓度上升,一般需 3~4 周左右恢复正常。

13. 答案:E

解析:绒毛膜癌(E 对)是一种高度恶性的肿瘤,继发于葡萄胎、流产或足月分娩以后。绒毛膜癌首选的治疗方法是化学药物治疗,以手术治疗和放射治疗为辅。

14. 答案:E

解析:水痘由水痘一带状疱疹病毒感染所致,主要损害部位在皮肤和黏膜,如破损常并发皮肤感染。若患者免疫力极低,不能清除病毒,则病毒可到达单核-巨噬细胞系统,引起全身播

散性水痘,可波及内脏造成局灶性坏死、充血水肿和出血,但此情况较少见,所以肺炎、心肌炎、脑炎、败血症(A、B、C、D 错)均不是水痘最常见的并发症。

15. 答案:D

解析:糖化血红蛋白无法反映瞬时血糖,主要反映近 8~12 周总的血糖水平,为糖尿病控制情况的主要监测指标之一(D 对)。

16. 答案:B

解析:手外伤创口出血不止可使伤员迅速陷入休克,甚至致死,须及时止血。局部加压包扎(E 对)是手外伤创面出血,甚至腕平面的尺、桡动脉断裂出血,最简单而行之有效的止血方法。手外伤止血时禁用止血带在腕平面以上捆扎(C 错),捆扎过紧、时间过长易导致手指坏死;若捆扎压力不够,只将静脉阻断而动脉未完全阻断,出血会更加严重。

17. 答案:C

解析:输尿管结石(C 对)可引起肾绞痛或输尿管绞痛,典型的表现为疼痛剧烈难忍,阵发性发作,位于腰部或上腹部,并沿输尿管行径放射至同侧腹股沟,还可放射到同侧睾丸或阴唇。结石处于输尿管膀胱壁段,可伴有膀胱刺激症状及尿道和阴茎头部放射痛。

18. 答案:E

解析:慢性肾炎的治疗应以防止或延缓肾功能进行性恶化(E 对)、改善或缓解临床症状及防治心脑血管并发症为主要目的,而不以消除尿红细胞或轻度尿蛋白为目标。

19. 答案:D

解析:急性脑器质性障碍(急性脑病综合征)多以意识障碍(D 错,为本题正确答案)为主要特征。其特征包括:①意识障碍:为主要特征,有明显的昼夜节律变化,表现为昼轻夜重;②感知障碍:错觉(B 对)和幻觉,以视错觉和视幻觉(A 对)较常见;③注意障碍:注意涣散(C 对),表现为注意力不集中;④

定向障碍(E对):对周围环境与事物的觉察清晰度降低。

20. 答案:C

解析:乳牙萌出顺序一般为下颌先于上颌、自前向后,大多于3岁前出齐。

21. 答案:D

解析:硝酸盐还原试验:大肠埃希菌等革兰阴性细菌含硝酸盐还原酶,可使尿中的硝酸盐还原为亚硝酸盐,此法对诊断尿路感染有很高的特异性但敏感性较差。该试验需要尿中有定量硝酸盐存在,同时需要尿液在膀胱内有足够的停留时间,否则易出现假阴性。革兰阳性菌不含硝酸还原酶,所以为阴性。该方法可作为尿感的筛检试验。

22. 答案:B

解析:上尿路结石尿常规多为镜下血尿(B对)。全程无痛性血尿见于肾脏肿瘤或者输尿管肿瘤(A、E错)。终末血尿见于提示膀胱病变(D错)。初始血尿提示病变位于尿道(C错)。

23. 答案:D

解析:外阴阴道念珠菌病又称假丝酵母菌,其主要传播途径为内源性(D对)传染。假丝酵母菌除作为条件致病菌寄生阴道外,也可寄生于人的口腔、肠道,一旦条件适宜,这3个部位的假丝酵母菌可互相传染,称为内源性传染。少部分患者可通过性生活(E错)直接传染,极少通过间接性(C错)传染,不能通过血液(A错)和垂直传播。

24. 答案:B

解析:在临床上和生理实验中所使用的各种溶液,其渗透压与血浆渗透压相等,称为等渗溶液。浓度为0.9%的NaCl溶液为等渗溶液,红细胞悬浮于其中可保持正常形态和大小。5%GS为等渗溶液,10%GS为高渗液,故选B选项。

25. 答案:B

解析:内旋转:胎头为适应骨盆纵轴而旋转,使矢状缝与中骨盆及出口前后径相一致的动作称为内旋转。内旋转使胎头向前旋转45°内旋转动作从中

骨盆平面开始至骨盆出口平面结束,胎头在第一产程末完成内旋转动作。

26. 答案:B

解析:早期梅毒首选的治疗药物是青霉素(B对);孕期淋病首选的治疗药物是头孢曲松钠。

27. 答案:E

解析:子宫破裂时,产妇突感下腹一阵撕裂样剧痛,子宫收缩骤然停止,腹痛稍缓和后,待羊水、血液进入腹腔,又出现全腹持续性疼痛;腹壁下可清楚扪及胎体(E对);阴道检查可有鲜血流出,但量通常不多。病理性缩复环见于先兆子宫破裂,子宫破裂时病理性缩复环消失。

28. 答案:D

解析:有助于确定新生儿缺氧缺血性脑病损害严重程度和判断预后的检查首选脑电图(D对),新生儿缺氧缺血性脑病时脑电图可表现为脑电活动延迟(落后于实际胎龄)、异常放电,活动异常等。头颅CT(B错)、头颅MRI(C错)、颅脑超声检查(E错)都对新生儿缺氧缺血性脑病有辅助检查的价值,可以诊断损害和出血的部位等,但并不是新生儿缺氧缺血性脑病损害严重程度和判断预后的首选检查。新生儿缺氧缺血性脑病很少用到脑氢质子磁共振波谱进行检查(A错)。

29. 答案:D

解析:当某一感觉器官处于功能活动状态时,出现涉及另一感官的幻觉是反射性幻觉(D对)。功能性幻觉是一种伴随现实刺激而出现的幻觉,即当某种感觉器官处于功能活动状态时出现涉及该器官(A错)的幻觉,正常知觉与幻觉并存。内脏幻觉(B错)是患者身体内部某一部位或某一脏器虚幻的知觉体验。假性幻觉(C错)是存在于自己的主观空间内,不通过感觉器官而获得的幻觉。

30. 答案:E

解析:唐氏综合征患儿的特殊面容:出生时即有明显的特殊面容,表情呆滞,

睑裂小、眼距宽、双眼外眦上斜，可有内眦赘皮，鼻梁低平、外耳小、硬腭窄小，常张口伸舌，流涎多，头小而圆、前囟大且关闭延迟，颈短而宽，常呈嗜睡和喂养困难。智能落后：这是唐氏综合征最突出、最严重的临床表现。绝大部分患儿都有不同程度的智能发育障碍，随年龄的增长日益明显。嵌合体型患儿临床表现因嵌合比例以及 21 号染色体三体细胞在中枢神经中的分布不同而有很大差异，其行为动作倾向于定型化，抽象思维能力受损最大。生长发育迟缓：患儿出生的身长(E 错)和体重均较正常儿低，生后体格发育、动作发育均迟缓。

31. 答案:A

解析:热性惊厥多发生在热性疾病初期体温骤然升高时,70%以上与急性上呼吸道感染有关,其他伴发于发疹性疾病中耳炎、下呼吸道感染等疾病,但绝不包括颅内感染和各种颅脑病变引起的急性惊厥。

32. 答案:A

解析:短暂性脑缺血发作(TIA)是局部脑或视网膜缺血引起的短暂性神经功能障碍。发病无先兆,一般无意识障碍,可反复发作,每次持续数分钟,通常在 30 分钟内完全恢复,超过 2 小时常遗留轻微神经功能缺损表现或 CT 及 MRI 显示脑组织缺血征象,但一般在 24 小时内完全恢复,且无后遗症。

33. 答案:C

解析:尺神经在腕部损伤主要表现为环、小指“爪形手”畸形,夹纸试验阳性、Froment 征及手部尺侧半和尺侧一个半手指感觉障碍,肘上损伤除以上表现外还可出现环、小指末节屈曲功能障碍。

34. 答案:D

解析:由于苯丙氨酸是合成蛋白质的必需氨基酸,在儿童生长发育阶段,血苯丙氨酸浓度过高或者过低影响其神经系统发育,过度控制苯丙氨酸的摄入亦会导致损伤。故苯丙氨酸应按

每日 30~50mg/kg 适量给予以维持血中苯丙氨酸浓度在 0.12~0.6mmol/L(2~10mg/dl)。饮食控制至少需持续到青春期以后。

35. 答案:B

解析:颅脑对冲伤是指头部遭受外力时,发生在着力部位对侧的脑损伤。由于枕骨内面和小脑幕表面比较平滑,而颅前窝和颅中窝底凹凸不平,因此,在对冲伤中,脑损伤最常见于额、颞叶前部和底部(B 对)。

36. 答案:C

解析:育龄期女性患有高血压,阴茎套是较理想的避孕方法。正确使用避孕率高,达 93%~95%。阴茎套还具有防止性传播性疾病的作用,近年来受到全球重视。

37. 答案:C

解析:不协调性子宫收缩乏力处理原则为调节子宫不协调收缩,使其恢复正常节律性及极性。可给予哌替啶 100mg 或吗啡 10mg 肌内注射,经充分休息多可恢复为协调性子宫收缩(C 对)。

38. 答案:A

解析:胎盘大小和形态异常,均可发生前置胎盘。胎盘面积过大(D 对)而延伸至子宫下段,前置胎盘发生率双胎(B 对)较单胎高 1 倍。多次流产及刮宫(C 对)为子宫内膜损伤引发前置胎盘的常见因素。受精卵滋养层发育迟缓(E 对),当受精卵到达子宫腔后,滋养层尚未发育到可以着床的阶段,继续向下移动,着床于子宫下段而发育成前置胎盘。妊娠高血压综合征(A 错,为本题正确答案)是妊娠与血压升高并存的一组疾病,是胎盘早剥发生的高危因素,与前置胎盘的发生无关。

39. 答案:D

解析:正常足月儿肤色红润,皮下脂肪丰满,毳毛少(D 对)。皮肤稍黄,提示可能有新生儿黄疸;皮肤苍白,提示可能有晚期代谢性酸中毒;皮下脂肪少,易散热;棕色脂肪少,产热能力

差，寒冷时更易发生低体温，甚至硬肿症。皮肤苍白(A 错)、皮肤稍黄(E 错)、皮下脂肪少(B、C 错)均非正常足月儿的皮肤外观特点。

40. 答案:E

解析:筛查方法是用快速简便的实验检查或其他手段，是一种初步检查。对于前列腺癌的患者筛查最常用的方法是血清前列腺特异性抗原(PSA)检测(E 对)。直肠指检(D 错)可用于了解前列腺的形态、大小、硬度，表面是否光滑，有无结节与压痛，中央沟是否存在，但不能确诊前列腺癌。

41. 答案:B

解析:潜伏性感染又称潜在性感染。定义为病原体感染人体后寄生于某些部位，由于机体免疫力足以将病原体局限化而不引起显性感染(A 对)，但又不足以将病原体清除时，病原体便可长期潜伏起来，待免疫功能下降时，则可引起显性感染(E 对)。常见病原体有单纯疱疹病毒、水痘病毒(D 对)等。潜伏性感染并不是在每种传染病中都存在(C 对)。潜伏感染期间，病原体一般不排出体外(B 错，为本题正确答案)。

42. 答案:B

解析:分离性抽搐也称之为假性抽搐，一般和癫痫大发作的时候十分相似，但是不会出现咬舌以及大小便失禁等表现，也不存在意识丧失。而癫痫在大发作的时候一般患者会出现意识丧失以及大小便失禁甚至会出现咬舌的症状。所以这就是和癫痫大发作最大的区别。

43. 答案:D

解析:在创伤、手术后或感染时机体代谢的主要特点是代谢增高、蛋白质丢失增加、糖代谢紊乱、脂肪分解利用增加。重度感染及严重创伤后代谢率几乎增加 100%~200%，其程度与创伤感染程度成正比。此时由于体内类固醇、胰高血糖素和神经内分泌介质增加，蛋白质分解加速并持续时间长，因此骨骼肌的分解较单纯饥饿状态下更加

严重，造成病人负氮平衡。

44. 答案:E

解析:右室心梗后，导致右室收缩力下降，进入肺循环的血容量减少，继而出现左心低血容量，从而出现低血压。左室的心梗如果心肌梗死时间过长，心肌严重受损，可以导致血压降低甚至发生休克。右室心梗的血压低出现的更早，更明显。左室心梗硝酸甘油也不缓解。故关键的治疗措施是补充血容量，避免发生休克(E 对)。

45. 答案:B

解析:入睡前幻觉属于幻视觉(B 对)。

46. 答案:D

解析:神经症性障碍包括:恐怖性焦虑障碍、其他焦虑障碍、惊恐障碍、广泛性焦虑障碍、强迫障碍、严重应激反应和适应障碍、分离(转换)性障碍、躯体形式障碍、其他神经症性障碍、神经衰弱。

47. 答案:B

解析:不能喂养母乳时，配方奶粉应作为首选，它比普通的鲜奶具有更全面、更丰富的营养，可为缺乏母乳的婴儿提供较为全面、均衡的营养。

48. 答案:C

解析:思维形式障碍包括:①思维奔逸;②思维迟缓;③思维贫乏;④思维散漫(A 对);⑤病理性赘述(B 对);⑥思维中断;⑦思维被夺;⑧强制性思维;⑨思维不连贯;⑩思维化声(E 对);⑪语词新作(D 对);⑫象征性思维;⑬逻辑倒错性思维;⑭强迫思维。思维活动形式障碍:持续言语、刻板言语、重复言语、模仿言语。

49. 答案:B

解析:根据乳腺癌病期的早晚可出现不同的皮肤改变。一些部位潜在的早期癌即可侵犯乳房悬韧带使其挛缩，或肿瘤与皮肤粘连使皮肤外观凹陷，酷似酒窝，临床称为“酒窝征”。癌细胞堵塞皮下淋巴管，可出现皮肤水肿，呈“橘皮样变”。肿瘤侵入皮内淋巴管，可在肿瘤周围形成小癌灶，称为卫星

结节，如多数小结节成片分布，则形铠甲样变。晚期癌患者皮肤可出现完全固定甚至破溃，呈“菜花样”改变，经久不愈。

50. 答案:C

解析:神经症又名神经官能症，是一组主要表现为焦虑、恐惧、强迫、疑病症状或神经衰弱症状的精神障碍，几乎可以发生在任何一种精神疾病和一些躯体疾病中，包括神经衰弱、强迫症、焦虑症、恐怖症、躯体形式障碍等等，特异性较差(C对)。神经症具有一定的人格特质基础但非人格障碍(A错)。神经症起病急，病程不足3个月或仅有一次短暂发作。社会功能相对良好，患者一般能适应社会，其行为一般保持在社会规范容许的范围内，可以为他人理解和接受，但其症状妨碍了患者的心理功能或社会功能(E错)。

51. 答案:B

解析:小儿急性肾炎出现严重循环充血的治疗:严格限制水钠摄入，应以使用利尿剂和血管扩张剂为主。呋塞米静脉注射，每次1~2mg/kg，必要时4~8小时后可重复使用；硝普钠静脉滴注；必要时行透析治疗。

52. 答案:E

解析:清除胃肠道尚未被吸收的毒物常用催吐、洗胃、导泻、灌肠法。选项A、B、C、D正确。

53. 答案:D

解析:骨盆直肠间隙脓肿位置较深，空间较大，因此全身中毒症状严重而局部症状不明显。早期即可出现全身中毒症状，如寒战、高热、全身疲倦不适等。局部表现为直肠坠胀感，便意不尽，排尿困难等。B、E为肛周脓肿的特点，C为肛裂的特点。

54. 答案:B

解析:细菌性阴道病:胺臭味试验阳性。

55. 答案:B

解析:狭窄性腱鞘炎最常发生在中、环指，故选B选项。

56. 答案:B

解析:经锁骨下静脉置管易于活动和护理，主要并发症是气胸。经颈内静脉置管使转颈活动和贴敷料稍受限，局部血肿、动脉损伤及置管感染并发症稍多。经外周静脉至中心静脉置管(PICC):贵要静脉较头静脉宽、易置入，可避免气胸等严重并发症，但增加了血栓性静脉炎和插管错位发生率及操作难度。不宜采用的肠外营养途径为颈外静脉及股静脉(B对)，前者的置管错位率高，后者的感染性并发症高。

57. 答案:C

解析:一般认为，皮肤、黏膜出血点、紫癜等多为血管、血小板异常所致，而深部血肿、关节出血等则提示可能与凝血障碍等有关。

58. 答案:C

解析:脐带杂音为脐带血流受阻出现的与胎心率一致的吹风样低音响。

59. 答案:A

解析:臀先露分为单臀先露、完全臀先露(混合臀先露)和不完全臀先露(包括单足先露、单膝先露、双膝先露等)。臀位分娩最大的危害是围生儿死亡率明显升高，其原因是脐带脱垂。臀位的脐带脱垂发生率为4%~5%，为头位的10倍。单臀先露由于完全填满了宫颈口，脐带脱垂的发生率最低，仅1%左右；完全臀先露为2%~5%；不完全臀先露高达10%~18%。因此围产儿预后相对较好的臀先露是单臀先露。

60. 答案:D

解析:滴虫阴道炎是由阴道毛滴虫感染引起的阴道炎症。可经性交直接传播，男方通常无症状，但可作为携带者通过性交传播给女性，因此应同时治疗。

61. 答案:A

解析:继发性痛经进行性加重、子宫增大、质硬是子宫腺肌病的典型特点。

62. 答案:C

解析:吉兰-巴雷综合征首发症状常为四肢对称性无力，同时可有感觉障碍，

脑脊液检查典型改变是蛋白-细胞分离现象。

63. 答案:C

解析:正常成人的 REE(实际静息能量消耗)约为 $25\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$, 创伤、感染时视其严重程度 REE 可增加 $20\%\sim 30\%$ 不等, 只有大面积烧伤的才会增加 $50\%\sim 100\%$ 。通常的择期性手术增幅不大, 约为 10% 。故该胃癌患者术后每日需要的合理热量为 1650kcal 。

64. 答案:B

解析:颅中窝骨折累及蝶骨, 可有鼻出血或合并脑脊液鼻漏。累及颞骨岩部, 脑膜、骨膜、鼓膜均破裂时, 则合并有脑脊液耳漏。常合并第 VII、VIII 对脑神经损伤。根据患者伤后左耳漏、左耳听力下降及左鼻唇沟变浅(面神经部分受损), 应诊断为颅中窝骨折。

65. 答案:B

解析:患者病史为 7 年前到泰国打工, 7 年后出现腹泻, 肛周疱疹等。考虑是艾滋病感染后出现的机会性感染。血清 EBV IgM 抗体见于传染性单核细胞增多症; 纤维结肠镜检查适用于检查结肠内疑有息肉、肿瘤、溃疡、炎症、不明原因出血灶等病变; 血清 CMV IgM 抗体见于巨细胞病毒感染急性期。

66. 答案:D

解析:因为指头剧烈肿胀、跳痛, 应及时切开引流, 以免指甲、肌腱受感染侵蚀。切口纵形于患指节侧面, 不可在指面中线切开, 以免损及肌腱。

67. 答案:B

解析:关系妄想又称牵连观念、援引观念。患者坚信周围环境的各种变化和某些本来与他不相干的事物, 都与他有关系。该患者符合关系妄想的表现, 故选 B。

68. 答案:D

解析:(一)反复发作的喘息、气急、胸闷或咳嗽多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、病毒性上呼吸道感染、运动等有关。(二)发作时在双肺可闻及散在或弥漫性以呼气相为主

的哮鸣音呼气相延长。(三)上述症状可经治疗缓解或自行缓解。(四)除外其他疾病引起的喘息、气急、胸闷和咳嗽。(五)临床表现不典型者如无明显喘息或体征至少应有以下三项中的一项:①支气管激发试验或运动试验阳性;②支气管舒张试验阳性;③昼夜 PEF 变异率 $\geq 20\%$ 。符合 1~4 条或 4、5 条者可诊断为支气管哮喘。患儿反复咳嗽、喘息, 冬季明显加重, 尤以夜间及活动后为甚, 24 小时 PEF 24% , 且抗生素治疗无效, 符合支气管哮喘的诊断。

69. 答案:D

解析:妊娠早期女性出现心衰症状, 应控制心力衰竭后行人工流产。

70. 答案:D

解析:脑挫裂伤临床表现有:①意识障碍:少数范围局限的脑挫裂伤, 如果不存在惯性力所致的弥散性脑损伤, 可不出现早期意识障碍;②局灶症状与体征;③头痛、恶心和呕吐;④颅内压增高与脑疝。中间清醒期为硬脑膜外血肿临床表现。

71. 答案:A

解析:机械性肠梗阻:可见肠型、逆蠕动波、有压痛, 可触及肿块, 肠鸣音亢进等。麻痹性肠梗阻:主要为腹膨隆而无上述体征, 如肿瘤所致肠梗阻, 直肠指检可触及肿块。绞窄性肠梗阻:起病急骤, 易致休克, 有腹膜刺激征, 无肿物可及, 肠鸣音不亢进或消失。高位小肠梗阻症状以呕吐为主, 腹胀不明显, 腹部平片呈鱼骨刺样;低位性肠梗阻腹胀明显, 有多个气液平面, 呈阶梯状。

72. 答案:C

解析:新生儿败血症多数患儿表现为反应差, 精神较萎靡, 吃奶减少或不吃, 体温低或体温波动, 病理性黄疸, 呼吸急促、暂停、呻吟, 早产儿 B 族链球菌败血症有时主要表现为呼吸窘迫。

73. 答案:D

解析:患者左下腹肿块 5 年,子宫大小正常,左侧可触及 5×5×6cm 大小囊性肿物,可诊断为左侧卵巢囊肿,大便后突感左下腹持续性疼痛,说明发生左侧卵巢囊肿蒂扭转,应尽快手术治疗。

74. 答案:C

解析:根据患者症状及体征考虑为下肢静脉曲张。①非手术治疗:弹力绷带包扎或穿弹力袜避免过久增高腹压,仅能改善症状,适用于病变局限、程度轻者、妊娠妇女和不耐受手术者;②硬化剂注射和压迫法,利用硬化剂注入曲张静脉后引起的炎症反应使之闭塞。适用于少量、局限的病变或作为手术的辅助疗法;③手术治疗为根本的治疗方法。近年来,以静脉腔内激光、射频消融为代表的微创治疗手段已经逐渐替代传统手术成为静脉曲张治疗的主要手段。

75. 答案:D

解析:肛瘘的临床表现:①疼痛:多为隐痛不适。急性感染时,有较剧烈的疼痛;②瘘口排脓:瘘口经常有脓液排出,在脓液排出后,外口可以暂时闭合;当脓液积聚到一定量时,再次冲破外口排脓,如此反复发作;③发热:肛瘘引流不畅时,脓液积聚,毒素吸收可引起发热、头痛、乏力等表现;④肛周瘙痒:瘘口排出的脓液刺激肛周皮肤,使肛门部潮湿、瘙痒,久之可形成湿疹。

76. 答案:E

解析:桡动脉搏动触不到、手部发凉、皮肤苍白提示骨折伴血管损伤,应进行手术探查受损血管并修复,骨折复位内固定,加适当外固定。

77. 答案:C

解析:腰痛伴有坐骨神经痛是腰椎间盘突出症主要症状,疼痛为放射痛,可因咳嗽、打喷嚏、用力排便等使疼痛加重。

78. 答案:E

解析:体检 X 线示右上肺钙化灶,应首

选考虑肺癌等恶性病变,临床怀疑的肺癌病例应常规进行支气管镜检查,其主要目的是:①观察气管和支气管中的病变,并取得病理证据;②病灶准确定位,对制定手术切除范围、方式有重要意义;③发现可能同时存在支气管内原发癌。胸部 CT 只可定位,不能定性(B 错)。经胸穿刺活检适用于靠近周边的肿块,常规的痰细胞学或支气管镜等检查难以确诊的病例(C 错)。开胸活检一般不采用(D 错)。

79. 答案:D

解析:晨练时突发喘气、胸闷 1 小时,有端坐呼吸,口唇发绀,双肺叩诊过清音,呼吸音减弱,结合血气分析 PaO₂50mmHg, PaCO₂30mmHg,气胸诊断明确。

80. 答案:D

解析:水样便,无腥臭味,高度怀疑病毒性肠炎。侵袭性大肠杆菌肠炎大便为霉臭味;细菌性痢疾为黏液脓血便;真菌性肠炎大便呈豆腐渣样;金黄色葡萄球菌肠炎大便为腥臭味。

81. 答案:D

解析:肺炎支原体肺炎:①多见年长儿,近年来婴幼儿感染率增高;②常有发热,热型不定,热程 1~3 周;③刺激性咳嗽为本病突出表现,咯出黏稠痰,甚至带血丝;④本病特点之一是肺部体征不明显,体征与剧咳及发热等临床表现不一致;⑤本病特点之二是体征轻而 X 线改变明显且呈多样化。该患儿符合肺炎支原体的临床表现,抗生素治疗无效也有助于区别其他选项。

82. 答案:E

解析:急性输卵管炎和急性盆腔炎常有脓性白带和盆腔对称性的压痛,可伴有腰痛。宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛是盆腔炎性疾病的最低标准。

83. 答案:E

解析:无排卵性功能失调性子宫出血最常见的症状是子宫不规则出血,表现为月经周期紊乱,经期长短不一且出血量多少不一,时多时少。出血期

无下腹疼痛或其他不适，持续时间长或出血多者可导致贫血。黏膜下肌瘤时子宫呈均匀性增大，主要表现为经量增多、经期延长，严重时可致贫血。

84. 答案:B

解析:无明显自觉症状的小儿原发性肺结核治疗首选:异烟肼+利福平。

85. 答案:B

解析:慢性盆腔炎一般有急性盆腔炎史, A 不正确。卵巢肿瘤症状常表现为腹胀、腹部肿块及腹腔积液等, C 不正确。子宫腺肌病子宫呈均匀性增大或有局限性结节隆起, 质硬而有压痛, D 不正确。凡育龄妇女有继发性痛经进行性加重和不孕史, 盆腔检查扪及内有触痛性结节或子宫旁有不活动囊性包块, 即可初步诊断为子宫内膜异位症。故 B 正确。

86. 答案:C

解析:水痘皮疹特点:斑疹、丘疹、水疱疹和结痂疹同时存在(“四世同堂”)。

87. 答案:C

解析:冬季出生, 日照不足, 使内源性合成的维生素 D 的含量显著不足; 人工喂养的婴儿, 因为牛奶中的钙磷比例不合适, 磷过高影响钙的吸收; 未及时添加辅食, 可引起维生素 D 不足。4 个月, 颅骨软化、烦躁、夜间哭闹不安、多汗均为佝偻病初期特点。

88. 答案:C

解析:Dugas 征阳性提示肩关节脱位, 肩关节脱位的典型畸形为方肩。

89. 答案:E

解析:热性惊厥是小儿惊厥最常见的原因, 多由上呼吸道感染引起, 约 1/3 有阳性家族史。单纯型高热惊厥其特点是:①多在 6 个月至 5 岁之间发病, 有显著遗传倾向, 发作前后小儿情况良好; ②发作前均有发热, 常为 38.5~40℃, 多在发热初起体温上升时发作; ③以全身性发作为主, 一般不超过 10 分钟; ④每次发热过程一般仅有 1 次惊厥; ⑤发作前后, 神经系统无异常。

90. 答案:D

解析:强迫障碍:患者担心、害怕的对象是自己的强迫观念或行为, 非客观现实中的客体或处境, 同时具有强烈的控制意愿, 明显的强迫观念或行为, 但回避行为不明显。恐惧症的控制愿望并不强烈, 回避行为突出。

91. 答案:D

解析:两周岁以前的婴儿, 月数减 4~6。该小儿已有乳牙 2 枚, 故月数 = 2 + (4~6), 判断该小儿 6~8 个月。小于 6 月龄婴儿体重(kg) = 出生体重 + 月龄 × 0.7kg; 7~12 月龄婴儿体重(kg) = 6 + 月龄 × 0.25kg。此小儿的年龄最可能是 6 个月(D 对)。

92. 答案:B

解析:坐骨棘平面是判断胎头下降高低的标志, 胎头颅骨最低点平坐骨棘平面时以“0”表达; 坐骨棘水平以上为“-”; 坐骨棘以下为“+”。

93. 答案:B

解析:肾病综合征应具备 4 大特征。①大量蛋白尿:定性(+++)~(++++) , 持续 2 周以上; 定量 50mg/(kg·d), 2 周内 3 次; ②低白蛋白血症:血浆白蛋白 30g/L(或 ≤25g/L); ③高脂血症:血浆总胆固醇 >5.7mmol/L; ④不同程度水肿:多呈凹陷性, 可轻可重。上述四项中以大量蛋白尿和低白蛋白血症为必备诊断条件。患儿符合肾病综合征的诊断。

94. 答案:B

解析:口唇呈樱桃红色, 为一氧化碳中毒的特征性体征, 故答案为 B。

95. 答案:B

解析:“方颅、肋串珠、手足镯, 血清钙和血磷下降, 血清碱性磷酸酶升高”都是维生素 D 缺乏性佝偻病的临床表现, 故选 B。

96. 答案:A

解析:体外冲击波治疗(ESWL)适用于肾、输尿管上段 ≤2cm 的结石, 具有正常肾功能, 碎石成功率可达 90%左右(A 对)。非手术治疗适用于结石 <0.6cm,

光滑，无梗阻及感染、纯尿酸结石或胱氨酸结石。经皮肾镜取石或碎石术适用于 $\geq 2.0\text{cm}$ 的肾盂结石，部分肾盏结石及鹿角形结石。对结石远端尿路梗阻、肾内残余结石或结石质硬、复发结石、有活跃代谢性疾病及需再次手术者尤为适宜。

97. 答案:D

解析:子宫肌瘤红色样变:多见于妊娠期或产褥期,可有急性腹痛、发热、肌瘤迅速增大等临床表现。题目所给患者症状符合子宫肌瘤红色样变的临床表现,故选择D。

98. 答案:C

解析:咳嗽、低热1个月,卡介苗接种瘢痕阳性考虑肺结核,原发型肺结核儿童多见。

99. 答案:B

解析:抑郁症临床表现为抑郁发作。目前认为抑郁症的核心症状包括情绪低落、兴趣缺乏、快感缺失和易疲乏,可伴有多种躯体不适症状,食欲减退,睡眠障碍,自杀观念和行为等。

100. 答案:D

解析:丹毒的临床表现为起病急,局部出现界限清楚之片状红疹,颜色鲜红,并稍隆起,压之褪色。皮肤表面紧张炽热,迅速向四周蔓延,右小腿烧灼样痛是由A组乙型溶血性链球菌所致的急性真皮炎症。

101. 答案:B

解析:本例应诊断为产后大出血休克所致垂体缺血坏死,临床称为Sheehan综合征,属于垂体性闭经。

102. 答案:C

解析:根据患儿的临床表现考虑诊断为蛋白质-能量营养不良。蛋白质-能量营养不良是由于缺乏能量和(或)蛋白质所致的一种营养缺乏症,主要见于3岁以下婴幼儿,特征为体重不增、体重下降、渐进性消瘦或水肿、皮下脂肪减少或消失,常伴全身各组织脏器不同程度的功能低下及新陈代谢失常。其可并发自发性低血糖(C对),可

突然表现为面色灰白、神志不清、脉搏减慢、呼吸暂停、体温不升但无抽搐。若诊治不及时,可危及生命。

103. 答案:B

解析:患者害怕到人多的地方,符合特定恐惧的特点,符合恐惧症的诊断。

104. 答案:B

解析:等渗性缺水是由于消化液或体液急性丢失(呕吐、肠痿、肠梗阻、烧伤、腹腔感染),大量放胸、腹水,是外科病人最易发生的水和钠代谢紊乱。可表现为:恶心、呕吐,乏力、少尿,但不口渴,皮肤干燥、眼窝凹陷;体液丧失量达到体重的5%时出现脉搏细速、肢端湿冷、血压不稳定或下降达体重的6%~7%可休克(B对)。低渗性缺水是由于消化液或体液慢性丢失(慢性肠梗阻、长期胃肠减压、大创面慢性渗液)导致。高渗性缺水是由于水分摄入不足(食管癌)或丧失过多(大量出汗、糖尿病昏迷、溶质性利尿、尿崩症、大面积烧伤)。

105. 答案:D

解析:二尖瓣狭窄伴房颤易形成左房附壁血栓,可以形成体循环栓塞(D对)。

106. 答案:C

解析:癫痫的部分运动性发作,主要表现为单侧的面部或者单侧的肢体发作性抽搐,每次发作几分钟或十几分钟不等,没有意识障碍,没有自动症。该患者符合部分运动性发作的表现(C对)。

107. 答案:B

解析:①急性硬脑膜外血肿的典型意识障碍表现为受伤—昏迷—清醒—再次昏迷。患者头部受伤后出现中间清醒期,头痛、躁动、轻度颈抵抗,应诊断为急性硬脑膜外血肿(B对);②急性硬脑膜下血肿和脑内血肿常表现为伤后持续昏迷,无中间清醒期。蛛网膜下腔出血的常见病因为颅内动脉瘤,而不是脑外伤,常表现为一侧动眼神经麻痹、偏瘫、视力障碍等。脑膜炎主要表现为发热、脑膜刺激征等,无

头部外伤史。

108. 答案:D

解析:乙肝病史 10 年+凝血酶原活动度 <40%, 考虑诊断为:重型乙肝。病史如此之长, 肯定是慢性的(D 对)。

109. 答案:A

解析:患者生命体征较平稳, 应进行严密观察, 观察期间还应进行积极补充血容量, 防止休克(A 对); 禁用或慎用止痛剂, 以免掩盖伤情(D 错)。

110. 答案:D

解析:题干“4 个月的患儿”“大便无脓血”“食欲佳、精神好”提示生理性腹泻。孩子胃肠功能尚未发育成熟或是过敏性体质而导致腹泻。多见于 6 个月以内母乳喂养的有过敏体质的婴儿。这些孩子外观常显得比较虚胖, 并且脸部常有湿疹, 出生后不久就出现稀水样大便, 伴有奶瓣或少许透明黏液, 或有酸味, 但无臭味, 大便每天多达 7~8 次。孩子除大便次数多不成形外, 无其他不适, 精神好, 食欲佳, 体重照常增长。生理性腹泻一般不影响孩子的发育, 不需要治疗, 随着月龄的增长, 按时添加泥糊状食品, 大便就能逐渐转为正常。

111. 答案:B

解析:骨折线跨过脑膜中动脉易造成急性硬膜外血肿(B 对)。

112. 答案:B

解析:自然破膜后胎心率立刻减慢是脐带脱垂的典型表现, 因胎头压迫脐带, 导致胎儿缺血缺氧。

113. 答案:C

解析:患者急性起病, 主要表现为四肢无力, 查体:四肢肌力 2 级, 肌张力低, 腱反射消失, 病理征未引出, 无明显感觉障碍, 双侧腓肠肌握痛, 吉兰-巴雷综合征可能性大。重症肌无力起病较慢, 有病态疲劳性、每日波动性特点。周期性瘫痪过去有发作史, 无脑神经损害。急性脊髓灰质炎起病多有发热, 肌肉瘫痪多为节段性, 可不对称。多发性肌炎以对称性近端进行性

肌无力为主要表现。

114. 答案:D

解析:高渗性缺水病因有:①摄入水分不够, 如食管癌致吞咽困难, 重危患者的给水不足, 经鼻胃管或空肠造口管给予高浓度肠内营养溶液等; ②水分丧失过多, 如高热大量出汗(汗中含氯化钠 0.25%)、大面积烧伤暴露疗法、糖尿病未控制致大量尿液排出、尿崩症、溶质性利尿药利尿等。

115. 答案:B

解析:新生儿败血症出血倾向表现为:皮肤黏膜瘀点、瘀斑、针眼处渗血不止、消化道出血、肺出血等。Rh 溶血病多在生后 24h 内出现黄疸, 迅速加重, 胆红素上升很快; 肝脾大。血小板减少性紫癜:①至少 2 次化验检查血小板计数减少; ②脾脏一般不增大; ③骨髓巨核细胞增多或正常, 伴有成熟障碍; ④需排除继发性血小板减少症。该患儿呕血 1 次, 皮肤可见数个出血点, 脐带端少许渗血, 血小板 $100 \times 10^9/L$, 符合新生儿败血症的诊断, 故选 B。

116. 答案:D

解析:爪形手畸形提示尺神经损伤。拇指对掌功能丧失提示正中神经损伤, 故选 D。桡神经损伤时, 表现为垂腕, 伸拇、伸指障碍。

117. 答案:B

解析:腕关节屈曲、手背着地受伤是 Smith 骨折的典型受伤机制。

118. 答案:A

解析:坐位、膝前受较大外力, 髌剧痛, 功能受限, 出现屈曲、内收、内旋畸形, 应诊断为髌关节后脱位。髌关节后脱位时, 向后脱出的股骨头可挫伤或压迫坐骨神经, 可能导致坐骨神经损伤。

119. 答案:E

解析:患者 3 年前在国外有输血史, 3 个月来出现颈部、腹股沟淋巴结肿大, 并伴有腹泻及体重下降症状, 考虑 HIV 感染, 应进行抗 HIV+CD4+T 细胞计数

确诊。

120. 答案:D

解析:1 岁男孩。生长落后、智能发育迟缓。刚会独坐,不会站立(儿童期运动发育图 11~12 个月自己会站立)。查体:身长 60cm(1 岁时身高约 75cm),表情呆滞,眼裂宽,鼻梁低平,眼外眦上斜,四肢短,手指短粗,小指内弯,四肢肌张力低下(21-三体综合征典型临床表现),本患者诊断为唐氏综合征(21-三体综合征)(D 对)。先天性甲状腺功能减退症(A 错)常为过期产,根据典型临床表现和甲状腺功能测定确诊。蛋白质-能量营养不良(B 错)特征为体重不增、体重下降、渐进性消瘦等,常伴有营养摄入不足、消化吸收不良、急慢性疾病消耗等病因。维生素 D 缺乏性佝偻病(E 错)多为骨软化、方颅、鸡胸等骨骼畸形临床表现。苯丙酮尿症(C 错)苯丙氨酸羟化酶活性降低,患儿黑色素合成不足,头发由黑变黄,有鼠尿臭味等表现。

121. 答案:D

解析:女性患者 31 岁,产后 5 个月(绒毛膜癌多继发于非葡萄胎妊娠),哺乳期阴道不规则流血半月余,胸闷、咳嗽 10 天(肺转移的典型表现)。妇科检查:宫颈前唇有一个 2cm×1cm×1cm 的紫蓝色结节(阴道转移表现),子宫如 50 天妊娠大小(子宫复旧不全或不均匀增大),质软无压痛。双侧附件区各触及囊性包块,均约 6cm×5cm×5cm 大小,表面光滑(卵巢黄素化囊肿)。胸 X 线片示双肺中下部多发棉絮状阴影(肺转移表现)。根据患者的临床表现首先考虑诊断为绒毛膜癌(D 对)。侵蚀性葡萄胎只能继发于葡萄胎妊娠(A 错)。胎盘残留无转移灶表现(B 错)。肺癌主要表现为呼吸系统的症状(C 错)。卵巢肿瘤早期无明显症状,晚期表现为腹胀、腹部肿块、腹腔积液等症状(E 对)。

122. 答案:D

解析:HCG 水平是诊断妊娠滋养细胞肿瘤的主要诊断依据,故本题选 D。

123. 答案:D

解析:绒毛癌首选的治疗方案是化学治疗,故本题选 D。

124. 答案:D

解析:患者青年男性,突然意识不清(发作突然),跌倒,全身强直数秒钟后抽搐,咬破舌,2 分钟后抽搐停止(短暂性),醒后活动正常。考虑诊断为癫痫(D 对)全面强直-阵挛发作。脑出血(A 错)常表现为对侧偏瘫、偏身感觉缺失和同向性偏盲等。脑血栓形成(B 错)和脑栓塞(E 错)发作一般会有肢体麻木、无力等前驱症状,会出现三偏症状、失语、人格改变等脑血管缺血表现,会有不同程度的后遗症。蛛网膜下腔出血(C 错)会有典型的头痛、脑膜刺激征和眼部症状。

125. 答案:B

解析:癫痫是由于脑部神经元异常放电引起,脑电图(B 对)可以检出异常放电的部位,因而是诊断癫痫最重要的辅助检查方法。头颅 X 线片(A 错)只能检查颅骨器质性损害,不用于癫痫的检查。癫痫患者的脑脊液检查(C 错)通常是正常的。脑血管造影(D 错)和经颅超声多普勒(E 错)多用于辅助诊断脑血管疾病,对诊断癫痫意义不大。

126. 答案:E

解析:目前癫痫治疗以抗癫痫药物(E 对)治疗为主,可以控制或最大限度减少发作次数,使患者保持或恢复其原有的生理、心理和社会功能状态,长期治疗无明显不良反应。癫痫患者无颅内压增高、无血栓形成、无出血表现,无需使用降颅压药(A 错)、溶栓治疗(B 错)、止血药(C 错)。血压升高为继发性暂时性的,间歇期血压正常,不用扩血管药(D 错)降压。

127. 答案:C

解析:双相障碍的临床特点是反复(至少两次)出现心境高涨、精力充沛和活动增加(躁狂或轻躁狂)或心境低落、精力减退和活动减少(抑郁)。发作间期通常以完全缓解为特征。该患者符

合双相情感障碍表现，故选 C。

128. 答案:E

解析:双相障碍不论其为何种临床类型，都必须以心境稳定剂为主要治疗药物，首选锂盐(碳酸锂)，故选 E。

129. 答案:A

解析:头颅 CT 检查示左基底节区高密度阴影提示基底节区出血，故选 A。

130. 答案:A

解析:根据患者症状及体征，考虑因基底节区出血造成颅内压升高引发脑疝，首要措施应静滴甘露醇降低颅内压(A 对)。

131. 答案:D

解析:足月新生儿身长约 50cm; 1 岁时约 75cm; 2 岁时身长约 87cm; 2 岁后 12 岁前平均每年增长 6~7cm。

132. 答案:C

解析:出生时头围约 34cm; 1 岁约 46cm; 2 岁约 48cm; 5 岁约 50cm; 15 岁约 54~58cm。

133. 答案:B

解析:胆源性肝脓肿感染的病原菌以大肠埃希菌为主，其次为厌氧性链球菌。

134. 答案:C

解析:急性乳腺炎是一种常见的乳房急性化脓性的感染，最常见的致病菌为金黄色葡萄球菌。

135. 答案:A

解析:地西洋为苯二氮草类抗焦虑药，具有抗焦虑、镇静、催眠、抗惊厥、抗癫痫及中枢性肌肉松弛作用。小儿热性惊厥的止惊治疗首选地西洋。

136. 答案:A

解析:癫痫持续状态首选安定(地西洋)，静脉给予安定(地西洋)是治疗癫痫持续状态的最有效的药物。

137. 答案:A

解析:口服降糖药格列喹酮的主要不良反应是低血糖。

138. 答案:C

解析:阿卡波糖属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂类降糖药，其中最常见的不良反

应为胃肠道反应。

139. 答案:A

解析:初乳是乳腺在妊娠最后几个星期积存的分泌物和在雌性激素与黄体酮作用下从血液转移来的蛋白质的混合物。初乳富含 IgG 和 IgA，并且也含有一些 IgM 和 IgE。初乳的主要免疫球蛋白是 IgG，约占其全部免疫球蛋白的 60~90%。

140. 答案:B

解析:乳汁中脂肪含量最高的是过渡乳。

141. 答案:D

解析:对急性肾盂肾炎患者应选用血、尿药物浓度均高的药物。常用药物有喹诺酮类、头孢菌素类及半合成青霉素类，重症患者可两类药物如半合成青霉素与头孢菌素类合用。多采用静脉给药。治疗持续两周或更长(D 对)。

142. 答案:C

解析:妊娠妇女、老年患者、糖尿病患者、机体免疫力低下及男性患者推荐 7 日疗法(C 对)治疗急性膀胱炎。

143. 答案:E

解析:短暂性脑缺血发作头颅 CT 检查无异常发现。

144. 答案:A

解析:脑出血:头颅 CT 检查提示脑实质内高密度病灶(A 对); 脑栓塞:头颅 CT 一般显示低密度病灶; 脑血栓形成是脑梗死的一种，在 CT 上也是表现为梗死部位上的低密度影; 蛛网膜下腔出血头颅 CT 主要是蛛网膜下腔的高密度影，常见的有大脑外侧裂池、前纵裂池、鞍上池、桥脑小脑角池、中脑环池，以及后纵裂池的高密度影。

145. 答案:B

解析:嫉妒妄想又称不贞妄想。患者坚信自己的爱人对他不忠实而另有外遇，因而跟踪或监视其爱人的活动。主要是指认为配偶或性伴侣不贞的妄想，往往会伴随着激动情绪，甚至攻击行为。该患者属于嫉妒妄想，故选 B。

146. 答案:C

2020 年临床助理历年真题

解析:关系妄想又称牵连观念、援引观念。患者坚信周围环境的各种变化和 一些本来与他不相干的事物,都与他有关系。别人的谈话,无线电广播、报纸上的文章和消息是针对他而发的;别的人咳嗽、吐痰是表示轻视他等。该患者属于关系妄想,故选 C。

147. 答案:A

解析:安静时细胞两侧存在电位差的状态,称为极化。

148. 答案:B

解析:细胞受刺激兴奋时,膜电位负值减小,称为去极化。

149. 答案:A

解析:婚前医学检查的主要疾病包括:
①严重遗传性疾病; ②指定传染病(A 对); ③有关精神病; ④其他与婚育有关的疾病,如心、肝、肾、肺等重要脏器疾病、糖尿病以及生殖系统发育障碍或畸形等。

150. 答案:C

解析:母婴保健技术服务主要包括:①有关母婴保健的科普宣传、教育和咨询; ②婚前医学检查; ③产前诊断和遗传病诊断; ④助产技术; ⑤实施医学上需要的节育手术; ⑥新生儿疾病筛查(C 对); ⑦有关生育、节育、不育的其他生殖保健服务。

第一单元

A1/A2 型选择题

1. 胆固醇体内代谢的主要去路是在肝中转化为

- A. 乙酰 CoA
- B. NADPH
- C. 维生素 D
- D. 类固醇
- E. 胆汁酸

2. 豆类食物中含蛋白质最高的是

- A. 豌豆
- B. 大豆
- C. 绿豆
- D. 蚕豆
- E. 豆浆

3. 体内氨的主要去路是

- A. 合成谷氨酰胺
- B. 合成尿素
- C. 生成铵盐
- D. 生成非必需氨基酸
- E. 参与嘌呤、嘧啶合成

4. 流行病学研究的三种基本方法包括

- A. 观察法、实验法和数理法
- B. 描述性研究、病例对照研究和队列研究
- C. 描述性研究、实验研究和数学模型
- D. 病例对照研究、队列研究和实验研究
- E. 现况研究、病例对照研究和实验研究

5. 流行病学的基本原则不包括

- A. 群体原则
- B. 现场原则
- C. 对比原则
- D. 隔离原则
- E. 代表性原则

6. 我国社会主义医德基本原则的基本手段是

- A. 防病治病，救死扶伤
- B. 医学人道主义
- C. 全心全意
- D. 为人民健康服务

E. 尊重人格尊严

7. 我国导致胰腺炎的主要病因是

- A. 胆囊结石
- B. 胆囊息肉
- C. 胆汁瘀滞
- D. 胆囊缺血
- E. 胆道蛔虫

8. 短期保存蛋白质的方法是

- A. 用缓冲液溶解后 4℃ 保存
- B. 硫酸铵溶液中将蛋白沉淀后 4℃ 保存
- C. 在液氮中冷冻后 -80℃ 保存
- D. 常温保存
- E. 用缓冲液溶解后 0℃ 保存

9. 直接影响活动效率，使活动得以顺利完成的个性心理特征是

- A. 兴趣
- B. 习惯
- C. 能力
- D. 人
- E. 气质

10. 卵巢浆液性囊腺癌最常用的肿瘤标记物是

- A. 血清 β -hCG
- B. 血清雌激素
- C. 血清 CA125
- D. 血清 AFP
- E. 血清雄激素

11. 急性感染性心内膜炎主要致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎球菌
- C. 淋球菌
- D. 流感杆菌
- E. A 族链球菌

12. 两样本均数比较的 t 检验，差别有统计学意义时，P 越小说明

- A. 两总体均数的差别不大
- B. 两总体均数的差别越大
- C. 越有理由认为两总体均数的差别很大
- D. 越有理由认为两样本均数不同
- E. 越有理由认为两总体均数不同

13. “无论是致病、治疗，还是预防和康复都应把人视为一个整体，需要考虑各方面因素的交互作用，而不能机械地将他们分割开”。此观点所反映的医学模式是

- A. 自然哲学的医学模式
- B. 生物—心理—社会医学模式
- C. 神灵主义的医学模式
- D. 机械论医学模式
- E. 生物医学模式

14. 诊断门静脉高压侧支循环开放最有意义的体征是

- A. 食管胃底静脉曲张
- B. 腹壁静脉曲张
- C. 脐周静脉曲张
- D. 颈静脉怒张
- E. 痔静脉扩张

15. 对于贫血患者需要多次输血者，应选择的是

- A. 全血
- B. 红细胞+血浆
- C. 浓缩红细胞
- D. 冰冻红细胞
- E. 半浆血

16. 最容易导致上肢缺血性肌挛缩的骨折是

- A. 肱骨髁粉碎骨折
- B. Colles 骨折
- C. 尺骨鹰嘴骨折
- D. 桡骨小头骨折
- E. 肱骨髁上骨折

17. 以下各项中不适合采取一级预防的是

- A. 糖尿病
- B. 病因不明确疾病
- C. 脑卒中
- D. 职业病
- E. 心血管疾病

18. 伸直型肱骨髁上骨折，常见的并发症是

- A. 肱骨下端缺血性坏死
- B. 血管神经损伤
- C. 骨折局部感染

- D. 脂肪栓塞
- E. 损伤性休克

19. 休克代偿期表现不包括

- A. 血压下降
- B. 兴奋
- C. 过度通气
- D. 烦躁
- E. 舒张压升高

20. 遇到突发公共卫生事件时，个人利益将服从社会利益，这属于

- A. 全社会参与原则
- B. 社会公益原则
- C. 社会公正原则
- D. 互助协同原则
- E. 信息公开原则

21. 医疗机构从业人员的职业价值目标是

- A. 大医精诚
- B. 以患者为中心
- C. 人道行医
- D. 为人民健康服务
- E. 救死扶伤

22. 气性坏疽的临床特点是

- A. 局部胀痛不明显
- B. 病情发展缓慢
- C. 感染较局限
- D. 进行性肌肉坏死有血性分泌物恶臭
- E. 靠抗生素可控制住感染

23. 支气管哮喘发作时典型的临床体征是

- A. 咳嗽
- B. 两肺布满哮鸣音
- C. 胸闷
- D. 呼气相缩短
- E. 反复喘息

24. 确诊消化性溃疡首选的检查方法是

- A. B 超
- B. X 线
- C. 幽门螺旋杆菌检测
- D. 胃镜
- E. 胃液分析

2021 年临床助理历年真题

25. 在流行病学的病例对照研究中, 选择对照的最佳条件是

- A. 产生病例人群中的非患者, 其他非研究因素和特征与病例组有可比性
- B. 产生病例人群中非病例的一个非随机样本
- C. 产生病例人群中的非患者, 其他非研究因素与病例组相同
- D. 未患所研究疾病的人
- E. 未患所研究疾病的人, 其他非研究因素与病例组有可比性

26. 溶血性黄疸的特点是

- A. 血中结合胆红素增高
- B. 血中胆素原增加
- C. 尿中胆红素增加
- D. 血中游离胆红素浓度增加
- E. 粪便颜色变浅

27. 容易见到角化珠的癌可以确定为

- A. 移行细胞癌
- B. 基底细胞癌
- C. 分化好的鳞癌
- D. 分化差的鳞癌
- E. 分化差的腺癌

28. 医生劝患者“你应该参加一些晨间锻炼”这种医患关系属于

- A. 主动-被动型
- B. 指导-合作型
- C. 共同参与型
- D. 强制-被动型
- E. 指导-参与型

29. 对乙酰氨基酚用于治疗

- A. 急性痛风
- B. 类风湿性关节炎
- C. 急性风湿热
- D. 感冒发热
- E. 预防血栓形成

30. 疫苗接种记录保存年限不少于

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

31. 在临床上多发性骨髓瘤的突出症

状是

- A. 骨骼疼痛
- B. 不规则发热
- C. 广泛性出血
- D. 反复感染
- E. 贫血

32. 对鉴别是否肾小球源性血尿最有意义的是

- A. 全程血尿
- B. 合并尿道刺激征
- C. 尿潜血阳性
- D. 肉眼血尿
- E. 变性红细胞尿

33. 高血压可以引起左心室的心肌细胞

- A. 再生
- B. 化生
- C. 肥大
- D. 增生
- E. 变性

34. 具有价格昂贵, 极易耐药的抗菌药物处方权的是

- A. 住院医师
- B. 主治医师
- C. 主任医师
- D. 医院院长
- E. 执业药师

35. 骨筋膜室综合征多见于

- A. 上臂
- B. 腰部
- C. 大腿
- D. 小腿
- E. 背部

36. 狼疮性肾炎的特征性病理改变是

- A. 内皮细胞增生
- B. 苏木紫小体
- C. 上皮细胞增生
- D. 中性粒细胞浸润
- E. 血小板浸润

37. 甲状腺危象的治疗, 首先选用的药物是

- A. 甲硫氧嘧啶
- B. 甲巯咪唑

- C. 卡比马唑
- D. 普萘洛尔
- E. 丙硫氧嘧啶

38. 引起急性尿潴留最常见的病因是

- A. 膀胱结石
- B. 膀胱肿瘤
- C. 尿道狭窄
- D. 外伤性脊柱损伤
- E. 良性前列腺增生

39. 腹外疝最常见的疝内容物是

- A. 小肠
- B. 盲肠
- C. 大网膜
- D. 阑尾
- E. 膀胱

40. 当处方遇有特殊情况需要修改时，可由

- A. 药房划价人员修改并签字
- B. 药房调配人员修改并签字
- C. 处方医师修改并签字
- D. 患者修改并签字
- E. 任何医师都可修改

41. 单纯性髋关节后脱位首选的治疗方法是

- A. Allis 法
- B. Hippocrates 法
- C. 骨牵引
- D. 皮牵引
- E. 手术切开复位

42. 关于普鲁卡因作用表述正确的是

- A. 为全身麻醉药
- B. 可用于表面麻醉
- C. 穿透力较强
- D. 主要用于浸润麻醉
- E. 不用于传导麻醉

43. 中医典籍中有“天人合一”“天人相应”的观点。该观点所反映的医学模式为

- A. 神灵主义医学模式
- B. 整体医学模式
- C. 生物医学模式
- D. 生物-心理-社会医学模式
- E. 自然哲学医学模式

44. 右心衰时引起下肢水肿的最主要原因是

- A. 毛细血管压升高
- B. 淋巴回流受阻
- C. 血浆胶体渗透压降低
- D. 组织静水压降低
- E. 组织液胶体渗透压升高

45. 传染病的诊断依据

- A. 临床症状，体检，生化检查
- B. 临床资料，流行病学资料，实验室检查
- C. 临床资料，疫苗注射情况，实验室检查
- D. 临床症状，流行病学资料，病原学检查
- E. 流行病学的检查，病原学

46. 强心苷治疗心房纤颤的机制主要是

- A. 缩短心房有效不应期
- B. 减慢房室传导
- C. 抑制窦房结
- D. 直接抑制心房纤颤
- E. 延长心房不应期

47. 慢性右心衰竭时最早出现的临床表现是

- A. 上腹胀满
- B. 颈静脉充盈和怒张
- C. 肝大
- D. 对称性下肢凹陷性水肿
- E. 腹水

48. 膀胱肿瘤最常见的组织学类型是

- A. 鳞状细胞癌
- B. 腺癌
- C. 腺鳞癌
- D. 尿路上皮癌
- E. 未分化癌

49. 临床按颈动脉窦治疗阵发性室上性心动过速的直接作用是

- A. 心交感神经冲动增多
- B. 交感缩血管纤维冲动增多
- C. 心迷走神经冲动增多
- D. 窦神经冲动增多
- E. 交感舒血管纤维冲动增多

50. 慢性粒细胞白血病治疗首选的药物是

- A. 伊马替尼
- B. 阿糖胞苷
- C. 白消安
- D. 羟基脲
- E. α -干扰素

51. 慢性阻塞性肺疾病急性加重期常见的致病菌是

- A. 肺炎链球菌
- B. 卡他莫拉菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 金黄色葡萄球菌

52. 骨巨细胞瘤的典型 X 线表现是

- A. 葱皮样骨膜反应
- B. 骨质破坏死骨形成
- C. 日光放射状骨膜反应
- D. 肥皂泡样骨质反应
- E. 干骺端圆形边界清楚的溶骨性病灶

53. 诊断慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 的首选检查是

- A. 血常规
- B. 胸部 X 线平片
- C. 动脉血气分析
- D. 肺功能检查
- E. 胸部 HRCT

54. 颅底骨折通常的诊断依据是

- A. 脑脊液鼻、耳漏
- B. 头痛伴呕吐
- C. 偏瘫
- D. 头皮血肿
- E. 昏迷

55. 某中年人, 童年生活受挫折, 个性克制, 情绪压抑, 经常焦虑抑郁, 又不善于宣泄, 过分谨慎, 强求合作调和。他的行为模式最容易患的躯体疾病是

- A. 冠心病
- B. 脑出血
- C. 慢性结肠炎
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 癌症

56. 男孩, 5 岁, 喜欢啃指甲。家人带其到心理门诊寻求帮助, 心理治疗师指导其每当出现该想法时就用力拉弹手腕上的橡皮筋, 使其产生疼痛, 从而逐步消除其强迫症状。这种治疗方法属于

- A. 厌恶疗法
- B. 系统脱敏疗法
- C. 习惯转换法
- D. 冲击疗法
- E. 代币疗法

57. 患者, 男, 35 岁。现场急救发现血压 80/50mmHg, 皮肤潮红, 口唇樱桃红, 四肢无青紫。该患者的最有效的处理措施是

- A. 建立静脉通道
- B. 输液抗休克
- C. 高压氧舱治疗
- D. 就地心肺复苏
- E. 面罩吸氧

58. 患者, 男, 48 岁。反复发热、咳嗽、气促 2 年。查体: T37.8°C, 肺部可闻及固定的中细湿啰音。胸部 X 线片示支气管柱状扩张。该患者最可能的诊断是

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管扩张
- C. 肺脓肿
- D. 肺结核
- E. 肺癌

59. 患者, 男, 59 岁。高血压病史 10 年, 近 1 月来频繁出现突发性晕厥, 疑为脑出血所致, 最可能的出血部位是

- A. 脑干
- B. 脑室
- C. 脑桥
- D. 基底节
- E. 丘脑

60. 患者, 男, 20 岁。意外被钝器撞伤右上腹部 1 小时来诊, 查体: T37.5°C, 脉搏 110 次/分, BP90/60mmHg。右上腹压痛、反跳痛, 腹膜刺激征阳性。应首先考虑是

- A. 脾破裂
- B. 肝破裂
- C. 肾破裂
- D. 胃破裂
- E. 胆囊破裂

61. 患者，男，41 岁。因食管癌入院准备接受手术治疗。在术前准备阶段，患者一方面希望尽快恢复健康而配合各种检查和治疗，另一方面又担心自己主持的工程项目出问题而自行离院回单位开会，该患者角色状态属于

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为冲突
- C. 角色行为强化
- D. 角色行为异常
- E. 角色行为消退

62. 患者，女，35 岁。2 小时前出现呕血，2 天前因发热自行在家服用对乙酰氨基酚。查体：T37.3℃，血压 100/80mmHg，上腹部轻压痛。应首先考虑诊断的是

- A. 慢性胃炎
- B. 急性胃炎
- C. 胃癌
- D. 消化性溃疡
- E. 胃穿孔

63. 患者，男，21 岁。因左膝关节痛 1 周就诊腰痛 2 年。查体：左膝关节有压痛，右骶髂关节压痛阳性。对诊断最特异的检查方法是

- A. 血沉
- B. 类风湿因子
- C. 抗“O”
- D. HLA-B27
- E. CPR

64. 患者，男，68 岁。1 年前无明显诱因出现髋关节疼痛，休息后可好转。查体：腹股沟区压痛(+)，“4”字试验阳性。X 线显示髋关节间隙正常。最可能的诊断是

- A. 股骨头缺血性坏死
- B. 髋关节结核
- C. 类风湿关节炎
- D. 强直性脊柱炎
- E. 髋关节骨关节炎

65. 患者，女，46 岁。低热、腹胀 3 个月。查体：腹部弥漫压痛，揉面感，移动性浊音(+)，抗结核治疗 2 周未见好转。为进一步明确诊断，应做哪项检查

- A. 腹腔积液常规
- B. 血沉
- C. 腹腔镜+活检
- D. 全胃肠钡餐造影
- E. 剖腹探查

66. 患者，女，45 岁。右上腹痛 2 天。2 天前聚餐后突发右上腹疼痛，伴恶心，呕吐胃内容物 1 次。查体：T37℃，BP130/80mmHg，右上腹压痛(+)，Murphy 征阳性。血 WBC $14.1 \times 10^9/L$ ，N0.82。进一步检查首选

- A. 腹部 B 超
- B. 磁共振胰胆管成像
- C. 腹部 CT
- D. ERCP
- E. 立位腹部 X 线平片

67. 患者，男，30 岁。肛门周围胀痛伴发热 3 天。排便时疼痛加重。查体：肛门周围皮肤发红、压痛明显。最可能的诊断是

- A. 直肠后间隙脓肿
- B. 肛管括约肌间隙脓肿
- C. 骨盆直肠间隙脓肿
- D. 肛周皮下脓肿
- E. 直肠黏膜下脓肿

68. 患者，女，25 岁。妊娠 7 个月，发热，腰痛伴恶心、呕吐、尿频、尿急、尿痛 1 天查体：T38.5℃，左肾区叩击痛。血常规 WBC $11.9 \times 10^9/L$ ，N0.82，尿常规 RBC5~8/HP，WBC30~35/HP，尿蛋白(±)。最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 急性膀胱炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 急性胃肠炎

69. 患者，男，32 岁。上夜班时突发上腹部剧烈疼痛，20 分钟后疼痛波及至右下腹。查体：肝浊音界消失，上腹部

2021 年临床助理历年真题

腹肌紧张，右下腹有明显压痛及反跳痛。该患者最可能的诊断是

- A. 胃溃疡急性穿孔
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性小肠梗阻

70. 患者，男，18岁。右膝上肿痛2个月，疼痛进行性加重，夜间尤重。检查见患者消瘦，右膝肿胀，皮温稍热，静脉怒张，关节活动受限。其诊断首先应考虑

- A. 骨髓炎
- B. 骨结核
- C. 风湿性关节炎
- D. 骨性关节炎
- E. 骨肉瘤

71. 患者，男，70岁。进行性排尿困难10年，夜尿3~4次。从未药物治疗。直肠指检：前列腺体积增大，中央沟消失，表面尚光滑，质地中等。B超：双肾无积水，输尿管未见扩张。最大尿流率9ml/s。首选的治疗方法是

- A. 膀胱造瘘
- B. 根治性前列腺切除术
- C. 口服多沙唑嗪+非那雄胺
- D. 经尿道前列腺切除术
- E. 膀胱切开取石

72. 患者，男，20岁。平素健康淋雨后，突发寒战高热、头痛。第2天出现右侧胸痛、咳嗽、咳痰，胸片示右上肺大片实变影。体检不会出现的体征是

- A. 右上肺语颤增强
- B. 右上肺叩诊浊音
- C. 气管向左侧偏移
- D. 急性面容
- E. 脉率增快

73. 患者，男，49岁。寒战、高热伴肝区疼痛半个月。既往体健。查体：T38.5℃，P110次/分，BP110/70mmHg。皮肤无黄染，肝肋下可触及，肝区叩击痛阳性。血常规：WBC $16 \times 10^9/L$ ，N0.89。B超示肝左叶10cm×7cm液性暗区。最可能的诊断是

- A. 肝血管瘤
- B. 肝癌
- C. 细菌性肝脓肿
- D. 肝囊肿
- E. 肝包虫病

74. 患者，男，45岁。肝硬化病史3年。聚餐后出现呕血，鲜红色，量约1000ml。查体：脉搏120次/分，血压80/55mmHg。患者呕血可能的原因是

- A. 胃癌
- B. 胃溃疡
- C. 十二指肠溃疡
- D. 食管静脉曲张破裂
- E. 胃黏膜病变

75. 患者，女，48岁。发作性剑突下及右上腹绞痛3天，伴有寒战，半年内有类似发作史。查体：体温39℃，脉搏110次/分，血压140/85mmHg，血常规检查：WBC $12 \times 10^9/L$ ，N0.8，神志清楚，皮肤、巩膜轻度黄染，右肋缘下触及肿大的胆囊、触痛。最适宜的治疗是

- A. 胆总管切开减压、T管引流
- B. 联合应用大剂量抗生素
- C. 补液、恢复血容量
- D. 给予糖皮质激素
- E. 物理降温，支持治疗

76. 患者，男，55岁。胆囊结石10年，曾多次胆绞痛发作。B超示胆囊结石6枚，最大直径超过3cm。首选的治疗方法是

- A. 胆囊切除
- B. 溶石治疗
- C. 体外震波碎石治疗
- D. 抗感染治疗
- E. 胆囊造口

77. 患者，男，35岁。酗酒后剧烈呕吐胃内容物3次，随后呕吐鲜血50ml，伴头晕、心悸等症状，无腹痛。查体：BP90/60mmHg，心率90次/分，最可能的诊断

- A. 消化性溃疡出血
- B. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- C. 急性糜烂性胃炎出血
- D. 食管贲门黏膜撕裂综合征

E. 反流性食管炎伴出血

78. 患者，女，40 岁。便血 1 年，初为排便后有少量鲜血滴出，无痛，便后出血自行停止，近半年来偶有块状物自肛门脱出，便后自行回缩。则最佳的治疗方案是

- A. 单纯性痔切除术
- B. 注射硬化剂
- C. 温水坐浴
- D. 膜性痔疮环切术
- E. 无需治疗，保持大便通畅

79. 患者，女，31 岁。2 年前因胃出血行胃大部切除术。近 1 年半来头晕，乏力，面色逐渐苍白，平时月经量稍多。检查：Hb76g/L，RBC $3.1 \times 10^{12}/L$ ，WBC $5.3 \times 10^9/L$ ，网织红细胞 0.015。在进行体格检查时，不可能出现的体征是

- A. 皮肤干燥，毛发干燥易脱落
- B. 步态不稳，深感觉减退
- C. 口腔炎，舌乳头萎缩
- D. 指甲变脆，变平或匙状甲
- E. 心尖部收缩期吹风样杂音

80. 患者，男，50 岁。突起呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，BP190/100mmHg。该患者的最佳治疗药物是

- A. 西地兰
- B. 氨茶碱
- C. 硝普钠
- D. 多巴酚丁胺
- E. 硝酸甘油

81. 患者，女，45 岁。右下肢静脉迂曲扩张 15 年，长期站立有酸胀感，近 1 年右足靴区颜色加深、肿胀。大隐静脉瓣膜功能试验(+)，深静脉通畅试验(-)。最可能的诊断是

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 血栓性浅静脉炎
- C. 动静脉瘘
- D. 单纯性下肢静脉曲张
- E. 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全

82. 患者，男，22 岁。2 周前感冒，近 3 天感心悸。查体：心界不大，P₂>A₂，心率 96 次/分，可闻及频发期前收缩，

心脏各瓣膜区未闻及杂音。心电图示：室性期前收缩。血清肌钙蛋白升高。

该患者最可能的诊断是

- A. 感染性心内膜炎
- B. 扩张型心肌病
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性心包炎
- E. 病毒性心肌炎

83. 患者，男，44 岁。阵发性心悸 3 天。有高血压病史。查体：心率 200 次/分，节律整齐，心音正常，无杂音。发作时心电图有逆行 P 波，QRS 波群形态与时限正常。该患者最可能的诊断是

- A. 心房颤动
- B. 房性期前收缩
- C. 窦性心动过速
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 阵发性室上性心动过速

84. 患儿，女，7 岁。左髌疼痛、跛行 60 余天，伴乏力、低热、消瘦。查体：左腹股沟可触及 3cm×3cm 质软肿物，无压痛。“4”字试验阳性。X 线片示做髌关节间隙变窄，边缘性骨质破坏。最可能的诊断是

- A. 髌关节骨关节炎
- B. 股骨上端慢性骨髓炎
- C. 风湿性髌关节
- D. 髌关节结核
- E. 急性化脓性髌关节炎

85. 患者，男，10 岁。尿量减少及颜面部水肿 2 天。2 周前有上呼吸道感染史。查体：血压 140/90mmHg，颜面部及双下肢轻度水肿。尿常规：蛋白(++)，红细胞(+)。补体 C₃ 轻度下降。其最可能的临床诊断是

- A. 肾病综合征
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 急进性肾小球肾炎

86. 患者，女，23 岁。车祸致大量失血，入院时已昏迷。为抢救患者生命，需立即手术治疗，但短期内无法联系到患者家属。此时，合理的处理措施是

- A. 继续尝试联系家属

- B. 联系患者单位
- C. 转诊其他医疗机构
- D. 请示上级卫生主管部门
- E. 由医院负责人决策

87. 200 名高血压患者接受新药物治疗, 2 个月后有 110 名患者血压明显下降, 正确的说法为

- A. 该药没有疗效, 不能再用
- B. 时间短疗效可疑
- C. 未设对照组, 无法下结论
- D. 该药疗效显著, 值得推广
- E. 样本量小尚不能下结论

88. 男性患者, 胃癌晚期, 保守治疗。医生在诊疗过程中, 未告知患者和家属, 给患者开价格昂贵的进口药物。该案例中医生违背的临床诊疗伦理原则是

- A. 患者至上原则
- B. 有利原则
- C. 知情同意原则
- D. 最优化原则
- E. 尊重原则

89. 患者, 男, 60 岁。由高处坠落, 导致右侧大腿中下段开放性骨折, 大量出血。查体: 神志清, 面色苍白, 体温 37°C, 血压 80/50mmHg, 脉率 120 次/分。现场急救首要的处理措施是

- A. 抗休克
- B. 右伤下肢临时固定
- C. 清创缝合
- D. 加压包扎止血
- E. 给予输血

90. 患者, 男, 20 岁。平素健康, 淋雨后突发寒战、高热、头痛, 第 2 天出现右侧胸痛、咳嗽、咳痰胸片示右上肺大片实变影。体检不会出现的体征是

- A. 右上肺叩诊浊音
- B. 气管向左侧偏移
- C. 右上肺触觉语颤增强
- D. 急性病容
- E. 脉率增快

91. 患者, 男, 52 岁。间断无痛全程肉眼血尿 3 月, 查: 肾区无叩痛, 尿检红

细胞充满 HP, 膀胱镜未见异常, 静脉尿路造影示右肾盂有充盈缺损, 首先应考虑诊断为

- A. 肾盂肾炎
- B. 肾结核
- C. 肾结石
- D. 肾囊肿
- E. 肾盂癌

92. 患者, 男, 15 岁。2 年来时有尿频、尿急、尿痛和排尿困难、尿流中断, 改变体位后又能继续排尿, 首先应考虑

- A. 急性膀胱炎
- B. 肾母细胞瘤
- C. 尿道狭窄
- D. 膀胱结石
- E. 输尿管结石

93. 患儿, 男, 5 岁。右侧可复性腹股沟斜疝最佳的手术方法应选择

- A. 单纯疝囊高位结扎术
- B. Ferguson 法疝修补术
- C. McVay 法疝修补术
- D. Bassini 法疝修补术
- E. 疝成形术

94. 患儿, 男, 8 岁。阴囊包块, 透光试验阴性, 平卧后消失, 考虑诊断为

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 精索鞘膜积液
- C. 交通性鞘膜积液
- D. 腹股沟斜疝
- E. 睾丸肿瘤

95. 患者, 男, 30 岁。颈部包块 6 个月。查体: 甲状腺右叶可触及直径 2cm 质硬结节。B 超检查示: 甲状腺右叶下极实性结节, 2cm×1.5cm, 边界不规则, 内可见细小钙化。行穿刺活检, 最可能的病理类型是

- A. 鳞癌
- B. 滤泡状癌
- C. 未分化癌
- D. 乳头状癌
- E. 髓样癌

96. 患者, 男, 56 岁。间断活动时憋喘 1 年余, 近期加重, 重体力活动即感喘

2021 年临床助理历年真题

憋，有夜间憋醒。既往高血压病 8 年余，糖尿病 4 年余。查体：BP150/100mmHg，双肺呼吸音清。心率 76 次/分，律齐。患者经药物治疗症状好转，为改善预后需要长期使用的药物是

- A. 洋地黄类药物
- B. 肾上腺素能受体激动剂
- C. 磷酸二酯酶抑制剂
- D. 利尿剂
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

97. 患者，女，39 岁。因胆结石行胆囊切除术后 1 天。静息能量消耗(REE)比正常约增加

- A. 50%
- B. 10%
- C. 30%
- D. 5%
- E. 20%

98. 患者，男，25 岁。工地高空坠落受伤，出现血压下降，腹胀，腹痛。查体见髌骨挤压分离试验阳性，双下肢不等长，会阴部瘀斑。首先考虑的诊断是

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨干骨折
- C. 髌关节脱位
- D. 骨盆骨折
- E. 脊柱骨折

99. 某公司有 100 员工，集体食堂吃饭，近来一周其中 30 人相继突发腹泻，为描述病例发生的频率可用的是

- A. 罹患率
- B. 患病率
- C. 发病率
- D. 续发率
- E. 感染率

100. 患者，男，40 岁。外伤后腰痛伴右下肢麻木 2 周。查体：腰部活动受限，右小腿外侧和足背感觉减退，趾背伸肌力减退。最可能的诊断为

- A. 腰椎间盘突出症
- B. 腰肌劳损
- C. 腰椎肿瘤
- D. 腰椎结核

E. 强直性脊柱炎

101. 患者，女，58 岁。胃癌术后，手术很成功，但患者总哭并拒绝治疗，认为自己手术不完美。这种角色变化属于

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为冲突
- C. 角色行为强化
- D. 角色行为异常
- E. 角色行为消退

102. 患者，男，68 岁。排便时诉胸闷，随即跌倒，呼之不应，皮肤发绀。最有助于确诊心脏骤停的临床表现是

- A. 意识丧失
- B. 呼吸停止
- C. 皮肤发绀
- D. 心音消失
- E. 桡动脉搏动消失

103. 患者，男，28 岁。胫骨开放性骨折创口不愈，治疗 3 个月后形成窦道有少量脓性分泌物，并有死骨排出。应考虑为

- A. 骨结核
- B. 骨肿瘤
- C. 慢性骨髓炎
- D. 缺血性骨坏死
- E. 急性化脓性骨髓炎

104. 患者，男，66 岁。5 年前诊断左股骨颈骨折。近 1 年左髋疼痛，行走困难。X 线片示左髋关节间隙变窄，股骨头变形。最佳治疗方案是

- A. 左下肢皮肤牵引
- B. 切开复位钢板内固定
- C. 人工关节置换术
- D. 闭合复位内固定
- E. 卧床休息对症治疗

105. 患者，女，22 岁，患缺铁性贫血。膳食中应注意选择含铁丰富且吸收率高的食物尤其是

- A. 瘦肉
- B. 牛奶
- C. 大豆
- D. 蔬菜
- E. 鸡蛋

106. 患者，男，60 岁，突发喘憋 1 小时。查体：BP160/70mmHg，双肺满布湿性啰音，心率 105 次/分，该患者最适宜的治疗措施是

- A. 口服氨苯蝶啶
- B. 静脉滴注小剂量多巴胺
- C. 静脉推注呋塞米
- D. 口服螺内酯
- E. 口服氢氯噻嗪

107. 患者，男，50 岁，急性心肌梗死患者。突然出现胸闷、气喘、大汗淋漓，两肺满布干湿啰音，第一心音低钝。最可能的诊断是

- A. 急性左心衰
- B. 急性心包炎
- C. 急性动脉栓塞
- D. 主动脉夹层
- E. 急性肺栓塞

108. 患者，男，48 岁。印刷厂工人，出现神经衰弱 1 月，到医院就诊。经查，医生考虑应是患者长期处于苯超标的环境中导致慢性苯中毒。医生告知患者及家属后还应告知的是

- A. 医疗卫生机构医务部
- B. 用人单位
- C. 所在地卫生行政部门
- D. 国务院行政部门
- E. 县级以上卫生行政部门

109. 患者，男，43 岁。发现血压增高 1 年，经药物治疗后，血压控制不佳，遂先后加用了氢氯噻嗪、螺内酯、钙离子通道拮抗剂、缬沙坦、美托洛尔后导致面色潮红、头痛。主要导致此并发症的药物是

- A. 氢氯噻嗪
- B. 螺内酯
- C. 钙离子通道拮抗剂
- D. 缬沙坦
- E. 美托洛尔

110. 患者，男，38 岁。反复饥饿性上腹部隐痛 2 月余，进食后缓解。近期体重无明显变化。查体：上腹部无压痛，大便潜血试验阳性。该患者最可能的诊断是

- A. 胃溃疡
- B. 胃癌
- C. 十二指肠溃疡
- D. 胃穿孔
- E. 食管癌

111. 患者，男，30 岁。撞伤致单根肋骨骨折入院，查体：神志清楚，无呼吸困难，心率 100 次/分，血压 110/75mmHg，无伤口。胸片示肺组织压缩 <10%。进一步处理应选择

- A. 闭式胸腔引流
- B. 闭式胸腔引流同时应用抗生素
- C. 胸腔穿刺抽尽气体，择期剖胸探查
- D. 穿刺抽气后，停留闭式胸腔引流管持续引流
- E. 加压包扎，固定胸壁

112. 患者，女，23 岁。左侧大阴唇上可见一个 1.0cm 的圆形硬物，有多次不洁性生活史。考虑诊断为

- A. 梅毒
- B. 淋病
- C. 艾滋病
- D. 沙眼衣原体感染
- E. 尖锐湿疣

113. 一患者发热、咳嗽，到当地卫生院就诊医生未做相关检查，直接开了头孢氨苄、莫西沙星、阿莫西林三种抗生素。患者服用药物后，4 天后症状好转，但出现了腹胀腹泻。该医生在诊疗过程中违反了

- A. 对症下药原则
- B. 细致观察原则
- C. 节约费用原则
- D. 合理配伍原则
- E. 剂量安全原则

114. 患者，男，48 岁。1 年前体检发现空腹血糖 7.5mmol/L，餐后 2 小时血糖 12mmol/L。经运动及饮食治疗，并口服二甲双胍治疗。近来查：BMI27.4，糖化血红蛋白 8%，心肺腹查体无阳性发现。该患者控制糖尿病的最佳治疗方案应选择

- A. 继续原治疗方案
- B. 用胰岛素治疗
- C. 改用格列吡嗪

2021 年临床助理历年真题

- D. 加用磺脲类口服降糖药
- E. 增加二甲双胍剂量

115. 患者，男，27 岁。劳累时心悸，胸骨后疼痛 1 年。查体可闻及主动脉瓣区收缩期粗糙的喷射性杂音，主动脉瓣区第二心音减弱。X 线检查示：左室扩大和升主动脉扩张。可能的诊断是

- A. 冠心病心绞痛
- B. 非梗阻性肥厚型心肌病
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 高血压性心脏病

116. 患者，女，28 岁。冬天室内烤炉，被发现时昏迷不醒，口角有食物残渣，旁边有农药瓶。该患者考虑诊断为

- A. 急性一氧化碳中毒
- B. 急性有机磷中毒
- C. 急性脑出血
- D. 急性脑梗死
- E. 急性苯中毒

117. 患者，男，54 岁。1 年前日常活动后出现胸骨后疼痛，每日 2~3 次，近 2 月发作次数增多，每日 5~6 次，轻微活动也能诱发，发作时心电图 ST 段呈一过性水平压低应诊断为

- A. 稳定型心绞痛
- B. 不稳定型心绞痛
- C. 心内膜下心肌梗死
- D. 中间综合征
- E. 变异型心绞痛

118. 患者，男 70 岁。吞咽困难半个月。查体无明显阳性体征。上消化道钡餐造影示食管中段黏膜紊乱，管壁僵硬管腔狭窄。该患者最可能的初步诊断是

- A. 食管炎
- B. 食管憩室
- C. 贲门失弛缓症
- D. 食管癌
- E. 食管平滑肌瘤

119. 患者，男，28 岁。便秘半年，近半个月来排便时肛门疼痛，便后有出血，便后 30 分钟疼痛可缓解，其诊断

最可能是

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 直肠癌
- D. 肛瘘
- E. 肛裂

120. 患者，男，75 岁。平素身体健康。社区体检发现血压 150/70mmHg，脉压差大。其发生的机制是

- A. 交感神经活性亢进
- B. 肾脏水钠潴留
- C. 大动脉硬化
- D. 胰岛素抵抗
- E. 激素异常

121. 患者，女，48 岁。接触性出血 3 个月。妇科检查：宫颈呈糜烂状，宫体大小正常，活动好，双侧附件区无异常。宫颈活检示不典型增生侵及上皮全层，腺体有异型增生。考虑诊断为

- A. 宫颈原位癌
- B. 宫颈浸润癌
- C. 宫颈黏膜上皮 I 度非典型性增生
- D. 宫颈黏膜上皮 II 度非典型性增生
- E. 宫颈黏膜上皮 III 度非典型性增生

122. 患者，男，45 岁。转移性右下腹疼痛 8 小时入院。查体：体温 38.8℃，右下腹压痛，反跳痛，腹肌紧张。下列处理恰当的是

- A. 应用抗生素
- B. 暂时观察，不予处理
- C. 中药辅助治疗
- D. 手术治疗
- E. 针灸或理疗

123. 患者，女，36 岁。外阴痒 1 周，稀薄脓性的泡沫状白带。合理的处理是

- A. 青霉素
- B. 头孢拉定
- C. 氟哌酸
- D. 甲硝唑
- E. 制霉菌素

124. 患者，女，66 岁。体检发现血压高，无不适。有吸烟史。查体：血压 160/110mmHg。实验室检查血清总胆固

2021 年临床助理历年真题

醇 590mmol/L, 尿蛋白 240mg/24h。对该患者高血压的诊断应为

- A. 1 级, 高危
- B. 2 级, 高危
- C. 3 级, 高危
- D. 2 级, 很高危
- E. 3 级, 很高危

B1 型选择题

(125~126 题共用备选答案)

- A. 多巴胺
- B. 谷氨酸
- C. γ -氨基丁酸
- D. 甘氨酸
- E. 门冬氨酸

125. 属于抑制性氨基酸类神经递质的是

126. 属于兴奋氨基酸类神经递质的是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 血管炎
- B. 附着点炎
- C. 滑膜炎
- D. 肉芽肿改变
- E. 软骨增生

127. 类风湿关节炎的基本病理改变是

128. 系统性红斑狼疮的病理变化是

(129~130 题共用备选答案)

- A. 肾结石
- B. 肾结核
- C. 肾水肿
- D. 肾下垂
- E. 肾肿瘤

129. 血尿伴肾绞痛最可能的病因是

130. 以尿频、尿急为主要症状, 普遍抗生素治疗无效时应首先考虑的是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 烟酸
- B. 尼古丁
- C. 焦油
- D. 一氧化碳
- E. 苯并芘

131. 在烟草烟雾中, 使红细胞失去携氧能力的物质是

132. 烟草中使人成瘾的成分是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 高磷血症
- B. 低钾血症
- C. 高钙血症
- D. 低磷血症
- E. 高钠血症

133. 肾病综合征的患者过度使用利尿剂会出现

134. 慢性肾衰竭 5 期可能合并哪种电解质紊乱

(135~136 题共用备选答案)

- A. 手足抽搐
- B. 窒息
- C. 声音嘶哑
- D. 音调低沉
- E. 高热脉快

135. 甲状腺术后甲状旁腺损伤的表现是

136. 甲状腺术后甲状腺危象的表现是

A3/A4 型选择题

(137~138 题共用题干)

男, 62 岁。间隔咳嗽、咳痰 10 余年, 喘息 5 年, 加重 3 天入院。吸烟 41 年, 30 支/日, 已戒 5 年。查体: 烦躁, 球结膜充血、水肿, 口唇发绀。桶状胸, 双肺呼吸音低, 右下肺可闻及少许湿性啰音, 肝肋下 5cm, 肝颈静脉回流征(+), 双下肢水肿。血 K⁺4.5mmol/L。Na⁺129mmol/L, Cl⁻90mmol/L。

137. 若该患者出现意识障碍, 最可能的原因是

- A. 感染中毒性脑病
- B. 脑血管意外
- C. 肝性脑病
- D. 肺性脑病
- E. 低钠血症

138. 该患者目前最重要的治疗措施为

- A. 抗感染
- B. 静脉滴注支链氨基酸
- C. 无创通气
- D. 利尿

E. 纠正电解质紊乱

(139~141 题共用题干)

患者，女，25 岁。发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑 5 天。查体：双下肢和腹部皮肤有多处瘀斑，双侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大，活动无压痛，最大者为 2.0cm×2.5cm，胸骨压痛(+)，腹软，肝肋下 1.5cm，脾肋下 2cm。化验：Hb78g/L，WBC $18 \times 10^9/L$ ，分类可见原始和幼稚细胞，PLT $25 \times 10^9/L$ ，网织红细胞 0.002。

139. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 非霍奇金淋巴瘤
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 霍奇金淋巴瘤
- E. 系统性红斑狼疮

140. 为明确诊断首选的检查是

- A. 骨髓细胞学检查
- B. 淋巴结活检
- C. 骨髓活检
- D. 腹部 B 超
- E. ANA 谱

141. 明确诊断后，首选的治疗措施是

- A. ABVD 方案化疗
- B. VDLP 方案化疗
- C. 给予大剂量糖皮质激素
- D. DA 方案化疗
- E. CHOP 方案化疗

(142~143 题共用题干)

患者，男，57 岁。持续性胸痛 2 小时，2 小时前出现胸骨后疼痛，休息后未减轻，逐渐出现呼吸困难。既往有高血压和血脂异常病史。查体：BP130/80mmHg，双肺呼吸音清，P86 次/分，律齐，A2>P2，心电图：V1~V3 导联 ST 段抬高 0.3mV，IIII、avF 导联 ST 段压低 0.2mV。

142. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性心包积液
- B. 变异性心绞痛
- C. 急性心肌炎
- D. 急性心肌梗死
- E. 急性肺血栓栓

143. 该患者关键的治疗是

- A. 再灌注治疗
- B. 应用非甾体类抗炎药
- C. 应用糖皮质激素
- D. 应用华法林
- E. 应用非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

(144~146 题共用题干)

患者，男，25 岁。左上腹撞击伤 2 小时，左上腹疼痛伴轻度恶心未呕吐，伴心慌、出冷汗。查体：左上腹轻度压痛，反跳痛(±)，局限性腹肌紧张，移动性浊音(+)，肠鸣音 6/min，血压 80/50mmHg。

144. 该患者最有价值的诊断方法是

- A. 血常规
- B. 血淀粉酶检查
- C. X 线腹部平片
- D. 尿常规检查
- E. 腹腔穿刺

145. 最可能损伤的脏器是

- A. 结肠破裂
- B. 空肠破裂
- C. 肝破裂
- D. 脾破裂
- E. 肾破裂

146. 腹腔抽出不凝血的原因是

- A. 患者凝血机制异常
- B. 使用抗凝药物
- C. 弥散性血管内凝血
- D. 腹膜炎性渗出液混合
- E. 腹膜脱纤维作用

(147~148 题共用题干)

13 岁男孩，进食油腻食物后出现腹痛、呕吐，肛门停止排气、排便 6 小时。2 年前曾做阑尾炎切除术。腹部 X 平片立位检查示阶梯样液平面。

147. 导致此次疾病病因的是

- A. 不洁饮食
- B. 手术导致
- C. 细菌感染
- D. 遗传因素
- E. 应激反应

148. 患者考虑的诊断是

- A. 急性胰腺炎

2021 年临床助理历年真题

- B. 急性胃炎
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 胃溃疡并幽门梗阻
- E. 急性胆囊炎

(149~150 题共用题干)

某医院未经批准新设医疗美容科，营业并接诊患者，未出现医疗事故，卫生行政部门例行检查时发现医院未经报备审批进行美容诊疗。

149. 该医疗机构的行为性质属于

- A. 非法行医
- B. 超范围行医
- C. 正常医疗行为
- D. 特殊情况
- E. 开展新技术

150. 卫生行政部门应给予的处置是

- A. 责令整改，处以 5000 元以下罚款
- B. 予以警告，责令整改
- C. 责令整改，处以 3000 元以下罚款
- D. 吊销“医疗机构执业许可证”
- E. 责令整改，没收违法所得

第二单元

A1/A2 型选择题

1. 容易引起 II 型呼衰加重的药物是

- A. 呼吸兴奋剂
- B. 袪利尿剂
- C. 强心剂
- D. 镇静剂
- E. 血管扩张剂

2. 维生素 D 缺乏性佝偻病最早出现的骨骼改变是

- A. 肋骨串珠
- B. “O”形腿
- C. 手镯足镯
- D. 方颅
- E. 颅骨软化

3. 全身强直-阵挛性发作和失神发作合并发生时首选药物

- A. 地西洋(安定)
- B. 乙琥胺
- C. 苯妥英钠
- D. 苯巴比妥

E. 丙戊酸钠

4. 下列乙肝病毒标记物中反映 HBV 有活动性复制和传染性的是

- A. 表面抗原(HBsAg)
- B. 表面抗体(抗-HBs)
- C. e 抗原(HBeAg)
- D. e 抗体(抗-HBe)
- E. 核心抗体(抗-HBc)

5. 预防疟疾复发选用的药物是

- A. 伯氨喹
- B. 乙胺嘧啶
- C. 氯喹
- D. 奎宁
- E. 哌喹

6. 与甲状腺髓样癌有关的激素是

- A. 甲状腺素
- B. 促甲状腺素
- C. 降钙素
- D. 促甲状腺激素释放激素
- E. 胰高血糖素

7. 应用全胃肠外营养时，氮和热量之比应为

- A. 1:50~80Kcal
- B. 1:100~120Kcal
- C. 1:150~200Kcal
- D. 1:210~240Kcal
- E. 1:250Kcal 以上

8. 评价新生儿窒息程度的 Apgar 评分指标不包括

- A. 呼吸
- B. 拥抱反射
- C. 心跳
- D. 肌张力
- E. 皮肤颜色

9. 疟疾的传播途径是

- A. 血液传播
- B. 垂直传播
- C. 接触传播
- D. 按蚊吸血
- E. 空气传播

10. 小儿生长发育最迅速的时期是

- A. 婴儿期

- B. 幼儿期
C. 学龄前期
D. 学龄期
E. 青春期
11. 与排卵后基础体温升高有关的激素是
A. 雌激素
B. 缩宫素
C. 黄体生成素
D. 孕激素
E. 卵泡刺激素
12. 提示心包积液体征的是
A. de Musset 征
B. 脉短绌
C. Ewart 征
D. Roth 斑
E. Duroziez 征
13. 反映儿童体格发育与近期营养状况指标的是
A. 体重
B. 身高
C. 头围
D. 坐高
E. 胸围
14. 可判断有机磷杀虫药中毒的严重程度并指导治疗最有意义的是
A. 血胆碱酯酶活力
B. 血氧分压
C. 心率
D. 瞳孔大小
E. 肺部湿啰音
15. 羊水栓塞的常见病因不包括
A. 胎膜早破
B. 前置胎盘
C. 急产
D. 子宫不完全破裂
E. 脐带脱垂
16. 呼吸衰竭最主要的临床表现是
A. 呼吸费力伴呼气延长
B. 呼吸频率增快
C. 呼吸困难与发绀
D. 神经精神症状
E. 双肺有大量湿啰音
17. 感染日本血吸虫的主要病理变化
A. 尾蚴性皮炎
B. 过敏性皮炎
C. 虫卵肉芽肿
D. 成虫寄生门静脉引起血管阻塞
E. 肝细胞变性
18. 属于上运动神经元瘫痪的体征是
A. 腱反射消失
B. 浅反射活跃
C. 肌张力降低
D. 肌肉萎缩明显
E. 病理征阳性
19. 目前认为乳腺癌最有效的检出方法是
A. 防癌普查体检
B. 红外线
C. B 超
D. 核磁共振
E. 钼靶摄片
20. 确诊脓胸的最佳检查方法是
A. 胸部 B 超
B. 胸部 MRI
C. 胸部 X 线片
D. 胸腔穿刺
E. 胸部 CT
21. 甲状腺功能亢进时, 不会出现哪种症状
A. 心率加快
B. 消瘦
C. 皮肤潮湿
D. 便秘
E. 易饿多食
22. 下列在支气管哮喘的诊断中最有意义的是
A. 血气分析
B. 血常规检查
C. 临床症状和体征
D. 肺功能检查
E. 胸部 X 线检查
23. 角膜反射和瞳孔对光反射减弱的意识障碍是
A. 意识模糊

2021 年临床助理历年真题

- B. 昏睡
C. 中度昏迷
D. 深昏迷
E. 浅昏迷
24. 支气管哮喘患者呼气比吸气更为困难, 其原因是
A. 吸气是被动的, 呼气是主动的
B. 吸气时肺弹性阻力减小, 呼气时肺弹性阻力增大
C. 吸气时胸廓弹性阻力减小, 呼气时胸廓弹性阻力增大
D. 吸气时气道阻力减小, 呼气时气道阻力增大
E. 吸气时胸内负压减小, 呼气时胸内负压增大
25. 肩关节外展困难可能损伤的神经是
A. 正中神经
B. 肌皮神经
C. 桡神经
D. 尺神经
E. 腋神经
26. 结核性腹膜炎最主要的感染途径是
A. 血行播散
B. 淋巴播散
C. 腹腔内结核病灶直接蔓延
D. 呼吸道播散
E. 泌尿道播散
27. 胃食管反流病患者的典型症状是
A. 餐后上腹胀
B. 上腹部钝痛
C. 吞咽困难
D. 暖气
E. 反酸、烧心
28. 对颅底骨折合并脑脊液漏, 下列处理错误的是
A. 应用抗生素
B. 抬高床头
C. 脑脊液长期漏出者采用填塞
D. 保持口鼻腔清洁
E. 避免用力咳嗽
29. 可用作支气管哮喘治疗, 但不可用于急性发作时缓解的药物是
A. 糖皮质激素
B. 短效受体激动剂
C. 麻黄碱
D. 氨茶碱
E. 沙丁胺醇
30. 急性胰腺炎患者应禁用的药物为
A. 雷尼替丁
B. 吗啡
C. 生长抑素
D. 阿托品
E. 抑肽酶
31. 急性尿潴留最常用的有效治疗方法
A. 膀胱造瘘
B. 留置导尿
C. 膀胱穿刺
D. 前列腺切除术
E. 尿道扩张术
32. 不能提示存在幽门螺杆菌感染的检测方法是
A. 活组织 Hp 培养
B. 黏膜组织染色
C. 尿素酶快速试验
D. ¹³C 尿素呼气试验
E. 血清 Hp 抗体测定
33. 急性重型溃疡性结肠炎首选的药物是
A. 糖皮质激素
B. 柳氮磺胺吡啶
C. 免疫抑制剂
D. 抗生素
E. 乳酸杆菌制剂
34. 慢性萎缩性胃炎(B 型)的主要病因是
A. 幽门螺杆菌感染
B. 胆汁反流
C. 自身免疫性反应
D. 药物
E. 吸烟
35. 阑尾炎转移性右下腹痛, 刺激的神经是
A. 内脏大神经

2021 年临床助理历年真题

- B. 内脏小神经
C. 迷走神经
D. 肠系膜下丛神经
E. 肠系膜上丛神经
36. 丙硫氧嘧啶治疗甲亢的严重不良反应是
A. 血压升高
B. 粒细胞缺乏症
C. 血糖升高
D. 低血钾
E. 骨质疏松
37. 影响骨折伤口愈合的全身因素是
A. 年龄和健康状况
B. 应用大量糖皮质激素
C. 伤口异物
D. 加压包扎
E. 感染
38. 婴儿生理性贫血的时间是出生后
A. 1 个月
B. 2~3 个月
C. 4~6 个月
D. 7~9 个月
E. 10 个月后
39. 婴幼儿秋冬季腹泻的最常见病原是
A. 腺病毒
B. 诺沃克病毒
C. 轮状病毒
D. 埃可病毒
E. 柯萨奇病毒
40. 足月产是指
A. 妊娠满 36 周至不满 42 足周
B. 妊娠满 36 周至不满 40 足周
C. 妊娠满 37 周至不满 40 足周
D. 妊娠满 37 周至不满 42 足周
E. 妊娠满 38 周至不满 42 足周
41. 靴形心最常见于
A. 主动脉瓣关闭不全
B. 肺动脉瓣关闭不全
C. 二尖瓣狭窄
D. 二尖瓣关闭不全
E. 三尖瓣狭窄
42. 维持子宫正常位置, 防止子宫向下脱垂的主要韧带是
A. 子宫阔韧带
B. 子宫主韧带
C. 宫骶韧带
D. 子宫圆韧带
E. 腹股沟韧带
43. 胸骨后甲状腺肿的治疗首选
A. 抗甲状腺药物
B. 放射性碘
C. 复方碘剂
D. 甲状腺手术
E. 普萘洛尔
44. 大脑中调控情绪的主要部位在于
A. 左半脑
B. 额叶
C. 右半脑
D. 顶叶
E. 枕叶
45. 提示上运动神经元损害最有意义的体征是
A. 瘫痪肌肉不萎缩
B. 病理征阳性
C. 腱反射减弱
D. 浅反射消失
E. 肌张力正常
46. 诊断癫痫最有价值的检查是
A. 脑电图
B. CT
C. MRI
D. 脑脊液检查
E. 脑血管造影
47. 婴儿腹泻引起的高渗性脱水, 第 1 天补液宜选用的液体是
A. 1/2 张含钠液
B. 1/3 张含钠液
C. 1/4 张含钠液
D. 2/3 张含钠液
E. 等张含钠液
48. 诊断支气管扩张首选的检查是
A. 胸部超声
B. 胸部高分辨 CT
C. 支气管造影

2021 年临床助理历年真题

- D. 胸部 X 线
- E. 胸部磁共振

49. 肺癌中恶性程度最高的类型是

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 小细胞癌
- D. 大细胞癌
- E. 类癌

50. 抑郁症的核心症状是

- A. 情绪低落
- B. 思维贫乏
- C. 情绪高涨
- D. 幻觉
- E. 入睡困难

51. 苯丙酮尿症属于

- A. 染色体畸变
- B. 常染色体显性遗传
- C. 常染色体隐性遗传
- D. X 连锁显性遗传
- E. X 连锁隐性遗传

52. 胃癌的常见转移部位是

- A. 右锁骨上淋巴结
- B. 左锁骨上淋巴结
- C. 腋下淋巴结
- D. 腹股沟淋巴结
- E. 颈部淋巴结

53. 脑出血最常见的病因为

- A. 高血压
- B. 先天性动脉瘤
- C. 脑动脉粥样硬化
- D. 动静脉畸形
- E. 烟雾病

54. 肝性脑病患者禁用的饮食是

- A. 低蛋白饮食
- B. 低脂肪饮食
- C. 高蛋白饮食
- D. 高维生素饮食
- E. 高热量饮食

55. 门静脉高压症时，最早出现的症状是

- A. 腹水
- B. 脾大

- C. 黄疸
- D. 食管胃底静脉曲张
- E. 蜘蛛痣

56. 肝硬化失代偿期时，肝功能减退的表现是

- A. 脾肿大
- B. 肝掌、蜘蛛痣
- C. 腹壁静脉曲张
- D. 腹水
- E. 食管胃底静脉曲张

57. 患者，女，50 岁。掌指和腕关节反复肿痛 2 年余，近 1 个月病情加重，晨起时出现关节僵硬活动后可缓解。首先考虑的诊断是

- A. 风湿性关节炎
- B. 痛风
- C. 强直性脊柱炎
- D. 骨关节炎
- E. 类风湿关节炎

58. 27 岁经产妇，妊娠 39 周，双胎妊娠。第一儿枕先露自然分娩，第二儿间隔 8 分钟臀助产娩出，历经 10 分钟娩出胎盘，随后阴道流血量达 600ml，最可能的诊断是

- A. 副胎盘残留
- B. 胎盘残留
- C. 子宫收缩乏力
- D. 宫颈裂伤
- E. 凝血功能障碍

59. 患者，男，72 岁。因持续胸痛 6 小时入院，查体双肺底有少量湿啰音，诊断为急性心肌梗死，该患者心功能分级为

- A. NYHA 分级 I 级
- B. NYHA 分级 IV 级
- C. NYHA 分级 I 级
- D. Killip 分级 I 级
- E. Killip 分级 II 级

60. 患者，女，45 岁。不慎被汽车撞伤左下肢。查体：左膝部及小腿瘀血、肿胀、疼痛，膝关节屈伸受限，足背动脉触诊不清，足背屈、外翻功能障碍，其中符合腓总神经损伤的表现是

- A. 足背屈、外翻功能障碍

2021 年临床助理历年真题

- B. 小腿淤血, 肿胀
- C. 足背动脉触诊不清
- D. 膝关节屈伸受限
- E. 小腿疼痛、活动受限

61. 某孕妇, 26 岁, 末次月经为 2021 年 1 月 12 日, 则预产期应是

- A. 2021 年 10 月 12 日
- B. 2021 年 10 月 19 日
- C. 2021 年 11 月 12 日
- D. 2021 年 11 月 13 日
- E. 2021 年 11 月 19 日

62. 小儿, 长了 12 颗牙, 能爬台阶, 能认识和指出自己的五官, 知道大小便。最可能的年龄是

- A. 2 岁
- B. 4 岁
- C. 1.5 岁
- D. 3 岁
- E. 2.5 岁

63. 患者, 女, 30 岁。因头晕、高血压就诊。查体: 心率 88 次/分, 血压 150/90mmHg。有高血压家族史。现阶段准备备孕, 首选的降压药物是

- A. 酚妥拉明
- B. 硫酸镁
- C. 硝普钠
- D. 卡托普利
- E. 拉贝洛尔

64. 8 个月男婴, 维生素 D 缺乏出现方颅, X 线检查骨骺端出现杯口形状, 考虑属于佝偻病的哪一期

- A. 初期
- B. 活动期
- C. 恢复期
- D. 后遗症期
- E. 早期

65. 患者, 女, 19 岁。腹痛 3 天, 伴有恶心、呕吐。查体: 左侧附件区有压痛 右转疼痛缓解。B 超提示左侧卵巢位置有液性暗区。首先考虑诊断的是

- A. 卵巢黄体破裂
- B. 输卵管妊娠破裂
- C. 急性盆腔炎
- D. 急性阑尾炎

E. 卵巢囊肿蒂扭转

66. 患儿, 男, 6 岁。有发热, 突发神志不清抽搐, 10 分钟后自行缓解, 事后全无发作时记忆。查体: 体温 37.8℃, 其余未见异常。既往无相关病史。考虑诊断为

- A. 热性惊厥
- B. 癫痫
- C. 维生素 D 缺乏性佝偻病
- D. 中毒性脑病
- E. 颅内出血

67. 患者, 男, 32 岁。乏力、怕冷伴声音嘶哑半年。查 T3、T4 降低, TSH 升高。该患者首选的治疗药物是

- A. 甲巯咪唑
- B. T3、T4 降低, TSH 升高。
- C. 丙硫氧嘧啶
- D. 碘剂
- E. 钙剂

68. 女孩, 16 岁, 考试前复习紧张, 出现早搏。行 24 小时动态心电图监测: 心脏搏动 110431 次, 早搏 825 次。其适宜的治疗方案是

- A. 抗心律失常治疗
- B. 休息后复查
- C. 安装人工心脏起搏器
- D. 应用镇静剂
- E. 手术治疗

69. 患者, 男, 32 岁。低热 1 周, 一个月前曾去非洲旅游。查体: 双侧腋窝淋巴结肿大, 腋窝下有红点, 肛周鸡冠状疣状物, CD4⁺下降。诊断首先考虑

- A. 淋病
- B. 梅毒
- C. 尖锐湿疣
- D. 疱疹病毒感染
- E. 艾滋病

70. 患者, 女, 26 岁。多个性伴侣, 6 天前发生性关系。自觉尿频、尿痛 2 天就诊, 阴道检查见尿道口有大量脓性分泌物。此时考虑诊断为

- A. 梅毒
- B. 生殖器疱疹
- C. 淋病

2021 年临床助理历年真题

- D. 天疱疹
- E. 艾滋病

71. 患者，男，57 岁。由于肠梗阻切除小肠 105cm，影响吸收的营养素是

- A. 维生素 C
- B. 维生素 B6
- C. 维生素 D
- D. 维生素 B12
- E. 维生素 E

72. 患者，男，32 岁。因不能胜任工作被单位辞退，情绪低落，觉得自己一无是处，想自杀。家人发现异常后带其就诊。该患者首选的治疗药物是

- A. 5-羟色胺再摄取抑制剂
- B. 去甲肾上腺素
- C. 丙咪嗪
- D. 阿米替林
- E. 碳酸锂

73. 患者，男，40 岁。患十二指肠球部溃疡穿孔，急症上腹正中切口行胃大部切除术，切口内置乳胶。正常情况下该患者拆线时间应为术后

- A. 3~4 天
- B. 5~6 天
- C. 7~9 天
- D. 10~12 天
- E. 12 天以上

74. 患儿，男，10 岁。游走性关节痛，伴心悸、呼吸困难 1 周。查体：T36.5℃，BP90/60mmHg，双肺湿啰音。经治疗 1 周后死亡，尸检发现：二尖瓣肿胀，有赘生物。考虑诊断是

- A. 急性心力衰竭
- B. 感染性心内膜炎
- C. 室间隔缺损合并肺部感染
- D. 吸入性肺炎
- E. 急性心肌梗死

75. 患者，女，32 岁。白带增多伴腥臭味 3 天。妇科检查：阴道 PH5.3，氨臭味试验阳性鱼腥味。该患者最可能的诊断是

- A. 滴虫阴道炎
- B. 阴道念珠菌病
- C. 细菌性阴道炎

- D. 老年性阴道炎
- E. 阿米巴性阴道炎

76. 小儿 8 个月，突然抽搐，持续 2 分钟，发作时意识不清，自行缓解。不伴发热，3 天内抽搐 4 次。醒后活泼如常。血钙为 1.73mmol/L，血糖 4.0mmol/L，诊断为

- A. 低血糖
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 婴儿痉挛症
- D. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症
- E. 营养性低镁血症

77. 患者，男，14 岁。被开水烫伤上肢，皮肤见创面深浅不一，还有大小不同的水泡。其烧伤累及皮肤的深度为

- A. I 度烧伤
- B. 深度烧伤
- C. 浅度烧伤
- D. 深 II 度烧伤
- E. 度烧伤

78. 患者，女，18 岁。反复咳嗽喘息 1 年，发作时呼吸困难，夜间和凌晨发作时症状加重。X 线胸片显示心肺无异常。应诊断为

- A. 慢性喘息性支气管炎
- B. 支气管扩张
- C. 急性间质性肺炎
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性阻塞性肺疾病

79. 某家工厂食堂，工人就餐 1 小时后，陆续出现唇、指甲以及全身皮肤青紫等症状。根据中毒症状，中毒的原因最可能是

- A. 钡盐中毒
- B. 有机磷中毒
- C. 一氧化碳中毒
- D. 亚硝酸盐中毒
- E. 病毒感染

80. 患者，女，33 岁。胫腓骨中 1/3 骨折，复位后，用长腿石膏管型固定，4 个月骨折愈合拆除石膏后，发现膝关节功能发生障碍，其原因是

- A. 肌肉萎缩
- B. 关节僵硬

- C. 关节强直
- D. 骨折复位不想
- E. 骨折畸形愈合

81. 男性患者, 28 岁。公司职员, 近 3 个月来无明显原因出现猜疑被害, 感觉别人的一举一动都针对自己, 自己的思想受到电脑的控制, 独处时耳朵可以听到同事讨论自己的声音, 并听到有人商议如何加害自己。因此, 不敢出门, 情绪低落, 兴趣缺乏, 有轻生的想法。该患者可能的诊断是

- A. 精神分裂症
- B. 强迫症
- C. 抑郁症
- D. 癔症
- E. 反应性精神病

82. 患者, 女, 35 岁。恶心乏力、食欲减退 1 个月。连续 2 年转氨酶偏高, 有轻度脂肪肝。30 年前曾有手术史, 接种过乙肝疫苗。查体: 皮肤无黄染, 肝、脾肋下未触及。目前考虑诊断为

- A. 甲型病毒性肝炎
- B. 乙型病毒性肝炎
- C. 丙型病毒性肝炎
- D. 丁型病毒性肝炎
- E. 戊型病毒性肝炎

83. 患者, 男, 60 岁。发作性右侧肢体无力伴言语不利 2 天, 每次持续 20 分钟后可自行缓解。脑 CT 检查未见异常。最可能的诊断是

- A. 部分性癫痫
- B. 脑栓塞
- C. 周期性瘫痪
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 脑血栓形成

84. 25 岁初产妇, 妊娠 39 周, 规律宫缩 8 小时。宫口开大至 3cm, 宫缩 10 分钟 3 次, 胎心 120 次/分。本例正确的处置是

- A. 严密观察产程进展
- B. 人工破膜
- C. 静注 25% 葡萄糖液和内加维生素 C
- D. 静脉滴注缩宫素, 加速产程进展
- E. 立即行剖宫产术

85. 患者, 女, 56 岁。阴道脱出肿物 2 年。妇科检查: 阴道前壁膨出, 宫颈光滑, 用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外。该患者应诊断为阴道前壁膨出和子宫脱垂

- A. I 度轻型
- B. I 度重型
- C. II 度轻型
- D. II 度重型
- E. III 度

86. 初孕妇, 26 岁。妊娠 28 周。1 周内阴道流血 2 次, 量少, 无腹痛。今晨突然阴道流血同月经量。查体: P88 次/分, BP110/70mmHg。子宫软, 无宫缩, 臀先露, 未入盆。胎心率 144 次/分。诊断考虑

- A. 早产
- B. 前置胎盘
- C. 先兆流产
- D. 胎盘早剥
- E. 宫颈息肉

87. 患者, 男, 32 岁。2 周前右足底被铁钉刺伤, 未做清创处理。近日出现头痛, 张口困难。查体: 满脸大汗苦笑脸, 角弓反张。最可能感染的致病菌是

- A. 梭状芽孢杆菌
- B. 表皮葡萄球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. β -溶血性链球菌

88. 2 岁男孩因感冒 2 天伴发热来诊, 查体: T39°C, P130 次/分。神清, 咽及右鼓膜中度充血, 其余检查正常, 在体检中, 突然发呆, 双眼上翻, 出现四肢强直性阵挛性运动, 对该患儿首先应该进行

- A. 全面体检
- B. 保持呼吸道通畅, 解痉
- C. 腰穿刺术
- D. 静脉注射安定
- E. 以上都不是

89. 患者, 女, 40 岁。工厂作业时, 右手中指被机器绞伤, 流血 1 小时。查体: 右手中指中节指骨以远不完全离

断，创缘不齐，污染严重，指骨外露。最合适的处置是

- A. 清创后一期缝合伤口
- B. 加压包扎止血、观察
- C. 清洗伤口后包扎
- D. 清创后二期缝合伤口
- E. 直接缝合

90. 患儿，10 个月。腹泻 2 天入院。查体：精神萎靡，呈嗜睡状，前囟明显凹陷，皮肤干燥，四肢发凉，哭时少泪、尿少，血钠 125mmol/L。该患儿的脱水程度及性质是

- A. 轻度脱水，等渗性
- B. 轻度脱水，低渗性
- C. 中度脱水，等渗性
- D. 中度脱水，低渗性
- E. 重度脱水，低渗性

91. 1 岁小儿，高热 6 天，伴咳嗽、气促。查体：精神不振，面色苍白，呼吸急促，皮肤可见猩红热样皮疹，双肺闻及细湿啰音，X 线胸片可见多发性肺脓肿，可能诊断是

- A. 呼吸道合胞病毒肺炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 金黄色葡萄球菌肺炎
- D. 革兰阴性杆菌肺炎
- E. 肺炎支原体肺炎

92. 患者，女，35 岁，G3P2。性接触后出血 2 个月。妇科检查：外阴阴道无异常，宫颈可见菜花样肿物，质地糟脆，直径 2cm，触血(+)，子宫前位，正常大小无压痛，双附件无异常。为明确诊断，首选的检查是

- A. HPV 检查
- B. 宫颈锥切术
- C. 超声检查
- D. 宫颈活检
- E. 宫颈细胞学检查

93. 患者，女，30 岁。G3P2，3 个月前孕 48 天行人工流产，术后未来月经，基础体温呈双相型曲线，雌、孕激素试验均阴性。考虑的诊断是

- A. 多囊卵巢综合征
- B. Asherman 综合征
- C. Shehan 综合征

- D. 卵巢早衰
- E. 空蝶鞍综合征

94. 患者，女，23 岁。外阴瘙痒、白带增多 5 天。有不洁性接触史。妇科检查：外阴粉状小乳头突起，宫颈光滑，子宫正常大，附件无异常。最可能的诊断是

- A. 淋病
- B. 梅毒
- C. 尖锐湿疣
- D. 外阴阴道念珠菌病
- E. 滴虫阴道炎

95. 患者，男，26 岁。3 天前外出就餐后出现腹痛、腹泻、里急后重伴发热。查体：T39.2℃，BP126/80mmHg，腹软，左下腹压痛(+)、反跳痛(-)。大便常规检查：红、白细胞满视野。最可能的诊断是

- A. 霍乱
- B. 急性肠炎
- C. 急性阿米巴痢疾
- D. 急性细菌性痢疾
- E. 急性阑尾炎

96. 患者，男，35 岁，农民。5 天来出现发热、头痛、眼眶痛、腰痛。家里老鼠较多。查体：面部潮红，结膜充血，胸背部皮肤有大小不等的出血点。尿常规：尿蛋白(+++)。为明确诊断，应进行的检查是

- A. 肥达-外斐试验
- B. 尿培养
- C. 血清特异性抗体检测
- D. 血常规
- E. 咽拭子培养

97. 男婴，10 个月。近来出现面色黄，少笑，不哭。查体：四肢及头部不规则震颤，腱反射亢进。血象检查：呈大细胞性贫血。血涂片中红细胞大小不等，中心淡染区消失。最可能的诊断是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 营养性巨幼红细胞性贫血
- C. 感染性贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 地中海贫血

98. 患儿，女，2岁。经常患感冒和肺炎。体检：心前区隆起，无震颤，胸骨左缘第2肋间可闻及11级喷射性杂音， $P_2 > A_2$ 伴有固定分裂线示右心房、右心室扩大。该患儿最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 法洛四联症

99. 患者，男，61岁。突发剧烈头痛伴恶心、呕吐。高血压病史5年，有长期吸烟史。查体：神志清楚，四肢肌力正常，腱反射消失，无异常感觉。颈抵抗(+)，病理征(-)。该患者最可能的诊断是

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑膜炎
- D. 脑栓塞
- E. 海绵窦血栓形成

100. 患者，女，62岁。发现右侧乳房肿块3个月，诊断为乳腺癌。发现血脂异常3年，未诊治。右乳腺癌改良根治术后第4天，感左小腿疼痛，左脚不能着地踏平。查体： $T_{37.2}^{\circ}\text{C}$ ， P_{86} 次/分， $BP_{120/80}\text{mmHg}$ ，伤口局部无异常渗出，左小腿肿胀最可能的原因是

- A. 血栓性浅静脉炎
- B. 急性动脉栓塞
- C. 血栓闭塞性脉管炎
- D. 大隐静脉曲张
- E. 深静脉血栓形成

101. 男孩，5岁。1小时前头部摔伤，无伤口，头皮下有明显波动感，后眉弓至枕部逐渐水肿。下列处理方法正确的是

- A. 急诊手术
- B. 观察不予处理
- C. 抗生素治疗
- D. 穿刺抽血+局部加压包扎
- E. 切开引流

102. 初孕妇，26岁。妊娠35周，自觉头痛、视物模糊2周，晨起突然出现持续性腹痛且逐渐加重。腹部检查：子

宫板状硬。该患者最可能的诊断是

- A. 先兆早产
- B. 胎盘早剥
- C. 急性阑尾炎
- D. 前置胎盘
- E. 先兆子宫破裂

103. 患儿，男，4岁。高热1天伴全身出疹全身皮肤弥漫性充血发红，可见均匀密集红色细小丘疹，唇周苍白，咽扁桃体充水肿，草莓舌。最可能的诊断是

- A. 风疹
- B. 麻疹
- C. 幼儿急疹
- D. 猩红热
- E. 水痘

104. 患儿，男，1岁。发热9天。查体： $T_{39}^{\circ}\text{C}$ ，眼结膜充血，口唇鲜红、干裂，舌呈草莓样，皮肤有浅红色斑丘疹，右颈淋巴结蚕豆大，双肺呼吸音粗，心率130次/分，腹软，肝、脾无肿大，指、趾端少许脱皮。实验室检查：血 $WBC_{19} \times 10^9/L$ ， $NO_{.72}$ ， $LO_{.28}$ ， $P_{1t}420 \times 10^9/L$ ， $ESR_{120}\text{mm/h}$ 。最可能的诊断为

- A. 猩红热
- B. 幼年类风湿关节炎
- C. 传染性单核细胞增多症
- D. 川崎病
- E. 金黄色葡萄球菌败血症

105. 8个月男婴，咳嗽1天，发热3小时。 $T_{39.3}^{\circ}\text{C}$ ，就诊过程中突然双眼上翻，肢体强直，持续1分钟。查体：咽红，心肺腹及神经系统无异常，半年前有过类似病史。患儿惊厥最可能的原因是

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 中毒性脑病
- C. 低钙惊厥
- D. 癫痫
- E. 高热惊厥

106. 患者，女，38岁。左乳房无痛性肿物2个月余，查体：左乳外上象限有 $3\text{cm} \times 5\text{cm}$ 肿块表面不光滑，边界不清与皮肤粘连。最可能的诊断是

- A. 乳腺增生症
- B. 急性乳腺炎
- C. 乳房结核
- D. 乳腺癌
- E. 乳房后脓肿

107. 一小儿身高 85cm, 前囟已闭, 头围 48cm, 乳牙 20 枚, 已会跳并能用简单的语言表达自己的需要对人事有喜乐之分。按公式计算此小儿的体重约是

- A. 9Kg
- B. 10Kg
- C. 12Kg
- D. 13Kg
- E. 14Kg

108. 45 岁妇女, 患 I 度子宫脱垂伴阴道前后壁明显膨出。两个月前患乙型肝炎住院治疗 50 天, 现来院咨询避孕方法, 应选用

- A. 宫内节育器
- B. 口服避孕药
- C. 安全期避孕
- D. 外用避孕药膜
- E. 男用阴茎套

109. 初孕妇, 25 岁。妊娠 38 周。骨盆外测量: 骶耻外径 18.5cm, 髂嵴间径 27cm, 坐骨结节间径 7.5cm。本例孕妇的骨盆应诊断为

- A. 单纯扁平骨盆
- B. 佝偻病性扁平骨盆
- C. 均小骨盆
- D. 漏斗型骨盆
- E. 男型骨盆

110. 患者, 男, 59 岁。晨起轻微头痛和发现左侧肢体无力。左侧 Babinski 征阳性, 左侧肢体痛温觉消失。可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 高血压脑病
- D. 脑膜瘤
- E. 脑栓塞

111. 患者, 男, 67 岁。头痛、呕吐数天。4 个月前有头部摔伤史。头颅 CT

示右额颞顶新月形中等密度影。该患者最可能的诊断是

- A. 脑挫伤
- B. 脑肿瘤
- C. 慢性硬膜外血肿
- D. 脑转移瘤
- E. 慢性硬膜下血肿

112. 患者, 男, 4 岁, 1 小时前摔倒后右肩部疼痛。查体: 头向右侧偏斜, 右肩下沉, 右侧上肢活动障碍, Dugas 征阴性。最可能的诊断是

- A. 锁骨骨折
- B. 正中神经损伤
- C. 桡骨头半脱位
- D. 肘关节脱位
- E. 肩关节脱位

113. 患者, 男, 55 岁。咳嗽、胸闷、气短伴有低热 2 周。查体: T37.5°C, 呼吸 26 次/分, 口唇发绀。双下肺叩诊呈浊音、语颤明显减弱、呼吸音消失。胸水常规: 呈血性 WBC1200×10⁶/L, 多核细胞 56%, 单核细胞 44%, 葡萄糖 2.4mmol/L, LDH190U/L, ADA15U/L, 胸液/血清 CEA 比值为 2。应考虑该患者考虑诊断为

- A. 化脓性胸膜炎
- B. 结核性胸腔积液
- C. 乳糜样胸腔积液
- D. 恶性胸腔积液
- E. 漏出性胸腔积液

114. 李某, 25 岁, 初产妇。产后哺乳 1 个月, 乳房出现局部红、肿、热、痛。查体: 左侧乳房外下象限出现一 5cm×6cm 脓肿, 有波动感。首选的处理措施是

- A. 应用足量抗生素
- B. 局部理疗
- C. 停止哺乳
- D. 乳罩托起乳房
- E. 切开引流

115. 患儿, 男, 2 岁, 发热 4 天, 体温达 40°C, 伴流涕, 鼻塞、咳嗽, 眼结膜充血, 眼泪较多, 今发现耳后、颈枕部出现散在红色丘疹, 疹间皮肤正常。最可能的诊断为

- A. 幼儿急疹
- B. 风疹
- C. 水疹
- D. 猩红热
- E. 麻疹

116. 患儿，男，6岁。因智能发育落后就诊，头发呈金黄色，皮肤色白，时有抽搐，不伴发热无腹泻。为协助诊断，应首选

- A. 脑电图检查
- B. Guthrie 试验
- C. 尿三氯化铁试验
- D. 尿蝶呤分析
- E. 血钙、磷检测

117. 赵某，24岁，经产妇，停经9周，下腹阵发性剧烈疼痛10小时伴多量阴道流血，超过月经量。检查宫口开大近2cm。本例最正确的处置应是

- A. 静脉滴注止血药物
- B. 口服硫酸舒喘灵
- C. 肌注硫酸镁
- D. 肌注黄体酮
- E. 行负压吸宫术

118. 26岁初产妇，妊娠40周，临产后10小时出现烦躁不安，自述下腹疼痛难忍。检查腹部见病理缩复环，下腹拒按，胎心听不清，导尿为血尿。此病例应诊断为

- A. 先兆子宫破裂
- B. 子宫破裂
- C. 重型胎盘早剥
- D. 羊水栓塞
- E. 妊娠合并急性泌尿系感染

119. 29岁初孕妇，妊娠37周，有妊娠期糖尿病，胎心率140次/分，产前监护NST无反应型，首先采用的处理措施是

- A. 做OCT
- B. 行B型超声生物物理评分
- C. 人工破膜了解羊水性状
- D. 立即剖宫产
- E. 3日后复查NST

120. 患儿，女，2岁。生后4个月出现发绀，哭吵甚时有抽搐史。查体：发育

差，发绀明显，心前区可闻及Ⅲ级左右收缩期的喷射音，胸片示：肺血少，右心室增大，心腰凹陷，呈靴形心。此患儿的诊断应是

- A. 法洛三联症
- B. 动脉导管未闭
- C. 肺动脉狭窄
- D. 室间隔缺损
- E. 房间隔缺损

121. 患者，男，25岁。发作性意识丧失伴四肢抽搐8年。2天前自行调整治疗药物，次日出现频繁发作，意识不清，应立即采取的处理措施是

- A. 鼻饲苯妥英钠
- B. 口服丙戊酸钠
- C. 静脉注射地西泮
- D. 肌注苯巴比妥
- E. 气管切开

122. 患者，男，25岁。有一天饮一两白酒后出现意识不清，怀疑同饮者欲加害于他，言语行为狂暴，将同饮者打伤，数十分钟后进入酣睡醒后完全不能回忆，幼年受过脑外伤。该患者最可能的诊断是

- A. 病理性醉酒
- B. 遗忘综合征
- C. 妄想
- D. 脑外伤所致精神障碍
- E. 单纯性醉酒

123. 患者，女，28岁。月经量多1年，近10日经常鼻出血，脾肋下未及。血红蛋白90g/L，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ 。骨髓检查：粒红细胞系增生旺盛，巨核细胞增多，伴成熟障碍，应诊断为

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 血友病
- C. 过敏性紫癜
- D. 弥散性血管内凝血
- E. 血小板增多

124. 患者，男，10岁。发热头痛呕吐3天，嗜睡半天，于7月10日入院。既往体健。查体：T38.6℃，P112次/分，R20次/分，BP130/75mmHg。神志不清，皮肤无瘀斑，心肺未见异常，

2021 年临床助理历年真题

腹软，压痛及反跳痛(-)，肝脾肋下未触及，脑膜刺激征(+)。实验室检查血 WBC $124 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.70，淋巴细胞 0.30。腰穿脑脊液检查压力 200mmH₂O，WBC $170 \times 10^9/L$ ，单核 0.66，多核 0.34，蛋白 11g/L，糖 42mmol/L，氯化物 115mmol/L。该患者最可能的诊断是

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 肾综合征出血热
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 结核性脑膜炎
- E. 隐球菌性脑膜炎

125. 患者，男，10岁。发热头痛呕吐3天，嗜睡半天，于7月10日入院。既往体健。查体：T38.6℃，P112次/分，R20次/分，BP130/75mmHg。神志不清，皮肤无瘀斑，心肺未见异常，腹软，压痛及反跳痛(-)，肝脾肋下未触及，脑膜刺激征(+)。实验室检查血 WBC $124 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.70，淋巴细胞 0.30。腰穿脑脊液检查压力 200mmH₂O，WBC $170 \times 10^9/L$ ，单核 0.66，多核 0.34，蛋白 11g/L，糖 42mmol/L，氯化物 115mmol/L。最有助于确诊的检查是

- A. 血清特异性 IgM 抗体
- B. 脑脊液涂片找细菌
- C. 脑脊液培养
- D. 血培养
- E. 结核菌素试验

B1 型选择题

(126~127 题共用备选答案)

- A. 骨髓增生异常综合征
 - B. 再生障碍性贫血
 - C. 缺铁性贫血
 - D. 巨幼细胞性贫血
 - E. 阵发性障碍睡眠性血红蛋白尿症
126. 可采用抗胸腺细胞球蛋白(ATG)治疗的是

127. 可采用维生素 B₁₂、叶酸治疗的是

(128~129 题共用备选答案)

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿溶血病
- C. 新生儿败血症

- D. 先天胆道闭锁
- E. 母乳性黄疸

128. 生后 1~3 个月仍有黄疸，但一般不需要治疗的是

129. 血红蛋白下降，网织红细胞升高，血清总胆红素增多的是

(130~131 题共用备选答案)

- A. 子宫收缩乏力
- B. 软产道裂伤
- C. 胎盘剥离不全
- D. 胎盘部分粘连
- E. 凝血功能障碍

130. 胎盘剥离延缓，胎盘剥离后阴道流血不止，有血块，检查子宫轮廓不清，应诊断为

131. 胎儿娩出后立即出现持续性阴道流血色鲜红，子宫轮廓清楚。应诊断为

(132~133 题共用备选答案)

- A. 放射状切口
- B. 末节指侧面纵切口
- C. 指末端鱼口状切口
- D. “+”字形切口
- E. 弧形切口

132. 脓性指头炎切开引流的正确切口是

133. 痛切开引流的正确切口是

(134~135 题共用备选答案)

- A. II, III, aVF
- B. V1, V2, V3
- C. V3, V4
- D. I, aVL
- E. V5, V6

134. 提示急性下壁心肌梗死的心电图导联是

135. 提示急性高侧壁心肌梗死导联是

(136~137 题共用备选答案)

- A. 晚餐碳水化合物摄入过多
- B. 夜间曾发生过低血糖
- C. 夜间肝脏葡萄糖产生过多
- D. 清晨胰岛素作用不足

2021 年临床助理历年真题

E. 清晨胰岛素拮抗激素增多

136. 黎明现象的原因是

137. Somogyi 效应的原因是

A3/A4 型选择题

(138~139 题共用题干)

患者,男,35岁。活动后心悸、气短1年。查体:BP144/78mmHg,双肺呼吸音清,心率82次/分,心律整齐,胸骨左缘第3~4肋间可闻及3/6级收缩期喷射性杂音。胸部X线示左心室增大,左心室射血分数43%。

138. 该患者最可能的诊断是

- A. 高血压性心脏损害
- B. 风湿性心脏病
- C. 病毒性心肌炎
- D. 肥厚型心肌病
- E. 扩张型心肌病

139. 该患者最适宜的治疗药物是

- A. 硝酸甘油
- B. 地高辛
- C. 美托洛尔
- D. 氢氯噻嗪
- E. 氨茶碱

(140~142 题共用题干)

男婴,10个月。单纯母乳喂养,面色苍白1个月。易疲乏、时而烦躁、食欲缺乏。查体:皮肤及唇黏膜苍白,肝肋下2cm。血常规:Hb75g/L,RBC $3.0 \times 10^{12}/L$ 。血涂片:红细胞大小不等,以小为主,中央淡染区扩大。

140. 该患儿最可能的诊断是

- A. 生理性贫血
- B. 溶血性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 巨幼细胞性贫血
- E. 营养性缺铁性贫血

141. 经有效治疗后首先出现变化的是

- A. 血红蛋白上升
- B. 红细胞上升
- C. 细胞内含铁酶活性开始恢复
- D. 红细胞游离原卟啉上升
- E. 网织红细胞上升

142. 若Hb恢复正常,还需要继续药物

治疗的时间是

- A. 3~4周
- B. 1~2周
- C. 9~12周
- D. 13~18周
- E. 6~8周

(143~144 题共用题干)

患儿,男,5岁。发热2天伴咽痛。查体:咽部充血,咽腭弓、悬雍垂、软腭处可见白色颗粒物。

143. 最可能的诊断是

- A. 急性上呼吸道感染
- B. 麻疹
- C. 疱疹性咽峡炎
- D. 急性扁桃体炎
- E. 手足口病

144. 其病原体最可能为

- A. 柯萨奇A组病毒
- B. 呼吸道合胞病毒
- C. 腺病毒
- D. 鼻病毒
- E. 冠状病毒

(145~146 题共用题干)

患者,女,48岁。近2年月经不规律。现停经6个月,阴道不规则流血半个月,无腹痛。既往有高血压、糖尿病病史。查体:肥胖,一般情况好,血压150/105mmHg。子宫及双附件无明显异常。

145. 该患者最可能的诊断是

- A. 老年性阴道炎
- B. 子宫内膜息肉
- C. 老年性子官内膜炎
- D. 宫颈癌
- E. 子宫内膜癌

146. 为明确诊断,下一步应进行的检查是

- A. 宫腔镜检查
- B. 宫腔涂片细胞学检查
- C. 宫颈活检
- D. 宫颈管细胞学检查
- E. 子宫分段诊刮活检

(147~148 题共用题干)

患儿,男,5岁,因体格和智力发育落

2021 年临床助理历年真题

后来诊。查体:身材矮小眼距宽,鼻梁低,头围小,通贯手,胸骨左缘第3~4间可闻及3/6级收缩期杂音。

147. 最可能的诊断为

- A. 软骨发育不良
- B. 21-三体综合征
- C. 先天性甲状腺功能减退症
- D. 佝偻病
- E. 苯丙酮尿症

148. 为明确诊断, 最合适的检查是

- A. 智力测定
- B. 血 T3、T4 检测
- C. 头颅 CT
- D. 超声心动图检查
- E. 染色体核型分析

(149~150 题共用题干)

患者, 女, 28 岁, 已婚。G2P0, 2 次自然流产史。现停经 3 周, 出现少量阴道流血。B 超提示宫腔内见不匀质回声, 呈蜂窝状, 子宫大小明显大于孕周。

149. 该患者最可能的诊断为

- A. 宫外孕
- B. 卵巢巧克力囊肿
- C. 葡萄胎
- D. 子宫肌瘤红色变
- E. 早孕合并子宫肌瘤

150. 明确诊断后, 首选的治疗是

- A. 立即清宫
- B. 抗炎治疗
- C. 腹腔镜
- D. 宫腔镜
- E. 性激素治疗

答案

第一单元

1. 答案:E

解析:无论是外源性胆固醇或内源性胆固醇在体内均不能彻底氧化分解,只能转化为其他化合物。胆固醇在体内最重要的一个转化途径,是通过肝脏将胆固醇转化为胆汁酸,选项 E 正确。这一途径不仅是机体向体外排泄胆固醇的重要途径,而且也是维持机体胆固醇水平平衡的关键所在。

2. 答案:B

解析:大豆蛋白质含量约为 35%~40%,大豆含有丰富的优质蛋白、不饱和脂肪酸、钙及维生素,是我国居民膳食中优质蛋白质的重要来源。

3. 答案:B

解析:体内血氨的去路一共有五条,第一条路就是在肝脏转变为尿素,也是最主要的去路(B);第二条路是合成氨基酸;第三条路是合成其他的含氮物;第四条路是合成天冬酰胺和谷氨酰胺;第五条路就是直接排出了。而氨在血中的转运流程就是氨在血液循环中的转运,然后以无毒的形式进行,比如生成丙氨酸或者谷氨酰胺等,然后将氨通过丙氨酸-葡萄糖循环和谷氨酰胺的运氨作用转运至肝脏或肾脏进行代谢。

4. 答案:A

解析:流行病学研究方法按照设计类型分为观察法、实验法和数理法三大类。

5. 答案:D

解析:流行病学的基本原则包括:群体原则、现场原则、对比原则、代表性原则。

6. 答案:A

解析:我国社会主义医学道德基本原则的内容是救死扶伤,忠于职守;钻研医术,精益求精;一视同仁,平等对待;语言文明,礼貌待人;廉洁奉公,遵纪守法;互尊互学,团结协作。其中“防治疾病,救死扶伤”是基本手段。

7. 答案:A

解析:我国导致胰腺炎的主要病因是胆囊结石。

8. 答案:A

解析:略

9. 答案:C

解析:个性心理特征是指人的多种心理特点的一种独特的结合,个体经常、稳定地表现出来的心理特点。比较集中地反映了人的心理面貌的独特性、个别性。主要包括能力、气质、性格。其中,能力标志着人在完成某种活动时的潜在可能性上的特征;气质标志着人在进行心理活动时,在强度、速度、稳定性、灵活性等动态性质方面的独特结合的个体差异性;而性格则更是鲜明地显示着人在对现实的态度和与之相适应的行为方式上的个人特征。

10. 答案:C

解析:略

11. 答案:A

解析:急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是金黄色葡萄球菌。【避错】亚急性细菌性心内膜炎的病原菌主要是草绿色链球菌。

12. 答案:E

解析:略

13. 答案:B

解析:生物-心理-社会医学模式的主要特征是:把人理解为生物的、心理的、社会的三种属性的统一体,人的健康和疾病不仅是生物学过程,而且有心理和社会的因素,要从生物、心理、社会相统一的整体水平来理解和防治疾病。生物心理社会医学模式主张在已有生物医学的基础上,加强心理和社会因素的研究和调控。生物-心理-社会医学模式在更高层次上实现了对人的尊重。不仅重视人的生物生存状态,而且更加重视人的社会生存状态。从生物和社会结合上理解人的生命,理解人的健康和疾病,寻找疾病现象的机理和诊断治疗方法。医生不仅要关心病人的躯体,而且要关心病人的心理;不仅要关心病人个体,而且要关心病人的家属、关心病人的后代、关心社会。

14. 答案:A

解析:食管-胃底静脉曲张多发生于各种引起门脉高压的肝脏疾病,以肝硬化最为常见,在持续性的门脉高压作

用下，发生肝内外血管增殖，当门静脉系统的胃冠状静脉在食管下段和胃底处，与腔静脉系统的食管静脉、奇静脉相吻合时，形成食管-胃底静脉曲张。

15. 答案:C

解析:对于贫血患者需要多次输血的患者，应选择的产品是浓缩红细胞。

16. 答案:A

解析:由于肱骨髁周围血管神经比较丰富，因此肱骨髁粉碎骨折最容易导致上肢缺血性肌挛缩。

17. 答案:B

解析:三级预防:①第一级预防亦称为病因预防，是采取措施防止疾病的发生。②第二级预防亦称为临床前期预防(或症候前期)，即在疾病的临床前期作好早期发现、早期诊断、早期治疗的“三早”预防措施。③第三级预防亦称为康复治疗。故本题选 B。

18. 答案:B

解析:伸直型肱骨髁上骨折在早期并发症主要是血管神经损伤。

19. 答案:A

解析:休克的本质是各种原因所引起的机体有效循环血容量不足，进而导致组织器官灌注不足，其最终的结局是导致组织细胞缺血，缺氧。在休克早期，因机体自身的神经体液调节功能影响，患者可表现为对休克的相关代偿，但是有时因临床查体，问诊的不注意，或者是因原发疾病的影响，在临床上往往会导致相关的漏诊情况发生。在临床表现上，患者可表现为神志清楚，表情淡漠或亢奋。患者自诉尿量减少。查体:可见患者脉搏细数，四肢末梢凉，皮肤发花等周围循环不良的表现。脉压差值减少和收缩压较其基础血压下降明显，也是休克早期的重要表现之一。结合患者血乳酸测定，血流动力学等相关检测可直接或间接发现患者有循环血容量不足，组织灌注不良的相关证据。此期如果能对患者进行积极的抗休克治疗，去除病因治疗等，其休克的进程往往可被有效的阻断，进而减少其进展到休克晚期出现 DIC 等情况的发生。综上本题选 A。

20. 答案:B

解析:略

21. 答案:D

解析:医疗机构从业人员的职业价值目标是为人民健康服务。

22. 答案:D

解析:气性坏疽的临床特点有病情迅速发展，伤口剧裂疼痛，且呈进行性加重，用药无效；伤口软组织肿胀，进行性加重；软组织迅速出现坏死，伤口周围皮肤发亮、苍白，皮肤表面可出现如大理石样斑纹；伤口处有大量浆液性或浆液血性渗出物，有恶臭，伤口中有气泡冒出。故本题选 D。

23. 答案:B

解析:支气管哮喘发作时典型的临床体征是两肺布满哮鸣音。

24. 答案:D

解析:消化性溃疡在临床当中首选的检查方法是胃镜检查。

25. 答案:A

解析:略

26. 答案:D

解析:一般在临床上，溶血性黄疸患者实验室检查特点有以下一些方面:患者血清总胆红素水平升高，以非结合胆红素为主，结合胆红素水平基本是正常。由于血液中非结合胆红素水平的升高，因此结合胆红素形成代偿性增加，从胆道排至肠道也增加，导致尿胆原升高，粪胆原随之增加，粪色会出现加深的情况，肠内的尿胆原增加，重吸收至肝内者也增加。故本题选 D。

27. 答案:C

解析:在镜下，分化好的鳞状细胞癌巢中央可见到层状的角化物，称作角化珠。分化较差的鳞状细胞癌无角化珠形成。基底细胞癌、移行细胞癌、腺癌也没有角化珠的出现。故选 C。

28. 答案:B

解析:根据医患双方在医疗措施制定和执行中的地位 and 主动性的 size，把医患关系分为主动-被动型、指导-合作型、共同参与型。共同参与型:(1)医务人员帮助病人自助。(2)病人是合作关系的参加者(利用专家的帮助)。(3)临床大多数慢性病患者。(4)模式的原型:成人-成人。故选 B。

29. 答案:D

解析:对乙酰氨基酚片属于解热镇痛药物,主要用于发热、头痛、关节痛等,它通过抑制环氧化酶,选择性地抑制下丘脑体温中枢前列腺素的合成,导致外周血管扩张出汗,从而达到解热的作用。通过抑制前列腺素的合成和释放,提高痛阈,从而起到镇痛作用。故选 D。

30. 答案:E

解析:疫苗接种记录保存年限不少于 5 年。

31. 答案:A

解析:骨痛是本病的主要症状之一。疼痛程度轻重不一,早期常是轻度的、暂时的,随着病程进展可以变为持续而严重。疼痛剧烈或突然加剧,常提示发生了病理性骨折。绝大多数(90%~93%)患者在全病程中都会有不同程度的骨痛症状,但确有少数患者始终无骨痛。故选 A。

32. 答案:E

解析:肾小球源性血尿中红细胞为变形红细胞,即红细胞呈现多种形态,如面包圈样、草莓样、水滴样,甚至为破碎红细胞,提示血尿是因肾小球的病变所致。非肾小球源性血尿,尿中红细胞多呈正常或大致正常形态。鉴别血尿是否是肾小球源性血尿主要依靠尿中红细胞的形态,相差显微镜检查是首选,故选 E。

33. 答案:C

解析:高血压的患者重要的靶器官损害就是左心室的肥厚,因为长期的血压升高,心脏会发生代偿性增厚,而抵抗血管压力的增加是心脏靶器官损害的主要表现。

34. 答案:C

解析:《抗菌药物临床应用管理办法》第二十四条:具有高级专业技术职务任职资格的医师,可授予特殊使用级抗菌药物处方权;具有中级以上专业技术职务任职资格的医师,可授予限制使用级抗菌药物处方权;具有初级专业技术职务任职资格的医师,在乡、民族乡、镇、村的医疗机构独立从事一般执业活动的执业助理医师以及乡村医生,可授予非限制使用级抗菌药物处方权。药师经培训并考核合格后,方可获得抗菌药物调剂资格。二级以

上医院应当定期对医师和药师进行抗菌药物临床应用知识和规范化管理的培训。医师经本机构培训并考核合格后,方可获得相应的处方权。其他医疗机构依法享有处方权的医师、乡村医生和从事处方调剂工作的药师,由县级以上地方卫生行政部门组织相关培训、考核。经考核合格的,授予相应的抗菌药物处方权或者抗菌药物调剂资格。

35. 答案:D

解析:骨筋膜室综合征是指各种原因造成的肢体创伤,导致筋膜室内压力升高,阻断筋膜室内组织微循环而引发的一系列症状和体征,最常见于四肢创伤后。因筋膜室内肌肉和神经的长时间缺血后会导致肌肉坏死及神经功能障碍,造成肢体严重的不可逆损伤。主要见于下肢动脉取栓术后引起的下肢肿胀导致的筋膜室压力增高,选 D。晚期主要表现为 5P 症状,包括疼痛、苍白、感觉异常、麻痹和无脉。

36. 答案:B

解析:狼疮性肾炎的特征性病理改变是苏木紫小体。

37. 答案:E

解析:甲状腺危象时,首先要去除引起危象的原因,包括感染、外伤这些因素。首选的药物是采用丙硫氧嘧啶,不能选用甲巯咪唑。故选 E。

38. 答案:E

解析:略

39. 答案:A

解析:腹外疝最常见的疝内容物是小肠。

40. 答案:C

解析:略

41. 答案:A

解析:单纯性髋关节后脱位首选的治疗方法是 Allis 法。

42. 答案:D

解析:普鲁卡因对组织无刺激性,应用广泛,为短效局麻药,注射一到三分钟后起效,维持三十到四十五分钟。局麻药作用弱而短,毒性较小,对黏膜的穿透力弱一般不用于表面麻醉,广泛适用于浸润麻醉,传导麻醉,蛛网膜下腔麻醉及膜外腔麻醉。

43. 答案:E

解析:略

44. 答案:A

解析:因为右心衰竭以后,右心室里的血液不能够主动顺利的排经肺动脉瓣,排入到肺循环当中,导致右心室压力增高,右心房内的血液不能顺利的进入右心室内充盈,所以引起中心静脉压升高。中心静脉压升高以后,静脉回流受阻及减少,导致全身静脉液体静压升高,这种静脉压力升高以后会出现远隔的身体部位,或者是位置低垂地方液体回流障碍,导致水肿,这种水肿常常为对称性,表现为凹陷性的水肿,常在活动以后加重,早晨休息以后或者平卧位,抬高四肢以后水肿可以减轻,同时右心衰竭水肿患者还可以出现肝脏的淤血,胃肠道瘀血水肿的情况。

45. 答案:B

解析:传染病的诊断要综合各个方面的资料。第1要收集详尽的临床资料,第2收集流行病学资料,流行病学资料在传染病的诊断中占有重要的地位。第3分析实验室及其他的检查资料。故选B。

46. 答案:B

解析:强心苷治疗心房纤颤是通过增强迷走神经的兴奋性,加速钾离子外流,增加最大舒张电位与阈电位的距离,而降低窦房结兴奋性和自律性,使窦房结发放冲动减慢,也使心房有效不应期缩短。也较减慢钙离子内流,房室除极减慢,房室传导也减慢,因而可以减慢心室率,增加心脏排血量。它适用于快速心房颤动,可以减慢心室率,但是不能转复房颤为窦性心律。故本题选B。

47. 答案:B

解析:右心衰竭是由于右心收缩和舒张功能障碍导致右心排血量不足以支撑人体所需而引起的一系列症状,出现右心衰竭时右心收缩功能受限,右心排出量减少,右心收缩后残留在右心室的血量增多导致下肢静脉回流受阻,最早出现的是肝-颈静脉回流征。故选项B正确。

48. 答案:D

解析:膀胱癌根据组织学类型可将膀胱癌分为移行细胞癌、鳞状细胞癌和

腺癌,有些为混合性。其中,膀胱癌的组织类型以移行细胞癌(尿路上皮癌)为最常见,腺癌很少见。

49. 答案:C

解析:通过按压颈动脉窦来刺激迷走反射的方法。就是压迫颈动脉窦,用手指轮流压迫两侧的颈动脉搏动的部位,颈动脉窦的压迫持续时间大概10-15秒。但是不可以同时两侧压迫,只能是轮流压迫,直到病人的心跳减慢。

50. 答案:A

解析:慢性粒细胞白血病首选的治疗药物是伊马替尼。

51. 答案:A

解析:慢性阻塞性肺疾病急性加重期常见的致病菌是肺炎链球菌。

52. 答案:D

解析:一般骨巨细胞瘤的X线表现,主要还是表现为侵蚀骨垢,形成溶骨性病灶,具有偏心性膨胀性,边缘一般没有硬化的情况,也没有反应性的新骨形成。病变部骨皮质会有斑驳的情况,成肥皂泡样的改变。

53. 答案:D

解析:肺功能检查是诊断慢性阻塞性肺疾病(COPD)的首选检查。

54. 答案:A

解析:临床上颅底骨折通常的诊断依据是脑脊液鼻、耳漏。

55. 答案:E

解析:童年生活受挫,个性压抑克制,焦虑抑郁,典型的B型人格,这种人格的一类人最容易患癌症。

56. 答案:A

解析:厌恶疗法是比较经典行为疗法当中的一种,有一点类似于惩罚措施,也就是让患者面对自己厌恶、反感、讨厌的事物,从而降低不良行为出现的频率。

57. 答案:C

解析:患者皮肤潮红,口唇樱桃红,一氧化碳中毒的典型表现,患者血压80/50mmHg(休克状态)。一氧化碳中毒首先要保障通气顺畅,最有效的处理措施是高压氧仓治疗,以避免因为缺氧时间长而引起脑病,故本题选C。

58. 答案:B

解析:患者肺部可闻及固定的中细湿

啰音，胸部 X 线片示支气管柱状扩张。符合支气管扩张的诊断，故本题选 B。

59. 答案:D

解析:脑出血最常见的是基底核区出血。

60. 答案:B

解析:患者右上腹撞击伤，休克状态(出血)，右上腹压痛反跳痛明显，腹膜刺激征阳性，符合肝脏破裂的典型表现。

61. 答案:B

解析:角色行为强化指安于患者角色，对自我能力表示怀疑，产生退缩和依赖心理。角色行为缺如指没有进入患者角色，不承认自己是患者，不能很好地配合医疗和护理。角色行为冲突指患者与其患病前的各种角色发生心理冲突而引起行为的不协调。

62. 答案:B

解析:患者呕血，上腹部轻压痛，体温、血压正常，故考虑是急性胃炎，选 B。

63. 答案:D

解析:患者主要表现为左膝关节有压痛，右髋髂关节压痛阳性，故该患者最可能的诊断是强直性脊柱炎。对强直性脊柱炎最特异的检查方法是 HLA-B27(D 对)。

64. 答案:A

解析:患者有髋关节疼痛病史，查体出现腹股沟区压痛阳性(股骨头坏死的典型体征)，“4”字试验阳性。X 线显示髋关节间隙正常。故选 A。

65. 答案:C

解析:中青年女性患者，低热(结核毒血症)、腹胀、腹痛 1 个月。查体:腹部弥漫压痛，揉面感(结核性腹膜炎的典型体征)，移动性浊音阳性(腹水阳性)。综合患者病史与体检，考虑诊断为结核性腹膜炎。腹腔镜+活检是对该患者诊断最有意义的检查。

66. 答案:A

解析:患者在聚餐后(食用油腻食物)突发的右上腹疼痛(胆囊)，且右上腹压痛，伴恶心呕吐，Murphy 征阳性，诊断为急性胆囊炎，进一步要做的检查是腹部 B 超。

67. 答案:D

解析:肛门周围胀痛、发热，排便时疼痛加重。查体发现肛门周围皮肤发红、

压痛明显。考虑肛周皮下脓肿，选 D。

68. 答案:D

解析:患者腰痛、尿频、尿急、尿痛、左肾区叩击痛，白细胞增多，血尿等提示急性肾盂肾炎可能性最大，D 项正确。

69. 答案:A

解析:患者突然出现上腹部的剧烈疼痛，随即转至右下腹，查体明显的腹部三联征，故该患者最可能的诊断是胃溃疡急性穿孔。

70. 答案:E

解析:患者进行性加重疼痛，消瘦，检查发现右膝肿胀，皮温稍热，静脉怒张，关节活动受限。考虑为骨肉瘤，是青少年最常见的原发恶性骨肿瘤，好发于四肢长骨干骺端，其中一半以上的病例发生于膝关节周围。最常见的临床症状是疼痛和局部肿块。符合患者的临床表现，故选 E。

71. 答案:D

解析:患者老年男性，进行性排尿困难病史，前列腺 III 度增大，尿路严重梗阻，此时应当行前列腺切除术切除前列腺，故选 D。

72. 答案:C

解析:大叶性肺炎是肺炎双球菌等细菌感染引起的，呈大叶性分布的肺部急性炎症。常见的诱因有受凉、劳累或者是淋雨，好发于青壮年男性以及冬春季节。该病可分为充血期、实变期和消散期。其中充血期肺部体征可呈现局部呼吸活动度减弱，语音震颤增强(A 对)，叩诊浊音(B 对)，可轻及捻发音。实变期可有典型的体征，比如患侧呼吸运动减弱，语音共振，语音震颤增强，叩诊呈浊音或者湿音，可闻及病理性的支气管呼吸音。消散期叩诊逐渐变为清音，支气管呼吸音也逐渐减弱，出现湿性啰音。突发高热有急性病容(D 对)，脉率增快(E 对)。故本题选择 C。

73. 答案:C

解析:患者寒战、高热，肝区叩击痛，符合细菌性脓肿的典型症状:寒战、高热、肝区疼痛和肝大。故本题选择 C。

74. 答案:D

解析:食管胃底静脉曲张是肝硬化失代偿期比较明显的症状，食管与胃底

静脉曲张破裂出血最突出的主诉是呕血，呕出的血往往是鲜红色，量比较多。患者肝硬化病史 3 年，在餐后呕吐大量鲜血，故本题选 D。

75. 答案:A

解析:患者有典型的急性胆囊炎症状，手术应选择胆总管切开减压。同时患者有腹痛、寒战、高热、黄疸反复发作，符合夏科三联征表现即胆总管结石，所以应行胆总管探查 T 管引流术。故本题选 A。

76. 答案:A

解析:胆囊切除术的临床指征是:1. $\geq 3\text{cm}$ 的大胆囊结石:远期诱发癌变风险高; 2. 充填性结石:胆囊完全被结石填充变成瓷性胆囊，失去正常生理功能; 3. 合并腹痛:内科保守治疗无效后需手术切除; 4. 合并息肉; 5. 合并高血压、糖尿病等基础疾病:基础性疾病得到控制时进行胆囊手术。患者胆囊结石病史 10 年，此次胆囊大于 3cm(大于 3cm 的结石远期诱发癌变的风险高)，故本题选 A。

77. 答案:D

解析:食管-贲门黏膜撕裂综合征多见于中年男性，发病高峰在 30~50 岁之间，男性多于女性。主要是因为中年男性爱饮酒，而饮酒是此病的高危因素，从而引发食管-贲门黏膜撕裂综合征。患者在饮酒后剧烈呕吐，后呕吐鲜血，无腹痛。符合食管贲门黏膜撕裂综合征的特点，故本题选 D。

78. 答案:B

解析:患者便血史，近来偶有脱出，便后自行回缩，此时是二期的痔疮，可以选择在痔核内注射硬化剂来进行治疗。故本题选 B。

79. 答案:B

解析:胃大部分切除术后影响了铁的吸收，引起缺铁性贫血，缺铁性贫血的常见表现有黏膜损害，有口角炎、舌炎、咽下困难及外胚叶组织营养缺乏的表现，如皮肤干燥、毛发枯、反甲等，还会出现神经、精神系统表现，如嗜异食癖。缺铁性贫血由于红细胞中血红蛋白含量的下降，血液携氧能力下降，会有皮肤苍白、心率加快、心脏杂音等循环系统改变。B 项属共济失调，病变在小脑:深感觉减退见于脊

髓后索(薄束和楔束)损伤。故选 B。

80. 答案:C

解析:本例突起呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，血压明显升高，考虑为血压骤升导致急性左心衰竭，降压为首要治疗，首选硝普钠静脉给药。硝普钠对动脉和静脉平滑肌均有直接扩张作用，有明显的降血压作用，应用于高血压急症; 且血管扩张使心脏前、后负荷均减低，心排血量改善，明显改善心力衰竭症状。西地兰适用于房颤伴心衰，无降压作用。氨茶碱对解除支气管痉挛有效，有正性肌力作用，扩张外周血管和利尿作用，也无明显降低血压作用。多巴酚丁胺具有升高血压作用，适用于低血压合并心力衰竭患者。硝酸甘油可扩张小静脉，降压效果不如硝普钠，且可反射性引起心率加快，不利于心衰患者。

81. 答案:D

解析:患者右下肢静脉迂曲扩张 15 年，长期站立有酸胀感。近 1 年右足靴区颜色加深、肿胀。且大隐静脉瓣膜功能试验阳性，深静脉通畅试验阴性，故诊断为单纯性下肢静脉曲张。

82. 答案:E

解析:患者两周前感冒，近来发生心悸，查体闻及频发期前收缩。心电图示:室性期前收缩。血清肌钙蛋白升高。考虑是病毒性心肌炎，故选择 E。

83. 答案:E

解析:患者有高血压病史，阵发性心悸(发生房室折返性心动过速所致)，发作时心电图有逆行 P 波，QRS 波群形态与时限正常。均与阵发性室上性心动过速的典型临床表现相符，故诊断为阵发性室上性心动过速。选 E。

84. 答案:D

解析:患者左髋疼痛、跛行 60 余天，伴乏力、低热、消瘦(结核感染的典型表现)。最可能的诊断是髋关节结核。

85. 答案:C

解析:患者有上呼吸道感染史，2 天来尿量减少，面部及双下肢水肿，尿蛋白、尿红细胞均阳性，补体 C3 轻度下降，最有可能的诊断是急性肾小球肾炎。

86. 答案:E

解析:略

87. 答案:C

解析:略

88. 答案:C

解析:临床诊疗伦理原则:(1)患者至上原则:医务人员在诊疗过程中始终以患者为中心,并把患者的利益放在首位。(2)最优化原则:在选择诊疗方案时以最小的代价获得最大效果的决策。(3)知情同意原则:医务人员在选择和确定疾病的诊疗方案时要取得患者知情和自由选择与决定,对于一些特殊检查特殊治疗和手术,以患者或患者家属(无家属者由监护人)签字为据。(4)保密守信原则:医务人员在对患者疾病诊疗的过程中及以后要保守患者的秘密和隐私,并遵守诚信的伦理准则。

89. 答案:D

解析:患者外伤有开放性骨折,大量出血、休克。现场急救首要的处理措施是加压包扎止血。

90. 答案:B

解析:患者在淋雨后突发寒战、高热、头痛,第2天出现右侧胸痛、咳嗽、咳痰胸片示右上肺大片实变影,诊断为大叶性肺炎,体检时不会出现的体征是气管向左侧偏移。气管偏移一般在一侧肺不张或者一侧气胸时出现。故本题选B。

91. 答案:E

解析:患者中老年男性,无痛性肉眼血尿(肾盂癌早期表现),查无异常,尿路造影显示肾盂有充盈缺损,故选择E选项。

92. 答案:D

解析:膀胱结石的临床表现为排尿痛、尿流中断,且改变体位又能继续排尿。

93. 答案:A

解析:常用的术式有3类。①疝囊高位结扎术:适用于儿童、疝囊较小、腹壁肌肉发育健全者。它也是疝修补术或疝成形术的基本步骤之一。②疝修补术:适用于腹壁缺损不十分严重的病人。是治疗腹股沟疝最常用的方法,在疝囊高位结扎后加强腹壁,其修补法主要有加强腹后壁的西尼法和加强前壁的佛格逊法。③无张力疝修补术。

94. 答案:D

解析:透光试验阴性,平卧后消失,考虑诊断为斜疝。

95. 答案:D

解析:甲状腺癌常见的病理学分型包括甲状腺乳头状癌,甲状腺未分化癌,甲状腺滤泡癌,甲状腺髓样癌。其中,甲状腺乳头状癌多伴有钙化,也是甲状腺癌中最常见的一种,约占甲状腺癌的80%,是恶性程度最低的一种甲状腺癌。一般来说,甲状腺癌经过系统治疗,预后是比较良好的,对于45以下的患者生存器基本上不会受到明显的影响,成本是比较低的,不需要放疗和化疗,只需要手术治疗,而且手术痛苦是比较小的,术后恢复是非常良好的。

96. 答案:E

解析:该患者为高血压心脏病患者伴发糖尿病,降压药物的选择首选血管紧张素转换酶抑制剂,该药长期使用可改善心室重构现象,从而改善患者预后。故选E。

97. 答案:B

解析:略

98. 答案:D

解析:患者有高空坠落史,出现血压下降,髌骨挤压试验阳性,双下肢不等长,会阴部淤斑,可以首先诊断骨盆骨折。

99. 答案:A

解析:罹患率表示某人群某病新病例发生频率,通常多指在某一局限范围,短时间内的发病频率。

100. 答案:A

解析:患者外伤后出现腰痛及右下肢麻木,查体出现腰部活动受限,最可能的诊断是腰椎间盘突出症。

101. 答案:C

解析:(1)角色行为缺如:即未能进入角色或否认自己患病;(2)角色冲突:病人角色和其他角色发生心理冲突;(3)角色行为减退:进入角色的病人,由于更强烈的情感需要,从事其他不应承担的活动;(4)角色行为强化:表现为自信心减弱,依赖性加强,安于病人角色现状。

102. 答案:D

解析:心音消失是最有助于确诊心脏骤停的临床表现。

103. 答案:C

解析:患者有开放性骨折史,创口不愈合,应该考虑的是慢性骨髓炎。

104. 答案:C

解析:老年患者股骨颈骨折,容易使股骨头血供缺乏。X线片提示股骨头已经坏死,最有效地治疗是人工关节置换。

105. 答案:A

解析:略

106. 答案:C

解析:患者喘憋,双肺布满湿啰音,心率过快。最适宜的治疗措施是静脉推注呋塞米。

107. 答案:A

解析:患者心肌梗死,突然胸闷、气喘、大汗,两肺满布干湿啰音,第一心音低钝。最可能的诊断是急性左心衰。

108. 答案:C

解析:略

109. 答案:C

解析:双氢吡啶类的钙拮抗剂目前在临床上常用的有硝苯地平、尼群地平、氨氯地平、非洛地平等。非双氢吡啶类钙拮抗剂主要用于心律失常(如维拉帕米)、和冠心病心绞痛(如硫氮卓酮)。这类药物常见的不良反应包括:体位性低血压;心动过速;头痛、颜面潮红、多尿;便秘;胫前、踝部水肿;心动过缓或传导阻滞;抑制心肌收缩力;皮疹和过敏反应等。

110. 答案:C

解析:患者上腹部饥饿痛,进食后缓解,提示十二指肠溃疡,选C。

111. 答案:E

解析:略

112. 答案:A

解析:患者有不洁性生活史,硬下疳,故选A。

113. 答案:D

解析:未对患者进行相关检查,就直接开药,违背了合理配伍原则。

114. 答案:B

解析:患者糖尿病经过口服药物治疗加运动饮食治疗效果不好,2型糖尿病经饮食及口服降糖药治疗未获得良好控制者,经体力锻炼和饮食治疗效果不佳者,亦可直接加用胰岛素治疗。所以该患者控制糖尿病的最佳治疗方案应选择用胰岛素治疗。

115. 答案:C

解析:主动脉瓣狭窄主要临床表现为呼吸困难、心绞痛和晕厥;重要体征为主动脉瓣区收缩期喷射样杂音,常伴震颤;X线检查可见左心房扩大,升主动脉扩张。因此,本例可能的诊断为主动脉瓣狭窄。

116. 答案:A

解析:患者处于密闭环境中,室内烤炉火,最有可能的诊断是急性一氧化碳中毒。

117. 答案:B

解析:选项A,稳定型心绞痛指劳累性心绞痛发作的性质在1~3个月并无改变,即每日和每周疼痛发作次数大致相同,诱发疼痛的劳累和情绪激动程度相同,每次发作疼痛的性质和部位无改变,疼痛时限相仿,用硝酸甘油后,也在相同时间内发生疗效。选项B,不稳定型心绞痛是稳定型劳力性心绞痛和心肌梗死中间状态。选项C,心内膜下心肌梗死为缺血性坏死累及心室壁的内层,不到心室壁厚度的50%。患者多出现胸骨后压榨样剧烈疼痛,向左上肢放射。休息和含硝酸甘油不能缓解,常伴烦躁不安、出汗、恐惧或濒死感。选项D,中间综合征的特点是疼痛在休息或睡眠时发生,历时较长,达30min到1h或以上,但无心肌梗死的客观证据,常为心肌梗死的前奏。选项E,变异型心绞痛发作时,心电图示有关导联的ST段抬高,与之相对应的导联则ST段可压低,为冠脉突然痉挛所致,迟早会发生心肌梗死。患者符合恶化型心绞痛的标准,应考虑为B。

118. 答案:D

解析:患者老年男性,吞咽困难,上消化道钡餐造影示食管中段黏膜紊乱,管壁僵硬管腔狭窄。诊断为食管癌。

119. 答案:E

解析:患者排便疼痛,便后出血,便后疼痛可缓解,最可能的诊断是肛裂。

120. 答案:C

解析:老年人血管脆性增高,大动脉硬化导致脉压差较大。故选C。

121. 答案:B

解析:患者妇检宫颈呈糜烂状,宫颈活检示不典型增生侵及上皮全层,腺体有异型增生(癌变)。考虑诊断为宫颈

浸润癌。

122. 答案:D

解析:患者转移性右下腹痛,腹肌紧张,诊断为急性阑尾炎,最恰当的处理是手术治疗。选 D。

123. 答案:D

解析:患者主要症状是外阴瘙痒和泡沫样白带,诊断为滴虫性阴道炎,治疗首选甲硝唑。

124. 答案:C

解析:临床上把高血压分为三级,一级高血压标准为收缩压 140-160、舒张压 90-100 之间,二级高血压标准为收缩压 160-180、舒张压 100-110 之间,三级高血压标准为收缩压 >180、舒张压 ≥110。高血压病的危险分层,分为低危、中危、高危和极高危。低危指的是高血压病一级,没有伴随其他的危险因素。中危指的是高血压病一级,伴有 1-2 种危险因素。还有高危的病人指的是高血压病 1-2 级,伴随三种以上的危险因素。还有一种是极高危的,极高危指的是高血压病三级以上,或者是高血压病 1-2 级,但是伴随相应的靶器官的损害,或者是相应的临床症状,比如有糖尿病或者肾功能不全的情况,都统称为极高危的病人。故本题选 C。

125. 答案:C

解析:略

126. 答案:B

解析:略

127. 答案:C

解析:略

128. 答案:A

解析:略

129. 答案:A

解析:略

130. 答案:B

解析:血尿伴肾绞痛最可能的病因是肾结石。以尿频、尿急为主要症状,普遍抗生素治疗无效时应首先考虑的是肾结核。

131. 答案:D

解析:略

132. 答案:B

解析:略

133. 答案:B

解析:略

134. 答案:A

解析:肾病综合征的患者过度使用利尿剂,病人会出现为低血容量、低血钾、低血钠、低氯血症等。通常进入到慢性肾衰竭 5 期的人会有难以控制的高血压、顽固的电解质紊乱、酸中毒,及严重的难以纠正的心功能衰竭。

135. 答案:A

解析:略

136. 答案:E

解析:略

137. 答案:D

解析:略

138. 答案:A

解析:患者吸烟史,间隔咳嗽、咳痰 10 余年,喘息 5 年(COPD)。加重 3 日(急性加重期),闻及湿性啰音,此时的处理措施应该为抗感染。

139. 答案:A

解析:急性淋巴细胞白血病是血液系统的恶性肿瘤。主要有贫血、出血、感染和浸润这几大临床表现。通常情况下,它起病是比较急的,病程相对比较短。如果一个人反复的发热,且用抗感染效果欠佳,就需要考虑是不是有恶性血液病的可能。如果有全身的淋巴结肿大,以及鼻出血,牙龈出血,或者皮肤的淤点淤斑,如果这种情况经常发生,也需要考虑是不是血液系统的恶性肿瘤。对于急性淋巴细胞白血病,它和髓系白血病的主要差异就是它常伴有全身多处的淋巴结的肿大。对于髓系,这个症状并不是很明显。除了上述的表现之外,还有一个典型的特点就是胸骨的压痛。所以,对于急性淋巴细胞白血病,主要的几大症状,就是贫血、出血、感染、浸润。

140. 答案:A

解析:略

141. 答案:B

解析:略

142. 答案:D

解析:略

143. 答案:A

解析:患者高血压病、血脂异常病史,持续性胸痛 2 小时,2 小时前出现胸骨后疼痛,休息后未减轻,逐渐出现呼

吸困难。V1~V3 导联 ST 段抬高，该患者最可能的诊断是急性心肌梗死。该患者关键的治疗是再灌注治疗。

144. 答案:E

解析:略

145. 答案:D

解析:略

146. 答案:E

解析:患者撞击伤，左上腹疼痛伴轻度恶心未呕吐，伴心慌、出冷汗。考虑脾破裂出血，此时可行腹腔穿刺进行确诊。若腹腔抽出不凝血，则可能是腹膜脱纤维作用。

147. 答案:B

解析:略

148. 答案:C

解析:患者腹部手术史，进食后出现呕吐、腹痛，且停止排便、排气。首先要考虑的诊断为黏连性肠梗阻。导致此次疾病的主要病因是腹部手术史。

149. 答案:B

解析:略

150. 答案:C

解析:略

第二单元

1. 答案:D

解析:II 型呼吸衰竭即高碳酸性呼吸衰竭，血气分析特点为 O₂ 分压下降、CO₂ 分压增加。若使用镇静剂，可加重 CO₂ 潴留，从而加重 II 型呼吸衰竭(D 对)。呼吸兴奋剂可增加肺通气，加快 CO₂ 排除，故不会加重 II 型呼吸衰竭(A 错)。袝利尿剂主要作用为利尿，对肺通气无影响(B 错)。强心剂主要加强心肌收缩力，使心脏搏出量增加，对肺通气无影响(C 错)。血管扩张剂主要作用为扩张静脉，从而降低血压，对肺通气无影响(E 错)。

2. 答案:E

解析:维生素 D 缺乏性的佝偻病患者在发病的最早期，骨骼不会出现明显得改变，当三个月到六个月之间会出现明显的颅骨软化，主要为颅骨比较薄。前卤周围比较柔软，当被按压枕骨和顶骨时会有乒乓球样的触感。

3. 答案:E

解析:丙戊酸钠是广谱的抗癫痫药，用

于全面性发作，尤其是全面性强直-阵挛发作合并失神发作的首选药物。

4. 答案:C

解析:选项 A 乙型肝炎表面抗原(HBs):属于 HBV 的外壳蛋白，不含病毒核酸成分，本身不具传染性，不反映病毒有无复制、复制过程、传染性强弱及预后倾向。其临床意义需结合其他检查项目综合判断。选项 B 表面抗体(抗-HBs):是保护性抗体，说明机体对乙型肝炎病毒具备了一定的免疫力。选项 E 为 e 抗原(HBeAg):是乙肝病毒核心颗粒中的一种可溶性蛋白质，为乙肝病毒复制的标志之一，代表着传染性高低，阳性则说明传染性较强。选项 D 为 e 抗体(抗-HBe):出现于 HBeAg 阴转后，代表传染性下降，但仍具有一定的传染性，且表明病程较长。选项 C 核心抗体(抗-HBc):是乙型肝炎核心抗原刺激肝细胞所产生的一种免疫球蛋白，是乙肝病毒抗体系统中出现较早的抗体，传染性强。

5. 答案:A

解析:预防疟疾复发选用的药物是伯氨喹。

6. 答案:C

解析:降钙素由甲状腺素滤泡旁细胞合成和分泌的肽类激素，可减低血浆中钙、磷浓度，抑制钙、磷的吸收。甲状腺髓样癌来源于分泌降钙素的甲状腺滤泡旁细胞。

7. 答案:C

解析:应用全胃肠外营养时，氮和热量之比应为 1:(150~200)kcal。

8. 答案:B

解析:Apgar 评分，即阿氏评分、新生儿评分，Apgar(阿普加)这个名字的英文字母刚好对应检查项目的英文首字母，包括:肌张力(Activity)、脉搏(Pulse)、皱眉动作即对刺激的反应(Grimace)、外貌(肤色)(Appearance)、呼吸(Respiration)，是孩子出生后立即检查他身体状况的标准评估方法。

9. 答案:D

解析:疟疾的传播途径是按蚊吸血。

10. 答案:A

解析:小儿生长发育最迅速的时期是婴儿期。

11. 答案:D

解析:月经周期中有正常的排卵,排卵期体温应该是轻度升高的。女性的排卵是受到体内激素水平控制的,在排卵之前,女性的激素水平达到高峰,尤其是孕激素,孕激素升高之后,就会导致体温轻度升高,一般比原来的基础体温升高 0.3 度-0.5 度。

12. 答案:C

解析:心脏浊音界向两侧增大,皆为绝对浊音区;心尖搏动弱,位于心浊音界左缘内侧或不能扪及;心音低而遥远;心包有大量积液时,可在左肩胛下出现浊音及左肺受压迫所引起的支气管呼吸音,称心包狭窄征(Ewart 征);少数病例中,在胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及心包叩击音。故选 C。点头征和 Duroziez 征、双期杂音均见于主动脉瓣关闭不全。脉短绌指脉率少于心率者,常见于期前收缩、心房颤动。Roth 斑见于风心病。

13. 答案:A

解析:体重是反映体格生长和营养状况的重要指标。

14. 答案:A

解析:目前胆碱酯酶主要用于有机磷农药中毒及其肝脏功能的评定与分析情况,可作为疾病的病情轻重及其预后参考。临床上胆碱酯酶偏低,可见于有机磷农药中毒的患者、肝硬化、消化道出血、消化道肿瘤疾病患者,甚至于心肌梗塞的患者、长期饥饿等等。胆碱酯酶主要由肝脏内合成、分解,胆碱酯酶降低多是由于肝脏代谢异常导致,说明肝脏受到不同程度的损伤,肝脏合成功能下降,出现胆碱酯酶降低的情况。有机磷中毒的患者胆碱酯酶的活力下降,从而导致胆碱酯酶降低。胆碱酯酶越低提示有机磷中毒病情越危重。

15. 答案:E

解析:对于羊水栓塞,多数是在羊水进入到血循环之后,对肺小血管产生阻塞作用,引发肺动脉高压、凝血功能异常及 I 型变态反应等,导致产妇机体出现病理性的生理变化,最终形成羊水栓塞。主要病因有羊膜腔内压力过高,血窦开放,胎膜破裂。

16. 答案:C

解析:呼吸衰竭最主要的临床表现是

呼吸困难与发绀。

17. 答案:C

解析:略

18. 答案:E

解析:属于上运动神经元性疾病的体征是:肌张力增高(折刀样),腱反射增强,病理反射阳性,无肌肉萎缩;在急性严重损伤病变时,由于断联休克作用,瘫痪开始是迟缓的,可以无病理反射,休克期过后逐渐转变为痉挛性瘫痪。

19. 答案:E

解析:临床上目前认为乳腺癌最有效的检出方法是钼靶摄片。

20. 答案:D

解析:胸腔穿刺是确诊脓胸的最佳检查方法。

21. 答案:D

解析:甲状腺功能亢进的临床表现主要有怕热、多汗,多食,心慌,体重下降,不会出现胃肠道等临床表现,故本题选 D。

22. 答案:D

解析:肺功能检查是呼吸系统疾病的必要检查之一,主要用于检测呼吸道的通畅程度、肺容量的大小,对于早期检出肺、气道病变,评估疾病的病情严重程度及预后,评定药物或其他治疗方法的疗效,鉴别呼吸困难的原因,诊断病变部位、评估肺功能对手术的耐受力或劳动强度耐受力及对危重患者的监护等方面有重要的临床价值。

23. 答案:C

解析:角膜反射和瞳孔对光反射减弱的意识障碍是中度昏迷。

24. 答案:D

解析:略

25. 答案:E

解析:肩关节外伤后有时会损伤腋神经。而腋神经支配三角肌。所以腋神经损伤后肩关节前举、后伸、外展功能往往会受限。

26. 答案:C

解析:略

27. 答案:E

解析:胃食管反流病患者的典型症状是反酸、烧心。

28. 答案:C

解析:对颅底骨折合并脑脊液漏,我们不能擦拭脑积液,或者用纱布填塞,以防脑脊液漏,以防逆行性感染,造成颅内感染。

29. 答案:D

解析:氨茶碱的主要不良反应包括恶心、呕吐、心律失常、血压下降及多尿,偶可兴奋呼吸中枢,严重者可引起抽搐乃至死亡。静脉注射速度过快可引起严重不良反应,甚至死亡。由于氨茶碱的“治疗窗”窄,所以在支气管哮喘急性发作时不能使用。

30. 答案:B

解析:急性胰腺炎患者的主要表现之一是腹痛,轻重程度不一,如腹痛严重,在治疗时可以采用止痛治疗,止痛药物可考虑应用盐酸哌替啶,但不推荐应用吗啡,吗啡会造成奥狄氏括约肌痉挛、胰液排出不畅,而包括胆结石、胆囊炎等各种原因造成的胰管阻塞,是胰腺炎患者腹痛的重要原因之一。所以应用吗啡可能加重胰腺炎的腹痛表现,甚至加重病情。

31. 答案:B

解析:如果有急性的尿潴留,首先要进行留置尿管然后进行导管插入术(无创)或耻骨上膀胱造口术(有创)以排出膀胱尿液以减轻疼痛,然后应进行进一步检查以确定原因。

32. 答案:E

解析:此题考点为消化性溃疡的辅助检查 HP 检测。胃黏膜组织染色法、快速尿素酶试验、幽门螺杆菌培养、¹³C 或 ¹⁴C 尿素呼吸试验阳性均可确定目前存在幽门螺杆菌的感染。血清幽门螺杆菌抗体测定为非侵入性间接检查幽门螺杆菌感染的方法,阳性表明受试者感染了幽门螺杆菌,因血中抗体存留时间长,阳性者不能肯定目前是否有幽门螺杆菌存在。因此,正确答案是 E。

33. 答案:A

解析:重型溃疡性结肠炎首选的药物主要为糖皮质激素类药物,对于溃疡性结肠炎的治疗,其主要包括内科保守治疗和外科手术治疗的方法。治疗重型溃疡性结肠炎的药物主要包括,激素,它们具有抑制免疫反应的作用,特别是对于处于急性期的患者。

34. 答案:A

解析:在我国 80%以上,慢性萎缩性胃炎属于 B 型,与幽门螺杆菌、化学损伤比如胆汁反流、非甾体抗炎药,吸烟、酗酒等有关。

35. 答案:B

解析:阑尾炎之所以出现转移性右下腹痛,主要和解剖生理构造有密切的关系。由于阑尾的神经是由于交感神经腹腔丛和内脏的神经传入,其传入的脊髓节段在体表定位在第 10 和第 11 胸节,当急性阑尾炎发病时阑尾黏膜受到刺激之后,会表现为脐周的牵扯样疼痛,属于内脏疼痛的性质,随着阑尾炎症逐渐扩展,最终阑尾炎症侵及了阑尾管腔的浆肌层,疼痛就会随之转移在阑尾脏器本身的疼痛上面,因此就出现了典型的表现转移性右下腹部疼痛。临床上也根据疼痛的特点对阑尾进行初步的判定,而且准确率和诊断率也比较高。

36. 答案:B

解析:丙硫氧嘧啶为硫脲类药物,有过敏反应、消化道反应、粒细胞缺乏症、甲状腺肿及甲状腺功能减退,其中最严重的不良反应为粒细胞缺乏,应定期做血象检查,所以答案为 B。

37. 答案:A

解析:略

38. 答案:B

解析:略

39. 答案:C

解析:婴幼儿秋冬季腹泻的最常见病原体是轮状病毒。

40. 答案:D

解析:略

41. 答案:A

解析:靴形心最常见于主动脉瓣关闭不全。

42. 答案:B

解析:正常情况下有四对韧带支撑子宫位于前倾前屈位,分别为阔韧带、圆韧带、主韧带和宫骶韧带。首先,阔韧带是位于子宫两侧的双层腹膜,它的上缘游离形成骨盆漏斗韧带,而卵巢内侧与宫角之间的阔韧带稍增厚,形成卵巢固有韧带,子宫动静脉和输尿管均从阔韧带的基底部穿过。其次,圆韧带是起自宫角前面止于大阴唇前

端的一条韧带，有支撑子宫前倾位置的作用。再次，主韧带是横行于子宫颈两侧与骨盆之间的韧带，可以固定子宫颈的位置，防止子宫脱垂。最后，宫骶韧带起自子宫体和子宫颈交界处的后方，终止于第 2、3 骶椎前缘，其主要作用是向后、向上牵引宫颈，进一步使子宫位于前倾的位置。

43. 答案:D

解析:胸骨后甲状腺肿是进行手术治疗的绝对指征，病人也会表现为颈前隆起性的包块，并且有明显的压气感，因为肿大的腺体也容易压迫到气管，在充分的术前准备之后，选择甲状腺腺体大部分切除。

44. 答案:B

解析:略

45. 答案:B

解析:运动神经元的胞体主要位于大脑皮质体运动区的锥体细胞，这些细胞的轴突组成下行的锥体束，其损害后，中枢性瘫痪的肌张力增高(折刀样肌张力增高)，腱反射亢进，病理反射阳性。

46. 答案:A

解析:对于癫痫来说最重要的检查，叫脑电图检查，脑电图检查是一种脑电信号的检查，因为大脑平时工作的时候，有正常的脑电信号出来，然后癫痫发作的时候它出来的脑电信号是异常的，所以通过脑电图检查就可以发现脑电是正常的还是异常的，但是也不是说就做这一个检查就可以，因为它的异常放电跟时间有关系。还有的一个检查就是磁共振的检查，磁共振检查是检查大脑的结构，可以发现大脑有没有这个出血缺血，或者有没有软化灶，或者脑肿瘤结构性的病变。最主要的检查就是这两个。

47. 答案:B

解析:(1)第一天补液步骤如下:①扩容阶段:对重度脱水或中度脱水有明显周围循环障碍者，用 2:1 等张含钠液 20ml/kg，于 30~60 分钟内静脉推注或快速滴注，以迅速增加血容量，改善循环和肾脏功能。适用于任何脱水性质的患儿。②补充累积损失为主的阶段:在扩容后根据脱水性质选用不同溶液(扣除扩容液)继续静脉滴注。

对中度脱水无明显周围循环障碍者不需要扩容，可直接从本阶段开始补液。本阶段(8~12 小时)滴速宜快，一般为每小时 8~10ml/kg。③维持补液阶段:脱水已基本纠正，只需补充生理需要量和异常的继续损失量。应当将输液速度稍放慢，将余量于 12~16 小时滴完，一般约每小时 5 ml/kg。若吐泻缓解，可酌情减少补液量，或改为口服补液。输液速度主要决定于脱水程度和大便量，一般按每毫升 16 滴计算，小滴按每毫升 20~22 滴计算。应用上述方法补液，水量稍显不足，尤其是输液量少者，但患儿多能饮水，故可以弥补，不必全部静脉滴注。呕吐频繁，不能饮水者，可给予适量的 5%~10% 葡萄糖溶液，加入上述滴液中滴注，尤其是在维持补液阶段，以免发生高钠血症。每一个病例病情不同，进水量多少不等，尤其是大便量难以准确估算和预测，这是影响输液量的一个重要的变化因素。所以在治疗过程中要密切观察治疗后的反应，随时调整液体的成分、量和滴速。(2)第二天以后的补液:经第一天补液后，脱水和电解质紊乱已基本纠正，故输液主要是补充生理的需要量和异常的继续损失量(防止发生新的累积损失)，继续补钾，供给热量。如吐泻好转，可停止静脉输液，口授饮食；若腹泻仍频或口服液量不足者，仍需静脉补液。补液量需根据吐泻和进食情况估算。可 100ml/(kg·d) 计算，补液成分可用 3:2:1 液，于 12~24 小时内以平均速度输入。

48. 答案:B

解析:略

49. 答案:C

解析:略

50. 答案:A

解析:抑郁症的典型表现有情绪低落，思维缓慢，意志活动减退，其中情绪低落是核心症状。

51. 答案:C

解析:略

52. 答案:B

解析:略

53. 答案:A

解析:略

54. 答案:C

解析:肝性脑病患者禁用的饮食是高蛋白饮食,尤其是动物蛋白的食物,肝性脑病患者进食高蛋白食物,尤其是含动物蛋白丰富的食物,是肝性脑病的诱发因素之一,因此出现肝性脑病症状时,应停止进食此类食物,以减少氨在肠道内的产生。

55. 答案:B

解析:门静脉高压时,出现最早的症状是脾大。

56. 答案:B

解析:在肝硬化失代偿期时,肝功能减退的突出表现是肝掌和蜘蛛痣,选择 B 选项。

57. 答案:E

解析:患者掌指和腕关节反复肿痛,近期晨起时出现关节僵硬活动后可缓解(晨僵,类风湿关节炎的主要临床表现)。首先考虑类风湿关节炎,选 E。

58. 答案:C

解析:产妇在娩出胎盘后阴道大量流血,最可能的诊断是子宫收缩乏力。

59. 答案:E

解析:Killip 分级是用于在 AMI(急性心梗)所致的心力衰竭的临床分级。I 级:无心力衰竭征象,但 PCWP(肺毛细血管楔嵌压)可升高,病死率 0~5%。II 级:轻至中度心力衰竭,肺啰音出现范围小于两肺野的 50%,可出现第三心音奔马律、持续性窦性心动过速或其它心律失常,静脉压升高,有肺淤血的 X 线表现,病死率 10~20%。III 级:重度心力衰竭,出现急性肺水肿,肺啰音出现范围大于两肺的 50%,病死率 35~40%。IV 级:出现心源性休克,收缩压小于 90mmHg,尿少于每小时 20ml,皮肤湿冷,发绀,呼吸加速,脉率大于 100 次/分,病死率 85~95%。NYHA 分级是按照诱发心衰症状的活动程度将心功能的受损状况分为四级。I 级:患者患有心脏病,但日常活动量不受限制,一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。II 级:心脏病患者的体力活动受到轻度的限制,休息时无自觉症状,但平时一般活动下出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。III 级:心脏病患者体力活动明显受限,小于平时一般活动即可引起上述症状。IV 级:

心脏病患者不能从事任何体力活动,休息状态下也出现心衰的症状,体力活动后加重。

60. 答案:A

解析:腓总神经损伤患者主要表现为足下垂、小腿外侧的皮肤感觉消退及腿部麻痹等症状,还可能伴有足下垂内翻等并发症的发生。故选 A。

61. 答案:B

解析:计算预产期的算法整个孕期有 280 天,计算方法是最后一次来月经的第一天算起月份=最后一次来月经的月份加上 9 或减去 3;(如果数加上 9 大于 12,则用减 3 算,如果加上 9 小于 12 则用加 9 的算)日期=最后一次来月经的日期加 7。

62. 答案:C

解析:根据公式:牙齿数=月龄-6 得出小儿年龄为 18 个月,即 1.5 岁。

63. 答案:E

解析:患者处于备孕期,应当选择甲基多巴和拉贝洛尔适合女性备孕期期间服用的降压药。

64. 答案:B

解析:佝偻病一般分为三期:第一、初期,因为血钙水平的偏低,孩子的神经兴奋性比较强。第二、激期(活动期),也是病情进展比较快的时期,出现骨骼畸形、方颅。第三、恢复期或者后遗症期。

65. 答案:E

解析:年轻女性患者,腹痛且伴有恶心呕吐,查体发现左侧附件区有压痛,右转疼痛缓解。B 超提示左侧卵巢位置有液性暗区。首先应该考虑的是卵巢囊肿蒂扭转。

66. 答案:B

解析:患者突发神志不清抽搐,10 分钟后可自行缓解,事后全无发作时记忆。其余无异常,符合癫痫发作特点,故本题选 B。

67. 答案:C

解析:患者 T3、T4 降低, TSH 升高。诊断为甲状腺功能减退证,治疗首选丙硫氧嘧啶。

68. 答案:B

解析:患者学生,过度紧张出现早搏,最适宜的治疗方案是休息后复查。

69. 答案:E

解析:患者非洲旅游史,查体发现双侧腋窝淋巴结肿大,腋窝下有红点,肛周鸡冠状疣状物,CD4⁺下降。首先应该考虑的是艾滋病。

70. 答案:C

解析:患者多个伴侣史,尿痛,大量脓性分泌物,首先应该考虑的诊断是淋病(C对)。女性的患者出现淋病以后,主要表现为宫颈的红肿、糜烂,可以有黄绿色的脓性分泌物,外阴刺痒并有烧灼感,偶尔有腹痛、腰痛。符合患者的临床症状。故本题选择C选项。

71. 答案:D

解析:小肠切除影响吸收的营养素是维生素B12。

72. 答案:A

解析:患者情绪低落,想自杀,典型的“三无症状”。诊断为抑郁症,治疗药物选择5-羟色胺再摄取抑制剂。

73. 答案:C

解析:上腹部手术后拆线时间是7~9天。

74. 答案:B

解析:略

75. 答案:C

解析:患者青年女性,白带鱼腥臭味,阴道PH值偏碱性,符合细菌性阴道炎的临床特征,故选择C选项。

76. 答案:D

解析:患儿抽搐,后自行缓解,血钙为1.73mmol/L(小于2.25),诊断为维生素D缺乏性手足搐搦症。

77. 答案:C

解析:烧伤主要分为三度,也叫三度四分法,烧伤分度主要是根据烧伤深度来划分,具体如下:1、I度烧伤,最浅的烧伤也叫表皮烫伤,主要表现为红斑等;2、II度烧伤,又分为深II度,还有浅II度,II度烧伤,主要表现为真皮部分的烧伤;3、III度烧伤,是最深的烧伤,表现为皮肤全层,还包括皮下组织全层烧伤。国际上主要为三度四分法,皮肤分为五层,最浅层是表皮。I度烧伤是表皮烧伤,愈合最快。烧伤越深,愈合越慢。

78. 答案:D

解析:患者是女青年,有反复咳嗽喘息史,且发作时加重,诊断为支气管哮喘(D对)。慢性喘息性支气管炎临床症状主要是有一个长期的咳痰(A错)伴

有喘息以及反反复发作为特征。支气管扩张患者的典型症状为长期持续的反复咳嗽、咳痰或咳脓痰,发热、咯血,还可伴有呼吸困难、消瘦以及贫血等症状(B错)。多数急性间质性肺炎患者既往体健,起病突然,突然出现发热、干咳、咳脓痰、胸闷、乏力等,病情进展迅速(C错)。慢性阻塞性肺疾病起病缓慢,病程较长,早期可以没有自觉症状。随病程发展可出现慢性咳嗽、咳痰、气短、胸闷等。(E错)。

79. 答案:D

解析:根据中毒症状:唇、指甲以及全身皮肤青紫,且是在集体进食后出现的,诊断为亚硝酸盐中毒。

80. 答案:B

解析:患者石膏固定长腿4个月,后发现膝关节功能发生障碍,最可能的原因是关节僵硬。

81. 答案:A

解析:精神分裂症患者会有感知觉的障碍、思维障碍、情感障碍、意志和行为障碍认知功能障碍。一般多并发精神衰退、精神残疾等疾病(A对)。强迫症的基本症状包括强迫观念和强迫行为,严重程度差异较大,有些患者还有回避行为和情绪波动严重等表现(B错)。抑郁症的患者表现为“三低症状”(C不对)。反应性精神病是由于剧烈或持续的精神紧张性刺激直接引起的。其临床表现的主要内容与精神创伤密切相关,并伴有相应的情感体验,容易被人所理解(E错)。

82. 答案:C

解析:略

83. 答案:D

解析:短暂性脑缺血发作常起病突然,迅速出现一侧肢体麻木、无力以及失语、语笨、头晕等局灶性神经系统或视网膜的功能缺损,一般多在1~2小时内恢复,不遗留神经功能缺损体征。多有反复发作的病史,每次发作时的临床表现基本相似。

84. 答案:A

解析:产妇宫缩规律,宫口开大速度正常,胎心正常,此时只用严密观察产程进展进行。

85. 答案:D

解析:子宫脱垂目前分度是使用pop-q

分度，根据患者采取平卧位向下用力屏气时子宫下降的程度而定，一般分为一度、二度和三度。一度是子宫和宫颈，没有脱出阴道口。二度子宫脱垂是宫颈已经从阴道口脱出，且有一部分子宫体也脱出阴道口。三度子宫脱垂是最严重，全部宫颈以及宫体完全脱出，需要采取手术治疗。

86. 答案:B

解析:孕妇无痛性阴道流血(胎盘早剥的典型症状)。先兆流产的患者会有少量阴道流血，会伴有阵发性下腹痛或腰背痛。胎盘早剥一般有诱发因素:高龄、外伤、感染等。宫颈息肉会有接触性出血。故诊断应该考虑前置胎盘。

87. 答案:A

解析:患者外伤史，张口困难，哭笑面容，角弓反张:破伤风的典型急性症状，诊断为破伤风。其感染致病菌为梭状芽孢杆菌。

88. 答案:B

解析:根据题干:双眼上翻，出现四肢强直性阵挛性运动，该患儿有抽搐，所以首先要解痉。

89. 答案:D

解析:一期缝合，是在手术后或创伤后的允许时间内立即缝合创口。二期缝合，一般是创伤后超过允许时间，创面无法完全缝合或者创口感染坏死等原因造成的。等到创口完全新鲜，肉芽组织饱满再做缝合以使创口痊愈。一期缝合一般伤口浅，创缘整齐，不伴随细菌感染。一般是瓣鲜伤品的缝合。如果伤口愈合不良，有必要时就是采取二期缝合。一期缝合对应于一期愈合;二期缝合跟二期愈合有关。但是如果一期缝合不良，也可以导致伤口愈合不良，引起二期愈合。根据患者创缘不齐，污染严重，应该选择清创后二期缝合伤口，故本题选 D。

90. 答案:D

解析:小儿轻度脱水，临床表现孩子精神稍差，略有烦躁不安，体格检查的时候可以见到皮肤稍干燥，弹性尚可，眼窝和前囟稍凹陷，哭的时候有眼泪，口唇黏膜略干，尿量稍减少。中度脱水，孩子精神萎靡或烦躁不安，皮肤苍白，干燥，弹性较差，眼窝和前囟明显凹陷，哭的时候眼泪少，口唇粘

膜干燥，四肢稍凉，尿量明显减少。重度脱水的时候，孩子呈重病容，精神极度萎靡，表情淡漠，昏睡甚至昏迷，皮肤发灰或者有花纹，弹性极差，眼窝和前囟凹陷，眼闭不合，两眼凝视，哭的时候没有眼泪，口唇粘膜极干燥，尿量极少甚至无尿。血钠小于 135mmol/L，为低渗性缺水。故本题选择 D 选项。

91. 答案:C

解析:根据题干:双肺闻及细湿啰音，可以考虑诊断为肺炎，金黄色葡萄球菌肺炎最常见并发症是猩红热样皮疹，肺脓肿。

92. 答案:D

解析:①患者接触性出血，宫颈菜花状肿物，应考虑宫颈癌。为明确诊断，应首选宫颈活组织检查(D)。②HPV 检查、宫颈细胞学检查均用于宫颈癌的普查。宫颈锥切术常用于宫颈上皮内瘤变的治疗。超声检查不能确诊宫颈癌。

93. 答案:B

解析:患者人工流产史，一直未来月经，基础体温呈双相型曲线，符合 Asherman 综合征。人工流产后宫颈或宫腔黏连称为 Asherman 综合征，是由于刮宫时损伤宫颈管黏膜或子宫内膜基底层，肌层，局部创面形成而致黏连。多次人工流产，术后感染及术后卵巢功能低下易引起。临床出现闭经、月经过少和不育者。

94. 答案:C

解析:患者不洁性接触史，有白带增多，外阴粉状小乳头突起，宫颈光滑，子宫正常大，附件无异常。最可能的诊断是尖锐湿疣。

95. 答案:D

解析:患者在就餐后出现腹痛、腹泻、里急后重伴发热(细菌性痢疾典型表现)。粪常规检查红白细胞满视野，最可能的诊断是急性细菌性痢疾。

96. 答案:C

解析:略

97. 答案:B

解析:患者面色黄，少笑，不哭。血象检查呈大细胞性贫血。血涂片中红细胞大小不等，中心淡染区消失。最可能的诊断是营养性巨幼红细胞性贫血。

98. 答案:A

解析:患者心前区隆起,无震颤,胸骨左缘第2肋间可闻及11级喷射性杂音, $P_2 > A_2$ 伴有固定分裂线示右心房、右心室扩大。最可能的诊断是房间隔缺损。

99. 答案:A

解析:患者高血压病史5年,突发剧烈头痛伴恶心、呕吐。神志清楚,四肢肌力正常,腱反射消失,无异常感觉。颈抵抗(+),病理征(-)。该患者最可能的诊断是蛛网膜下腔出血。

100. 答案:E

解析:患者血脂异常史,术后4天左小腿疼痛,左脚不能着地踏平。考虑是深静脉血栓形成。

101. 答案:D

解析:外伤后头皮下有明显波动感,后眉弓至枕部逐渐水肿。此时应该做穿刺抽血+局部加压包扎处理。

102. 答案:B

解析:产妇妊娠晚期,突发持续性腹痛,子宫板状硬,最有可能的诊断是胎盘早剥。

103. 答案:D

解析:患者高热,伴全身出疹全身皮肤弥漫性充血发红,咽扁桃体充血水肿,草莓舌。最可能的诊断是猩红热。

104. 答案:D

解析:本例患儿发热9天,眼结膜充血,口唇鲜红、干裂,舌呈草莓样,皮肤有浅红色斑丘疹,右颈淋巴结蚕豆大,指、趾端少许片状脱皮,血中白细胞增多,中性粒细胞增多,血小板增多,血沉加快,应诊断为川崎病(D对)。未见口周苍白圈、杨梅舌等特异症状,排除猩红热(A错)。无关节肿胀,排除幼年类风湿关节炎(B错)。无咽峡炎症状,早期白细胞升高,不符合传染性单核细胞增多症(C错)。无黄疸、出血、休克等症状,排除金黄色葡萄球菌败血症(E错)。

105. 答案:E

解析:患者高热,就诊过程中突然双眼上翻,肢体强直,持续1分钟。神经系统无异常,考虑惊厥最可能的原因是高热惊厥。

106. 答案:D

解析:患者38岁(绝经前女性),左乳房无痛性肿物,表面不光滑,边界不

清与皮肤粘连。最可能的诊断是乳腺癌。

107. 答案:C

解析:小儿身高85cm,头围48cm,乳牙20枚,大概是2岁左右的年龄,根据公式:体重=年龄 \times 2+8可以得出此小儿的体重约是12Kg。

108. 答案:E

解析:最佳避孕方式是男用阴茎套。

109. 答案:D

解析:骨盆外测量:骨盆外测量各径线正常值2cm或以上为均小骨盆;骶耻外径18cm为扁平骨盆。坐骨结节间径8cm,耻骨弓角度 90° ,为漏斗型骨盆。

110. 答案:B

解析:患者在晨起时发作,轻微头痛和发现左侧肢体无力。左侧Babinski征阳性,左侧肢体痛温觉消失。最可能的诊断是脑血栓形成。

111. 答案:E

解析:根据患者有头部摔伤史及CT检查发现新月形中等密度影,可诊断为硬脑膜下血肿。硬脑膜下血肿根据其受伤后出现临床症状和体征的时间不同分为急性、亚急性和慢性三种类型,头部受伤后3天以内出现颅内血肿症状者称为急性硬脑膜下血肿;3天至3周出现颅内血肿症状者称为亚急性硬脑膜下血肿;3周以上出现颅内血肿症状者称为慢性硬脑膜下血肿。故本例属于慢性硬脑下血肿,答案为E。

112. 答案:A

解析:根据病史“患者以左手托右肘部,头向右倾,检体见右肩下沉,右上肢功能障碍。胸骨柄至右肩峰连线中点隆起,并有局部压痛”可诊断为锁骨骨折,难以正确诊断时可拍上胸部正位X线片帮助诊断。肩关节脱位:在肩关节脱位时,将患侧肘部紧贴胸部时,手掌搭不到健侧肩部;手掌搭在健侧肩部时,肘部无法紧贴胸部,称为Dugas征阳性。

113. 答案:D

解析:根据患者的临床表现,双下肺叩诊呈浊音、语颤明显减弱、呼吸音消失提示有胸腔积液,结合胸腹水的化验,CEA明显增高,常提示为恶性胸水,故本题的正确答案为选项D。

114. 答案:E

解析:患者产后一个月,乳房出现局部红、肿、热、痛。考虑是急性乳腺炎,乳房外下象限发现一有波动感的脓肿,此时首选的处理措施应该是切开引流。

115. 答案:E

解析:麻疹皮疹先见于耳后发际。幼儿急疹特征是持续高热 3~5 天,皮疹主要见于躯干、颈部、上肢。风疹特征为发热第 2 天出疹并于一天内出齐。川崎病应在下述 6 条主要临床症状中至少满足 5 条才能确定:①不明原因的发热,持续 5 天或更久;②双侧结膜充血;③口腔及咽部黏膜弥漫充血,唇发红及干裂,并呈杨梅舌;④发病初期手足硬肿和掌跖发红,以及恢复期指(趾)端出现膜状脱皮;⑤躯干部多形红斑,但无水疱及结痂;⑥颈淋巴结的非化脓性肿胀,其直径达 1.5cm 或更大。咽结合膜热特点为急性起病,高热,咽部充血,疼痛明显,眼睛发红显著。

116. 答案:C

解析:患儿智能发育落后,惊厥,毛发皮肤色泽变浅,是苯丙酮尿症的典型临床表现,为协助诊断,应首选尿三氯化铁试验。Guthrie 试验为新生儿筛查检测,尿蝶呤分析用于鉴别各型 PKU。

117. 答案:E

解析:根据停经 8 周,阵发性腹痛,阴道流血,宫口开大可以初步诊断为难免流产。此时应尽早使胚胎及胎盘组织完全排出,可行刮宫术或负压吸宫术,并对妊娠物仔细检查,并送病理检查。故选项 E 正确。

118. 答案:A

解析:孕妇患重度子痫前期,慢性肾脏疾病或全身血管疾病病变时,胎盘早剥发生率增高,当底蜕膜螺旋小动脉痉挛或硬化,引起远端毛细血管变形坏死甚至破裂出血,血液流至底蜕膜曾与胎盘之间形成血肿,致使胎盘与子宫壁分离,主要表现为腹痛,阴道流血等失血表现,前置胎盘的典型症状是妊娠晚期或临产时发生无诱因,无腹痛反复阴道流血,先兆子宫破裂有子宫病理性缩复环形成,下腹部压痛,胎心率改变和血尿的出现。子宫破裂全腹压痛,反跳痛,腹壁下可清楚扪及胎体。

119. 答案:B

解析:略

120. 答案:A

解析:动脉导管未闭,肺动脉狭窄,室间隔缺损和房间隔缺损属于潜伏紫绀型先心病,患儿不应出现明显的紫绀,且患儿有阵发性缺氧发作史,其是法洛四联症的特异性临床表现,故本题正确答案为选项 A。

121. 答案:C

解析:癫痫发作时,首先予以静注地西洋止惊处理。

122. 答案:A

解析:患者在酒后出现意识不清,狂暴,且在清醒后不能回忆,该患者最可能的诊断是病理性醉酒。

123. 答案:A

解析:该患者无肝脾肿大,血小板计数减少,骨髓检查粒、红细胞系增生旺盛,巨核细胞增多,伴有成熟障碍,这些为特发性血小板减少性紫癜为诊断要点。故答案选 A。

124. 答案:A

解析:患者发热、嗜睡、神志不清,脑膜刺激征(+),红细胞、中性粒细胞升高,腰穿脑脊液检查压力 200mmH₂O,该患者最可能的诊断是流行性乙型脑炎。

125. 答案:A

解析:略

126. 答案:B

解析:抗胸腺细胞球蛋白(ATG)是再生障碍性贫血患者免疫抑制治疗的常用药物之一,属于多克隆抗体,为马、猪或兔免疫血清,具有杀伤 T 细胞的作用,常用于重症再生障碍性贫血患者的治疗。

127. 答案:D

解析:叶酸与维生素 B₁₂ 可以一起治疗巨幼红细胞性贫血。巨幼红细胞性贫血的时候,往往是由于叶酸或者是维生素 B₁₂ 缺乏所导致的,

128. 答案:E

解析:母乳性黄疸不严重,对宝宝的生长发育不会造成太大的影响,只是肤色会比较黄。建议在平时加强护理并且调整饮食,也可以在平时多给宝宝晒太阳,对此症状有一定的改善作用。

129. 答案:B

解析:血红蛋白下降,网织红细胞升高,血清总胆红素增多的是新生儿溶血病。

130. 答案:A

解析:本题主要考查考生的综合应用能力,考核产后出血病因的鉴别。引起产后出血常见的四大原因是:子宫收缩乏力、软产道裂伤、胎盘残留、凝血功能障碍。子宫收缩乏力是引起产后出血最常见的原因,主要存在胎儿过大、子宫张力过高、产程过长、精神紧张等因素,表现为胎儿、胎盘娩出后,子宫质软、轮廓不清、阴道暗红色血液,经使用缩宫素或按摩子宫有效。

131. 答案:B

解析:在胎儿娩出后立即(胎盘尚未娩出)流出鲜红色血液,且子宫轮廓清楚,应该诊断为软产道裂伤。

132. 答案:B

解析:略

133. 答案:D

解析:略

134. 答案:A

解析:略

135. 答案:D

解析:略

136. 答案:E

解析:略

137. 答案:B

解析:略

138. 答案:D

解析:肥厚型梗阻性心肌病体格检查可有心脏轻度增大,能听到第四心音;在胸骨左缘第3-4肋间听到较粗糙的喷射性收缩期杂音;心尖部也常可听到收缩期杂音,胸部X线示左心室增大。故答案选D。

139. 答案:C

解析:凡是能够抑制心肌收缩力或使回心血量增多的因素都可以是肥厚性心肌病所产生的杂音减轻。尤其是 β 受体阻滞剂和维拉帕米常做为治疗肥厚性心肌病的首选药物。但二者不能同时使用。

140. 答案:E

解析:该病例的实验结果支持缺铁性贫血,且婴儿从4个月开始应添加辅食,补充铁剂,但是单纯母乳喂养,导致营养性缺铁性贫血。

141. 答案:C

解析:略

142. 答案:E

解析:略

143. 答案:C

解析:疱疹性咽峡炎是小儿一种特殊上感。除上感表现外,咽峡部、软腭、悬雍垂等处黏膜出现2~4mm灰白色小丘疹,周围绕有红晕,渐变成疱疹,疱疹破溃,形成溃疡,亦可三种病变同时存在。

144. 答案:A

解析:最常见的病原体是柯萨奇A组病毒。

145. 答案:E

解析:患者围绝经期女性,阴道不规则流血半个月,无腹痛,最有可能的诊断是子宫内膜癌。

146. 答案:E

解析:为明确诊断,下一步应进行的检查是子宫分段诊刮活检。

147. 答案:B

解析:21-三体综合征(唐氏综合征)有其特殊面容如表情呆滞,眼距宽,眼裂小,鼻梁低,口半张,舌伸出口外,皮肤细嫩;智能低下;体格发育迟缓,如肌张力低下;伴发畸形,如右侧通贯手,这些表现均是21-三体综合征的特征。

148. 答案:E

解析:本题考查的是检查方法。患者身材矮小,头围小,眼距宽,鼻梁低,外耳小,通贯手,心脏听诊有杂音,因此可采取染色体核型分析。故选E。

149. 答案:C

解析:患者2次流产史,停经后阴道流血(葡萄胎最常见的症状),子宫变大。最可能的诊断是葡萄胎。

150. 答案:A

解析:葡萄胎在明确诊断后就要立即清宫。

第一单元

A1/A2 型选择题

1. 烟草当中的哪种主要成分导致吸烟成瘾

- A. 甲醛
- B. 焦油
- C. 尼古丁
- D. 一氧化碳
- E. 烟尘

2. 氨基酸脱羧过程引起过敏感应的是

- A. 谷氨酸
- B. 苯丙氨酸
- C. 组氨酸
- D. 色氨酸
- E. 鸟氨酸

3. 肝性脑病的诱因不包括

- A. 消化道出血
- B. 口服抗生素
- C. 便秘
- D. 大量放腹水
- E. 大量摄入蛋白质

4. 支气管扩张的手术适应症

- A. 经过治疗，病变减轻
- B. 脓痰多，伴咯血
- C. 合并肺心病
- D. 合并感染
- E. 大量反复咯血但病变局限

5. 下列肾损伤最严重的是

- A. 肾囊肿
- B. 肾蒂血管损伤
- C. 肾血肿
- D. 肾实质裂伤
- E. 肾挫伤

6. 对患者死因有异议的，应在 48 小时内进行尸检，医疗机构具有保存冷冻尸体条件时，最长保存时间为

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 7 天
- D. 10 天
- E. 14 天

7. 急性阑尾炎最有诊断价值的体征是

- A. 腰大肌实验阳性
- B. 闭孔内肌实验阳性
- C. 全腹压痛
- D. 麦氏点固定压痛
- E. 结肠充气实验阳性

8. 可以引起首关消除的主要给药途径是

- A. 静脉给药
- B. 口服给药
- C. 直肠给药
- D. 肌肉注射
- E. 吸入给药

9. 下列属于水溶性维生素的是

- A. 维生素 D
- B. 维生素 A
- C. 维生素 C
- D. 维生素 E
- E. 维生素 K

10. 某县级医院接诊一腹痛腹泻患者，初步诊断为霍乱，该县医院按照传染病防治法下列做法不正确的是

- A. 立即关闭医院，歇业整顿
- B. 隔离患者
- C. 传染源地区消毒
- D. 上报相关部门
- E. 对患者接触人群进行医学观察

11. 为了记录两家医院 10 年收入病人的总量，应选用的统计图为

- A. 散点图
- B. 圆形图
- C. 直方图
- D. 直条图
- E. 线形图

12. 一侧手指麻木伴肩痛，上肢放射痛，考虑最可能的颈椎病类型是

- A. 神经根型颈椎病
- B. 交感型颈椎病
- C. 混合型颈椎病
- D. 脊髓型颈椎病
- E. 椎动脉型颈椎病

13. 某患者得知自己患癌症晚期，要求医生办理出院回家，医生得知后予以

2022 年临床助理历年真题

办理出院，该医师的行为体现了什么

- A. 中立原则
- B. 公正原则
- C. 尊重原则
- D. 不伤害原则
- E. 平等原则

14. 幼儿刚出生时需要接种的疫苗是

- A. 百白破
- B. 乙肝
- C. 麻疹
- D. 乙脑
- E. 麻风

15. 患者肺活量 3600ml，潮气量 500ml，深吸气量 2100ml，求补呼气量

- A. 1100ml
- B. 600ml
- C. 2100ml
- D. 1500ml
- E. 1600ml

16. 普鲁卡因的麻醉方式不包括

- A. 硬膜外麻醉
- B. 浸润麻醉
- C. 表面麻醉
- D. 蛛网膜下腔麻醉
- E. 传导麻醉

17. 公共卫生监测的种类繁多，最普遍的是

- A. 死因检测
- B. 症状检测
- C. 传染病监测
- D. 公共卫生监测
- E. 行为及行为危险因素监测

18. 重症哮喘的最常见酸碱平衡失调是

- A. 呼吸性碱中毒
- B. 呼酸合并代碱
- C. 呼酸合并代酸
- D. 呼碱合并代酸
- E. 呼碱合并代碱

19. 一女性在公园散步时，迎面有一辆自行车冲来，躲闪及时未受伤，事后自觉手心出汗和心跳加速，此时属于以下哪类情况

- A. 应激
- B. 兴奋
- C. 恐慌
- D. 抑郁
- E. 心境障碍

20. 休克合并少尿首选

- A. 多巴胺
- B. 肾上腺素
- C. 异丙肾上腺素
- D. 可乐定
- E. 去氧肾上腺素

21. 心衰细胞中含有

- A. 脂褐素
- B. 含铁血黄素
- C. 钙盐
- D. 胆红素
- E. 脂滴

22. 下列属于链霉素的典型副作用的是

- A. 痛风
- B. 肝功能损害
- C. 听觉神经毒性
- D. 高尿酸血症
- E. 眼球突出

23. 艾滋病自愿咨询和自愿检测办法的制定单位是

- A. 设区市疾病预防控制中心
- B. 设区市卫生医疗机构
- C. 省、直辖市卫生主管部门
- D. 县级以上卫生主管部门
- E. 国务院卫生主管部门

24. 下列何种因素可引起冠状动脉强烈舒张

- A. 交感神经兴奋 α 受体
- B. ATP
- C. 腺苷
- D. 洋地黄
- E. 迷走神经兴奋 N 受体

25. 胃癌的好发部位是

- A. 胃体
- B. 胃角
- C. 胃窦
- D. 贲门

E. 胃大弯

26. 未婚夫妻在双方父母陪同下婚前行婚检查,发现男方有严重的遗传疾病,不能生育。医生应告知

- A. 患者本人
- B. 患者未婚妻
- C. 双方父母
- D. 女方父母
- E. 男方及父母

27. 患者需手术,目前有两种方案,医生和患者讲述了两种方法的利弊,患者在充分知情并同意后选了方案二,这体现的医学伦理学的基本原则是

- A. 公正原则
- B. 不伤害原则
- C. 尊重原则
- D. 恭请原则
- E. 中立原则

28. 支气管哮喘急性发作期首选的治疗是

- A. 雾化糖皮质激素
- B. 吸入 β 受体激动剂
- C. 氨茶碱
- D. 吸入 β 受体阻滞剂
- E. 利尿剂

29. 提示胰腺炎加重的因素

- A. 血钙降低
- B. 血清淀粉酶升高
- C. 尿淀粉酶升高
- D. 血清脂肪酶升高
- E. 碱性磷酸酶升高

30. 属于慢性非传染性疾病的基本特征的是

- A. 可在人与人之间传播
- B. 一旦发病,病情迁延不愈
- C. 常可治愈
- D. 起病急骤
- E. 病因明确

31. 急性肾小球肾炎的主要致病菌为

- A. β 溶血性链球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 金色葡萄球菌
- D. 铜绿假单胞菌

E. 肺炎链球菌

32. 患有 IgA 肾病的贫血患者应选择下列哪种血液制品

- A. 辐照红细胞
- B. 洗涤红细胞
- C. 浓缩红细胞
- D. 去白红细胞
- E. 悬浮红细胞

33. 某机构发现 2019 年 7 月-9 月期间,某中学爆发肺结核,这种监测属于

- A. 主动监测
- B. 被动监测
- C. 哨点监测
- D. 常规检测
- E. 特殊检测

34. 某精神病人,专科医院治疗,认为效果良好,可出院,当地医疗卫生机构不应该采取的措施是

- A. 随访
- B. 监督服药
- C. 建立健康档案
- D. 医疗限制
- E. 健康教育

35. 妊娠剧吐不能进食者,为预防 Wernicke 综合征,应补充的维生素是

- A. 维生素 B1
- B. 维生素 B6
- C. 维生素 A
- D. 维生素 K
- E. 维生素 PP

36. 急性腹部闭合性损伤时,不是手术指征的是

- A. 膈下游离气体
- B. 腹穿抽出不凝血
- C. 恶心,呕吐加剧
- D. 腹膜刺激征加重
- E. 全身情况恶化趋势

37. 以膀胱刺激征为主要临床表现的疾病

- A. 肾结核
- B. 肾结石
- C. 急性肾炎
- D. 肾囊肿

2022 年临床助理历年真题

E. 多囊肾

38. 我国肝硬化最常见于

- A. 酒精性肝炎
- B. 病毒性肝炎
- C. 高脂饮食
- D. 劳累过度
- E. 药物引起

39. 骨折特有的体征是

- A. 局部皮下瘀斑
- B. 功能障碍
- C. 畸形
- D. 纵向叩击痛
- E. 局部压痛

40. 体内嘌呤核苷酸的分解代谢终产物是

- A. 尿素
- B. β -丙氨酸
- C. NH_3
- D. 尿酸
- E. β -氨基异丁酸

41. 支气管扩张的主要原因

- A. 支气管组织感染和支气管阻塞
- B. 先天性发育障碍
- C. 囊性纤维化
- D. 机体免疫功能失调
- E. 先天性 $\alpha 1$ -抗胰蛋白酶缺乏

42. 镜下见细胞排列整齐，癌巢中见角化珠及细胞间桥，可确定为

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 基底细胞癌
- D. 脂肪癌
- E. 绒毛膜癌

43. 骨折后见胫腓骨骨皮质不连续，右小腿外侧和足背感觉障碍，最可能损伤的神经是

- A. 腓总神经
- B. 胫神经
- C. 腓肠神经
- D. 坐骨神经
- E. 腰椎神经

44. 嵌顿性疝与绞窄性疝的主要鉴别

点是

- A. 有无血运障碍
- B. 是否出现恶心呕吐
- C. 疝内容物是否水肿
- D. 疝内容物能否还纳
- E. 是否出现低血压

45. 蛋白质变性理化性质的变化错误的是

- A. 肽键断裂
- B. 粘度增加
- C. 易于沉淀
- D. 吸收紫外线能力变强
- E. 溶解度降低

46. 急性肾小球肾炎的前驱感染表现为

- A. 发热两周
- B. 血行感染
- C. 尿道感染
- D. 皮肤感染
- E. 链球菌感染

47. 属于雌激素的作用是

- A. 促进乳腺腺泡发育成熟
- B. 宫颈粘液减少
- C. 阴道上皮细胞脱落加快
- D. 促进水钠潴留
- E. 抑制输卵管肌收缩的振幅

48. 某学者对某社区进行有关吸烟和肺癌的关系，对该社区中吸烟和不吸烟进行分组跟踪观察其肺癌的发生率，则该研究方法属于

- A. 病例对照研究
- B. 横断面研究
- C. 现况调查
- D. 实验研究
- E. 队列研究

49. 烧伤现场急救不包括

- A. 立即用清水冲洗患处
- B. 干净纱布覆盖患处
- C. 脱去着火的衣物
- D. 立即转移到安全通风位置
- E. 碘伏擦拭皮肤

50. 佝偻病早期出现的症状

- A. 颅骨软化

- B. 运动发育缓慢
- C. 神经系统兴奋
- D. 串珠手
- E. 方颅

51. 传染病的特征不包括

- A. 免疫后抗体
- B. 传染性
- C. 有病原体
- D. 流行性
- E. 聚集性

52. 高血压伴低血钾，首先考虑的疾病是

- A. 嗜铬细胞瘤
- B. 主动脉缩窄
- C. 肾动脉狭窄
- D. 皮质醇增多
- E. 原发性醛固酮增多症

53. 儿童生长发育最迅速的时期

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄期
- E. 学龄前期

54. 背部脂肪瘤最常见的大体分型是

- A. 囊状
- B. 结节状
- C. 息肉状
- D. 溃疡状
- E. 分叶状

55. 慢性活动性胃炎最主要的病因是

- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 暴饮暴食
- C. 自身免疫相关
- D. 饮酒
- E. 咖啡和浓茶

56. 判断呼吸衰竭的指标

- A. 血气分析氧分压 $< 60\text{mmHg}$
- B. 呼吸困难
- C. 咳嗽咳痰
- D. 咯血
- E. 肺部 velcro 啰音

57. 下列疾病中，可引起单侧胸廓饱满，

呼吸音减低的是

- A. 肺不张
- B. 气胸
- C. 肺脓肿
- D. 肺实变
- E. 胸膜肥厚

58. 长期营养不良首先萎缩的组织是

- A. 肝
- B. 脂肪细胞
- C. 肾
- D. 脑
- E. 胸腺

59. 青春期描述错误的是

- A. 男性 10-18 岁
- B. 淋巴发育达到最高峰
- C. 甲状腺一过性肿大
- D. 女性的重要标志为月经初潮
- E. 出现体格发育高峰

60. 支气管扩张患者首选的影像学检查是

- A. X 线
- B. 高分辨 CT
- C. MRI
- D. 支气管镜
- E. 肺动脉造影

61. 破伤风的常见致病菌

- A. 溶血性链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 梭状芽孢菌

62. 下列哪项不是表示疾病流行强度的指标

- A. 暴发
- B. 大流行
- C. 流行
- D. 散发
- E. 短期波动

63. 轻链型多发性骨髓瘤的蛋白尿类型是

- A. 肾小球型蛋白尿
- B. 肾小管型蛋白尿
- C. 溢出型蛋白尿

2022 年临床助理历年真题

- D. 混合型蛋白尿
- E. 生理型蛋白尿

64. 黄先生今日食用谷类 200g, 水果 200g, 牛奶 300g, 鱼类 25g, 植物油 50g, 根据我国居民膳食宝塔, 该居民摄入过多的是

- A. 谷类
- B. 水果
- C. 牛奶
- D. 鱼类
- E. 植物油

65. 肾病综合征是什么类型蛋白尿

- A. 肾小球型蛋白尿
- B. 肾小管型蛋白尿
- C. 溢出型蛋白尿
- D. 混合型蛋白尿
- E. 生理型蛋白尿

66. 诊断宫内活胎最有意义的是 B 超见

- A. 节律性胎动
- B. 妊娠囊
- C. 卵黄囊
- D. 胚芽
- E. 原始心管搏动

67. 甲状腺术后, 评估再发甲亢可能的最敏感的指标是

- A. TgAb
- B. FSH
- C. TPOAb
- D. TRAb
- E. FT4

68. 对“健康就是没病”这一观点, 有什么样的认识

- A. 我国学者对健康的观点
- B. 人类对健康的最初认识
- C. 近代国际对健康的观点
- D. 健康的新定义
- E. 人类对健康正确的认识

69. 下列属于正反馈的是

- A. 甲状腺激素调节
- B. 皮质醇激素调节
- C. 排卵时黄体激素调节
- D. 肺牵张反射
- E. 降压调节

70. 要比较某地两医院近 10 年来住院病人人数的上升的速度, 宜绘制

- A. 条图
- B. 圆图
- C. 直方图
- D. 线图
- E. 半对数线图

71. 中医典籍中天人合一、天人相应所反映的医学模式为

- A. 自然哲学医学模式
- B. 神灵主义医学模式
- C. 生物-心理-社会医学模式
- D. 整体医学模式
- E. 生物医学模式

72. 活动后出现右肾绞痛伴血尿, 应考虑

- A. 肾结石
- B. 肾癌
- C. 肾囊肿
- D. 膀胱癌
- E. 肾积水

73. 肺动脉高压的特征性心电图表现为

- A. 肺性 P 波
- B. QRS 波畸形
- C. T 波高尖
- D. P-R 间期延长
- E. 出现 U 波

74. 国人急性胰腺炎最常见的病因是

- A. 饮酒
- B. 暴饮暴食
- C. 胆道疾病
- D. 慢性胃炎
- E. 脂肪肝

75. 用于诊断急性重型胰腺炎的指标是

- A. 血清淀粉酶
- B. 尿淀粉酶
- C. 胆固醇
- D. 血清钙
- E. 血糖

76. 急性肾盂肾炎患者首选的抗生素

是

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 万古霉素
- D. 头孢呋辛
- E. 庆大霉素

77. 重症精神病患者最常见的妄想是

- A. 夸大妄想
- B. 关系妄想
- C. 疑病妄想
- D. 钟情妄想
- E. 被害妄想

78. 腹部脏器损伤，下列哪个不是急诊手术指征

- A. X 线示膈下游离气体
- B. 恶心呕吐加重
- C. 血尿淀粉酶升高
- D. 腹穿有血性液体
- E. 腹膜炎加重

79. 患者男，39 岁，乏力纳差，腹胀 1 年，否认肝炎病史，无黄疸，承认饮酒 20 年，200ml/天，查体可见蜘蛛痣、肝掌，肝肋下未触及，脾肋下 3cm，最可能的诊断

- A. 酒精性肝硬化
- B. 脂肪肝
- C. 原发性肝癌
- D. 病毒性肝炎
- E. 胆总管结石

80. 男性，45 岁，头晕头痛 1 周，休息后稍缓解，多次测量血压偏高，未正规治疗，测量血压 BP145/90mmHg，患者最先出现的病变

- A. 左心室肥厚
- B. 肝硬化
- C. 肾颗粒性固缩
- D. 视网膜出血
- E. 脑出血

81. 女，28 岁，1 周前受凉咳嗽、高热、寒战、右上腹痛，2 天前咳痰带血丝。胸部 X 线示右中肺炎。下列诊断可能是

- A. 克雷伯杆菌肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎

- C. 支原体肺炎
- D. 病毒性肺炎
- E. 金黄色葡萄球菌

82. 男童，4 岁，心理咨询就诊，诉对母亲依赖，哭闹不愿上学，据弗洛伊德理论，处于心理发展阶段

- A. 口欲期
- B. 肛欲期
- C. 性器期
- D. 潜伏期
- E. 生殖期

83. 女，60 岁，2 周前出现心衰症状，经强心、利尿治疗好转，但近日病情加重，出现心慌，气短，下肢水肿加重。既往高血压病史 15 年。现诊断为原发性高血压，慢性心功能不全，左心室肥大，继续治疗应首选的药物是

- A. 咪达普利
- B. 硝苯地平
- C. 呋塞米
- D. 美托洛尔
- E. 氨茶碱

84. 男，65 岁。间断腹胀、上腹隐痛 25 年。胃镜检查提示：胃体黏膜变薄，血管透见，皱襞稀疏，患者可能缺乏的维生素是

- A. 维生素 B12
- B. 维生素 C
- C. 维生素 B2
- D. 维生素 B4
- E. 维生素 D

85. 男童，3 岁，从小与爷爷在山区生活。因患肺炎，由其父带入县城医院治疗。入院后哭泣，害怕，称想念爷爷，想回家找爷爷，拒绝配合治疗。该男童的症状考虑为

- A. 认知障碍
- B. 意识障碍
- C. 分离型焦虑
- D. 人格性焦虑
- E. 智力障碍

86. 男童，9 岁，两天前食用蚕豆后乏力，发热，恶心呕吐，茶色尿，一年前有类似症状，该患儿出现上述症状

的原因是缺乏以下哪种酶

- A. 己糖激酶
- B. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
- C. 丙酮酸脱氢酶
- D. 蛋白激酶
- E. 乳酸脱氢酶

87. 女, 18 岁, 大学新生, 入学后感觉与他人相处劳累, 学习生活困难, 从心理健康角度出发, 她的问题是

- A. 人格完整
- B. 人际和谐
- C. 适应环境
- D. 智力正常
- E. 情绪良好

88. 某男子, 新房装修后 3 天入住, 出现眼干、流泪、烧灼感、眼结膜充血、畏光, 过敏性皮炎, 呼吸道刺激, 导致以上症状的原因是

- A. 一氧化碳
- B. 甲醛
- C. 二氧化碳
- D. 二氧化硫
- E. 氯

89. 男性, 28 岁, 户外高热工作数周后, 自觉工作能力增强, 检查后发现血压和心率降低, 这种现象属于以下那种情况

- A. 热应激
- B. 热障碍
- C. 热适应
- D. 热射病
- E. 热痉挛

90. 女, 25 岁, 孕 10 周, 甲状腺可闻及血管杂音, 甲状腺 2 度肿大, 未触及结节, 无高血压, 糖尿病, 首选的治疗是

- A. 放疗
- B. 化疗
- C. 手术
- D. 口服甲硫咪唑
- E. 口服丙硫氧嘧啶

91. 男性, 71 岁, 不慎从楼梯上摔下来, 摔伤右髌部, 既往全身情况良好。查体: 右下肢短缩 3cm、外旋 85° 畸形,

下肢轴向叩击痛阳性。首选的治疗方法是

- A. 石膏外固定
- B. 内固定
- C. 外展位皮牵引
- D. 手法复位
- E. 中立位骨牵引

92. 患者, 男, 50 岁, 平时高脂高糖饮食, 实验室检查: 血糖 15.6mmol/L, 此时除高糖饮食外还需密切关注的是

- A. 酮体生成
- B. 尿素生成
- C. 一碳化物生成
- D. 胆固醇生成
- E. 蛋白质分解

93. 女, 74 岁, 进行性吞咽困难伴胸骨后不适 2 月, 无反酸、嗝气、烧心。近期体重减轻 4kg, 检查首选

- A. 肠镜
- B. 消化道造影
- C. 胃镜
- D. 腹部 CT
- E. 腹部平片

94. 患者, 女, 56 岁, 活动后胸闷气短 3 天。查体: 血压 80/50mmHg, 中心静脉压 16cmH₂O, 双下肢水肿, 心脏彩超提示主动脉瓣狭窄。该患者中心静脉压高, 血压低的原因是

- A. 血容量不足
- B. 射血分数减少
- C. 血容量过多
- D. 后负荷减少
- E. 血管过度收缩

95. 男, 40 岁, 饮酒后突发上腹痛 8h。左上腹痛伴胸腹部放射, 伴恶心呕吐。既往无胆囊病史。查体: T 38.5℃, WBC 13.5×10⁹/L, 左上腹压痛, 肌紧张, 血清淀粉酶 600U/L, 该患者最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 胃溃疡伴穿孔
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性胆管炎
- E. 急性肠梗阻

2022 年临床助理历年真题

96. 男, 62 岁, 双下肢进行性水肿 2 月, 高血压 5 年, 查体: BP155/70mmHg, 双下肢中度凹陷型水肿, 尿常规: 蛋白(++++) , RBC(-) , 血总蛋白 53g/L, 白蛋白 27g/L, 肌酐 82 μ mol/l。为明确诊断, 最有价值的辅助检查是

- A. 清洁中段尿检
- B. 肾活检
- C. 腹部 b 超
- D. 双下肢深静脉彩超
- E. 尿相差显微镜检

97. 女, 45 岁, 右下肢静脉曲张 8 年。近期出现右下肢酸胀感, 白天活动后肿胀, 晨起消失。查体: 右下肢脚踝部轻度水肿。足靴区皮肤色素沉着, 大腿下内侧及小腿后方浅静脉明显扩张、迂曲, 大隐静脉瓣膜功能试验(+), 深静脉通畅试验(-) 交通静脉瓣膜功能试验(-)。该患者最可能的诊断是

- A. 单纯性下肢静脉曲张
- B. 下肢深静脉血栓形成
- C. 血栓性浅静脉炎
- D. 动静脉瘘
- E. 血栓闭塞性脉管炎

98. 男性, 30 岁, 车祸后左上腹剧烈疼痛 2 小时, 急诊腹腔穿刺抽出不凝血, 最可能的诊断是

- A. 脾破裂
- B. 肝破裂
- C. 小肠破裂
- D. 结肠破裂
- E. 结肠破裂

99. 男, 6 岁, 发现阴囊肿大 3 天。查体: 左侧阴囊肿大呈球形, 光滑, 无压痛。首选的检查是

- A. 透光实验
- B. X 线
- C. B 超
- D. CT
- E. MRI

100. 患者男性, 40 岁。术后粘连性肠梗阻 3 天, 加重 1 天。查体: 可见肠蠕动脉, 肠鸣音亢进, 右下腹有局限性压痛。多次立位腹部 X 线平片可见固定肠袢。正确的治疗措施是

- A. 灌肠治疗
- B. 继续补液、观察病情变化
- C. 注射吗啡止痛
- D. 肠造瘘术
- E. 剖腹探查

101. 男, 70 岁, 双下肢水肿 1 个月, 既往高血压病史 20 年, 未规范使用药物治疗。查体: 血压 170/110mmHg, 心率 55 次/分, 心电图提示左心室肥厚, 该患者首选的降压药物是

- A. 普萘洛尔
- B. 氨氯地平
- C. 卡维地洛
- D. 氢氯噻嗪
- E. 氯沙坦

102. 女, 32 岁, 外阴瘙痒, 分泌物增多, 白带呈豆腐渣样, 初步考虑为

- A. 萎缩性阴道炎
- B. 假丝酵母菌阴道炎
- C. 滴虫性阴道炎
- D. 细菌性阴道炎
- E. 宫颈糜烂

103. 男, 45 岁, 双下肢水肿伴乏力 5 年, 尿量 400ml/天, 持续 1 周。既往有糖尿病, 肌酐 368 μ mol/L。目前最佳的处理是

- A. β 受体抑制剂
- B. 输血
- C. 血液透析
- D. 碳酸氢钠
- E. ACEI

104. 患者女, 48 岁, 外阴粉色菜花状赘生物, 醋酸白实验阳性, 该患者适用的药物是

- A. 咪喹莫特
- B. 甲硝唑
- C. 三氯醋酸
- D. 干扰素
- E. 红霉素

105. 女, 24 岁, 发现乳房外上象限肿块, 大小约 2 \times 3cm, 质硬, 光滑, 边界清, 活动好, 无压痛, 全身浅表淋巴结未触及肿大。最可能的诊断是

- A. 乳腺癌

2022 年临床助理历年真题

- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳腺囊性增生
- D. 乳头状瘤
- E. 乳房肉瘤

106. 男性, 28 岁, 因车祸撞击头部, 立即昏迷 3 小时, 醒后出现头晕、呕吐, 右耳道有血性液体流出, 考虑诊断为

- A. 脑震荡合并颅中窝骨折
- B. 脑挫裂伤合并颅中窝骨折
- C. 脑挫裂伤合并颅前窝骨折
- D. 脑震荡合并颅前窝骨折
- E. 脑震荡合并颅后窝骨折

107. 女, 21 岁, 皮肤巩膜黄染, 辅助检查: 抗 HAV IgG(+), HBSAg(+), 抗 HBE(+), 抗 HBC (+)。下列哪项是该病的主要预防措施

- A. 甲肝疫苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 口服抗病毒药物
- D. 严格检查血液制品
- E. 注意饮食卫生

108. 女, 35 岁。间断发热, 腹胀伴全腹压痛 4 个月。查体: 37.5℃, 腹部揉面感, 移动性浊音阳性。腹水常规: 黄绿色, 白细胞 $600 \times 10^9/L$, 多核细胞 0.20, 单核细胞 0.80。最可能的诊断是

- A. 自发性细菌性腹膜炎
- B. 肝硬化腹水
- C. 恶性腹水
- D. 结核性腹膜炎
- E. 腹膜间皮瘤

109. 患者, 男, 63 岁, 夜间阵发性呼吸困难 2 月, 咳粉红色泡沫样痰, 心电图显示心房颤动, 该患者需应用的药物为

- A. 美托洛尔
- B. 硝苯地平
- C. 维拉帕米
- D. 硝酸甘油
- E. 西地兰

110. 男, 32 岁, 聚餐后两小时突发腹痛, 腹部揉面感, 触诊腹部有压痛,

反跳痛, 肌紧张, 既往有胃病 10 年, 考虑诊断

- A. 消化性溃疡伴穿孔
- B. 胆囊炎
- C. 胰腺炎
- D. 阑尾炎
- E. 急性胃炎

111. 患者, 男性 19 岁, 因胸闷, 憋喘 1 天入院, P96 次/分, R23 次/分, Bp100/60, 胸片左侧气胸, 左侧肋脊角变钝, 肺压缩 80%, 下列措施正确的是

- A. 胸腔闭式引流
- B. 胸腔穿刺引流
- C. 胸腔镜手术
- D. 吸氧, 观察
- E. 开胸探查

112. 男 72 岁, 咳嗽咳痰 10 个月, 活动后气短 2 年。既往查 X 线示双肺纹理增粗、紊乱, 膈肌低平。吸烟史 40 年, 20 支/天, 戒烟 3 年。为明确诊断, 首选检查

- A. 支气管镜
- B. 高分辨胸部 CT
- C. 胸部 X 线
- D. 肺功能
- E. 血气分析

113. 8 个月儿童, 在社区服务中心接种疫苗, 造成肝功能严重受损。经调查医院的冰箱停电后疫苗失效, 工作人员继续注射, 对该工作人员进行的处罚是

- A. 撤销职位
- B. 吊销执照
- C. 警告
- D. 暂停职业活动
- E. 罚款

114. 患儿 5 岁, 智力低下, 皮肤苍白, 毛发发黄, 尿有鼠臭味, 草莓舌, 血中苯丙氨酸含量高于正常, 其遗传方式

- A. 常染色体隐性遗传
- B. 常染色体显性遗传
- C. X 连锁隐性遗传
- D. X 连锁显性遗传

E. 染色体畸变

115. 男性, 30 岁, 突发心脏骤停, 经心肺复苏后, 意识, 呼吸逐渐恢复。查体 BP:90/60mmHg, 呼吸 32 次/分, 复苏后用药

- A. 多巴酚丁胺
- B. 胺碘酮
- C. 米力农
- D. 维拉帕米
- E. 阿托品

A3/A4 型选择题

(116~117 题共用题干)

患者, 女, 35 岁乏力心悸 1 年余, 近 2 个月症状加重, 伴厌食, 消瘦, 手颤。体格检查: 甲状腺弥漫性肿大, 心率 126 次/分, 心律齐。实验室检查提示 FT3, FT4 显著增高, TSH 降低。

116. 该患者最可能的诊断是

- A. 单纯性甲状腺肿
- B. 亚急性甲状腺炎
- C. 结节性毒性甲状腺肿
- D. 弥漫性毒性甲状腺肿
- E. 自身免疫性甲状腺炎

117. 对于该患者药物治疗首选

- A. 碳酸锂
- B. 丙戊酸钠
- C. 卡马西平
- D. 苯妥英钠
- E. 氯氮平

(118~119 题共用题干)

女, 36 岁, 发热、面色苍白伴牙龈出血 1 周入院。入院次日起出现皮肤多处片状淤斑、血尿。血红蛋白 80g/L, 白细胞 $2.0 \times 10^9/L$, 血小板 $50 \times 10^9/L$, 血浆纤维蛋白原 0.88/L。骨髓检查: 有核细胞增生极度活跃, 细胞质颗粒粗大的早幼粒细胞占 85%。

118. 首选的治疗方案应为

- A. 小剂量阿糖胞苷
- B. 柔红霉素加阿糖胞苷
- C. DA 方案+小剂量肝素
- D. 高三尖杉酯碱+阿糖胞苷
- E. 全反式维甲酸+砷剂+化疗

119. 获得完全缓解后的治疗策略是

- A. 化疗与全反式维甲酸交替治疗
- B. 单用全反式维甲酸维持治疗
- C. 定期联合化疗
- D. 中剂量阿糖胞苷强化治疗
- E. 停药、定期随诊

(120~122 题共用题干)

男, 36 岁, 反复发作性中上腹疼痛 3 年, 饥饿时加重, 伴反酸, 嗝气, 进食和服用抑酸药物可缓解。

120. 该病的特点是

- A. 糖尿病是危险因素
- B. 发作呈季节性
- C. 急性发作时常合并黄疸
- D. 进食油腻食物诱发
- E. 常有脂肪泻

121. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 腹部立位 X 平片
- B. 血清淀粉酶
- C. 胃镜
- D. 腹部 CT
- E. 腹部 B 超

122. 可能的诊断是

- A. 慢性胆囊炎
- B. 胃癌
- C. 十二指肠溃疡
- D. 胰腺癌
- E. 慢性胰腺炎

(123~124 题共用题干)

男, 68 岁。上腹绞痛伴恶心呕吐 8 小时。体检发现胆囊多发小结石。查体, 体温 39℃, P110 次/分, BP90/60mmHg, 神智恍惚, 皮肤巩膜黄染, 上腹部压痛, 肝区叩诊(+), 腹部 CT 提示: 胆囊积液, 胆囊壁水肿。

123. 最可能的诊断为

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性胃炎

124. 该患者首要处理措施是

- A. 胆囊切除术
- B. 胆总管切开引流
- C. 药物止痛止痉

2022 年临床助理历年真题

- D. 继续观察
- E. 胆囊造瘘术

(125~126 题共用题干)

男, 50 岁。反复咳嗽、喘息 20 年余, 加重 1 周入院。常规体检胸部 X 线片示双肺纹理增粗、紊乱。既往体健。吸烟 20 余年, 行肺功能检查示 FEV1/FVC 68.5%。FEV1 占预计值的 68%, 支气管舒张试验示 FEV1 改善 2.5%(30ml)。

125. 该患者首先考虑的诊断是

- A. 支气管扩张
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 阻塞性肺气肿
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎

126. 患者查血气分析 pH7.37, PaCO₂ 60mmHg, PaO₂ 55mmHg, 患者发生低氧血症的原因

- A. 肺泡通气量下降
- B. 通气/血流比例失调
- C. 膈肌麻痹
- D. 弥散功能障碍
- E. 肺内分流

(127~129 题共用题干)

男, 26 岁, 乏力、纳差 10 天。胸腹部可见瘀点, 大小 2~4mm, 压之可退色。全身可见肿大淋巴结, 活动度好。WBC: 3.95×10⁹/L, L0.76, N0.18。

127. 下列最可能的诊断是

- A. 急性肝炎
- B. 风疹
- C. 结核病
- D. 伤寒
- E. 麻疹

128. 为确定诊断首选的检测项目是

- A. 血培养
- B. 粪便培养
- C. 血常规检查
- D. 胆汁培养
- E. 出血热病毒抗体

129. 治疗首选

- A. 四环素
- B. 链霉素

- C. 青霉素
- D. 环丙沙星
- E. 氯霉素

B1 型选择题

(130~131 题共用备选答案)

- A. 左氧氟沙星
- B. 利福平
- C. 异烟肼
- D. 吡嗪酰胺
- E. 乙胺丁醇

130. 耐多药结核的治疗方案中宜增加的药物

131. 抑菌作用强的抗结核药物是

(132~133 题共用备选答案)

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 流感嗜血杆菌
- D. 克雷伯杆菌
- E. 肺炎支原体

132. 社区获得性肺炎最常见的致病菌

133. 小儿肺炎引起脓胸, 常见的致病菌为

(134~135 题共用备选答案)

- A. 奥美拉唑
- B. 硝苯地平
- C. 氢氧化铝
- D. 铋剂
- E. 氯沙坦

134. 贲门失弛缓症的首选药物为

135. 胃食管反流病最佳的诊断性药物是

(136~137 题共用备选答案)

- A. 卡马西平
- B. 丙戊酸钠
- C. 乙琥胺
- D. 苯巴比妥
- E. 地西泮

136. 成人癫痫部分性发作首选的药物是

137. 癫痫小发作的药物首选为

2022 年临床助理历年真题

(138~140 题共用备选答案)

- A. 肾癌
 - B. 肾结石
 - C. 肾挫伤
 - D. 膀胱癌
 - E. 肾结核
138. 病变在肾, 症状表现在膀胱的是
139. 间歇性无痛性肉眼血尿, 最常见的是那种疾病
140. 腰部肿块, 痛性血尿, 最可能的诊断是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 生长抑素
 - B. 奥美拉唑
 - C. 铋剂
 - D. 潘多立酮
 - E. 莫沙必利
141. 治疗肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血首选
142. 治疗消化性溃疡首选的药物是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 外痔
 - B. 内痔
 - C. 肛周脓肿
 - D. 肠结核
 - E. 克罗恩病
143. 间歇性便后出血常见于
144. 引起肛痿的常见原因是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 喉上神经损伤
 - B. 喉返神经损伤
 - C. 切口内出血
 - D. 气管塌陷
 - E. 甲状腺危象
145. 女, 因甲亢行甲状腺次全切除。术后 6 小时, 突然呼吸困难。查体面色青紫, 颈部皮肤肿胀。引起该患者呼吸困难最可能的原因是
146. 甲状腺肿大患者术后出现声嘶最可能的原因是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 凝乳状、豆渣样白带
 - B. 透明白带
 - C. 泡沫状白带
 - D. 白色、腥臭味白带
 - E. 稀薄、淡黄色白带
147. 假丝酵母菌阴道病, 阴道分泌物的特点是
148. 滴虫性阴道病的分泌特点是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 气性坏疽
 - B. 疖
 - C. 破伤风
 - D. 蜂窝织炎
 - E. 丹毒
149. 患者表现为张口困难, 颈强直, 诊断为
150. 表现为下肢片状隆起红疹, 颜色鲜红, 边界清楚, 诊断为

第二单元

A1/A2 型选择题

1. 急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是
- A. 草绿色链球菌
 - B. 金黄色葡萄球菌
 - C. 淋球菌
 - D. 肺炎球菌
 - E. 肠球菌
2. 右心衰竭时下肢水肿形成的主要机制是
- A. 血浆胶体渗透压降低
 - B. 小动脉壁通透性增加
 - C. 毛细血管内静水压增加
 - D. 粘多糖在组织间隙内沉积
 - E. 淋巴液回流受阻
3. 我国女性常见的不孕原因是
- A. 免疫因素
 - B. 外阴、阴道因素
 - C. 输卵管阻塞

2022 年临床助理历年真题

- D. 子宫因素
E. 宫颈因素
4. 二甲双胍最主要的不良反应
A. 肝功能损伤
B. 消化道不良反应
C. 肾功能损伤
D. 白细胞减少
E. 低血糖
5. 甲状腺功能亢进症最常见的原因是
A. 垂体 TSH 瘤
B. 碘致甲状腺功能亢进
C. 甲状腺自主高功能腺瘤
D. 多结节性毒性甲状腺肿
E. 弥漫性毒性甲状腺肿
6. 子宫脱垂的主要原因
A. 营养不良
B. 手术损伤
C. 分娩损伤
D. 慢性疾病
E. 过度负重
7. 腰椎间盘突出症患者不会出现的症状是
A. 腰椎侧凸
B. 直腿抬高加强试验阳性
C. 直腿抬高试验阳性
D. 肌力下降
E. 压头试验阳性
8. 女性非复杂性膀胱炎感染，首选的治疗药物是
A. 青霉素
B. 头孢菌素
C. 磷霉素
D. 阿奇霉素
E. 红霉素
9. 对有神经症状的营养性巨幼贫患儿，最重要的治疗措施是
A. 维生素 B₁₂ 和叶酸
B. 叶酸
C. 铁剂
D. 丙球蛋白
E. 葡萄糖酸钙
10. 缺铁性贫血的组织表现有
A. 匙状甲
B. 头晕
C. 脸色苍白
D. 乏力
E. 头晕
11. 心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期不包括
A. 妊娠 32~34 周
B. 分娩期第一产程末
C. 第二产程
D. 产后 3 日
E. 28-32 周
12. 下列哪项不是软产道的组成
A. 盆底软组织
B. 阔韧带
C. 子宫下段
D. 阴道
E. 宫颈口
13. 全母乳喂养的小儿，肠道占优势的细菌是
A. 双歧杆菌
B. 嗜酸乳杆菌
C. 大肠埃希菌
D. 金黄色葡萄球菌
E. 链球菌
14. 丹毒的致病菌是
A. 葡萄球菌
B. 大肠杆菌
C. 绿脓杆菌
D. 乙型溶血性链球菌
E. 克雷伯杆菌
15. 下列用于反映梅毒的滴度指标是
A. 中位数
B. 四分位数间距
C. 几何均数
D. 标准差
E. 方差
16. 临床上抢救有机磷农药中毒常采用的方法是
A. 毛果芸香碱
B. 阿托加胆碱酯酶复能剂
C. 地塞米松
D. 导泄

E. 新斯的明

17. 纤维蛋白性心包炎的典型特征是

- A. 心包叩击音
- B. 心包摩擦音
- C. Ewart 征
- D. 心浊音界扩大
- E. 颈静脉怒张

18. 早期动脉粥样硬化病变最早进入动脉内膜的细胞是

- A. 红细胞
- B. 淋巴细胞
- C. 脂肪细胞
- D. 中性粒细胞
- E. 巨噬细胞

19. 急性肾炎临床表现中消失或恢复正常最慢的是

- A. 高血压
- B. 水肿
- C. 血尿及微量蛋白尿
- D. 补体 C3
- E. 管型尿

20. 内分泌功能减退性疾病目前较普遍使用的替代治疗方法是给予

- A. 调节神经递质或受体的药物
- B. 药理剂量的垂体激素
- C. 药理剂量的靶腺激素
- D. 药理剂量的促垂体激素
- E. 生理剂量的靶腺激素

21. 股骨头的主要血供来源是

- A. 小凹动脉
- B. 旋股内外侧动脉分支
- C. 闭孔动脉
- D. 股骨滋养动脉
- E. 髂外侧动脉

22. 胸骨后甲状腺肿的治疗首选

- A. 甲状腺手术
- B. 抗甲状腺药物
- C. 放射性碘
- D. 复方碘剂
- E. 普萘洛尔

23. 不属于行政处罚的是

- A. 责令停产停业

- B. 拘役
- C. 警告
- D. 罚款
- E. 吊销营业许可证

24. 关于二尖瓣狭窄下列说法正确的是

- A. 三尖瓣区出现收缩期杂音
- B. 会出现奔马律
- C. 梨形心
- D. 心脏向左下扩大
- E. 心尖上翘

25. 一经诊断应立即清宫的为

- A. 稽留流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 先兆流产
- E. 完全流产

26. 常见原发性闭经原因不包括

- A. 米勒管发育不全综合征
- B. 雄激素不敏感综合征
- C. 特纳综合征
- D. 多囊卵巢综合征
- E. 对抗性卵巢综合征

27. 继发性闭经常见于

- A. 下丘脑性闭经
- B. 子宫性闭经
- C. 卵巢性闭经
- D. 垂体性闭经
- E. 下生殖道发育异常

28. 体内氨的主要去路是

- A. 合成谷氨酰胺
- B. 合成尿素
- C. 生成铵盐
- D. 生成非必须氨基酸
- E. 参与嘌呤/嘧啶合成

29. 属于晚期减速主要原因的是

- A. 胎头受压
- B. 胎盘功能减退
- C. 胎动
- D. 子宫收缩
- E. 胎盘早剥

30. 患者经抗肿瘤治疗后尿检发现大

2022 年临床助理历年真题

量葡萄糖和氨基酸，推测其肾单位受损部位

- A. 近端小管
- B. 肾小球
- C. 集合管
- D. 髓袢升支粗段
- E. 远曲小管

31. 二尖瓣狭窄的杂音特征

- A. 心尖区舒张期隆隆样杂音
- B. 心尖区收缩期吹风样杂音
- C. 胸骨右缘第 2 肋间粗糙喷射性收缩期杂音
- D. 胸骨左缘第 3、4 肋间和右缘第 2 肋间舒张期杂音
- E. 胸骨左缘第 2 肋间连续机器样杂音

32. 小儿出现腰椎前凸的年龄为

- A. 12 个月
- B. 3 个月
- C. 6 个月
- D. 9 个月
- E. 18 个月

33. 二尖瓣关闭不全听诊区杂音

- A. 心尖区舒张中期隆隆样杂音
- B. 心尖区收缩期吹风样杂音
- C. 胸骨右缘第 2 肋间粗糙喷射性收缩期杂音
- D. 胸骨左缘第 3、4 肋间和右缘第 2 肋间叹息样舒张
- E. 胸骨左缘第 2 肋间连续机器样杂音

34. 质子泵抑制剂的药理作用是作用于

- A. 乳酸脱氢酶
- B. $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶
- C. $\text{H}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶
- D. HMG-CoA 还原酶
- E. 葡萄糖-6-磷酸酶

35. 腺垂体功能减退所致垂体危象时，最紧急的治疗药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 高渗盐水
- C. 促性腺激素
- D. 甲状腺激素
- E. 升压药

36. 孕妇硬膜内麻醉下进行剖宫产，术后 12 小时体位应为

- A. 低平卧位
- B. 侧卧位
- C. 半卧位
- D. 头高足底
- E. 平卧位

37. 广泛性焦虑症的特征性表现是

- A. 濒死感
- B. 运动性不安
- C. 兴奋性增高
- D. 过度担忧
- E. 阵发性紧张、恐惧

38. 小儿持续性惊厥首选药物为

- A. 水合氯醛灌肠
- B. 地西洋静脉滴注
- C. 地塞米松
- D. 苯巴比妥肌注
- E. 间羟胺

39. 一侧卵巢增大，内可见血流信号，甲胎蛋白异常增高，考虑是

- A. 浆液性囊腺瘤
- B. 卵巢卵黄囊瘤
- C. 库肯伯格瘤
- D. 畸胎瘤
- E. 无性细胞瘤

40. 肾出血热的传染源是

- A. 老鼠
- B. 猪
- C. 蚊子
- D. 钉螺
- E. 猫狗

41. 髋关节后脱位，复位常采用的方法

- A. 提拉法
- B. 切开复位
- C. HippocratEs 法
- D. 三角巾悬吊
- E. 夹板固定

42. 治疗缺铁贫最合理的治疗注意事项是

- A. 多喝牛奶，补充营养
- B. 与维生素 C 合用促进吸收
- C. 合理膳食，增加谷物的摄入

- D. 多饮浓茶
- E. 少吃鱼肉及肉类

43. 用某种诊断方法判断为阴性的人中，实际无病的人所占的比例称

- A. 假阳性率
- B. 假阴性率
- C. 阴性预测值
- D. 特异度
- E. 敏感度

44. Barrett 食管是指下列哪一种

- A. 食管鳞状上皮增生
- B. 黏膜固有层乳头向表面延伸
- C. 上皮层内中性粒细胞和淋巴细胞浸润
- D. 食管下段的复层鳞状上皮被单层柱状上皮所替换
- E. 黏膜糜烂或溃疡形成

45. 老年人最常见的不容易发生嵌顿的疝是

- A. 腹疝
- B. 白线疝
- C. 腹股沟直疝
- D. 腹股沟斜疝
- E. 脐疝

46. 下列预防接种第 2 个月应该接种的疫苗是

- A. 百白破疫苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 卡介苗疫苗
- D. 脊髓灰质炎疫苗
- E. 麻疹疫苗

47. 胸部 X 线检查，肺门舞蹈征多见于哪一种先天性心脏病

- A. 房间隔缺损
- B. 法洛三联症
- C. 动脉导管未闭
- D. 室间隔缺损
- E. 二尖瓣狭窄

48. 重症肌无力禁用的药物是

- A. 新斯的明
- B. 糖皮质激素
- C. 氨基糖苷类抗生素
- D. 免疫球蛋白

E. 维生素 C

49. 不宜使用序受体阻滞剂的情况是

- A. 慢性心力衰竭
- B. 射血分数保留的心力衰竭
- C. 高血压合并支气管哮喘
- D. 肥厚梗阻性心肌病
- E. 高血压

50. 关于雌激素的作用，下列不正确的是

- A. 增加输卵管宫缩
- B. 色素沉着
- C. 抗凝
- D. 子宫内膜变厚
- E. 促进水钠潴留

51. 下列缩宫素的作用中，不正确的是

- A. 增加宫缩
- B. 加快产程
- C. 促进泌乳
- D. 降压
- E. 由卵巢产生

52. 女，35 岁，早孕八周，行人工流产负压吸引术时突发胸闷、面色苍白，心动过缓，服用阿托品后缓解，应考虑诊断为

- A. 羊水栓塞
- B. 漏吸
- C. 人工流产术后综合症
- D. 子宫穿孔
- E. 子宫破裂

53. 女，35 岁，月经规律，28 天到 30 天一次，经期五到八天，末次月经 2022 年 3 月 15 日，计算其预产期是

- A. 2022-10-22
- B. 2022-12-22
- C. 2022-11-22
- D. 2023-01-15
- E. 2023-01-22

54. 女，26 岁，一个月前因工作差错被领导批评后，自觉生活无望，周围同事议论、笑话自己，在家中拒食一周。入院后对同病房的人指手画脚，还经常自言自语，觉得同屋病友都不行，瞧不起任何人。应考虑为

- A. 应激
- B. 抑郁症
- C. 双相障碍
- D. 焦虑症
- E. 精神分裂症

55. 女, 65 岁, 多饮、多尿、多食两年, 腹痛、恶心、呕吐两天。近 2 月体重下降 10kg。外院诊断为急性肠胃炎, 行补液治疗未见好转。查体: 空腹血糖 5mmol/L, 餐后 2h 血糖 1mmol/L, 未曾服用降糖药物治疗。为控制血糖, 下列治疗适宜的是

- A. 二甲双胍
- B. 格列类
- C. 胰岛素
- D. 阿卡波糖
- E. 吡格列酮

56. 男, 33 岁, 关节疼痛两年, 累及双手小关节与膝关节, 既往有十二指肠溃疡, 下列用药需避免

- A. 柳氮磺吡啶
- B. 糖皮质激素
- C. 环磷酰胺
- D. 来氟米特
- E. 双氯芬酸

57. 女性, 36 岁, G2P0, 停经 90 天, 阴道流血 1 天, 超声提示: 子宫内膜均匀, 呈落雪状, 首选的治疗措施是

- A. 化学治疗
- B. 清宫术
- C. 子宫全切
- D. 子宫次全切
- E. 继续观察

58. 男, 66 岁。2 天前与人争吵时觉头晕, 当时测血压 140/80mmHg, 今天骑车 10 公里到县医院就诊, 到达时测血压 160/85mmHg, 关于此时该患者的诊断, 正确的说法是

- A. 咱不能诊断为高血压, 患者完全休息好后, 多日不同次测量血压, 取平均值
- B. 诊断为高血压 1 级, 低危
- C. 诊断为高血压 2 级, 需进行进一步检查后明确分组
- D. 诊断为高血压 2 级, 中危

E. 诊断为单纯收缩期高血压 2 级, 中危

59. 男孩, 1 岁, 头痛呕吐 10 天, 黄色水样便, 8-14 次, 量多。精神差, 皮肤干燥, 四肢冷, 眼窝及前囟内陷, Na^+ : 128mmol/L, K^+ : 0mmol/L, 下列补液首选

- A. 静滴 2:1 含钠等张液
- B. 口服补盐液
- C. 静滴 2:3:1 含钠等张液
- D. 静滴 4:3:2 含钠等张液
- E. 静滴 9 氯化钠溶液

60. 男, 60 岁, 背部疼痛 1 月, 既往糖尿病史 10 年, 血糖控制不佳, 查体 $T38.5^{\circ}C$, P88 次/分, BP122/66mmHg。背部疼痛, 可见多个脓肿, 有波动感, 目前主要处理措施

- A. 使用抗生素
- B. 使用糖皮质激素
- C. 密切观察
- D. 切开引流
- E. 积极控制血糖

61. 男, 60 岁。进行性吞咽困难 4 月余。无反酸、嗝气、腹痛, 无发热。发病以来体重无明显变化。查体: $T36.5^{\circ}C$, P80 次/分, R18 次/分, BP120/80mmHg。浅表淋巴结未触及。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软, 无压痛。胃镜: 食管中段可见隆起病变, 累及食管全周, 长约 4cm, 伴不规则溃疡形成, 黏膜粗糙、质硬、易出血。行活组织病理检查, 最可能的结果是

- A. 平滑肌瘤
- B. 鳞癌
- C. 腺癌
- D. 淋巴瘤
- E. Barrett 食管

62. 男, 62 岁。上腹痛 10 天。既往高血压病史 10 余年, 反复心前区疼痛发作 2 个月, 口服阿司匹林 100mg/日、降压药物、他汀类降脂药等治疗。查体 $T36.5^{\circ}C$, P80 次/分, R18 次/分, BP120/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率齐, 腹软, 无压痛。上消化道 X 线钡剂造影胃角切迹壁外

龛影。14C 尿素呼气试验阴性。最适宜的治疗药物是

- A. 氢氧化铝
- B. 雷尼替丁
- C. 枸橼酸铋钾
- D. 多潘立酮
- E. 奥美拉唑

63. 女, 60 岁。晨起后突感右上肢无力, 持物掉落, 伴言语不利, 休息半小时后缓解。既往有高血压、糖尿病病史。查体: 未见脑神经异常, 四肢运动、感觉及共济运动正常。最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 低血糖
- C. 高血压脑病
- D. 癫痫单纯性部分性发作
- E. 短暂性脑缺血发作

64. 女, 28 岁。发热、咳嗽 2 个月, 胸部 X 线片示左上肺不规则片状阴影, 予抗结核治疗 1 个月余。查体 T38.5℃。巩膜稍黄染, 双肺未闻及干湿啰音。血 WBC $3 \times 10^9/L$, N 55。肝功能检查示 ALT、AST 正常。总胆红素 $6 \mu\text{mol/L}$, 直接胆红素 $8 \mu\text{mol/L}$ 。该患者现停用的药物是

- A. 利福平
- B. 异烟肼
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 链霉素

65. 男, 30 岁, 反复腹泻半年, 既往药物静脉史, 近期感头痛、恶心、呕吐, 全身散在皮疹, 无发热。实验室检查: 血 WBC $8 \times 10^9/L$ 。为进一步明确诊断, 应做什么检查

- A. HIV 检测
- B. HPV 检测
- C. CD4⁺ T 细胞计数
- D. 血糖
- E. 血沉

66. 新生儿, 出生后 1 分钟, 四肢略屈曲, 躯干皮肤色红, 四肢青紫, 呼吸慢且不规则, 清除喉部分泌物时有皱眉, 听诊心率 90 次/分, 1 分钟 Apgar 评分为

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8
- E. 9

67. 患儿 5 岁, 2 岁时发现智力低下, 查体: 表情呆滞, 皮肤苍白, 毛发发黄, 有怪臭味, 血中苯丙氨酸含量高于正常, 该疾病的发病机制为

- A. 常染色体隐性遗传
- B. 常染色体显性遗传
- C. 性染色体显性遗传
- D. 性染色体隐性遗传
- E. 多基因遗传

68. 婴儿, 出生后 5 天, 右乳房发现一肿块, 约鹌鹑蛋大小, 无红肿、无发热, 患儿不哭, 不闹。最合理的治疗措施是

- A. 硫酸镁外敷
- B. 手术切除
- C. 予以观察
- D. 应用抗生素
- E. 热敷

69. 男, 68 岁, 四肢疲乏无力 2 天, 既往高血压病史 20 年, 长期用氨苯蝶啶, 心电图提示 T 波高尖, 该患者四肢疲乏无力的原因最可能是

- A. 高钾血症
- B. 低钾血症
- C. 低钙血症
- D. 高钙血症
- E. 高镁血症

70. 女, 25 岁, 孕 10 周, 产检发现甲状腺 2 度肿大, 可闻及血管杂音, 未触及结节, 无高血压、糖尿病病史, 首选的治疗是

- A. 丙硫氧嘧啶
- B. 甲硫咪唑
- C. 手术切除
- D. 放射性碘治疗
- E. 普萘洛尔

71. 女, 30 岁。腹痛、腹泻伴急后重 3 天。最初为稀便, 2 天后为粘黏脓血便, 偶见片状灰白色膜状物排出。此病变

最可能的炎症类型是

- A. 纤维素性炎
- B. 变质性炎
- C. 出血性炎
- D. 浆液性炎
- E. 化脓性炎

72. 女, 初孕妇, 妊娠 10 周。患者小阴唇内侧出现一些赘生物, 病理活检提示尖锐湿疣。治疗首先的是

- A. 咪喹莫特
- B. 激光
- C. 干扰素
- D. 三氯醋酸
- E. 红霉素

73. 女, 28 岁, G3P0, 孕 32+5 周, 阴道流血 3 小时, 其流血量大于月经量, 无腹痛, 查体: 心率 86 次/min, 呼吸 20 次/分, BP115/86mmHg, 无宫缩, LOT, 胎头高浮, 未入盆, 胎心 150 次/分, 胎心音清楚, Hb60g/L。该孕妇阴道流血的原因是

- A. 前置胎盘
- B. 流产
- C. 胎盘早剥
- D. 先兆子宫破裂
- E. 异位妊娠

74. 某孕妇, 26 岁, 妊娠 31 周, 无痛性阴道流血 4 次, 检查发现胎心在正常范围内, 子宫无压痛, 阴道流血量少于月经量, 正确的护理措施是

- A. 卧床休息, 左侧卧位
- B. 肛查, 了解宫口有无开大
- C. 阴道检查
- D. 缩宫素引产
- E. 输血

75. 患儿男, 2 岁, 发热 2 天, 最高体温 39.6°C, 伴流涕, 鼻塞, 眼结膜充血, 眼泪多, 今发现耳后、枕部散在红色丘疹, 疹间皮肤正常, 考虑最可能的诊断是

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 猩红热
- D. 幼儿急诊
- E. 水痘

76. 女, 25 岁, 皮肤瘀斑伴月经量多 2 周, 血常规: Hb98g/L, 骨髓细胞学检查: 增生活跃, 粒细胞、红系不明显, 涂片巨核细胞 302 个, 产板型巨核细胞 1 个, 患者的诊断是

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼细胞贫血
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 再生障碍性贫血
- E. 急性巨核细胞性白血病

77. 女, 52 岁, 左肩部疼痛放射至左前臂上部, 查体提示左肩肌肉轻度萎缩, 诊断为

- A. 神经根型颈椎病
- B. 交感型颈椎病
- C. 肩关节囊肿
- D. 脊髓型颈椎病
- E. 椎动脉型颈椎病

78. 女, 30 岁, 孕 39 周, 皮肤黄染、乏力, 呕吐 1 周, 入院检查: 胎心 108 次/分, 反复变异减速, 行急诊剖宫产, 娩出一 3200g 男婴, 15 分钟后胎盘娩出, 子宫缩小, 质硬, 但阴道持续流血, 约 1900ml, 无血凝块, 该患者出血的原因是

- A. 晚期产后出血
- B. 前置胎盘
- C. 宫缩乏力
- D. 凝血功能异常
- E. 胎盘早剥

79. 男性 60 岁, 刺激性咳嗽 2 月, 吸烟 23 年, 20 支/天, 胸部 CT 检查右肺门部见一 2×2cm 的团块影, 纵隔多见淋巴结肿大, 支气管镜检查右主支气管壁弥漫性增厚, 管壁狭窄, 该疾病的病理分型为

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 小细胞肺癌
- D. 大细胞肺癌
- E. 混合型细胞癌

80. 患儿 7 岁, 下肢水肿, 血压 100/70mmHg, 高胆固醇血症, 蛋白尿 ++, 尿 WBC(-)。该患者出现蛋白尿的

机制是

- A. 肾小球滤过率增加
- B. 肾小管通透性增加
- C. 肾小管重吸收增加
- D. 肾小球滤过膜受损
- E. 肾动脉硬化

81. 患者男, 38 岁。因牙龈出血肿痛来院检查, 血小板 $6 \times 10^9/L$ 。给予输入血小板治疗, 输血小板 30ml 后, 患者出现荨麻疹, 不应采取的措施是

- A. 停止输入血小板
- B. 减慢输入血小板
- C. 输入碳酸氢钠
- D. 肌注异丙托溴铵
- E. 肌注苯海拉明

82. 男, 56 岁, 既往有乙型肝炎病史 20 年。查体: 腹壁静脉曲张, 移动性浊音阳性, 进食后突然呕血, 常用药物是

- A. 莫沙必利
- B. 枸橼酸铋钾
- C. 奥美拉唑
- D. 潘多立酮
- E. 生长抑素

83. 患者男, 45 岁, 头晕, 行走不稳 10 天, 指鼻试验阳性, 该患者最有可能损伤的部位是

- A. 基底节区
- B. 小脑
- C. 大脑皮质层
- D. 脊髓
- E. 下丘脑

84. 男, 68 岁, 间断性咳嗽、咳痰 10 余年活动后气短 2 年, 曾行胸部 X 线片示双肺纹理增粗、紊乱, 膈肌低平, 吸烟史 40 年, 20 支/天, 已戒 3 年。为了明确诊断, 首选的检查

- A. 血气分析
- B. 肺功能
- C. X 线
- D. 超声心动图
- E. 胸部 CT

85. 女性, 27 岁, 月经期同房, 3 天后出现下腹疼痛, 发热, 宫颈举痛, 该

患者最可能的诊断是

- A. 急性盆腔炎
- B. 慢性盆腔炎
- C. 异位妊娠
- D. 卵巢蒂扭转
- E. 子宫内膜异位症

86. 男性, 70 岁, 排便次数增加、大便变细 3 月余, 血便 2 周, 伴有里急后重感, 首选的检查是

- A. 结肠镜
- B. 大便常规
- C. CEA 检查
- D. 直肠指诊
- E. 腹部 CT

87. 男, 16 岁, 军训中摔倒, 大量出汗, 口唇苍白, 呼吸 24 次/分, 心率 168 次/分, BP101/69mmHg, 应该的措施是什么

- A. 将其转移至凉爽处
- B. 口服温盐水
- C. 静滴碳酸氢钠溶液
- D. 氯丙嗪
- E. 直肠灌洗

88. 男, 45 岁, 2 年来反复乏力, 食欲缺乏, 肝区隐痛, 查体: 面色灰暗, 巩膜黄染, 见肝掌和蜘蛛痣, 肝肋下 2cm, 质地中等, 脾肋下 5cm。实验室检查: ALT:256U/L, AST 314U/L, 总胆红素 62 μ mol/L, 血清球蛋白 38g/L, 类风湿因子阳性, 最可能的诊断是

- A. 慢性迁延性肝炎
- B. 慢性轻度肝炎
- C. 慢性重度肝炎
- D. 类风湿关节炎
- E. 细菌性肝炎

89. 男, 60 岁, 直肠癌根治术后 4 天, 今日晨起时突然左下肢肿胀, 皮温升高, 股三角区有深压痛, 最有可能的疾病是

- A. 大隐静脉曲张
- B. 下肢深静脉血栓
- C. 血栓闭塞性血管炎
- D. 动脉栓塞
- E. 淋巴水肿

90. 男, 20 岁, 因躁狂发作入院, 表现为动作增多, 语速加快, 滔滔不绝, 言语夸大, 好管闲事。入院后给予口服碳酸锂 1.0g/d, 2 天后出现恶心、呕吐和轻微手抖, 无意识障碍。应立即采取的措施是

- A. 加用卡马西平
- B. 行胃镜检查
- C. 血液透析
- D. 洗胃
- E. 停药, 检测血锂浓度

91. 男, 12 岁。反复左腰部胀痛 2 年。查体: 左腰部包块, 质软, 呈囊性感。B 超提示左肾积水, 肾皮质变薄。为了解左肾实质损害程度及分侧肾功能, 最佳检查为

- A. KUB
- B. 血 BUN, CR
- C. 静脉尿路造影
- D. 放射性核素肾显像
- E. 逆行尿路造影

92. 患者男, 58 岁, 忽然昏迷, 抽搐, 呼之不应, 数分钟后恢复, 醒后无记忆, 应首选的检查是

- A. 脑电图
- B. 脑部 CT
- C. 颅脑核磁
- D. 超声心动图
- E. 心电图

93. 某市 35 岁以上人口为 10 万人, 新冠肺炎患者为 1000 人, 其中慢性患者为 500 人; 因新冠肺炎死亡人数为 90 人; 其中 60 人合并慢性病, 求新冠肺炎合并慢性疾病患者死亡率

- A. 3
- B. 12
- C. 15
- D. 05
- E. 08

94. 男, 50 岁, 喜欢喝酒, 家人为了给他戒酒, 在酒里下了戒酒药, 使酗酒者饮用后痛苦的恶心呕吐抵消了饮酒的欣快感, 从而促使戒酒, 这种方法属于

- A. 系统脱敏

- B. 冲击疗法
- C. 厌恶疗法
- D. 暗示疗法
- E. 代币疗法

95. 女性, 52 岁, 左肩部疼痛 3 月, 疼痛可放射至左上臂中段, 查体示左肩关节周围肌肉轻度萎缩, 左肩关节外旋外展受限。考虑可能诊断为

- A. 粘连性肩关节囊炎
- B. 神经根型颈椎病
- C. 脊髓型颈椎病
- D. 椎动脉型颈椎病
- E. 交感型颈椎病

96. 男性, 50 岁, 间歇性无痛性血尿 3 个月, 经检查诊断为左侧肾癌, 该患者出现血尿表明

- A. 早期肾癌
- B. 晚期肾癌
- C. 肿瘤内出血
- D. 肾癌已侵入肾盏及肾盂
- E. 肾癌已侵入肾门

97. 女, 18 周, 发热一天, 抽搐一次, 发作 15 分钟无缓解送急诊, 查体, 体温 39.5℃, 无意识, 双眼上翻, 四肢抽搐, 首选药物是

- A. 苯巴比妥肌注
- B. 苯妥英钠滴注
- C. 地西洋静推
- D. 10%葡萄糖酸钙
- E. 口服水合氯醛

98. 男, 53 岁, 农民, 发热伴头痛 3 天, 查体: T: 38℃, BP: 70/50mmHg, 精神萎靡, 躯干皮肤有出血点, 实验室检查: 血 WBC: $18 \times 10^9/L$, N 0.6, 异型 L 0.16, PLT $60 \times 10^9/L$, 尿蛋白++, 该农民可能被什么感染

- A. 猪
- B. 鼠
- C. 人
- D. 禽
- E. 蚊子

99. 患者女, 29 岁, 素食者, 不吃深色食物, 出现夜间视物不清, 视物模糊, 需要食用哪种维生素补充

- A. 番茄素
- B. 维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 E
- E. 胡萝卜素

100. 中年男性，突发呕吐伴腹痛，中上腹持续疼痛，转移性右下腹两小时，压痛反跳痛，最可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 肠梗阻
- D. 胆囊炎
- E. 胃炎

101. 36 岁，初产妇，妊娠 39 周。自然临产，宫口全开，S=+3，胎心 109 次/分，下列正确的是

- A. 剖宫产
- B. 静滴缩宫素
- C. 阴道分娩
- D. 继续观察
- E. 人工破膜

102. 男，29 岁，因泛发暗红色斑丘疹，查体：躯干及四肢泛发暗红色斑丘疹，掌拓部可见铜红色斑疹，可以确诊为检查是

- A. 加热血清反应素试验
- B. 甲苯胺红不加热血清学试验
- C. 梅毒螺旋抗体颗粒凝集试验
- D. 性病研究实验室研究
- E. 肝功能检查

103. 女，65 岁，胸痛 5h。心电图急性前壁心肌梗死，心电监测显示室性期前收缩，药物治疗首选

- A. 西地兰
- B. 硝酸酯
- C. 阿托品
- D. 胺碘酮
- E. 普罗帕酮

104. 男性，62 岁，患者突然感觉胸髓以下，感觉运动障碍，大小便失禁，最有可能的诊断是

- A. 吉兰-巴雷综合征
- B. 急性脊髓炎
- C. 脊髓肿瘤

- D. 急性脊髓灰质炎
- E. 神经根型颈椎病

105. 女，45 岁。饱餐后出现上腹部剧烈疼痛 10 小时，向后背放射，屈曲位腹痛减轻，伴呕吐。有胆囊结石病史。查体服软，上腹部有压痛、反跳痛，Murphy 征阴性，肠鸣音弱。最可能的诊断是

- A. 急性胆囊炎
- B. 消化道穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性心肌梗死

106. 患者男，66 岁，大量饮酒后突发上腹部疼痛 2 小时，既往胆囊结石病史 10 余年，患者的疼痛可能向哪里放射

- A. 左肩部
- B. 右肩部
- C. 腰后部
- D. 左上腹
- E. 脐周

107. 男，2 岁，左上肢抽搐 3 天，每次发作约 10 秒钟缓解，3 天来共发作 5 次，每次 3 分钟，该患儿首选治疗药物是

- A. 苯妥英钠
- B. 乙琥胺
- C. 卡马西平
- D. 氯丙嗪
- E. 地西洋

108. 患者，女，40 岁，近天来脾气暴躁，晚上不睡觉，查体：甲状腺肿大，触之有细颤，有血管杂音。下列诊断哪项符合

- A. 甲状腺功能减退症障碍
- B. 糖尿病功能导致的精神障碍
- C. 甲状腺功能亢进导致的障碍
- D. 肾上腺导致的精神障碍
- E. 促甲状腺激素导致的精神障碍

109. 女，70 岁，摔伤致左髋部疼痛伴活动受限，左下肢缩短 3cm，外展 86°，该患者的诊断是

- A. 髋关节后脱位

- B. 髋关节前脱位
- C. 股骨颈骨折
- D. 股骨转子间骨折
- E. 股骨头骨折

110. 女, 70 岁, 摔伤致左髋部疼痛伴活动受限, 左下肢缩短 3cm, 外展 86° , 治疗方案是

- A. 半髋关节置换术
- B. 人工关节置换术
- C. 内固定手术
- D. 骨牵引
- E. 皮牵引

111. 男, 3 岁, 发烧 7 天。查体 T: 37°C , 眼睛结膜红, 颈部淋巴结大, 足有硬性水肿及蜕皮, 唇充血皲裂。首选检查

- A. 血常规+超声
- B. 血常规+EB 病毒检测
- C. 淋巴结活检
- D. 超声检查
- E. 血培养

112. 男, 68 岁, 上腹部绞痛, 伴恶心呕吐 8 小时, 体检胆囊多发小结石, 查体体温 39°C , P110, BP80/60mmHg, 神志恍惚, 皮肤巩膜黄染, 上腹部压痛, 肝区叩诊+, 腹部 CT: 胆囊积液, 胆囊壁水肿, 该患者首要处理措施是

- A. 胆总管切开引流
- B. 胆囊切除术
- C. 药物止痛止痉
- D. 继续观察
- E. 胆囊造瘘术

113. 男性, 82 岁, 今日晨起站立不稳, 来院前生活能自理, 查体: BP195/110mmHg, 神志清楚, 言语交流障碍, 右侧鼻唇沟稍浅, 四肢肌力, 肌张力正常, 应首选的检查是

- A. 头颅 MRI
- B. 脑电图
- C. 头颅增强 CT
- D. 头颅 CT
- E. 腰穿脑脊液检查

114. 男, 25 岁, “感冒”后双下肢进行性无力二便失禁 2 天, 胸 4 平面以下

痛、温觉消失, 双下肢肌力 2 级, 测 Babinski 征阳性, 最可能的诊断是

- A. 急性脊髓炎
- B. 吉兰巴雷综合征
- C. 脊髓髓外压迫
- D. 重症肌无力
- E. 面神经炎

115. 女, 40 岁。10 年来常出现畏寒、少汗、乏力、纳差, 月经不调、便秘, 少语少动表情淡漠, 近半年来出现面色苍白, 眼睑面部水肿, 反应迟钝, 有一过性幻视。最可能的诊断是

- A. 甲状腺功能亢进导致的障碍
- B. 糖尿病功能导致的精神障碍
- C. 甲状腺功能低下导致的精神障碍
- D. 肾上腺功能亢进导致的精神障碍
- E. 促甲状腺激素导致的精神障碍

116. 女, 54 岁, 双下肢水肿 7 天, 既往糖尿病、高血压 20 年。实验室检查: 尿糖阳性, 尿酮体阳性, 蛋白尿+++。最可能的诊断是

- A. 糖尿病肾病
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

117. 男, 6 个月, 高热咳嗽 3 天, 查体: 体温 39.5°C , 烦躁不安, 口唇发绀, 呼吸浅快, 可见三凹征, 双肺可闻及哮鸣音。胸片双下肺小点片状阴影, 纵隔变钝。WBC $8 \times 10^9/\text{L}$, N 0.44, L 0.52。最可能的诊断是

- A. 毛细支气管炎
- B. 支原体肺炎
- C. 金葡菌肺炎
- D. 衣原体肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

118. 女, 33 岁。发现左乳房包块 10 天, 无不适症状。查体: 乳房视诊无异常, 左乳房外上象限可触及一大小 $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ 包块, 质硬, 不光滑, 活动度良好, 左腋窝未触及肿大淋巴结。钼靶 X 线片检查见一直径 5cm 不光滑密度增高影, 周边有小毛刺, 中央可见聚集细小钙化点。拟手术治疗, 术后 10 天拟

行综合治疗，决定是否可用靶向治疗（曲妥珠单抗）的肿瘤标记物是

- A. PR
- B. ER
- C. MHC
- D. TNF- α
- E. HER-2

119. 男，35 岁，右下肢受伤后被亲属送至社区医院，医生检查后，准备为患者进行心电图，胸部 X 片以及血常规等检查。患者家属知道后，觉得这些检查没有必要，认为医生过度检查，医生向患者家属讲明检查的必要性，家属了解后表示同意并向医生表示了歉意，请问该事件中体现出医患关系中的

- A. 医患双方在知识上的不对等性
- B. 医患纠纷无法避免
- C. 社会价值的同一性
- D. 医患信任不充分
- E. 医疗信息不对称

120. 女，50 岁，头痛呕吐 2 周，发作性抽搐 3 次，5 年前行右乳腺癌根治术，头颅 CT 示：左额叶多个低密度影，占位明显，首先考虑诊断胖

- A. 转移性脑瘤
- B. 脑炎
- C. 脑梗死
- D. 脑血栓
- E. 脑膜炎

121. 女，55 岁，间断上腹部隐痛 1 年，消瘦半年，Hb59g/L，WBC $8 \times 10^9/L$ ，Plt $160 \times 10^9/L$ ，胃镜检查提示胃癌，拟行胃癌根治术，需完善术前输血相关血清学检查，其不包括

- A. 血小板抗体筛查
- B. 不规则抗体筛查
- C. 交叉配血试验
- D. ABO 血型鉴定
- E. Rh 血型鉴定

122. 某患者发现乙肝 20 年，肝功能异常半年查：HBVDNA $8 \times 10^5 IU/L$ ，最重要的治疗措施是

- A. 短效干扰素
- B. 恩替卡韦

- C. 拉米夫定
- D. 阿德福韦酯
- E. 利巴韦林

123. 患者，女，25 岁。反复右下腹痛、腹泻便秘交替出现半年，伴午后低热。查体：心、肺未见明显异常，右下腹触及包块，轻压痛无反跳痛。X 线钡剂检查可见升结肠痉挛回盲部跳跃征。最可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 肠结核
- C. 结肠癌
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 肠易激综合征

124. 男，23 岁，从三楼跳下致腰椎骨折，问其缘由，认为总有一个老头和一个女人在他耳边说，叫他快点去死，他是在忍受不了。此症状属于

- A. 抑郁障碍
- B. 广泛性焦虑障碍
- C. 适应障碍
- D. 精神分裂症
- E. 双相障碍或者恐惧障碍

125. 男性，30 岁，已婚，有一 3 岁儿子。因“心烦、焦虑 1 个月”来医院诊治。近 1 年来，夫妻感情紧张，妻子曾提出离婚，患者拒绝。1 个月前，患者妻子向法院提出离婚要求，且带儿子离开家庭。患者托朋友与妻子和解亦无结果，出现心烦、紧张，焦虑不安，生活邈遏，工作时注意力不集中，伴心慌。查：心电图正常。交谈切题，焦虑明显，不理解妻子为何要离婚，未发现精神病性症状。起初，患者认识不到夫妻感情破裂的原因，经过数次心理治疗后，患者能正确对待当前的家庭关系，逐步回复正常生活和工作。该患者的诊断是

- A. 抑郁障碍
- B. 广泛性焦虑障碍
- C. 适应障碍
- D. 精神分裂症
- E. 双相障碍或者恐惧障碍

A3/A4 型选择题

（126~127 题共用题干）

2022 年临床助理历年真题

男，40 岁，呕吐寒战高热 1 周，隔日发作一次。2 月前曾去东南亚旅游。查体心肺未及明显异常，脾肋下 1cm，血常规：HB105g/L，WBC $5.0 \times 10^9/L$ 。

126. 首选检查为

- A. 血涂片
- B. 免疫学监测
- C. 吖啶橙荧光染色法
- D. X 线胸片检查
- E. 酶联免疫吸附试验

127. 首选治疗是

- A. 乙胺嘧啶
- B. 伯氯喹
- C. 青蒿素
- D. 甲硝唑
- E. 哌喹

(128~129 题共用题干)

女性，40 岁，因离婚出现兴趣减退，缺乏兴趣，感觉生活没有意义，感觉周围的人都在讨论自己，心神不安，紧张，出汗。

128. 该患者最可能的诊断为

- A. 广泛性焦虑障碍
- B. 双相障碍
- C. 抑郁障碍
- D. 应激障碍
- E. 创伤后应激障碍

129. 该患者治疗首选

- A. 抗焦虑药
- B. 抗抑郁药
- C. 心境稳定剂
- D. 抗精神障碍药物
- E. 电击疗法

(130~132 题共用题干)

患儿高热，查体：体温： $39.5^{\circ}C$ ，烦躁，可见三凹征，双肺呼吸喘鸣音为主。

130. 最可能的诊断是

- A. 呼吸道合胞病毒肺炎
- B. 支原体肺炎
- C. 金葡菌肺炎
- D. 链球菌肺炎
- E. 衣原体肺炎

131. 治疗吸氧，退热的同时

- A. 补液

- B. 雾化
- C. 使用抗生素
- D. 胸腔穿刺
- E. 继续观察

132. 如果治疗有效果症状减轻，进一步检查是

- A. 特异性抗体
- B. 病毒抗原
- C. 胸腔穿刺积液培养
- D. 血常规
- E. 支气管镜

(133~134 题共用题干)

男，68 岁，间断咳嗽咳痰 10 余年，喘息 5 年，加重 3 天，吸烟 20 余年，查体：烦躁不安，球结膜充血，口唇发绀。桶状胸，右下肺可闻及湿罗音。

133. 下列心电图改变提示慢性肺心病的是

- A. 右束支阻滞
- B. P 波增宽，有切迹
- C. 胸前导联顺钟向转位
- D. V_{5~6} 导联 st 段压低
- E. V_{1~4} 导联 st 改变

134. 该患者目前最重要的治疗措施

- A. 无创通气
- B. 抗感染
- C. 利尿
- D. 纠正电解质紊乱
- E. 吸入糖皮质激素

(135~136 题共用题干)

女，45 岁，性交时接触性出血 1 月，妇科检查：宫颈口见一菜花样新生物，直径约 2cm，阴道内未见异常，三合诊宫颈旁组织无异常。

135. 最可能的诊断是

- A. 尖锐湿疣
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 宫颈肌瘤
- E. 慢性宫颈炎

136. 首选的治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 冷冻疗法
- C. 放疗

2022 年临床助理历年真题

- D. 化疗
- E. 激光治疗

B1 型选择题

(137~138 题共用备选答案)

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

137. 疫苗接种记录保存年限不少于

138. 二类精神药物处方保存时间是多久

(139~140 题共用备选答案)

- A. 右心室肥厚，右心房肥大
- B. 心电图左偏，左心室肥厚
- C. 轻度左心室肥厚或正常
- D. 心电图右偏，不完全性右束支传导阻滞
- E. 右心室肥厚，电轴右偏，部分患儿右心房肥大

139. 轻微室间隔缺损的心电图表现

140. 原发孔型房间隔缺损的心电图表现常为

(141~142 题共用备选答案)

- A. 正常红细胞
- B. 小细胞
- C. 大细胞
- D. 畸形红细胞
- E. 破碎红细胞

141. 慢性失血性贫血的红细胞形态

142. 再生障碍性贫血的红细胞形态

(143~144 题共用备选答案)

- A. 丹毒
- B. 痈
- C. 破伤风
- D. 疔
- E. 急性蜂窝织炎

143. 临床表现为局部斑片状红斑，界限清楚，有压痛的疾病是

144. 临床表现为苦笑面容，角弓反张，诊断为

(145~146 题共用备选答案)

- A. 内脏性幻觉
- B. 错觉
- C. 感觉过敏
- D. 感觉减退
- E. 内感性不适

145. 患者有时感觉到胃扭转，穿孔，破裂

146. 患者有时感到躯体内出现牵拉、挤压，蚂蚁爬行感，性质难以描述，定位不准

(147~148 题共用备选答案)

- A. 甲状腺激素
- B. 促甲状腺激素释放激素
- C. 抗利尿激素
- D. 甲状旁腺激素
- E. 促甲状腺激素

147. 垂体后叶储存的激素是

148. 垂体分泌的激素是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 抗核抗体
- B. 抗 dsDNA 抗体
- C. HLA-B27
- D. 抗 CCP 抗体
- E. RF

149. 对诊断强直性脊柱炎有辅助作用的检查标志物是

150. 对诊断类风湿性关节炎特异性较高的检查指标

答案

第一单元

1. 答案:C

解析:尼古丁(烟碱)是烟草中的依赖性成分,重复使用尼古丁增加心脏速度和升高血压并降低食欲。大剂量的尼古丁会引起呕吐以及恶心,严重时导致死亡。

2. 答案:C

解析:组氨酸在组氨酸脱羧酶的催化下生成组胺,组胺是强血管扩张剂,可引起过敏反应(C对)。谷氨酸脱羧生成 γ -氨基丁酸,是抑制性神经递质(A错)。苯丙氨酸可经羟化生成酪氨酸(B错)。色氨酸脱羧生成5-羟色胺,也可收缩血管,但不引起过敏反应(D错)。鸟氨酸脱羧生产腐胺,腐胺又可转变为亚精胺及精胺,是调节细胞生长的重要物质(E错)。

3. 答案:B

解析:肝性脑病(HE)指在肝硬化基础上因肝功能不全和(或)门-体分流引起的、以代谢紊乱为基础、中枢神经系统功能失调的综合征。约50%肝硬化病人有脑水肿,病程长者大脑皮质变薄,神经元及神经纤维减少。常见诱因有消化道出血、大量排钾利尿、腹腔积液、高蛋白饮食、催眠镇静药、麻醉药、便秘、尿毒症、外科手术及感染等。

4. 答案:E

解析:支气管扩张手术适应证包括有:①一般情况较好,心、肝、肾等重要器官功能可以耐受手术;②经规范内科治疗,但症状无明显减轻,存在大量脓痰、反复或大量咯血等症状;③病变相对局限。

5. 答案:B

解析:肾蒂血管损伤时,肾蒂或肾段血管的部分或全部撕裂,可引起大出血、休克。引起肾急剧移位,肾动脉突然被牵拉,致血管内膜断裂,形成血栓,易造成肾功能丧失,是肾损伤中较为严重的一种类型。

6. 答案:C

解析:对患者死因有异议的,尸检必须在患者死亡后48小时内进行,但具备

尸体冻存条件的可以延长至7日。

7. 答案:D

解析:急性阑尾炎典型的腹痛发作始于上腹,逐渐移向脐部,数小时(6~8小时)后转移并局限在右下腹。右下腹压痛是急性阑尾炎最常见的重要体征。压痛点通常位于麦氏点,可随阑尾位置的变异而改变,但压痛点始终在一个固定的位置上。

8. 答案:B

解析:首关消除:从胃肠道吸收入门静脉系统的药物在到达全身血循环前必先通过肝脏,如果肝脏对其代谢能力很强或由胆汁排泄的量大,则使进入全身血循环内的有效药物量明显减少,这种作用称为首关消除。口服给药在胃肠道吸收入血,可引起首关消除。

9. 答案:C

解析:水溶性维生素包括维生素B族维生素(B1、B2、PP、泛酸、生物素、B6、叶酸与B12)和维生素C。脂溶性维生素包括维生素A、维生素D、维生素E和维生素K,是疏水性化合物。

10. 答案:A

解析:霍乱属于甲类传染病,根据我国《传染病防治法》,医疗机构发现甲类传染病时,应当及时采取下列措施:①对病人、病原携带者予以隔离治疗,隔离期限根据医学检查结果确定;②对疑似病人,确诊前在指定场所单独隔离治疗;③对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者,在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。对于拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的,可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。

11. 答案:D

解析:直条图表示相互独立的统计指标数值大小和它们之间的对比关系。描述对比两家医院收治病人总量,应选用直条图。散点图用点的密集程度和变化趋势表示两指标之间的关系。圆形图用于描述构成比关系。直方图主要用于描述连续变量频数的分布情况。线形图通过线段的上升或下降来表示变量的连续变化过程。

12. 答案:A

解析:神经根型颈椎病临床上开始多

为颈肩痛，短期内加重，并向上肢放射。放射痛范围根据受压神经根不同而表现在相应皮节。皮肤可有麻木、过敏等异常，同时可有上肢肌力下降、手指动作不灵活(A对)。交感型颈椎病表现为头痛、头晕、记忆力减退、失眠等。脊髓型颈椎病，病人出现上肢或下肢麻木无力、僵硬、双足踩棉花感，束带感，双手精细动作障碍。检查时可有病理征可呈阳性。椎动脉型颈椎病可出现头晕、恶心、耳鸣、偏头痛等症状。

13. 答案:C

解析:医学伦理原则包括尊重原则、不伤害原则、有利原则、公正原则。医生得知患者出院意图后予以办理出院,体现的是尊重原则中的尊重患者的自主权(C对)。

14. 答案:B

解析:根据我国免疫规划疫苗儿童免疫程序表,出生时需接种的疫苗为乙肝疫苗;卡介苗。百白破疫苗第一针在3月龄时接种。麻疹、乙脑、麻风疫苗接种年龄在8个月左右。

15. 答案:D

解析:补呼气量是指平静呼气末,再尽力呼气所能呼出的气体量。可用肺活量-深吸气量表示。该患者肺活量3600ml,潮气量500ml,深吸气量2100ml,则补呼气量为 $3600-2100=1500$ ml。

16. 答案:C

解析:普鲁卡因毒性较小,是常用的局麻药之一。适用于浸润麻醉、阻滞麻醉、腰椎麻醉、硬膜外麻醉及封闭疗法等。但它的麻醉效能较弱,黏膜穿透力很差,故不用于表面麻醉和硬膜外阻滞。

17. 答案:C

解析:公共卫生监测分为疾病监测、健康状况监测、危险因素监测和其他监测。其中疾病监测是最早产生和发展的公共卫生监测。疾病监测中的传染病监测是最普遍的监测。

18. 答案:C

解析:重症哮喘患者,发作时严重气流受限,血气分析 $PaO_2 < 60$ mmHg, $PaCO_2 > 45$ mmHg, $SaO_2 \leq 90\%$,pH可降低,表现为低氧血症、二氧化碳潴留、呼

吸性酸中毒。同时严重缺氧导致无氧代谢增强,乳酸等酸性物质产生增多,引起代谢性酸中毒。故重症哮喘时,最常见的酸碱平衡失调是呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒。

19. 答案:A

解析:女性,公园内散步时,受到迎面驶来的自行车的刺激,未受伤。时候自觉手心出汗、心跳加速,属于应激反应(A对)。应激是由危险的或出乎意料的外界情况的变化所引起的一种情绪状态。应激时身体处于充分动员的状态,心率、血压、体温、肌肉紧张度、代谢水平等都发生显著变化,从而增加机体活动力量,以应付紧急情况。

20. 答案:A

解析:多巴胺是最常用的血管活性药,兼具兴奋 α 、 β_1 和多巴胺受体作用,可增强心肌收缩力和增加心排血量,并扩张肾和胃肠道等内脏器官血管。既可以抗休克(强心扩血管),又可利尿,故在休克合并少尿时首选多巴胺(A对)。

21. 答案:B

解析:左心衰竭肺淤血时,有些巨噬细胞吞噬了红细胞并将其分解,胞浆内形成含铁血黄素,此时这种细胞称为心力衰竭细胞,又称心衰细胞(B对)。

22. 答案:C

解析:链霉素是一种氨基糖苷类抗生素,主要与其他抗结核药联合用于结核分枝杆菌所致各种结核病的初治病例,或其他敏感分枝杆菌感染。不良反应主要为耳毒性、前庭功能损害和肾毒性等,影响前庭功能时可有步履不稳、眩晕等症状;影响听神经出现听力减退、耳鸣、耳部饱满感。

23. 答案:D

解析:艾滋病,是指人类免疫缺陷病毒(又称“艾滋病病毒”)引起的获得性免疫缺陷综合征。国家建立健全艾滋病监测网络,实行艾滋病自愿咨询和自愿检测制度。县级以上地方人民政府和政府有关部门应当依照规定,根据本行政区域艾滋病的流行情况,制定措施,鼓励和支持居民委员会、村民委员会以及其他有关组织和个人推广预防艾滋病的行为干预措施,帮助

有易感染艾滋病病毒危险行为的人群改变行为。

24. 答案:C

解析:冠状动脉血流量主要受心肌代谢水平的调节,也受神经和体液因素的调节。心肌代谢增强时,耗氧量增加,局部组织中 O_2 分压降低,此时 ATP 生成减少而分解增加,心肌细胞中的 ATP 分解为 ADP 和 AMP。存在于冠脉血管周围间质细胞中的 5'-核苷酸酶可将 AMP 分解而产生腺昔。腺昔具有强烈的舒张小动脉作用。交感神经兴奋 α 受体、洋地黄、迷走神经兴奋 N 受体均可引起冠状动脉收缩。

25. 答案:C

解析:胃癌的好发部位依次为胃窦、贲门、胃体。

26. 答案:A

解析:医务人员应尊重患者的人格,对于病人的隐私要给予保密,不得随意散布、谈论。本题中未婚夫妻行婚前检查,发现男方有严重的遗传病,两人尚未构成法定关系,医生应遵守保密原则,将检查结果告知患者本人。

27. 答案:C

解析:医学伦理学的基本原则中的尊重原则要求医务人员尊重患者,知情同意、知情选择、要求保守秘密和隐私等均是尊重患者的体现。本题中医生向患者讲述了两种治疗方法的利弊,让患者自主选择,体现了尊重原则中的尊重患者的自主权。

28. 答案:B

解析:支气管哮喘急性发作的首选药物为 β_2 受体激动剂,首选吸入给药。吸入型糖皮质激素、氨茶碱为控制类药物。 β 受体阻滞剂、利尿剂不是哮喘的治疗药物。

29. 答案:A

解析:血钙小于 2mmol/L 时,提示 Ca^{2+} 内流入腺泡细胞,胰腺坏死,胰腺炎加重。血尿酸淀粉酶、脂肪酶是比较特异的诊断指标,但与病情严重程度不成正相关。碱性磷酸酶升高多提示骨骼疾病、肝胆疾病等。

30. 答案:B

解析:慢性非传染病是起病时间长,缺乏明确病因证据,一旦发病即病情迁延不愈的非传染性疾病的概括性总称。

可在人与人之间传播是传染病的特征。

31. 答案:A

解析:急性肾小球肾炎的主要致病菌为 β -溶血性链球菌“致肾炎菌株”。

32. 答案:B

解析:IgA 肾病是最为常见的一种原发性肾小球疾病,是指肾小球系膜区以 IgA 或 IgA 沉积为主,伴或不伴有其他免疫球蛋白在肾小球系膜区沉积的原发性肾小球病。IgA 肾病患者出现贫血,考虑病人已经出现肾功能的损害,此时应选择洗涤红细胞。洗涤红细胞适用于:对血浆蛋白有变态反应的贫血患者;自身免疫性溶血性贫血患者;阵发性睡眠性血红蛋白尿症患者;高钾血症及肝肾功能障碍需要输血者。

33. 答案:A

解析:主动监测是指上级单位主动地、有计划地组织到下级单位收集资料或开展定期的调查收集资料,本题中机构主动发现中学暴发肺结核,属于主动监测(A对)。

34. 答案:D

解析:根据《中华人民共和国精神卫生法》第五十五条 医疗机构应当为在家居住的严重精神障碍患者提供精神科基本药物维持治疗,并为社区康复机构提供有关精神障碍康复的技术指导和支持。社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室应当建立严重精神障碍患者的健康档案,对在家居住的严重精神障碍患者进行定期随访,指导患者服药和开展康复训练,并对患者的监护人进行精神卫生知识和看护知识的培训。县级人民政府卫生行政部门应当为社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室开展上述工作给予指导和培训。精神病人经专科医院治疗,认为其已达到出院标准的,当地医疗卫生机构不应对其进行医疗限制(D错)。

35. 答案:A

解析:妊娠剧吐可引起一系列严重并发症,除较为常见的脱水、电解质紊乱和代谢性酸中毒外,还可诱发 Wernicke 脑病。Wernicke 脑病是维生素 B1 缺乏导致的严重神经系统并发症。妊娠剧吐不能进食者,维生素 B1 缺乏,进而使得丙酮酸脱氢酶活性下降,丙

酮酸不能完全进入三羧酸循环彻底氧化，组织供能受到影响。妊娠剧吐不能进食者，为预防 Wernicke 脑病，应补充维生素 B1 (A 对)。

36. 答案:C

解析:急性腹部闭合损伤时，需要进行剖腹探查的情况包括:。①全身情况有恶化趋势，出现口渴、烦躁、脉率增快，或体温及白细胞计数上升，或红细胞计数进行性下降；②腹痛和腹膜刺激征进行性加重或范围扩大；③肠鸣音逐渐减弱、消失或腹部逐渐膨隆；④膈下有游离气体，肝浊音界缩小或消失，或者出现移动性浊音；⑤积极抗休克后病情未见好转或继续恶化；⑥消化道出血；⑦腹腔穿刺抽出气体、不凝血、胆汁、胃肠内容物等；⑧直肠指诊有明显触痛。恶心、剧烈呕吐不属于剖腹探查的指征 (C 错)。

37. 答案:A

解析:膀胱刺激征指尿频、尿急、尿痛，也是肾结核的典型症状之一 (A 对)。

38. 答案:B

解析:肝硬化是临床常见的慢性进行性肝病，由一种或多种病因长期或反复作用形成的弥漫性肝损害。在我国大多数为肝炎后肝硬化，少部分为酒精性肝硬化和血吸虫性肝硬化。我国以乙型肝炎病毒 (HBV) 为主；在欧美国家，酒精及丙型肝炎病毒 (HCV) 为多见病因

39. 答案:C

解析:骨折的一般表现包括:局部疼痛、肿胀和功能障碍。骨折的特有体征包括:畸形、异常活动、骨擦音。

40. 答案:D

解析:体内嘌呤核苷酸的分解产物是尿酸。

41. 答案:A

解析:支气管扩张的发病机制尚未完全阐明，目前认为关键环节为支气管-肺感染与支气管阻塞，二者相互影响，形成恶性循环，导致进行性支气管壁破坏和支气管扩张。

42. 答案:A

解析:分化好的鳞癌镜下可见癌巢中央的层状角化物—角化珠，细胞间可见细胞间桥 (A 对)。腺癌核分裂象多见。基底细胞癌镜下，癌巢由深染的基底

细胞样癌细胞构成，有浅表型、结节型等组织类型。脂肪癌镜下主要是见到脂肪母细胞，不同分化阶段的脂肪母细胞及成熟的脂肪细胞等。绒毛膜癌镜下可以看到胎盘合体滋养层和细胞滋养层。

43. 答案:A

解析:骨折后见胫腓骨骨皮质不连续 (提示胫腓骨骨折)，右小腿外侧和足背感觉障碍，最可能损伤了腓总神经。

44. 答案:A

解析:嵌顿性疝:疝囊颈较小而腹内压突然增高时，疝内容物可强行扩张囊颈而进入疝囊，随后因囊颈的弹性收缩，又将内容物卡住，使其不能回纳，这种情况称为嵌顿性疝。肠管嵌顿如不及时解除，肠壁及其系膜受压情况不断加重可使动脉血流减少，最后导致完全阻断，即为绞窄性疝。嵌顿性疝和绞窄性疝实际上是一个病理过程的两个阶段，鉴别点主要是有无血运障碍。

45. 答案:A

解析:蛋白质变性是在某些物理和化学因素作用下，蛋白质特定的空间构象被破坏，也即有序的空间结构变成无序的空间结构，从而导致其理化性质的改变和生物学活性的丧失。蛋白质变性主要是二硫键和非共价键的破坏，不涉及一级结构的改变，故不存在肽键断裂

46. 答案:E

解析:急性肾小球肾炎的前驱感染表现为链球菌感染 1~3 周左右，相当于抗原免疫后产生抗体的时间。

47. 答案:D

解析:雌激素对女性生殖系统的结构和功能具有重要的调节作用。其中高浓度的雌激素可使体液向组织间隙转移，导致钠、水潴留 (D 对)。

48. 答案:E

解析:某学者进行吸烟与肺癌的关系研究，选取该社区内吸烟和不吸烟的人群进行分组跟踪观察其肺癌的发生率，这种研究方法属于队列研究 (E 对)，队列研究是将一个范围明确的人群按是否暴露于某可疑因素或暴露程度分为不同的亚组，追踪各组的结局并比较其差异，从而判定暴露因素与结局

之间有无关联及关联程度大小的一种观察性研究方法。

49. 答案:E

解析:烧伤现场急救原则:1. 快速去除致伤原因(扑灭火焰、脱去着火的衣物,迅速离开现场,及时冷疗即用冷水淋洗创面、用冷水浸湿的纱布或毛巾覆盖创面); 2. 对病人施行相应的急救处理; 3. 妥善保护创面; 4. 保持呼吸道通畅; 5. 其他救治; 6. 转送。医用碘伏多为浅棕色,可能掩盖创面情况,高浓度碘伏对黏膜有刺激作用,可导致愈合时间延长。

50. 答案:C

解析:佝偻病在临床上可分为4期,初期多见于6个月以内,特别是3个月以内小婴儿。多为神经兴奋性增高的表现如易激惹、烦闹、汗多刺激头皮而摇头等。活动期(激期)多为骨骼改变和运动功能发育迟缓。恢复期症状减轻或接近消失。后遗症期症状消失。

51. 答案:E

解析:传染病的四个基本特征包括:病原体、传染性、流行病学特征、感染后免疫。其中流行病学特征包括流行性、季节性、地方性、外来性。

52. 答案:E

解析:原发性醛固酮增多症是由肾上腺皮质病变引起醛固酮分泌增多,导致潴钠排钾、体液容量扩增、肾素-血管紧张素系统受抑制,表现为高血压和低血钾的临床综合征。

53. 答案:B

解析:儿童生长发育在第一年为生后的第一个生长高峰;第二年以后增长速度逐渐减慢,至青春期出现第二个生长高峰。新生儿期为自胎儿娩出脐带结扎时开始至28天之前;婴儿期为自出生到1周岁之前;幼儿期自1岁至满3周岁之前;学龄前期自3周岁至6~7岁入小学前;学龄期自入小学始(6~7岁)至青春期。故儿童生长发育最迅速的时期为婴儿期。

54. 答案:E

解析:背部脂肪瘤外观常为分叶状,有被膜,质地柔软,切面呈黄色,似脂肪组织。直径通常为数厘米,亦有大至数十厘米者。常为单发性,亦可为多发性。镜下见似正常脂肪组织,呈

不规则分叶状,有纤维间隔。一般无明显症状,手术易切除。

55. 答案:A

解析:慢性活动性胃炎最主要的病因为幽门螺旋杆菌感染, Hp 凭借其产生的氨及空泡毒素导致细胞损伤;促进上皮细胞释放炎症介质;菌体细胞壁 Lewis X、Lewis Y 抗原引起自身免疫反应;多种机制使炎症反应迁延或加重。暴饮暴食、饮酒多为胰腺炎的病因。自身免疫因素也是慢性胃炎的病因之一,在欧洲所占比例较大。咖啡和浓茶多为胃食管反流病、消化性溃疡的诱发因素。

56. 答案:A

解析:呼吸衰竭是指各种原因引起的肺通气和(或)换气功能严重障碍,使静息状态下亦不能维持足够的气体交换,导致低氧血症伴(或不伴)高碳酸血症,进而引起一系列病理生理改变和相应临床表现的综合征。在海平面、静息状态、呼吸空气条件下,动脉血氧分压(PaO₂) <60mmHg, 伴或不伴二氧化碳分压(PaCO₂) >50mmHg, 可诊断为呼吸衰竭。

57. 答案:B

解析:气胸可引起患侧胸廓饱满、呼吸活动度降低、气管向健侧移位、伤侧胸部叩诊鼓音、呼吸音降低。肺不张患侧胸廓平坦,呼吸音减低。肺脓肿患侧胸廓平坦或稍塌陷,呼吸音减低。肺实变双侧胸廓对称、呼吸运动减弱。胸膜肥厚时,肋间隙变窄,胸廓缩小。

58. 答案:B

解析:营养不良性萎缩是指蛋白质摄入不足或者血液等消耗过多。全身营养不良性萎缩见于长期饥饿、消化道梗阻、慢性消耗性疾病及恶性肿瘤等,这种萎缩常按一定顺序发生,即脂肪组织首先发生萎缩,其次是肌肉,再其次是肝、脾、肾等器官,而心、脑的萎缩发生最晚。局部营养不良性萎缩常因局部慢性缺血引起。

59. 答案:B

解析:青春期年龄范围一般从10~20岁,是从儿童到成人的过渡时期。这是一个由一系列内分泌变化导致性成熟并形成生殖能力的过程。此期儿童的体格生长发育再次加速,出现第二次高

峰，同时生殖系统的发育也加速并渐趋成熟，女性的重要标志为月经初潮。女孩的青春期开始年龄和结束年龄都比男孩早 2 年左右。青春期身体发育成熟，需碘量大，碘的摄入相对缺乏，引起甲状腺激素合成不足，甲状腺一过性肿大。淋巴系统在儿童期生产迅速，于青春期前达到高峰，以后逐渐下降。

60. 答案:B

解析:高分辨率 CT 可在横断面上清楚地显示扩张的支气管，且兼具无创、易重复、易接受的特点，现已成为支气管扩张的主要诊断方法。

61. 答案:E

解析:破伤风常见致病菌为破伤风梭菌，是一种梭状芽胞杆菌。

62. 答案:E

解析:疾病流行强度的指标包括:散发、流行、大流行和暴发。短期波动不属于表示疾病流行强度的指标。

63. 答案:C

解析:轻链型多发性骨髓瘤的蛋白尿类型是溢出性蛋白尿。除此之外溢出性蛋白尿还可见于溶血性贫血、挤压综合征、浆细胞病等。

64. 答案:E

解析:根据中国居民膳食宝塔，推荐各类食物的合理摄入范围，谷类 250~400g，水果 200~350g，奶及奶制品 300g，水产品 40~75g，油 25~30g，黄先生今日摄入植物油 50g，超过膳食宝塔推荐摄入量。

65. 答案:A

解析:肾病综合征的蛋白尿类型是肾小球型蛋白尿(A 对)。肾小管型蛋白尿可见于肾盂肾炎、间质性肾炎、重金属中毒、药物损害及肾移植术后等。溢出性蛋白尿多见于溶血性贫血、挤压综合征、多发性骨髓瘤、浆细胞病、轻链病等。混合型蛋白尿可见于糖尿病、系统性红斑狼疮等。生理性蛋白尿可见于剧烈运动(或劳累)、受寒、发热、精神紧张或体位性蛋白尿等。

66. 答案:E

解析:诊断宫内活胎最有意义的 B 超表现是原始心管搏动。节律性胎动在妊娠 20 周左右出现。超声发现宫内孕囊或胚芽可以确诊为宫内妊娠。

67. 答案:D

解析:甲状腺术后，评估甲亢复发的最敏感的指标为 TRAb。TRAb 又称为 TSH 结合抑制免疫球蛋白，是诊断 GD 的第一线指标，未治疗的 GD 病人的阳性率达到 98%。

68. 答案:B

解析:“健康就是没病”这一观点是传统医学和世俗观念对健康的观点，但这种认识并不全面，也不是对健康的认识，健康不仅仅是没有疾病和身体的虚弱现象，而是一种在身体上、心理上和社会上的完满状态。1990 年世界卫生组织进一步对健康的定义作了补充，提出健康还应包括道德健康，即:健康是指，一个人在身体健康、心理健康、社会适应健康和道德健康四个方面皆健全。

69. 答案:C

解析:来自受控部分的输出信息反馈调整控制部分的活动，最终使受控部分的活动向与其原先活动的相同方向改变，这种反馈活动称为正反馈。如:排尿排便反射、分娩过程、凝血过程等。在排卵时，随优势卵泡成熟，体内雌激素水平进一步增加，此时血中高浓度的雌激素对下丘脑及腺垂体都产生正反馈调节作用，触发下丘脑 GnRH 大量释放，刺激腺垂体分泌的 LH 和 FSH 大幅增加达峰值，促进排卵。

70. 答案:E

解析:半对数线图适用于描述研究指标变化的速度，要比较两医院近 10 年来住院病人人数的上升速度，宜绘制半对数线图。

71. 答案:A

解析:中医典籍中“天人合一”“天人相应”所反映的医学模式是自然哲学医学模式。

72. 答案:A

解析:活动后出现右肾绞痛、血尿应考虑肾结石。

73. 答案:A

解析:心电图不能直接反映肺动脉压升高，但能提示右心增大或肥厚，心电图上显示肺性 p 波(诊断标准是 II、III、aVF 导联 P 波呈高尖状、电压 $\geq 0.25\text{mV}$ 、时限正常)，提示右心房肥大，是肺动脉高压的特征性表现。

74. 答案:C

解析:急性胰腺炎常见的致病因素包括:胆道疾病、饮酒、代谢性疾病、十二指肠液反流、医源性因素、肿瘤、某些药物、创伤、胰腺血液循环障碍、饮食等因素。其中,胆道疾病占 50% 以上,是国人急性胰腺炎最常见的病因。

75. 答案:D

解析:血钙 $<2\text{mmol/L}$ 提示 Ca^{2+} 内流入腺泡细胞,胰腺坏死,是诊断急性重型胰腺炎的指标。

76. 答案:D

解析:急性肾盂肾炎首次发生的致病菌 80% 为大肠埃希菌,在留取尿细菌检查标本后应立即开始治疗,首选对革兰阴性杆菌有效的药物。72 小时显效者无需换药,否则应按药敏结果更改抗生素。头孢呋辛属于二代头孢菌素,用于敏感细菌引起的上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤和软组织感染、耳鼻喉部感染,以及急性无并发症的淋病(尿道炎和宫颈炎)等

77. 答案:E

解析:被害妄想是指患者坚信自己被某些人或某组织进行迫害,如投毒、跟踪、监视、诽谤等。患者受妄想的影响可出现拒食、逃跑、报警、自伤、伤人等行为。主要见于精神分裂症和其他妄想性障碍,是重症精神病患者最常见的妄想。

78. 答案:C

解析:腹部损伤的破腹探查指征包括:①全身情况有恶化趋势(恶心呕吐加重可提示病情恶化)(B 对);②腹痛和腹膜刺激征进行性加重或范围扩大(E 对);③肠鸣音逐渐减弱、消失或腹部逐渐膨隆;④膈下有游离气体,肝浊音界缩小或消失,或者出现移动性浊音(A 对);⑤积极抗休克后病情未见好转或继续恶化;⑥消化道出血;⑦腹腔穿刺抽出气体、不凝血、胆汁、胃肠内容物等(D 对);⑧直肠指诊有明显触痛。血尿淀粉酶不能反应病情严重情况,不作为急诊手术指征(C 错,为本题正确答案)。

79. 答案:A

解析:中年男性,饮酒 20 年,200ml/

天,否认肝病史。查体:腹胀、蜘蛛痣、肝掌、脾大(肝硬化特征性表现),患者最可能诊断为酒精性肝硬化。

80. 答案:D

解析:中年男性,头晕头痛一周,多次测量血压偏高,未正规治疗。查体:BP145/90mmHg,该患者属于 I 级高血压(轻度)。高血压早期视网膜小动脉发生痉挛,随着病程进展出现硬化。血压急骤升高可引起视网膜渗出和出血。高血压持续进展即可引起全身小动脉病变,表现为小动脉玻璃样变,中层平滑肌细胞增殖,管壁增厚,管腔狭窄,并进而导致重要靶器官,如心、脑、肾缺血损伤。故选 D。

81. 答案:B

解析:青年女性,一周前有上呼吸道感染史,2 天前出现咳痰带血丝,X 线示右中肺炎。该患者最可能的诊断为肺炎链球菌肺炎。

82. 答案:C

解析:人的心理发展被分为五个时期:口唇期、肛门期、性器期、潜伏期、两性期。4 岁男童不愿上学,对母亲依赖,属于心理发展阶段的性器期,此时,男孩总想要独占母亲的爱,父亲则成为和自己争夺母亲的爱的一个对手。

83. 答案:A

解析:老年女性,2 周前出现心衰症状,经治疗后好转,近日心衰加重,出现心慌、气短、下肢水肿加重等表现。诊断为原发性高血压、慢性新功能不全、左心室肥大,患者继续治疗首选的药物为 ACEI 类药物,对肥胖、糖尿病和心脏、肾脏靶器官受损的高血压病人具有较好的疗效,特别适用于伴有心力衰竭、心肌梗死、房颤、蛋白尿、糖耐量减退或糖尿病肾病的高血压病人。

84. 答案:A

解析:中老年男性,腹胀腹痛 25 年,胃镜检查可见胃粘膜变薄、皱襞稀疏,初步判断为慢性胃炎。当体内出现针对壁细胞或内因子的自身抗体时,自身免疫性的炎症反应导致壁细胞总数减少、泌酸腺萎缩、胃酸分泌降低;内因子减少可导致维生素 B12 吸收不良,出现恶性贫血,故该患者最可能

缺乏的微生物为维生素 B12。

85. 答案:C

解析:3 岁男童,自幼与爷爷一同生活,与爷爷分离后哭泣、拒绝配合治疗,考虑该男童的症状为分离性焦虑。分离性焦虑障碍一般起病于童年早期阶段,患者针对与所依恋的人分别而产生的过度焦虑,出现过度的情绪反应。认知障碍是指与学习、记忆以及思维判断有关的大脑高级智能加工过程出现异常。意识障碍患者的典型症状包括睡眠过度延长、无自发睁眼、自主活动消失等。焦虑性人格障碍,以一贯感到紧张、提心吊胆、不安全,及自卑为特征。智力障碍一般指的是由于大脑受到器质性损害或由于脑发育不完全,从而造成认知活动的持续障碍以及整个心理活动的障碍。

86. 答案:B

解析:9 岁男童,食用蚕豆后乏力、发热、恶心呕吐、茶色尿(急性溶血表现),考虑为蚕豆病。蚕豆病是红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症的临床表现之一,G-6-PD 缺乏导致红细胞不能产生足够的 NADPH, GSH 显著减少,使红细胞对氧化的攻击敏感性增高, Hb 的巯基遭受氧化损伤,形成高铁血红蛋白和变性 Hb,沉积在红细胞膜形成海因小体,使红细胞变形性明显下降,易被单核-巨噬细胞吞噬破坏发生血管外溶血;细胞膜脂质的过氧化作用导致血管内溶血急性发作。

87. 答案:C

解析:心理健康的标准包括:智力正常、情绪良好、人际和谐、适应环境、人格完整。大学新生入学后感觉与他人相处劳累、学习生活困难,该同学最可能出现上述表现的原因是尚未适应大学环境(C 对)。

88. 答案:B

解析:男性,入住刚装修好的新房后出现眼干、流泪、烧灼感、结膜充血、畏光、过敏性皮炎、呼吸道症状等表现(黏膜受刺激的表现),结合患者所处环境,判断患者最可能为甲醛中毒(B 对)。

89. 答案:C

解析:青年男性,户外高热环境工作,血压和心率降低,这种现象属于热适

应。热适应是指人体在热环境工作一段时间后对热负荷产生的适应反应。表现为体温调节能力增强;皮肤温度和机体中心温度降低;心血管紧张性下降;合成热应激蛋白。

90. 答案:E

解析:青年女性,孕 10 周,甲状腺 2 度肿大,可闻及血管杂音,未触及结节,诊断为单纯性甲状腺肿。无高血压糖尿病史。该患者首选的治疗为丙硫氧嘧啶(E 对)。

91. 答案:B

解析:老年男性,右髌部摔伤。查体:右下肢短缩 3cm、外旋 85° 畸形,下肢轴向叩击痛阳性。提示股骨颈骨折,应尽早尽快进行手术治疗,患者既往状态良好,首选内固定。对于 24 小时内不能进行手术的患者,可考虑进行牵引。

92. 答案:A

解析:中年男性,平素高脂高糖饮食,实验室检查血糖 15.6mmol/L,已达糖尿病标准(空腹血糖 ≥ 7.0 ,餐后 2 小时血糖 ≥ 11.1),该患者需要控制饮食,合理控制总热量,还需密切关注酮体的生成。

93. 答案:C

解析:老年女性,进行性吞咽困难伴胸骨后不适 2 月(中晚期食管癌典型表现:进行性吞咽困难)。无反酸、嗝气、烧心(可初步排除食管反流病)。近期体重减轻 4kg(肿瘤晚期患者可出现消瘦、贫血、营养不良、脱水或恶病质等)。综合分析,该患者最可能的诊断为食管癌,胃镜是食管癌诊断的首选方法,可直接观察病灶形态。

94. 答案:B

解析:中老年女性,活动后胸闷气短。查体:血压 80/50mmHg, CVP 16cmH₂O(高于 15cmH₂O 时,提示心功能不全、静脉血管床过度收缩或肺循环阻力增高),双下肢水肿,提示新功能不全。心脏彩超提示主动脉瓣狭窄。该患者血压低、中心静脉压升高的原因最可能是心功能不全导致、主动脉狭窄导致的射血分数减少(B 对)。

95. 答案:A

解析:中年男性,饮酒后突发左上腹痛,向胸腹部放射,伴恶心呕吐。既往无

胆囊病史。查体:体温升高,白细胞升高,左上腹压痛、肌紧张,血清淀粉酶 600U/L(正常值 25-125U/L),该患者最可能的诊断为急性胰腺炎(A对)

96. 答案:B

解析:中老年男性患者,双下肢中度凹陷性水肿、高血压。尿常规:蛋白(+++),RBC(-),白蛋白 27g/L(<30g/L,提示低蛋白血症),肌酐 82 μ mol/l,该患者最可能诊断为肾病综合征。对肾炎、肾病综合征、急性肾损伤及原因不明的蛋白尿和(或)血尿,可通过肾穿刺活检明确病理类型、探讨发病机制、明确病因、指导治疗和评估预后(B对)。

97. 答案:A

解析:中年女性,右下肢静脉曲张 8 年。近来右下肢酸胀、活动后肿胀,晨起消失。查体:右踝部水肿、足靴区皮肤色素沉着,大腿下内侧、小腿后方浅静脉扩张、迂曲(单纯性静脉曲张主要临床表现)。大隐静脉瓣膜功能试验(+)提示大隐静脉瓣膜功能不全,深静脉通畅试验(-)说明深静脉通畅,交通静脉瓣膜功能试验(-)提示交通支瓣膜功能正常,该患者最可能的诊断为单纯性下肢静脉曲张。

98. 答案:A

解析:青年男性,车祸后左上腹剧烈疼痛,腹腔穿刺抽出不凝血,最可能的诊断是脾破裂。

99. 答案:A

解析:6 岁男童,阴囊肿大 3 天。查体:左侧阴囊肿大呈球形、光滑无压痛,该患儿最可能的诊断为鞘膜积液,首选透光试验。鞘膜积液以一侧鞘膜积液多见,表现为阴囊或腹股沟囊性肿块,呈慢性、无痛性逐渐增大。睾丸鞘膜积液呈球形或卵圆形,表面光滑,有弹性和囊样感,无压痛,一般触不到睾丸和附睾。透光试验阳性。

100. 答案:E

解析:中年男性,术后粘连性肠梗阻 3 天,近一天加重。查体:可见肠蠕动波、肠鸣音亢进,右下腹局限性压痛。多次立位腹平片可见固定肠袢,提示梗阻为绞窄性肠梗阻。绞窄性肠梗阻应立即解除梗阻,进行手术治疗,回复肠管血液循环。

101. 答案:E

解析:老年男性,双下肢水肿 1 月余(提示可能存在右心衰),既往高血压病史 20 年,未规范治疗。查体血压 170/110mmHg(正常血压<120/80),该患者已达 II 级高血压。心电图提示左心室肥厚,该患者为心功能受损的高血压病人,首选的降压药为血管紧张素转换酶抑制剂即氯沙坦。

102. 答案:B

解析:中年女性,外阴瘙痒、豆腐渣样白带,初步考虑为外阴阴道假丝酵母菌病。外阴阴道假丝酵母菌病是由假丝酵母菌引起的常见外阴阴道炎症。主要表现为外阴阴道瘙痒、阴道分泌物增多。阴道分泌物的特征为白色稠厚,呈凝乳状或豆腐渣样。萎缩性阴道炎主要症状为外阴灼热不适、瘙痒,阴道分泌物稀薄,呈淡黄色;感染严重者阴道分泌物呈脓血性。

103. 答案:C

解析:中年男性,既往糖尿病多年,双下肢水肿伴乏力 5 年,尿量 400ml/天(正常成人:1000-2000ml/天;少尿:<400ml/天),持续一周,血肌酐 368 μ mol/L,为慢性肾衰竭失代偿期,该患者已符合血液透析指征,对于糖尿病肾病病人,GFR <15ml/min 时,即可安排肾脏替代治疗。

104. 答案:A

解析:中年女性,外阴粉色菜花状赘生物,醋酸白试验阳性,可初步诊断为尖锐湿疣。非妊娠期尖锐湿疣的治疗可使用咪喹莫特乳膏、鬼臼毒素酊、氟尿嘧啶乳膏等。

105. 答案:B

解析:青年女性,乳房外上象限有一 2 \times 3cm,圆形肿块,质硬、光滑、边界清,可推动,无压痛,全身浅表淋巴结无肿大,最可能的诊断为乳腺纤维腺瘤。

106. 答案:B

解析:青年男性,车祸撞击头部,立即昏迷(符合脑挫裂伤的临床表现),醒后出现头晕、呕吐(受伤时第四脑室底的脑干呕吐中枢受到脑脊液冲击、蛛网膜下腔出血对脑膜的刺激或前庭系统受刺激等原因引起),右耳道有血性液体流出(颅底骨折出现耳漏),考虑

诊断为脑挫裂伤合并颅中窝骨折。

107. 答案:B

解析:青年女性,皮肤巩膜黄染。实验室检查:抗 HAV IgG(+) (提示既往感染甲肝), HBSAg(+) (提示 HBV 感染), 抗 HBE(+) (提示乙肝发作), 抗 HBC(+) (提示既往感染或感染 HBV)。该患者初步诊断为乙型肝炎。注射乙肝疫苗是乙型肝炎的主要预防措施(B 对)。

108. 答案:D

解析:中年女性,发热、腹胀腹痛 4 个月,查体:37.5℃,腹部揉面感、移动性浊音阳性(存在腹腔积液)。腹水常规:黄绿色(结核性腹水多为黄绿色),白细胞 $600 \times 10^9/L$,以单核细胞为主。结核性腹腔积液多为黄绿色,白细胞计数超过 $500 \times 10^9/L$,以淋巴细胞或单核细胞为主,结合患者低热等临床表现,最可能的诊断为结核性腹膜炎(D 对)。

109. 答案:E

解析:老年男性,夜间阵发性呼吸困难(右心衰可能),咳粉红色泡沫痰(提示肺水肿),心电图提示房颤,该患者需应用洋地黄类药物。洋地黄类药物通过抑制 $Na^+ - K^+ - ATP$ 酶发挥药理作用。洋地黄的临床应用:伴有快速心房颤动/心房扑动的收缩性心力衰竭是应用洋地黄的最佳指征,包括扩张型心肌病、二尖瓣或主动脉瓣病变、陈旧性心肌梗死及高血压性心脏病所致慢性心力衰竭(E 对)。

110. 答案:A

解析:中年男性,餐后突发腹痛,腹部揉面感(腹膜炎征象),腹部压痛、反跳痛、肌紧张,既往胃病史,该患者最可能的诊断为胃溃疡穿孔(A 对)。胃溃疡穿孔的患者既往有溃疡病史。病人在穿孔发生前常有溃疡症状加重或有过度疲劳、精神紧张等诱发因素。病人突发上腹部剧痛,呈“刀割样”,腹痛迅速波及全腹。体格检查可见腹肌紧张呈“板状腹”,反跳痛明显。立位 X 线检查膈下可见新月状游离气体影,可以确定诊断。

111. 答案:A

解析:青年男性,胸闷憋喘入院,查体:P 96 次/分(正常值 60~100),R23 次/分(正常值 16~20),Bp100/60,胸

片提示左侧气胸,左侧肋脊角变钝,肺压缩 80%(超过 50%属于大量气胸),该患者诊断为左侧大量气胸,此时应行胸腔闭式引流。闭式胸腔引流术的适应证为:①中、大量气胸、开放性气胸、张力性气胸;②经胸腔穿刺术治疗,伤员下肺无法复张者;③需使用机械通气或人工通气的气胸或血气胸者;④拔除胸腔引流管后气胸或血胸复发者;⑤剖胸手术。

112. 答案:D

解析:老年男性,咳嗽、咳痰、活动后气短。既往 X 线检查:肺纹理增粗、紊乱,膈肌低平。吸烟史 40 年,戒烟 3 年,该患者最可能的诊断为慢性阻塞性肺疾病(有吸烟等高危因素,临床表现咳、痰、喘等可高度怀疑慢性阻塞性肺疾病),为明确诊断,首选检查为肺功能检查(D 对)。

113. 答案:D

解析:疫苗失效后,工作人员继续注射,导致儿童肝功能严重受损,属于在执业过程中违反相关规定,应由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停 6 个月以上 1 年一下的执业活动(D 对)。

114. 答案:A

解析:5 岁患儿,智力低下、皮肤苍白、毛色发黄、尿中鼠臭味(尿中排出较多苯乙酸)、草莓舌,血中苯丙氨酸含量高于正常,该患儿最可能的诊断为苯丙酮尿症。苯丙酮尿症患儿智力落后、头发由黑变黄,有特殊体味,血苯丙氨酸升高。苯丙酮尿症是一种常染色体隐性遗传病(A 对)。

115. 答案:A

解析:中年男性,突发心脏骤停,心肺复苏后意识、呼吸逐渐恢复。BP 90/60mmHg,呼吸 32 次/分,该患者目前血压偏低,需应用升压药物。多巴酚丁胺是 β 肾上腺素受体激动剂。可增加心肌收缩力,增加心排出量和降低肺毛细血管楔压,并使左室充盈压明显降低,使心功能改善,继发地促进排钠、排水、增加尿量,有利于消除水肿(A 对)。

116. 答案:D

解析:中年女性(甲状腺疾病高发人群),乏力心悸 1 年余,近来症状加重,

伴厌食、消瘦、手颤。体格检查可见甲状腺弥漫性肿大、心率加快、心律齐。实验室检查:FT₃、FT₄增高, TSH降低。初步诊断为弥漫性毒性甲状腺肿(D对)。

117. 答案:B

解析:该患者诊断为弥漫性毒性甲状腺肿, 首选治疗药物是丙戊酸钠。

118. 答案:E

解析:中年女性, 发热、牙龈出血、面色苍白就诊。入院后皮肤多处瘀斑、血尿。血红蛋白 80g/L(女性正常值 110~150g/L), 白细胞 $2.0 \times 10^9/L$ (正常值 $4 \sim 10 \times 10^9/L$), 血小板 $50 \times 10^9/L$ (正常值 $100 \sim 300 \times 10^9/L$), 血浆纤维蛋白原 0.88/L(正常值 1.75~5.54g/L)。骨髓检查:有核细胞增生活跃, 早幼粒细胞占 85%。该患者诊断为急性早幼粒细胞白血病(AML)。AML 的治疗多采用全反式维 A 酸+蒽环类药物。ATRA+蒽环类的基础上加用砷剂(如三氧化二砷, ATO)能缩短达 CR 时间(E对)。

119. 答案:A

解析:该患者诊断为急性早幼粒细胞白血病(AML)。AML 在获得分子学缓解后可采用化疗、ATRA 以及砷剂等药物交替维持治疗近 2 年, 期间应定期监测并维持 PML-RARA 融合基因阴性。

120. 答案:B

解析:中年男性, 反复发作性中上腹疼痛、饥饿痛, 伴反酸、嗝气, 进食抑酸药可缓解, 该患者最可能的诊断是十二指肠溃疡。十二指肠溃疡的典型表现为上腹痛, 疼痛与进餐有关, 多为饥饿痛, 部分患者可有上腹胀、上腹部不适、厌食、嗝气、反酸等消化不良症状。十二指肠溃疡发作期可为数周或数月, 发作有季节性, 典型者多在季节变化时发生, 如秋冬和冬春之交发病。

121. 答案:C

解析:中年男性, 反复发作性中上腹疼痛、饥饿痛, 伴反酸、嗝气, 进食抑酸药可缓解, 该患者最可能的诊断是十二指肠溃疡。胃镜检查是十二指肠溃疡诊断的首选方法和金标准, 可以①确定有无病变、部位及分期; ②鉴别良恶性溃疡; ③治疗效果的评价;

④对合并出血者给予止血治疗; ⑤对合并狭窄梗阻病人给予扩张或支架治疗; ⑥超声内镜检查, 评估胃或十二指肠壁、溃疡深度、病变与周围器官的关系、淋巴结数目和大小等。

122. 答案:C

解析:中年男性, 反复发作性中上腹疼痛、饥饿痛, 伴反酸、嗝气, 进食抑酸药可缓解, 该患者最可能的诊断是十二指肠溃疡。十二指肠溃疡的典型表现为上腹痛, 疼痛与进餐有关, 多为饥饿痛, 部分患者可有上腹胀、上腹部不适、厌食、嗝气、反酸等消化不良症状。

123. 答案:D

解析:中老年男性, 上腹绞痛伴恶心呕吐 8 小时。胆囊内多发小结石。查体:体温升高、血压降低、神志不清、黄疸(雷诺五联征)、上腹压痛、肝区叩诊阳性。腹部 CT 提示:胆囊积液、胆囊壁水肿(胆囊炎表现)。该患者最可能诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎。

124. 答案:B

解析:首要处理措施应为胆总管切开引流, 只有使胆道压力降低, 才有可能中止胆汁或细菌向血液的反流, 阻断病情的恶化。

125. 答案:E

解析:中年男性, 吸烟 20 余年(慢性阻塞性肺疾病高危因素)。X 线胸片提示双肺纹理增粗、紊乱。肺功能检查:FEV₁/FVC 68.5%(<70%提示气流受限), FEV₁ 占预计值的 68%(50~79 提示 GOLD2 级, 中度), 支气管舒张试验 FEV₁ 改善 2.5%, 即使用支气管扩张剂后 FEV₁/FVC 为 71%。综合分析, 该患者最可能的诊断为慢性支气管炎(E对)。

126. 答案:A

解析:该患者血气分析:PH 7.37; PaCO₂ 60mmHg(正常值 35~45mmHg); PaO₂ 55mmHg(正常值 80~100mmHg), 提示患者发生低氧血症, 最可能的原因为持续性气流受限导致的肺泡通气量下降, 导致的低氧血症。

127. 答案:D

解析:青年男性, 乏力纳差 10 天, 胸腹部可见 2~4mm 瘀点, 压之可褪色(玫瑰疹), 可见肿大淋巴结, 活动度良好。WBC: $3.95 \times 10^9/L$, L 0.76, N 0.18(白

细胞减少,淋巴细胞增多,中性粒细胞减少),最可能的诊断为伤寒(D对)。

128. 答案:A

解析:伤寒杆菌血培养阳性可确诊诊断。

129. 答案:D

解析:喹诺酮为伤寒经验治疗的首选药物,常用的第三代喹诺酮有诺氟沙星、左旋氧氟沙星、环丙沙星等。

130. 答案:A

解析:耐多药肺结核的WHO推荐增加新代的氟喹诺酮类药物,如:莫西沙星;左氧氟沙星;氧氟沙星等。

131. 答案:D

解析:抗结核药物异烟肼(INH)对巨噬细胞内外的结核分枝杆菌均具有杀菌作用。利福平(RFP)对巨噬细胞内外的结核分枝杆菌均有快速杀菌作用。链霉素(SM)对巨噬细胞外碱性环境中的结核分枝杆菌有杀菌作用。乙胺丁醇(EMB)对结核分枝杆菌有抑菌作用。吡嗪酰胺(PZA)主要杀灭巨噬细胞内酸性环境中的B菌群。故选D。

132. 答案:B

解析:社区获得性肺炎的常见病原体为肺炎链球菌、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌和呼吸道病毒(甲、乙型流感病毒,腺病毒,呼吸道合胞病毒和副流感病毒)等,肺炎链球菌是社区内获得性肺炎最常见的致病菌,约占社区获得性肺炎的40%~50%。

133. 答案:A

解析:小儿肺炎引起脓胸,最常见的致病菌为金黄色葡萄球菌。金黄色葡萄球菌肺炎病理改变以肺组织广泛出血性坏死和多发性小脓肿形成为特点。由于病变发展迅速,组织破坏严重,故易形成肺脓肿、脓胸、脓气胸、肺大疱、皮下气肿、纵隔气肿。并可引起败血症及其他器官的迁徙性化脓灶。

134. 答案:B

解析:贲门失弛缓症的首选药物为硝苯地平,硝苯地平是钙通道阻滞剂,能松弛胃肠道,可用于治疗贲门失弛缓症。

135. 答案:A

解析:胃食管反流病病常见直接损伤因素为胃酸及胃蛋白酶,抑制胃酸成为基础治疗药物。PPI抑酸作用强,疗

效确切,是治疗GERD的首选药物。

136. 答案:A

解析:成人癫痫部分性发作首选的药物是卡马西平。丙戊酸是一种广谱AEDs,是全面性发作,尤其是GTCS合并典型失神发作的首选药。乙琥胺仅用于单纯失神发作。苯巴比妥常作为小儿癫痫的首选药物,较广谱,起效快。地西洋可与其它抗癫痫药合用,治疗癫痫大发作或小发作,控制癫痫持续状态时应静脉注射。

137. 答案:C

解析:成人癫痫部分性发作首选的药物是卡马西平。丙戊酸是一种广谱AEDs,是全面性发作,尤其是GTCS合并典型失神发作的首选药。乙琥胺仅用于单纯失神发作。苯巴比妥常作为小儿癫痫的首选药物,较广谱,起效快。地西洋可与其它抗癫痫药合用,治疗癫痫大发作或小发作,控制癫痫持续状态时应静脉注射。

138. 答案:E

解析:膀胱刺激征指尿频、尿急、尿痛,也是肾结核的典型症状之一肾结核是典型的病变在肾,症状在膀胱的疾病。肾癌的常见症状为间歇无痛肉眼血尿,肉眼血尿、腰痛和腹部肿块被称为肾癌的三联征。

139. 答案:D

解析:膀胱癌最常见的症状是血尿,约85%的病人表现为间歇性无痛全程肉眼血尿。肾癌的常见症状为间歇无痛肉眼血尿,肉眼血尿、腰痛和腹部肿块被称为肾癌的三联征。肾结石的主要症状是肾区疼痛伴肋脊角叩击痛和血尿,其程度与结石部位大小、活动与否及有无损伤、感染、梗阻等有关。肾挫伤表现为患侧疼痛、肿块,严重者出现肉眼血尿。肾结核的典型症状是尿频、尿急、尿痛,常有终末血尿。

140. 答案:C

解析:肾挫伤时,表现为肾瘀斑及包膜下血肿,涉及肾集合系统时可出现镜下血尿或轻度肉眼血尿。

141. 答案:A

解析:治疗肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血,尽早给予收缩内脏血管药物如生长抑素、奥曲肽、特利加压素或垂体加压素,减少门静脉血流量,

降低门静脉压，从而止血。生长抑素及奥曲肽因对全身血流动力学影响较小，不良反应少，是治疗 EGVB 最常用的药物。

142. 答案:B

解析:治疗消化性溃疡首选的药物为 PPI, 具有强大而持久的抑制胃酸分泌、抗幽门螺旋杆菌、胃粘膜预防保护作用。

143. 答案:B

解析:内痔的主要临床表现是出血和脱出。间歇性便后出鲜血是内痔的常见症状。

144. 答案:C

解析:大部分肛瘘由直肠肛管周围脓肿引起, 脓肿自行破溃处或切开引流处形成外口, 位于肛周皮肤

145. 答案:C

解析:甲状腺术后突发呼吸困难, 查体面色青紫、颈部皮肤肿胀, 最可能的原因是术后出血、血肿压迫气管, 导致患者呼吸困难。

146. 答案:B

解析:甲状腺术后出现声嘶, 最可能的原因是术中损伤了喉返神经, 一侧喉返神经损伤, 大都引起声嘶, 术后虽可由健侧声带代偿性地向病侧过度内收而恢复发音, 但喉镜检查显示病侧声带依然不能内收, 因此不能恢复其原有的音色。双侧喉返神经损伤, 视其损伤全支、前支或后支等不同的平面, 可导致失音或严重的呼吸困难, 甚至窒息, 需立即作气管切开。

147. 答案:A

解析:外阴阴道假丝酵母菌病主要表现为外阴阴道瘙痒、阴道分泌物增多。阴道分泌物的特征为白色稠厚, 呈凝乳状或豆腐渣样。

148. 答案:C

解析:滴虫性阴道病的分泌特点是稀薄脓性、泡沫状、有异味。

149. 答案:C

解析:破伤风典型症状是在肌紧张性收缩(肌强直、发硬)的基础上, 阵发性强烈痉挛, 通常最先受影响的肌群是咀嚼肌, 随后顺序为面部表情肌、颈、背、腹、四肢肌, 最后为膈肌。相应出现的征象为:张口困难(牙关紧闭)、蹙眉、口角下缩、咧嘴“苦笑”、

颈部强直、头后仰、“角弓反张”或“侧弓反张”等。

150. 答案:E

解析:丹毒起病急, 开始即可有畏寒、发热、头痛、全身不适等。病变多见于下肢, 表现为片状微隆起的皮肤红疹、色鲜红、中间稍淡、边界清楚, 有的可起水疱, 局部有烧灼样疼痛。

第二单元

1. 答案:B

解析:急性感染性心内膜炎最常见的致病菌为金黄色葡萄球菌, 少数由肺炎球菌、淋球菌引起。草绿色链球菌是亚急性感染性心内膜炎的常见致病菌, 其次是肠球菌。

2. 答案:C

解析:右心衰竭时, 右室内压力增高, 静脉回流受阻, 导致毛细血管内静水压增加, 引起下肢水肿(C对)。血浆胶体渗透压降低常见于血浆蛋白减少时, 如营养不良或某些肝肾疾病, 可因血浆胶体渗透压降低, 随之有效胶体渗透压下降, 有效滤过压增大而发生水肿(A错)。小动脉壁通透性增加多发生在感染、烧伤、过敏等情况下(B错)。黏多糖在组织间隙内沉积多是由于蛋白聚糖降解酶先天性缺陷所引起的蛋白聚糖分解代谢障碍(D错)。淋巴液回流受阻多见于丝虫病的患者, 淋巴管被堵塞, 使淋巴回流受阻, 含蛋白质的淋巴液就在组织间隙中积聚而形成淋巴水肿(E错)。

3. 答案:C

解析:我国女性常见的不孕因素是输卵管病变。我国女性不孕的病因中, 输卵管因素和排卵障碍各占约 40%左右, 其它因素包括子宫因素、宫颈因素、免疫因素的占 10%左右。不明原因占 10%。

4. 答案:B

解析:二甲双胍最主要的不良反应是消化道不良反应, 主要有食欲下降、恶心、腹部不适及腹泻等。大部分药物都可引起肝功能损伤, 如抗生素、抗结核类药物。引起肾功能损伤的药物可有 ACEI 类药物、非甾体类抗炎药等。白细胞减少可见于一些抗甲状腺

药物、抗生素等。低血糖是胰岛素、磺脲类药物的主要不良反应。

5. 答案:E

解析:甲状腺功能亢进症的病因包括弥漫性毒性甲状腺肿、结节性毒性甲状腺肿和甲状腺自主高功能腺瘤等,其中原发性甲亢最常见。弥漫性毒性甲状腺肿是甲亢最常见的病因,约占80%左右。

6. 答案:C

解析:子宫脱垂的主要原因是分娩损伤,尤其是阴道分娩可导致盆腔筋膜、韧带和肌肉可能因过度牵拉而被削弱其支撑力量,而发生子宫脱垂。手术损伤、慢性疾病、过度负重也是子宫脱垂的原因之一,但不是最主要的原因。

7. 答案:E

解析:腰椎间盘突出症患者常见的体征包括:①腰椎侧凸;②腰部活动受限;③压痛及骶棘肌痉挛;④直腿抬高试验及加强实验阳性;⑤神经系统表现(感觉异常、肌力下降、反射异常)等。压头试验阳性常见于神经根型颈椎病。

8. 答案:C

解析:对女性非复杂性膀胱炎,SMZ-TMP(复方新诺明)(800mg/160mg,每日2次,疗程3天),呋喃妥因(50mg,每8小时1次,疗程5~7天),磷霉素(3g单剂)被推荐为一线药物(C对)。

9. 答案:A

解析:营养性巨幼细胞性贫血是由于维生素B₁₂和(或)叶酸缺乏所致的一种大细胞性贫血。主要临床特点是贫血、神经精神症状、红细胞的胞体变大、骨髓中出现巨幼红细胞、用维生素B₁₂和(或)叶酸治疗有效。对于有神经症状的营养性巨幼细胞贫血患儿,应以维生素B₁₂治疗为主,单用叶酸有加重症状的可能。

10. 答案:A

解析:缺铁性贫血的组织表现包括:精神行为异常,如烦躁、易怒、注意力不集中、异食癖;体力、耐力下降;易感染;儿童生长发育迟缓、智力低下;口腔炎、舌炎、舌乳头萎缩、口角皲裂、吞咽困难;毛发干枯、脱落;皮肤干燥、皱缩;指(趾)甲缺乏光泽、脆薄易裂,重者指(趾)甲变平,甚至

凹下呈勺状(匙状甲)。头晕、脸色苍白、乏力、头晕是贫血的表现。

11. 答案:E

解析:妊娠32~34周、分娩期(第一产程末、第二产程)、产后3日内心脏负担最重,是心脏病孕妇的危险时期,极易发生心力衰竭。

12. 答案:B

解析:软产道由子宫下段、宫颈、阴道及盆地软组织共同组成。阔韧带是子宫4对韧带之一,限制子宫向两侧倾斜。

13. 答案:A

解析:人乳中乙型乳糖(β-双糖)含量丰富,利于双歧杆菌、乳酸杆菌生长。人乳中的补体即双歧因子也高于牛乳,能促进双歧杆菌的生长。全母乳喂养的小儿,肠道占优势的细菌为双歧杆菌。

14. 答案:D

解析:丹毒的致病菌为乙型溶血性链球菌。

15. 答案:C

解析:反应梅毒的滴度指标是几何均数,滴度是按倍数关系变化的,可以计算几何均数描述其平均水平。

16. 答案:B

解析:临床上抢救有机磷中毒常用ChE复能药和胆碱受体阻断剂,ChE复能药能使被抑制的ChE恢复活性,尚能作用于外周N₂受体,对抗外周N胆碱受体活性,能有效解除烟碱样毒性作用,对M样症状和中枢性呼吸抑制作用无明显影响。胆碱受体阻断剂可作用于外周M受体,改善M样症状。

17. 答案:B

解析:纤维蛋白性心包炎的典型特征为心包摩擦音,是心包炎最具诊断价值的体征,呈抓刮样粗糙的高频音。典型的摩擦音可听到与心房收缩、心室收缩和心室舒张相一致的三个成分,称为三相摩擦音。

18. 答案:E

解析:动脉粥样硬化病变早期进入动脉内膜的细胞是巨噬细胞。LDL通过内皮细胞渗入内皮下间隙,单核细胞迁入内膜;ox-LDL与巨噬细胞表面的清道夫受体结合而被摄取,形成巨噬细胞源性泡沫细胞;动脉中膜的SMC经

内弹力膜窗孔迁入内膜，吞噬脂质形成肌源性泡沫细胞；SMC 增生迁移，合成细胞外基质，形成纤维帽；ox-LDL 使泡沫细胞坏死崩解，形成粥样坏死物粥样斑块形成。

19. 答案:C

解析:急性肾炎临床表现中消失或恢复正常最慢的是血尿及微量蛋白尿。水肿消失后，蛋白尿仍可持续 1-2 个月，甚至更久。补体 C3 在 8 周内恢复正常。

20. 答案:E

解析:内分泌功能减退性疾病目前较普遍使用的代替治疗方法是给予生理剂量的靶腺激素。激素代替治疗要求尽量符合生理要求，既要改善症状，又需避免过量。

21. 答案:E

解析:股骨头的血供包括小凹动脉、股骨干滋养动脉、旋股内、外侧动脉，其中旋股内侧动脉的分支髂外侧动脉供应股骨头 2/3~4/5 区域的血液循环，是股骨头最主要的供血来源。

22. 答案:A

解析:胸骨后甲状腺肿治疗首选手术治疗。

23. 答案:B

解析:行政处罚包括人身罚、行为罚、财产罚、申诫罚。其中人身罚包括行政拘留、劳动教养；行为罚包括责令停产、停业，暂扣或者吊销许可证和营业执照；财产罚包括罚款、没收财物；申诫罚包括警告、通报批评。拘役是刑罚中的主刑之一，指短期剥夺罪犯人身自由，就近拘禁并强制劳动的刑罚。

24. 答案:C

解析:二尖瓣狭窄时，可在心尖区闻及舒张中晚期低调的隆隆样杂音，呈递增型，心影显示左心房增大，心脏向左上扩大，主动脉弓缩小、肺动脉主干突出、右心室增大、心脏呈梨形，心尖向下。奔马律多在严重心肌病及心力衰竭时出现。

25. 答案:C

解析:不全流产一经确诊应尽快行刮宫术或钳刮术，清除宫腔内残留组织。稽留流产，子宫 <12 孕周者，可行刮宫术。难免流产一旦确诊，应尽早使

胚胎及胎盘组织完全排出。先兆流产:适当休息，禁性生活。完全流产:流产症状消失，超声检查证实宫腔内无残留妊娠物，若无感染征象，无需特殊处理。

26. 答案:D

解析:多囊卵巢综合征是继发性闭经常见的原因。

27. 答案:A

解析:继发性闭经以下丘脑性闭经最常见，此类闭经的特点是下丘脑合成和分泌 GnRH 缺陷或下降导致垂体促性腺激素(Gn)，即卵泡刺激素(FSH)，特别是黄体生成素(LH)的分泌功能低下，故属低促性腺激素性闭经，治疗及时尚可逆。

28. 答案:B

解析:体内的氨主要在肝内通过鸟氨酸循环合成尿素，只有少部分在肾以铵盐形式排出。

29. 答案:B

解析:晚期减速是指伴随宫缩出现的减速，通常是对称性地、缓慢地下降到最低点再恢复到基线。减速的开始到胎心率最低点的时间>30 秒，减速的最低点通常晚于宫缩峰值；一般来说，减速的开始、最低值及恢复分别延后于宫缩的起始、峰值及结束。若多次反复出现胎心晚期减速，提示胎盘功能减退，胎儿明显缺氧(B 对)。

30. 答案:A

解析:正常情况下，尿中几乎不含葡萄糖，葡萄糖和氨基酸主要在近端小管被重吸收，患者经抗肿瘤治疗后，尿检发现大量葡萄糖和氨基酸，可能是近端小管受损(A 对)。

31. 答案:A

解析:二尖瓣狭窄的心脏杂音为心尖区舒张中晚期低调的隆隆样杂音，呈递增型(A 对)。

32. 答案:A

解析:小儿出现腰椎前凸的年龄为一岁，此时小儿开始行走，出现腰椎前凸。3 个月左右出现颈椎前凸。6 个月出现胸椎后凸。

33. 答案:B

解析:二尖瓣关闭不全的典型杂音为心尖区全收缩期吹风样杂音，杂音强度≥3/6 级，可伴有收缩期震颤(B 对)。

34. 答案:C

解析:质子泵抑制剂的药理作用是抑制 H⁺-K⁺-ATP 酶 α 亚单位的巯基共价结合使酶失活,减少胃酸分泌。由于 H⁺-K⁺-ATP 酶是胃酸分泌的最后环节, M 胆碱受体、CCK₂ 受体、H₂ 受体和胃泌素受体兴奋最终都是通过激活 H⁺-K⁺-ATP 酶而增加胃酸分泌,质子泵抑制药对各种因素引起的胃酸分泌均有抑制作用;质子泵抑制药体内活性代谢产物与质子泵的结合牢固不可逆。

35. 答案:A

解析:腺垂体功能减退所致垂体危象的处理包括:①纠正低血糖。②大剂量肾上腺皮质激素应用。③纠正水和电解质紊乱:血钠严重降低的病人,需要给予高浓度的氯化钠溶液。④纠正休克:严重病人,治疗后血压恢复不满意者,仍需要使用升压药和综合抗休克治疗。⑤其他:去除诱因;低体温者需要用热水袋、电热毯等将病人体温回升至 35℃ 以上,并在应用肾上腺皮质激素后开始用小剂量甲状腺素治疗;高热者需要物理和化学降温;慎用镇静药。

36. 答案:E

解析:孕妇蛛网膜下腔麻醉下进行剖宫产,术后 12 小时应平卧位或头低卧位,防止脑脊液外渗导致头痛。腰麻穿刺术时一般取侧卧位。腹部手术后,多采用半卧位。

37. 答案:D

解析:广泛性焦虑症的特征性表现为精神上的过度担忧。濒死感多见于惊恐障碍。运动性不安可表现搓手顿足、不能静坐、不停地来回走动、无目的小动作增多,也是广泛性焦虑症的表现。兴奋性增高、阵发性紧张、恐惧等也是广泛性焦虑症的表现,但特征性表现为过度担忧。

38. 答案:B

解析:小儿持续性惊厥首选静脉推注地西泮(B对)。

39. 答案:B

解析:一侧卵巢增大、内见血流信号,甲胎蛋白异常增高,考虑为卵黄囊瘤滑。

40. 答案:A

解析:肾综合征出血热传染源为鼠类

(A对)。在我国以黑线姬鼠、褐家鼠为主。

41. 答案:A

解析:髋关节后脱位常采用手法复位+外固定。常用的复位方法为 Allis 法,即提拉法(A对)。HippocratEs 法为肩关节脱位的复位方法。三角巾悬吊、夹板固定为固定方法,非复位方法。

42. 答案:B

解析:治疗缺铁性贫血的主要方法为补充铁剂。进食谷类、乳类和茶等会抑制铁剂的吸收,鱼、肉类、维生素 C 可加强铁剂的吸收。故在缺铁性贫血的治疗过程中,应避免饮用乳类、浓茶,少食谷物。多食鱼肉、维生素 C。

43. 答案:D

解析:用某种诊断方法判断为阴性的人中,实际无病的人所占的比例称特异度(D对)。

44. 答案:D

解析:Barrett 食管是指食管远端出现柱状上皮化生,即鳞状上皮被柱状上皮取代(D对)。

45. 答案:C

解析:腹股沟直疝常见于年老体弱者,疝囊颈宽大,疝内容物又直接从后向前突出,故平卧后疝块多能自行消失,不需用手推送复位。直疝很少进入阴囊,极少发生嵌顿(C对)。

46. 答案:D

解析:根据我国免疫规划疫苗儿童免疫程序表,第 2 个月应接种的疫苗为脊髓灭活疫苗(D对)。

47. 答案:C

解析:X 线检查可见肺门舞蹈症是动脉导管未闭的特征性变化。肺门舞蹈症:肺门的肺动脉及其分支明显扩张增粗,肺动脉瓣相对关闭不全,心室收缩时,肺动脉及肺门血管明显扩张,在 X 线透视下的明显搏动。

48. 答案:C

解析:重症肌无力禁用药和慎用药包括:氨基糖苷类抗生素、新霉素、多黏菌素、巴龙霉素等可加重神经-肌肉接头传递障碍;奎宁、奎尼丁等药物可以降低肌膜兴奋性;另外吗啡、地西泮、苯巴比妥、苯妥英钠、普萘洛尔等药物也应禁用或慎用。

49. 答案:C

解析: β 受体阻滞剂能与去甲肾上腺素能神经递质或肾上腺素受体激动药竞争 β 受体, 从而拮抗其 β 型拟肾上腺素作用。多用于慢性心力衰竭、充血性心力衰竭、高血压、心律失常、心肌梗死等。由于对支气管平滑肌 β 受体的阻断作用, 非选择性 β 受体阻断药可使呼吸道阻力增加, 诱发或加剧哮喘, 故高血压合并支气管哮喘的病人不适宜使用 β 受体阻滞剂。

50. 答案:C

解析: 雌激素可增加凝血因子 II、VII、IX、X 的活性, 从而促进血液凝固, 还能增加纤溶活性。

51. 答案:E

解析: 缩宫素是由下丘脑室旁核、视上核神经元产生的激素原裂解生成的神经垂体激素。具有增加宫缩、加快产程、促进泌乳、减压等作用。

52. 答案:C

解析: 中年女性, 孕 8 周, 行人工流产负压吸引术时突发胸闷、面色苍白、心动过缓等表现, 服用阿托品后缓解, 该患者最可能的诊断为人工流产综合反应(C 对)。

53. 答案:B

解析: 孕妇, 月经规律, 末次月经 2022 年 3 月 15 日。推算预产期的方法是末次月经第一日算起, 月份减 3 或加 9, 日数加 7, 则该孕妇的预产期应为 $3+9=12$; $15+7=22$, 即 2022 年 12 月 22 日。

54. 答案:C

解析: 青年女性, 因被领导批评之后, 自觉生活无望, 感觉周围同事议论笑话自己、拒食(抑郁发作)。后入院治疗, 在病房中对同病房患者指手画脚、自言自语、瞧不起别人(躁狂发作), 该患者最可能的诊断为双相障碍, 即即有躁狂发作又有抑郁发作的一类心境障碍(C 对)。

55. 答案:C

解析: 老年女性, 多饮多尿多食两年(糖尿病表现), 腹痛、恶心、呕吐两天, 近两个月体重下降 10kg。初诊为急性肠胃炎, 补液治疗未见好转。查体: 空腹血糖 11.5mmol/L ($\geq 7.0\text{mmol/L}$), 餐后 2h 血糖 14.1mmol/L ($\geq 11.1\text{mmol/L}$), 该患者

诊断为糖尿病, 既往未曾服用降糖药治疗, 该患者出现体重显著下降、且有并发症, 应使用胰岛素进行治疗(C 对)。

56. 答案:E

解析: 中年男性, 关节疼痛、累及双手小关节与膝关节, 最可能的诊断为类风湿性关节炎。常用的治疗药物包括非甾体类抗炎药、传统 DMARDs、生物 DMARDs、糖皮质激素(GC)及植物药等。非甾体类抗炎药是缓解关节炎症状的常用药, 但有胃肠道反应等不良反应, 且该患者既往有十二指肠溃疡, 使用非甾体类抗炎药会使其病情加重, 故用药时需避免使用非甾体类抗炎药, 双氯芬酸为非甾体类抗炎药。

57. 答案:B

解析: 中年女性, G2P0, 停经 90 天, 阴道流血 1 天, 超声示子宫内膜均匀, 呈落雪状。该患者最可能的诊断为葡萄胎。凡有停经后不规则阴道流血要考虑葡萄胎可能, 完全性葡萄胎的典型超声图像为子宫大于相应孕周, 无妊娠囊或胎心搏动, 宫腔内充满不均质密集状或短条状回声, 呈“落雪状”, 水泡较大时则呈“蜂窝状”。葡萄胎诊断一经成立, 应立即清宫。

58. 答案:A

解析: 老年男性, 与人争吵后情绪激动, 自觉头晕, 测量血压 $140/80\text{mmHg}$ 。今日骑车 10 公里到医院就诊, 到达时测量血压 $160/85\text{mmHg}$ 。该患者目前不能确诊为高血压及明确危险分组。高血压的诊断需要在安静、休息、坐位时, 测量上臂肱动脉部位血压, 一般需非同日测量三次血压值, 收缩压均 140mmHg 和(或)舒张压均 $\geq 90\text{mmHg}$ 可诊断高血压。

59. 答案:A

解析: 1 岁男童, 头痛、呕吐 10 天, 黄色水样便, 量多, $8\sim 14$ 次/天。精神差、皮肤干燥、四肢冷、眼窝及前囟凹陷, 该患儿属于重度脱水(精神差、四肢冷、前囟凹陷)。实验室检查: Na^+ : 128mmol/L ($< 130\text{mmol/L}$), K^+ : 5.0mmol/L (正常值 $3.5\sim 5.0\text{mmol/L}$)。该患儿属于重度低渗性脱水, 对于重度脱水, 应快速输入等张含钠液(生理盐水或 2:1 等张液)

按 20ml/kg 于 30 分钟~1 小时。

60. 答案:D

解析:老年男性,既往糖尿病史 10 年,血糖控制不佳,近期背部疼痛感,可见多个脓肿,有波动感,诊断为痈。糖尿病人抵抗力低下,易发生疖痈等浅部组织细菌性感染。痈形成脓肿时,应及时切开引流,在静脉麻醉下做“+”或“++”形切口切开引流,切口线应达到病变边缘健康组织,深度须达到痈的基底(深筋膜层),清除已化脓和尚未成脓、但已失活的组织,在脓腔内填塞生理盐水、碘附或凡士林纱条,外加干纱布绷带包扎。

61. 答案:B

解析:老年男性,进行性吞咽困难(食管癌典型表现),无反酸、嗝气、腹痛、发热(可初步排除食管返流、胃部疾病)。胃镜检查:食管中段可见长约 4cm 隆起型病变,累及食管全周,伴不规则溃疡形成。食管黏膜粗糙、质硬、易出血。其余检查未见明显异常。结合患者临床表现与胃镜检查结果,最可能的诊断为食管癌。我国 90% 的食管癌为鳞状细胞癌,少数为腺癌,故该患者行活组织病理检查,最可能的结果为鳞癌。

62. 答案:E

解析:老年男性,上腹痛 10 天。既往有阿司匹林药物史(消化性溃疡的常见诱因),上消化道造影可见胃角切迹壁外龛影,14C 尿素呼气试验阴性(无 HP 感染)。该患者最可能的诊断为胃溃疡。PPI 是治疗消化性溃疡的首选药物,常用奥美拉唑(E 对)。

63. 答案:E

解析:老年女性,晨起后突发右上肢无力,持物掉落,言语不利,休息后缓解。既往高血压、糖尿病病史。神经检查未见异常,四肢感觉、运动均正常。该患者最可能的诊断为短暂性脑缺血发作(E 对)。

64. 答案:A

解析:青年女性,发热、咳嗽 2 个月,X 线示左上肺不规则片状阴影,考虑肺结核,予抗结核药物治疗 1 月余,现巩膜黄染,白细胞减低,ALT、ASL 尚且正常,总胆红素 40.6 μmol/L(3.4~17.1 μmol/L),直接

胆红素 17.8 μmol/L(1.70~8.55 μmol/L),均升高。该患者此时应停用利福平(A 对)。

65. 答案:A

解析:青年男性,既往静脉注射史,反复腹泻半年,近期头痛、恶心、呕吐,多发皮疹,无发热。实验室检查:白细胞降低。该患者最可能的诊断为艾滋病。HIV 的传染途径主要是性接触、血液接触和母婴传播。患者之前有静脉注射史,感染 HIV 的可能性大。艾滋病急性期,患者可伴有全身不适、头痛、盗汗、恶心、呕吐、腹泻、咽痛、肌痛、关节痛、皮疹、淋巴结肿大及神经系统症状等。艾滋病的诊断首选抗体检测(A 对)。

66. 答案:A

解析:Apgar 评分内容包括皮肤颜色、心率、对刺激的反应、肌张力和呼吸五项指标;每项 0-2 分,总共 10 分。分别于生后 1 分钟、5 分钟和 10 分钟进行。新生儿,生后 1 分钟,四肢略屈曲(1 分),躯干皮肤色红、四肢青紫(1 分),呼吸慢且不规则(1 分),清除喉部分泌物时有皱眉(1 分),心率 90 次/分(1 分)。该新生儿 1 分钟 Apgar 评分为 1+1+1+1+1=5 分,轻度窒息。

67. 答案:A

解析:5 岁患儿,2 岁时发现智力低下。查体:呆滞、皮肤苍白、毛色发黄、尿中鼠臭味(尿中排出较多苯乙酸),血中苯丙氨酸含量高于正常,该患儿最可能的诊断为苯丙酮尿症。苯丙酮尿症是一种常染色体隐性遗传病(A 对)。

68. 答案:C

解析:新生儿右乳肿块,无红肿、发热,患儿不哭闹。怀疑单纯性乳房发育,目前无症状,无需处理。乳房肿块会在 2-3 周后自然消退。

69. 答案:A

解析:老年患者,既往高血压病史 20 年,长期服用氨苯蝶啶(保钾利尿药),近来四肢疲乏无力,心电图示 T 波高尖,该患者四肢疲乏无力的原因最可能是高钾血症(A 对)。

70. 答案:A

解析:青年女性,孕 10 周,产检发现甲状腺 2 度肿大,可闻及血管杂音,未触及结节。患者既往无高血压、糖

尿病。该患者最可能的诊断为甲状腺功能亢进症，治疗多选用抗甲状腺药物、放射碘和手术治疗。该患者孕 10 周，处于妊娠 T1 期，此时选用 PTU 最适宜，因为 PTU 致畸率小于 MMI，对胎儿造成的影响小。手术治疗应在 T2 期（4~6 个月）时进行。妊娠和哺乳期禁止放射碘治疗。普萘洛尔多用于高血压、心绞痛等心血管系统疾病。

71. 答案:A

解析:青年女性，腹痛、腹泻、里急后重。排粘液脓血便，偶见片状灰白色膜状物排出，最可能的诊断为细菌性痢疾。痢疾为纤维素性炎，以纤维蛋白原渗出为主，继而形成纤维蛋白，即纤维素。纤维素、中性粒细胞和坏死黏膜组织以及病原菌等可在黏膜表面形成一层灰白色膜状物，称为“伪膜”（A 对）。

72. 答案:D

解析:女，妊娠 10 周，小阴唇内侧可见尖锐湿疣。妊娠期尖锐湿疣的治疗主要是缓解症状，外阴小病灶主要采用 80%~90%三氯醋酸涂擦局部，每周 1 次（D 对）。

73. 答案:A

解析:青年女性，G3P0（多次流产史），孕 32+5 周，现阴道流血 3 小时，无腹痛。无宫缩，胎头高浮，未入盆，Hb 60g/L，该患者阴道流血最可能的原因为前置胎盘（A 对）。

74. 答案:A

解析:青年女性，妊娠 31 周，无痛性、无诱因多次阴道流血，检查发现胎心在正常范围内，高度怀疑前置胎盘。前置胎盘的处理是在保障母婴安全的前提下，尽量延长妊娠时间，提高胎儿存活性。该患者妊娠 31 周，可采用期待疗法，注意休息。左侧卧位（A 对）。

75. 答案:B

解析:2 岁男童，发热 2 天，流涕、鼻塞、眼结膜充血、多泪。今晨出现耳后、枕部散在红色丘疹，疹间皮肤正常。根据患儿高热 2 天后出疹、耳后、枕部散在丘疹，疹间皮肤正常，诊断为风疹。

76. 答案:C

解析:青年女性，皮肤瘀斑、月经量增多。血常规:Hb 98g/L(<110g/L 提示

贫血)。骨髓细胞学检查:增生活跃，粒系、红系不明显。产板型显著减少(<30%)。该患者最可能的诊断为特发性血小板减少性紫癜(C 对)。

77. 答案:A

解析:中年女性，左肩部疼痛、放射至左前臂。检查可见左肩肌肉轻度萎缩，该患者最可能诊断为神经根型颈椎病(A 对)。交感型颈椎病表现为头痛、头晕；面部或躯干麻木发凉，听力减退，或诉记忆力减退、失眠等。脊髓型颈椎病表现为上肢或下肢麻木无力、僵硬、双足踩棉花感，束带感，双手精细动作障碍，病理征可呈阳性。椎动脉型颈椎病患者可出现头晕、恶心、耳鸣、偏头痛等。

78. 答案:D

解析:青年女性，孕 39 周，皮肤黄染、乏力、呕吐 1 周(肝脏疾病可能)。入院后检查:胎心率 108 次/分，反复变异减速。急诊剖宫产，娩出一 3200g 男婴(体重正常)，15 分钟后胎盘娩出，子宫缩小质硬。阴道持续出血 1900ml，不凝血。胎儿、胎盘娩出后阴道持续流血，且血液不凝，结合患者可能存在肝病，致凝血功能障碍，高度怀疑凝血功能异常(D 对)。

79. 答案:A

解析:老年男性，吸烟 23 年，20 支/天。刺激性咳嗽 2 月，CT 可见右肺门 2×2cm 团块状阴影，纵膈多淋巴结肿大。支气管镜可见右主支气管壁弥漫性增厚、管腔狭窄。该患者最可能的诊断为中央型肺癌、肺鳞癌。

80. 答案:D

解析:7 岁患儿，下肢水肿、高胆固醇血症、蛋白尿(+++)。该患者初步考虑为肾病综合征。引起肾病综合征患者滤过膜受损致使原尿中蛋白含量增多，当其增多明显超过近端肾小管回吸收量时，形成大量蛋白尿。

81. 答案:B

解析:中年男性，牙龈出血就诊。输血小板后出现荨麻疹，疑出现过敏反应，此时应立即中止输血，可口服抗组胺药物如苯海拉明、异丙嗪等，并严密观察病情发展。反应严重者立即停止输血，肌内注射肾上腺素(1:1000, 0.5~1ml)和(或)静脉滴注糖皮质激素

(氢化可的松或地塞米松)。

82. 答案:E

解析:中年男性,乙肝病史20年。查体:腹壁静脉曲张、移动性浊音阳性(门脉高压、腹水)。进食后突然呕血,怀疑食管胃底静脉曲张出血。应尽早给予收缩内脏血管药物如生长抑素、奥曲肽、特利加压素或垂体加压素,减少门静脉血流量,降低门静脉压,从而止血。生长抑素及奥曲肽因对全身血流动力学影响较小,不良反应少,是治疗EGVB最常用的药物(E对)。

83. 答案:B

解析:中年男性,头晕、站立不稳、指鼻试验阳性。患者最可能损伤小脑。小脑蚓部损伤可导致躯体共济失调:躯干不能保持直立姿势,站立不稳、行走时两脚分开、步态蹒跚,呈醉酒步态。小脑半球损害时指鼻试验、跟膝胫试验、轮替试验笨拙,常有水平性也可为旋转性眼球震颤,眼球向病灶侧注视时震颤更加粗大,往往出现小脑性语言。

84. 答案:B

解析:老年男性,咳嗽、咳痰、活动后气短。既往X线检查:肺纹理增粗、紊乱,膈肌低平。吸烟史40年,戒烟3年,该患者最可能的诊断为慢性阻塞性肺疾病(有吸烟等高危因素,临床表现咳、痰、喘等可高度怀疑慢性阻塞性肺疾病),为明确诊断,首选检查为肺功能检查。

85. 答案:A

解析:青年女性,经期同房,3天后下腹痛、发热、宫颈举痛,该患者最可能的诊断为急性盆腔炎(A对)。

86. 答案:D

解析:老年男性,排便次数改变、大便变细(肠腔狭窄)、血便2周、里急后重(直肠刺激症状)。高度怀疑直肠癌,对于疑诊直肠癌的患者,首选直肠指诊,直肠指诊是诊断低位直肠癌最重要的体格检查,凡遇直肠刺激症状、便血、大便变细等均应采用(D对)。

87. 答案:A

解析:青少年,军训中摔倒,大汗、口唇苍白,心率加快,考虑为中暑。快速降温是治疗中暑的基础,迅速降温决定病人的预后。应将病人转移到通

风良好的低温环境,脱去衣服,同时进行皮肤肌肉按摩,促进散热(A对)。

88. 答案:C

解析:中年男性,乏力、食欲缺乏、肝区隐痛,提示存在肝病。查体:面色灰暗、巩膜黄染、肝掌、蜘蛛痣、肝肋下2cm,脾肋下0.5cm。实验室检查:ALT 256U/L(正常值0-40U/L),AST 314U/L(正常值15-40U/L),总胆红素62 μ mol/L(正常值<20 μ mol/L),血清球蛋白38g/L(正常值20-35g/L),类风湿因子阳性,该患者出现肝炎表现,且ALT,AST,总胆红素、血清球蛋白均升高,考虑为慢性重度肝炎(C对)。

89. 答案:B

解析:老年男性。直肠癌根治术后4天(术后血流缓慢,血液高凝状态,易形成血栓),晨起突发左下肢肿胀、皮温升高,股三角区有压痛,最可能的诊断为下肢深静脉血栓(B对),下肢深静脉血栓起病急骤,明显肿胀、病侧髂窝、股三角区有疼痛和压痛、浅静脉扩张,皮温升高。

90. 答案:E

解析:青年男性,躁狂发作入院,给予碳酸锂1.0g/d,2天后出现恶心、呕吐、手抖(锂盐不良反应),无意识障碍(暂未出现锂盐中毒)。此时应停药,监测患者血锂浓度,急性治疗期血锂浓度应维持在0.6~1.2mmol/L,维持治疗期为0.4~0.8mmol/L,血锂浓度上限不宜超过1.4mmol/L,以防锂中毒(E对)。

91. 答案:D

解析:12岁患儿,反复左腰部胀痛2年,左腰部囊性肿块,质软。B超提示左肾肾积水,皮质变薄。要了解左肾实质损害程度及分侧肾功能,最佳检查为放射性核素肾显像(D对)。

92. 答案:A

解析:中年男性,忽然昏迷、抽搐、呼之不应。数分钟后恢复,对发病过程无记忆,该患者最可能为癫痫发作,首选检查为脑电图。脑电图是脑生物电活动的检查技术,通过测定自发的有节律的生物电活动以了解脑功能状态,是癫痫诊断和分类的最客观手段。

93. 答案:B

解析:计算新冠肺炎合并慢性疾病患

者的死亡率，分子为死亡人数 60，分母为感染新冠肺炎的慢性病患者 500。 $60/500=0.12$ ，则新冠肺炎合并慢性疾病患者死亡率为 12%。

94. 答案:C

解析:为了帮助酗酒者戒酒，家人在酒里下了解酒药，使酗酒者饮酒后出现恶心呕吐，抵消了饮酒带来的欣快感，促使成功戒酒。这种方法属于行为疗法中的厌恶疗法，即通过药物刺激让适应不良行为和厌恶体验建立一定的条件联系，当欲实施一定行为时，便立刻产生了厌恶体验。为了避免这种厌恶体验，病人只有终止或放弃原有的适应不良行为(C对)。

95. 答案:A

解析:中年女性，左肩疼痛，放射至患侧上臂中段，肩关节周围肌肉萎缩，外旋外展受限，最可能的诊断为粘连性关节炎。

96. 答案:D

解析:中年男性患者，诊断为肾癌，出现间歇性无痛性血尿，表明肿瘤已侵入肾盂、肾盏，引起出血(D对)。

97. 答案:C

解析:18周患儿，发热、抽搐，发作15分钟无缓解。查体:体温 39.5°C ，无意识、双眼上翻、四肢抽搐，该患儿考虑高热惊厥。对于小儿惊厥，发作超过5分钟需要及时给予药物止惊。首选苯二氮草类药物:如有静脉通道，应静脉推注地西洋(C对)。

98. 答案:B

解析:中年男性，发热头痛3天。查体:体温 38°C ，BP 70/50mmHg，皮肤出血点。实验室检查:白细胞 $18\times 10^9/\text{L}$ ，存在异性淋巴细胞，PLT $60\times 10^9/\text{L}$ (正常值 $100\sim 350\times 10^9/\text{L}$)，尿蛋白+++。结合该患者高热、低血压、肾损害、出血、白细胞增高、血小板减少、异性淋巴细胞等表现，判断患者为肾综合征出血热。肾综合征出血热是由汉坦病毒属的各型病毒引起的，以鼠类为主要传染源的一种自然疫源性疾病(B对)。

99. 答案:E

解析:素食者，不吃深色食物，出现夜间视物不清、视物模糊，最可能缺乏维生素A。维生素A可在体内由胡萝卜

素转化而来，富含胡萝卜素的食物有西兰花、芒果、菠菜、生菜、小白菜、苋菜、杏、胡萝卜、红心甜薯等食物，多为患者不食用的食物，故该患者需要食用胡萝卜素(E对)。

100. 答案:A

解析:中年男性，突发呕吐、腹痛，起初为中上腹疼痛，后转移至右下腹。压痛、反跳痛(腹膜刺激征象)。结合该患者典型转移性右下腹疼痛特征，判断为急性阑尾炎(A对)。

101. 答案:E

解析:初产妇，妊娠39周，宫口开全，S₊3。胎心率109次/分(正常胎心率110~160)，此时应当人工破膜。

102. 答案:C

解析:青年男性，因发热、皮疹就诊。查体:T 38°C ，皮肤多发暗红色斑丘疹、无瘙痒。掌拓部铜红色斑疹(梅毒疹)。结合该患者典型皮疹表现，诊断为二期梅毒。首选的检查方法为梅毒螺旋体抗体颗粒凝集试验(C对)。

103. 答案:D

解析:老年女性患者，胸痛就诊，诊断为前壁心肌梗死合并室性期前收缩。心律失常必须及时消除，以免演变为严重心律失常甚至猝死，出现室性期前收缩时，立即用利多卡因 $50\sim 100\text{mg}$ 静脉注射，每 $5\sim 10$ 分钟重复1次，至期前收缩消失或总量已达 300mg ，继以 $1\sim 3\text{mg}/\text{min}$ 的速度静脉滴注维持(100mg 加入5%葡萄糖液 100ml ，滴注 $1\sim 3\text{ml}/\text{min}$)。如室性心律失常反复可用胺碘酮治疗(D对)。

104. 答案:B

解析:老年男性，突发胸髓以下感觉运动障碍，二便失禁。该患者最可能的诊断为急性脊髓炎。急性脊髓炎急性起病，可无任何其他症状而突然发生瘫痪，以胸髓最常见，病变平面以下感觉、运动障碍及括约肌功能障碍。

105. 答案:C

解析:中年女性，饱餐后上腹疼痛、呕吐，向后背放射。屈曲位可缓解。既往胆囊结石病史(胰腺炎最主要病因)，腹部压痛、反跳痛(腹膜刺激征象)，Murphy征阴性(排除胆囊炎)。结合该患者病史，临床表现(饱餐后腹痛、背部放射痛、强迫体位、腹膜炎体征)，

诊断为急性胰腺炎。

106. 答案:A

解析:老年男性,饮酒后突发上腹部疼痛(胰腺炎常见诱因),既往胆囊结石病史(胰腺炎常见病因),该患者可能诊断为急性胰腺炎。急性胰腺炎的腹痛多向左肩部、左腰背部放射。

107. 答案:C

解析:老年男性患者,左上肢抽搐3天,每次发作10秒钟缓解,3天共发作5次,初步判断该患者为单纯部分性癫痫发作。首选治疗药物为卡马西平(C对)。

108. 答案:C

解析:中年女性(甲状腺疾病高发人群),近来脾气暴躁、失眠。查体:甲状腺肿大、触及震颤、可闻及血管杂音。该患者最可能诊断为甲状腺功能亢进导致的障碍(C对)。

109. 答案:D

解析:老年女性,摔伤。查体:左髌部疼痛、活动受限,左下肢短缩3cm,外展86°。该患者应诊断为股骨转子间骨折。

110. 答案:C

解析:老年女性,摔伤。查体:左髌部疼痛、活动受限,左下肢短缩3cm,外展86°。该患者应诊断为股骨转子间骨折。多主张手术治疗,可采用Gamma钉、动力髌螺钉等进行内固定。

111. 答案:A

解析:3岁男童,发烧39°C,持续7天。查体:眼结膜红,颈部淋巴结肿大,足部硬性水肿、蜕皮,唇部充血皲裂。该患儿诊断为川崎病(发热、球结膜充血、唇充血皲裂、硬性水肿、淋巴结肿大)。首选检查为血液检查+超声心动图。

112. 答案:A

解析:老年男性,上腹绞痛、恶心呕吐8小时就诊,胆囊多发小结石。查体:T 39°C, BP 80/60mmHg,神志不清,黄疸,上腹部压痛,肝区叩击痛(腹痛、高热、黄疸、中枢神经系统受抑制、休克,符合Reynolds五连征)。腹部CT提示胆囊炎。该患者出现典型的Reynolds五连征,诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎。处理原则是立即解除胆道梗阻并引流。首要处理措施为胆

总管切开引流。

113. 答案:D

解析:老年男性患者,晨起站立不稳,生活可自理。查体:BP195/110mmHg(高血压),神志清,言语交流不利,右侧鼻唇沟浅,四肢正常,该患者考虑为脑血管病变,首选脑CT检查(D对)。

114. 答案:A

解析:青年男性,上呼吸道感染后双下肢进行性无力、二便失禁2天。胸4以下平面痛温觉消失,肌力2级(肢体能在床面上平移,但不能对抗地球引力,不能够抬离床面),Babinski征阳性(提示锥体束受损)。该患者最可能的诊断为急性脊髓炎(A对)。

115. 答案:C

解析:中年女性(甲状腺疾病高发人群),10年来常有畏寒、少汗、乏力、纳差、月经不调、便秘、反应迟钝、面色苍白、眼睑水肿,一过性幻视。该患者最可能的诊断为甲状腺功能低下所致的精神障碍(C对)。

116. 答案:A

解析:中年女性,既往糖尿病、高血压20年。双下肢水肿,尿糖阳性、尿酮体阳性,蛋白尿+++。该患者糖尿病史20年,现已出现蛋白尿,合并有尿酮体,考虑为糖尿病肾病(A对)。

117. 答案:A

解析:6月龄男童,高热咳嗽就诊。查体:T 39°C,烦躁、发绀,呼吸浅快,可见三凹征,双肺哮鸣音(喘息+三凹征+气促)。胸片示:双下肺小点片状阴影,纵膈变钝。外周白细胞及分类在正常范围内。结合患儿年龄、临床表现,符合毛细支气管炎的诊断(A对)。

118. 答案:E

解析:中年女性,左乳包块就诊。体格检查:左乳外上象限可触及一1.5×1.5cm质硬包块,活动度好,同侧腋窝未触及肿大淋巴结。乳腺钼靶可见左乳一直径1.5cm高密度影,周围有毛刺,中央有钙化点(恶性可能大)。怀疑乳腺癌可能,行手术治疗,术后10天拟行综合治疗。其中靶向治疗是通过转基因技术制备的曲妥珠单抗对HER2过度表达的乳腺癌病人有良好效果,可降低乳腺癌病人术后的复发转移风险,提高无病生存期,判断该患

者是否可用靶向治疗的肿瘤标记物为 HER-2。

119. 答案:A

解析:中年男性,外伤入院。医生准备为患者进行相关检查。患者家属认为这些检查没有必要。在医生讲解后,家属表示同意,这体现了医患双方在知识上的不对等性。

120. 答案:A

解析:中年女性,5年前行右乳腺癌根治术(乳腺癌病史),近来头疼、呕吐,发作性抽搐3次。头颅CT提示颅内多发占位。首先考虑诊断颅内脑转移瘤。

121. 答案:A

解析:中年女性,拟行胃癌根治术,术前输血相关血清学检查应包括:ABO血型鉴定、Rh血型鉴定、交叉配血试验。不规则抗体又称意外抗体,盐水血型鉴定和交叉配血试验只对ABO血型系统有效,而对其它多种血型系统无效,而其它血型系统的不规则抗体会导致输血反应,采用不规则抗体筛查血清或血浆,可以防止含有不规则抗体的血液输注给病人,避免由于献血者血液中的不规则抗体引起病人红细胞的破坏而引起的溶血性输血反应。血小板抗体筛查多用于特发性血小板减少性紫癜患者的诊断,不作为常规输血相关血清学检查。

122. 答案:B

解析:乙肝患者,半年来肝功能异常。检查提示HBV-DNA 2.8×10^5 IU/L(≥ 20000 U/ml)。需要进行抗病毒治疗。乙肝的抗病毒药物主要有核苷类似物(如替诺福韦、恩替卡韦、替比夫定、拉米夫定等)和干扰素[如普通干扰素 α (IFN α)和聚乙二醇干扰素(Peg IFN α)]。对于初治乙肝病人,优先推荐选用恩替卡韦、替诺福韦或长效干扰素(Peg IFN α)。

123. 答案:B

解析:青年女性(结肠癌可能小),右下腹痛、腹泻便秘交替出现,午后低热(结核毒性症状)。查体:右下腹扪及包块,轻压痛。X线钡剂灌肠可见升结肠痉挛、回盲部跳跃征(肠结核典型表现)。结合患者结核毒血症表现、X线钡剂检查,最可能的诊断为肠结核(B对)。

124. 答案:D

解析:青年男性,幻听有人在耳边教唆自己自杀,难以忍受,故从三楼跳下致腰椎骨折。该患者出现言语性的幻听,在意识清晰状态下出现持续的命令性幻听,常指向精神分裂症(D对)。

125. 答案:C

解析:中年男性,因与妻子离婚后焦虑、心烦来院。未发现精神病性症状,躯体检查正常,经治疗后患者能正确对待当前家庭关系,回复到正常工作生活。该患者属于适应障碍。适应障碍是指在明显的生活改变或环境变化时产生的、短期的和轻度的烦恼状态和情绪失调,常有一定程度的行为变化等,但并不出现精神病性症状。

126. 答案:A

解析:中年男性,东南亚旅居史,呕吐寒战高热1周,隔日发作一次。脾肋下1cm, Hb 105g/L(贫血), WBC 5.0×10^9 /L。根据患者临床表现与实验室检查,诊断为疟疾。疟疾的典型症状为突发寒战、高热和大量出汗。各种疟疾的两次发作之间都有一定的间歇期。首选检查为血涂片。

127. 答案:C

解析:根据患者临床表现与实验室检查,诊断为疟疾。疟疾的典型症状为突发寒战、高热和大量出汗。各种疟疾的两次发作之间都有一定的间歇期。首选的治疗为青蒿素及其衍生物。

128. 答案:C

解析:中年女性,离婚后出现兴趣减退、心境低落、自信降低,最可能诊断为抑郁障碍(C对)。抑郁障碍的诊断标准包括三条核心症状:①心境低落;②兴趣和愉快感丧失;③导致劳累增加和活动减少的精力降低;七条附加症状:①注意力降低;②自我评价和自信降低;③自罪观念和无价值感;④认为前途暗淡悲观;⑤自伤或自杀的观念或行为;⑥睡眠障碍;⑦食欲下降。

129. 答案:B

解析:诊断为抑郁障碍。治疗首选抗抑郁药,遵循个体化原则,需结合患者的年龄、性别、伴随疾病、既往治疗史等因素,从安全性、有效性、经济性、适当性等角度为患者选择合适的抗抑郁药物及剂量。

130. 答案:A

解析:患儿高热、烦躁,查体可见三凹征、双肺喘鸣音。该患儿最可能的诊断为呼吸道合胞病毒肺炎(A对)。

131. 答案:B

解析:诊断为呼吸道合胞病毒肺炎。在吸氧、退热的同时应雾化吸入,有助于解除支气管痉挛和水肿。

132. 答案:A

解析:经治疗后症状减轻,下一步需要进行特异性抗体检测,经典的方法有免疫荧光试验(IFA)、酶联免疫吸附试验(ELISA)等。恢复期 IgG 抗体升高 >4 倍为阳性。

133. 答案:C

解析:老年男性,咳嗽、咳痰 10 年,喘息 5 年,加重 3 天(咳痰喘+感染可能),吸烟 20 余年(慢性阻塞性肺疾病常见病因)。查体:烦躁不安、球结膜充血、口唇发绀、桶状胸。双下肺湿啰音。提示心肺功能失代偿期,诊断为慢性肺心病。慢性肺心病的心电图表现为:①额面平均电轴 $>+90^\circ$;② V_1 R/S >1 ;③重度顺钟向转位(V_5 R/S ≤ 1);④ $R_{V1} + S_{V5} \geq 1.05mV$;⑤aVR R/S 或 R/Q ≥ 1 ;⑥ $V_1 - V_3$ 呈 QS、Qr 或 qr(酷似心肌梗死,应注意鉴别);⑦肺型 P 波。

134. 答案:B

解析:慢性肺心病失代偿期的治疗原则为积极控制感染、通畅呼吸道,改善呼吸功能,纠正缺氧和二氧化碳潴留,控制呼吸衰竭和心力衰竭,防治并发症。该患者已有感染征象,应立即抗感染。

135. 答案:B

解析:中年女性患者,性交时接触性出血。妇科检查:宫颈口直径 2cm 菜花样赘生物,其余未见明显异常。该患者最可能的诊断为子宫颈癌。

136. 答案:A

解析:中年女性患者,性交时接触性出血。妇科检查:宫颈口直径 2cm 菜花样赘生物,其余未见明显异常。该患者最可能的诊断为子宫颈癌。根据子宫颈癌临床分期,该患者癌灶肉眼可见,直径为 2cm。属于 IB1 期(肉眼可见癌灶 $\leq 4cm$)。首选治疗方法为手术治疗。行广泛性子宫颈切除术及盆腔淋巴结切

除术或考虑前哨淋巴结绘图活检。

137. 答案:E

解析:疫苗接种记录保存时间不少于 5 年。

138. 答案:B

解析:二类精神药物处方保存时间为 2 年。

139. 答案:C

解析:室间隔缺损必然导致心室水平的左向右分流,其血流动力学效应为:①肺循环血量增多;②左室容量负荷增大;③体循环血量下降;④晚期可形成 Eisenmenger 综合征。轻微室间隔缺损时,心电图可正常或电轴左偏,较大室间隔时有左室肥厚。

140. 答案:E

解析:原发孔型房间隔缺损又称部分心内膜垫缺损或房室管畸形。心电图提示电轴右偏。p-R 间期延呈 I° 房室传导阻滞。左、右心室肥厚。向量心电图在额面位呈逆钟向心电环。

141. 答案:B

解析:慢性失血性贫血的红细胞形态为小细胞性贫血。

142. 答案:A

解析:正常红细胞贫血包括再生障碍性贫血、纯红细胞再生障碍性贫血、溶血性贫血、骨髓病性贫血、急性失血性贫血。

143. 答案:A

解析:丹毒表现为片状微隆起的皮肤红疹、色鲜红、中间稍淡、边界清楚,有的可起水疱,局部有烧灼样疼痛(A对)。

144. 答案:C

解析:破伤风典型症状是在肌紧张性收缩(肌强直、发硬)的基础上,阵发性强烈痉挛,通常最先受影响的肌群是咀嚼肌,随后顺序为面部表情肌、颈、背、腹、四肢肌,最后为膈肌。相应出现的征象为:张口困难(牙关紧闭)、蹙眉、口角下缩、咧嘴“苦笑”、颈部强直、头后仰、“角弓反张”或“侧弓反张”等。

145. 答案:A

解析:患者感觉胃扭转、穿孔、破裂,属于内脏幻觉(A对)。

146. 答案:E

解析:患者感到躯体不适,但性质难以

2022 年临床助理历年真题

描述，定位不准。属于内感性不适。

147. 答案:C

解析:垂体后叶又称神经垂体，主要储存血管加压素(抗利尿激素)和缩宫素。

148. 答案:E

解析:促甲状腺激素由腺垂体分泌。

149. 答案:C

解析:90%左右的强直性脊柱炎病人HLA-B27 阳性。

150. 答案:D

解析:抗 CCP 抗体是诊断类风湿性关节炎的特异性检查指标。

2023 临床助理历年真题

第一单元

A1/A2 型选择题

1. 前列腺增生最常见的早期症状

- A. 尿潴留
- B. 肉眼血尿
- C. 尿急
- D. 尿频
- E. 进行性排尿困难

2. 对诊断肾结核最有意义的是

- A. PE. T
- B. 尿路平片
- C. B 超
- D. 静脉尿路造影
- E. 膀胱镜检

3. 慢性肾衰竭患者发生贫血最主要的原因是

- A. 骨髓增生低下
- B. 促红细胞生成素减少
- C. 叶酸缺乏
- D. 营养不良
- E. 维生素 b12 缺乏

4. 血清与血浆的主要区别在于

- A. 血清易凝固
- B. 纤维蛋白原
- C. 凝血酶
- D. 血液分离的上层
- E. 血浆易凝固

5. 血行转移最常见的是

- A. 宫颈癌
- B. 卵巢癌
- C. 肝癌
- D. 乳腺癌
- E. 绒毛癌

6. 妊娠期巨幼细胞性贫血的原因

- A. 铁
- B. 蛋白质
- C. 锌
- D. 叶酸
- E. 维生素 B2

7. 肾病综合征的诊断

- A. 肾脏超声
- B. 造影
- C. CT
- D. UCG
- E. 尿常规和血常规

8. 儿童青少年好发什么卵巢肿瘤

- A. 生殖细胞肿瘤
- B. 上皮性肿瘤
- C. 转移性肿瘤
- D. 卵巢细胞肿瘤
- E. 性索间质肿瘤

9. 最能提示新生儿颅内压升高的表现是

- A. 前囟饱满，头颅增大
- B. 恶心呕吐
- C. 哭闹
- D. 发热
- E. 惊厥

10. 新生儿肺透明膜病的主要病理生理

- A. 肺顺应性增加
- B. 肺表面张力减少
- C. 肺泡萎陷液体渗出
- D. 肺泡表面活性物质减少
- E. 肺表面张力增大

11. 小儿麻疹最常见的并发症是

- A. 心肌炎
- B. 脑炎
- C. 肺炎
- D. 喉炎
- E. 结膜炎

2023 临床助理历年真题

12. 以下不是通过血液传播的疾病有

- A. 乙型肝炎
- B. 巨细胞病毒
- C. 单纯疱疹病毒
- D. 艾滋病
- E. 梅毒

13. 急性白血病患者最危及生命的出血是

- A. 消化道出血
- B. 咯血
- C. 眼底出血
- D. 颅内出血
- E. 尿血

14. 完全性葡萄胎检查不可见

- A. 胚胎或胎儿组织缺失
- B. 弥漫性滋养细胞增生
- C. 绒毛弥漫性水肿
- D. 水肿程度及大小不一的绒毛
- E. 种植部位滋养细胞呈弥漫和显著的异型性

15. 通过粪-口途径传播的传染病是

- A. 戊型病毒性肝炎
- B. 乙型病毒性肝炎
- C. 丙型病毒性肝炎
- D. 麻疹
- E. 白喉

16. 胎儿纵轴与母体纵轴间的关系称为

- A. 胎产式
- B. 胎先露
- C. 胎方位
- D. 横产式
- E. 胎势

17. 骨盆漏斗韧带内走形的组织结构

- A. 输卵管
- B. 中肾管遗迹

- C. 输尿管
- D. 卵巢动静脉
- E. 子宫动静脉

18. 水痘不会出现的情况是

- A. 丘疹、疱疹和结痂同时出现
- B. 皮疹退后留疤痕
- C. 最初表现为斑丘疹
- D. 皮疹向心性分布
- E. 皮疹先出现在躯干和头部

19. 小儿出生后体重下降 3%~9%，一般出现在

- A. 7 天内
- B. 1~2 个月
- C. 3~4 个月
- D. 2~3 个月
- E. 1~2 周

20. 小儿最常见的染色体疾病

- A. 13-染色体疾病
- B. 21-染色体疾病
- C. 18-染色体疾病
- D. 5p-染色体疾病
- E. Turner 疾病

21. 子宫颈癌的发生与下列哪项因素有关

- A. HSV-1
- B. HSV-2
- C. HIV
- D. HPV6、HPV11
- E. HPV16、HPV18

22. 新生儿甲低最早出现的症状是

- A. 腹泻
- B. 贫血
- C. 生理性黄疸消退延迟
- D. 心率正常
- E. 体温低

2023 临床助理历年真题

23. 不需要初种和复种的计划免疫疫苗

- A. 脊髓灰质炎疫苗
- B. 卡介苗
- C. 乙肝
- D. 流脑
- E. 乙脑

24. 下列不作为糖尿病诊断标准的是

- A. $3.9 \leq \text{空腹血糖} < 6.1$ 可排除糖尿病
- B. 糖尿病症状加尿糖阳性
- C. 糖尿病症状加空腹血糖 $> 7 \text{mmol/L}$
- D. 糖尿病症状加 OGTT $\geq 11.1 \text{mmol/L}$
- E. 糖尿病症状加随机血糖 $\geq 11.1 \text{mmol/L}$

25. 卵巢子宫内膜异位症的首选检查

- A. CA125
- B. 腹腔镜
- C. 经阴道超声
- D. 盆腔 MRI
- E. 腹部 B 超

26. 关于羊水引起肺栓塞下列选项错误的是

- A. 易引起 DIC
- B. 栓子有羊水结构
- C. 左心衰竭
- D. 右心衰竭
- E. 变态 II 型反应

27. 孕期 NST 异常的是

- A. 胎心率 $110 \sim 160$
- B. 胎心率小于 100
- C. 偶出现变异减速
- D. 40 分钟内 2 次或 2 次以上加速超过 15 次/分
- E. 基线变异 < 5 次/分

28. 抗生素治疗合用糖皮质激素的目的

- A. 抗炎
- B. 允许作用

C. 减轻中毒反应

- D. 抗休克
- E. 抗过敏

29. 月经第 3~5 天, 体内激素的变化是

- A. 雌激素和孕激素升高
- B. 孕激素和卵泡刺激素升高
- C. 孕激素和黄体生成素升高
- D. 雌激素和孕激素降低
- E. 黄体生成素和卵泡刺激素降低

30. 老年人最常见的硬脊膜外肿瘤是

- A. 脊膜瘤
- B. 淋巴瘤
- C. 转移瘤
- D. 胶质瘤
- E. 脊索瘤

31. 足月儿出现“生理性贫血”的时期是

- A. 生后 3~4 月
- B. 生后 2~3 月
- C. 生后 1~2 月
- D. 生后 6 个月以后
- E. 生后 5~6 月

32. 维持阴道正常酸性环境的主要菌群是

- A. 类杆菌
- B. 动弯杆菌
- C. 乳杆菌
- D. 梭杆菌
- E. 加得纳菌

33. 关于激素合成, 以下叙述错误的是

- A. 垂体通过分泌促激素来控制内分泌靶腺激素的产生
- B. 大多数激素基于机体需要即刻产生
- C. 甲状腺激素的储备很少
- D. 部分激素分泌具有昼夜节律性
- E. 生化信号参与激素合成

2023 临床助理历年真题

34. 川崎病的冠状动脉损害最常发生于起病的第

- A. 1~2 周
- B. 3~7 天
- C. 2~4 周
- D. 2~3 月
- E. 6 个月后

35. 评估患者营养状况指标不包括

- A. 前白蛋白
- B. 外周血淋巴细胞计数
- C. 血清转铁蛋白
- D. 血小板计数
- E. 血浆白蛋白

36. 苯丙酮尿症属于

- A. 染色体畸变
- B. 常染色体显性遗传
- C. 常染色体隐性遗传
- D. X 连锁显性遗传
- E. X 连锁隐性遗传

37. 胎儿先露的部位的指示点与母体骨盆的关系是

- A. 胎产位
- B. 胎方式
- C. 胎先露
- D. 骨盆轴
- E. 胎姿势

38. 抑郁症急性发病期，抗抑郁剂的治疗时间最少是多少

- A. 16 周
- B. 12 周
- C. 6 周
- D. 24 周
- E. 2 周

39. 前置胎盘腹部查体时，可能出现的体征

- A. 子宫板状硬
- B. 胎位不清
- C. 腹部压痛
- D. 胎先露高浮
- E. 子宫大小略小于孕周

40. 感染破伤风时，最晚累及的肌肉是

- A. 四肢肌
- B. 腹肌
- C. 膈肌
- D. 面部表情肌
- E. 咀嚼肌

41. 关于幻觉的叙述，最准确的是

- A. 错误的感知体验
- B. 迷幻的感觉体验
- C. 感觉体验
- D. 知觉体验
- E. 虚幻的知觉体验

42. 死亡率最高儿童年龄分期是

- A. 新生儿期
- B. 学龄期
- C. 幼儿期
- D. 婴儿期
- E. 学龄前期

43. 踝关节稳定性骨折无移位，石膏固定多久适合

- A. 1~2 周
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 6~8 周
- E. 2~3 周

44. 肩关节前脱位的典型表现

- A. 方肩畸形
- B. 腋窝可扪及肱骨头
- C. 锁骨下可扪及肱骨头
- D. Dugas 征 (+)
- E. 弹性固定

2023 临床助理历年真题

45. 恐惧障碍和广泛性焦虑的鉴别点是

- A. 精神焦虑
- B. 自主神经紊乱
- C. 自我认知
- D. 行为干预
- E. 特异性指向对象

46. 慢性酒精性中毒不出现

- A. 戒断反应
- B. 震颤谵妄
- C. 近记忆障碍
- D. 病理性醉酒
- E. 柯萨可夫综合征

47. 鉴别单纯型肾病和肾炎型肾病临床表现不包括

- A. 肾小球源性血尿
- B. C3 降低
- C. 低白蛋白血症
- D. 高血压
- E. 水肿

48. 复发性外阴阴道假丝酵母菌病 (RVVC) 的维持治疗应持续

- A. 1 个月
- B. 3 天
- C. 3 个月
- D. 6 个月
- E. 7-14 天

49. 肾结核早期症状是

- A. 低热, 盗汗
- B. 尿频
- C. 尿急, 尿痛
- D. 血尿
- E. 腰痛

50. 基底节脑出血最常见的病因是

- A. 糖尿病
- B. 原发性高血压

- C. 出血性疾病
- D. 动脉粥样硬化
- E. 脑动脉瘤

51. 男孩, 3 岁。右侧阴囊内肿块, 光滑, 有波动感, 右侧睾丸未触及, 卧位时肿块不消失, 透光实验阳性。首先考虑的诊断是

- A. 腹股沟疝
- B. 精索鞘膜积液
- C. 隐睾
- D. 睾丸鞘膜积液
- E. 交通性鞘膜积液

52. 女性, 35 岁, 乳房周期性胀痛 3 月, 月经前疼痛明显加重, 孕 3 产 1。查体: 肿物囊性, 边界不清, 腋窝未触及肿大淋巴结, 轻压痛, 考虑诊断为

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳腺囊性增生病
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 急性乳腺炎

53. 女, 32 岁, 阴道分泌物增多 1 月。查体: 阴道内稀薄脓性黄色泡沫状。阴道 pH 值为 5, 阴道分泌物线索细胞阳性, 患者首选的治疗药物是

- A. 制霉菌素
- B. 甲硝唑
- C. 阿奇霉素
- D. 头孢菌素类
- E. 青霉素

54. 男, 65 岁, 患再生障碍性贫血 2 年, 多次输血治疗。最近 2 次输血过程中出现发热, 体温达 39°C 以上, 经对症处理症状缓解。此次拟输血改善贫血症状, 应输注的血液成分是

- A. 辐照红细胞
- B. 浓缩红细胞

2023 临床助理历年真题

- C. 去除白细胞的红细胞
- D. 悬浮红细胞
- E. 冰冻红细胞

55. 男性，30岁。间歇出现颜面及下肢浮肿已经五年，伴乏力，头痛，查血压 180/110mmHg，Hb80g/L，尿蛋白(++)，尿红细胞 6-8 个/HP。下列治疗措施中，不选用

- A. 糖皮质激素
- B. 氢氯噻嗪
- C. 阿司匹林
- D. 卡托普利
- E. 普萘洛尔

56. 男性，33岁，关节疼痛2年，累及双手小关节与膝关节，既往有十二指肠溃疡，下列药物需注意避免

- A. 甲氨蝶呤
- B. 柳氮磺胺吡啶
- C. 双氯芬酸
- D. 来氟米特
- E. 糖皮质激素

57. 女，16岁，月经不规律，近期有乏力，面色苍白，食欲差等症状。检查:Hb96g/L，MCV60.96fl，该患者首选治疗为

- A. 硫酸亚铁
- B. 叶酸
- C. 维生素 B12
- D. 钙剂
- E. 输血

58. 男，30岁，右小腿贯穿性枪伤，X线检查未发现骨折及异物残留，正确的处理是

- A. 清创，切除伤口周围皮肤 3mm，缝合伤口
- B. 清创，充分引流，包扎伤口，直至愈合

- C. 清创，缝合伤口
- D. 切开弹道全程，清创，缝合伤口
- E. 清创，开放引流 3~5 天，延期缝合伤口

59. 女性，23岁，咽痛、发热伴咳嗽2周，颜面水肿3天，BP:150/100mmHg，皮肤无皮疹，尿常规及沉渣镜检:尿蛋白(++)，RBC:20~30/高倍视野，血肌酐:115 μ mmol/L，补体 C3 降低，ASO 升高，下列不适配的处理措施是

- A. 利尿
- B. 休息
- C. 控制血压
- D. 应用抗生素
- E. 应用糖皮质激素

60. 女性，30岁，高血压三年，与别人吵架后剧烈头痛1天，查体:鼻唇沟变浅，右双下肢肌力三级，CT示:左基底节高密度影，考虑诊断是下面哪个

- A. 短暂性缺血性发作
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 脑血栓
- D. 脑出血
- E. 脑梗死

61. 男性，27岁，发热伴腹痛腹泻3天，3天前到南方旅游，并在河水中游泳，粪便培养可见虫卵，该疾病的传播方式是

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 接触传播
- D. 虫媒传播
- E. 血液传播

62. 初产妇，35岁，孕39周，宫口开全3小时，宫缩间隔1-2分钟，用力屏气未见胎头拨露，阴道检:胎头

2023 临床助理历年真题

S=+2，矢状线与骨盆前后位一致，无头颅重叠及产瘤，大囟在骶骨后方，最可能的诊断是

- A. 胎头高直前位
- B. 前不均倾位
- C. 持续性枕后位
- D. 活跃期停滞
- E. 第二产程延长

63. 一小儿发热一周，X片可见双肺有小空洞，肺底有细湿啰音，该患儿除了抗菌以外，还需要应用哪种解热药物

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 萘普生
- C. 阿托品
- D. 地西洋
- E. 美托洛尔

64. 女性，18岁，晨起眼睑水肿3个月。查体：可见颜面、下肢水肿。尿常规：尿蛋白(++++)，其水肿原因主要考虑

- A. 毛细血管血压增高
- B. 血浆胶体渗透压降低
- C. 淋巴回流受阻
- D. 组织液静水压降低
- E. 组织液胶体渗透压升高

65. 男性，50岁，突发右脚第一跖趾关节剧痛，3小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查血尿酸为 $650\mu\text{mol/L}$ ，尿酸的最终产物是

- A. 核苷酸
- B. 嘌呤
- C. 氨基酸
- D. 嘧啶
- E. 甘油三酯

66. 老年女性患者，65岁，因不慎摔倒致股骨颈骨折，外旋 50° ，X线片

示：左髋关节间隙变窄，股骨头变性。适合该患者的治疗方法为

- A. 关节置换术
- B. 行内固定术
- C. 手法复位
- D. 石膏外固定
- E. 骨牵引术

67. 患者，男，37岁，大量饮酒后磕碰桌角，而后排尿不能，查体心肺体征无著征，骨盆挤压分离试验阳性，导尿试验阳性，考虑泌尿系统损伤为

- A. 后尿道损伤
- B. 尿道球部损伤
- C. 膀胱破裂
- D. 输尿管损伤
- E. 肾脏损伤

68. 女，36岁，心悸、胸闷伴憋喘2月。查体：颈部可触及一 $5\times 6\text{cm}$ 肿块，可推动，随吞咽移动，气管左偏，双手震颤，未触及颈部淋巴结肿大。首选的治疗是

- A. 甲疏咪唑
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 手术治疗
- D. 碘 131
- E. 随访观察

69. 患者女，34岁，既往月经不调，月经周期1-3月，胚胎移植术后停经45天，HCG阳性，如何判断孕周

- A. 双顶径
- B. 胚胎移植时间
- C. 宫高
- D. 雌激素变化
- E. 自身体温变化

70. 男，20岁，龟头无痛性溃疡，1~3周前有不洁性行为，查体：龟头可见直径1cm的圆形浅表溃疡，触之觉硬，

2023 临床助理历年真题

不能杀灭该病原体的是

- A. 干燥
- B. 煮沸
- C. 阳光
- D. 消毒剂
- E. 低温

71. 产妇 24 岁，孕 37 周+1，羊水正常，S+1，胎位 LOA，宫颈 bishop 评分 4 分，胎心率 136 次/分，产妇有支气管哮喘病史，曾诊断 2 型糖尿病，血糖控制良好，对于该产妇，接下来的处理是

- A. 肌注哌替啶
- B. 继续观察，等待妊娠
- C. 人工破膜
- D. 手术剖宫产
- E. 肌注地西洋

72. 女孩，4 岁，自幼体弱，易患呼吸道感染。查体：心前区稍隆起，无震颤，胸骨左缘第 2 肋间闻及 3/6 级收缩期杂音，P2 亢进，固定分裂。最可能的诊断是

- A. 动脉导管未闭
- B. 风湿性心脏病
- C. 室间隔缺损
- D. 法洛四联症
- E. 房间隔缺损

73. 女，27 岁，G1P1，顺产 2 周突发下腹痛伴发热 1 天，无咳嗽，咳痰，乳房胀痛，血 WBC $12 \times 10^9/L$ ，NO. 91，血常规正常，最容易发生的并发症是

- A. 子宫肌瘤囊性变
- B. 妊娠合并阑尾炎
- C. 子宫肌瘤蒂扭转
- D. 子宫肌瘤红色样变
- E. 产褥感染

74. 女，30 岁。尿频尿急尿痛 3 天。

尿常规：尿比重 1.017，RBC $0 \sim 3/HP$ ，WBC $6 \sim 10/HP$ 。静脉肾盂造影未见异常，首先考虑的治疗是

- A. 口服喹诺酮类 5 天
- B. 口服喹诺酮类 3 天
- C. 口服喹诺酮类 7 天
- D. 静脉氨苄青霉素 7 天
- E. 静脉青霉素联合红霉素 3 天

75. 新生儿，出生后 Apgar 评分 1 分钟、5 分钟、10 分钟，分别为 2、5、7 分，12 小时后出现吸吮、咂嘴等自主运动，考虑是以下哪种情况

- A. 新生儿低血糖
- B. 新生儿缺氧缺血性脑病
- C. 新生儿脑出血
- D. 先天性脑发育不全
- E. 先天性甲状腺功能减退症

76. 女婴，出生 3 天。黄疸迅速加重 2 天。足月儿，母乳喂养。实验室检查：血清总胆红素 289 $\mu\text{mol/L}$ 。母血型为 O 型、Rh 阳性，父血型为 AB 型、Rh 阳性。最可能的诊断是

- A. 新生儿母乳性黄疸
- B. 新生儿肝炎综合征
- C. 新生儿败血症
- D. Rh 血型不合溶血病
- E. ABO 血型不合溶血病

77. 患者，男，10 岁。尿量减少及颜面部水肿 2 天，2 周前有上呼吸道感染史。查体：血压 140/90mmHg，颜面部及双下肢轻度水肿。尿常规：蛋白(++)，红细胞(+)。补体 C3 轻度下降。其最可能的临床诊断是

- A. 肾病综合征
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 急进性肾小球肾炎

78. 男性，5岁，持续发热15天，体温 $39\sim 39.5^{\circ}\text{C}$ ，伴腹泻每日3~5次，体检：神萎，心率72次/分，肝右肋下2cm，脾肋下1.5cm，血常规检查：WBC $3.0\times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞60%，淋巴细胞40%，嗜酸粒细胞0，ALT200U/L，血清抗-HBs阳性，该病例最可能的诊断是

- A. 急性乙型肝炎
- B. 伤寒
- C. 钩端螺体病
- D. 急性血吸虫病
- E. 急性细菌性痢疾

79. 男性，22岁，臀区痛1年，伴晨僵，活动后好转，夜间加重，可疼醒，实验室：E.SR30mm/h，CRP18mg/L，HLA-B27(+)，骶髂关节CT示双侧骶髂关节面虫蚀样。首选治疗为

- A. 非甾体抗炎药
- B. 糖皮质激素
- C. 甲氨蝶呤
- D. 肿瘤坏死因子拮抗剂
- E. 来氟米特

80. 男，24岁，一小时前工作中右小腿被机器割伤，伤口无活动性出血，右小腿及右足血运正常，右侧足背前内侧感觉障碍，最可能损伤的神经是

- A. 股神经
- B. 胫神经
- C. 腓肠神经
- D. 腓总神经
- E. 隐神经

81. 男性，29岁，胫骨开放性骨折创口不愈，治疗3个月后形成窦道，有少量脓性分泌物，并有死骨排出。应考虑为

- A. 骨结核

- B. 骨肿瘤
- C. 慢性骨髓炎
- D. 缺血性骨坏死
- E. 急性化脓性骨髓炎

82. 男，28岁，新入职工人，在高温环境下连续工作数周后，觉得自己工作能力有所提高，检查后发现血压和心率降低，这种现象属于

- A. 热保护
- B. 热负荷
- C. 热过度
- D. 热适应
- E. 热应激

83. 男性，32岁，4小时前跌伤后昏迷5分钟清醒后步行回家。1小时因剧烈疼痛，呕吐3次来诊。查体：昏迷，P64次/分，BP180/90mmHg，R18次/分，头颅CT提示颅内双凸形高密度影。诊断应考虑为

- A. 急性硬膜外血肿
- B. 急性脑内血肿
- C. 脑挫伤
- D. 脑震荡
- E. 急性硬膜下血肿

84. 患者女，26岁。头部撞伤疼痛15小时。神志清，眼睑青紫，眼结膜下出血，嗅觉丧失，有淡红色液体从鼻腔流出。最可能的诊断是

- A. 眼外伤
- B. 颅前窝骨折
- C. 颅中窝骨折
- D. 颅后窝骨折
- E. 面部软组织损伤

85. 女，阴道分泌物多，外阴瘙痒2个月，之前因上呼吸道感染，口服抗生素10天，最可能是哪种致病菌

- A. 滴虫性阴道炎

2023 临床助理历年真题

- B. 细菌性阴道炎
- C. 外阴假丝酵母菌
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 非特异性外阴炎

86. 患儿，女，2岁，发热、咽喉疼痛3天，查腭咽弓、软腭及腭垂黏膜可体：咽部充血，见灰白色疱疹，周围伴红晕。患儿感染的病原体可能是

- A. 流感病毒
- B. 呼吸道合胞病毒
- C. 柯萨奇病毒
- D. 腺病毒
- E. 支原体

87. 患儿，发热、咳嗽5天，伴畏光、流泪，1天前患儿耳后、发际出现红色斑丘疹，疹间可见正常皮肤，不伴痒感，渐蔓延至躯干四肢。本病最常见的并发症是

- A. 心肌炎
- B. 喉炎
- C. 肺炎
- D. 胃肠炎
- E. 脑膜炎

88. 3岁小儿，发育落后，少动，紫绀，有蹲踞现象。查体：胸骨左缘第2、3肋间可闻及响亮粗糙的收缩期杂音，X线示：右室肥大，肺动脉凹陷，诊断考虑为

- A. 法洛四联症
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损
- D. 肺动脉狭窄
- E. 动脉导管未闭

89. 男，67岁，渐进性记忆力减退4年余，生活不能完全自理，出门不能找到回家的路，既往体健，查体无特殊，可能的诊断的是

- A. 阿尔茨海默病
- B. 环境障碍
- C. 轻度记忆力障碍
- D. 帕金森病性痴呆
- E. 血管性痴呆

90. 男，72岁，意识模糊伴剧烈呕吐3小时，高血压病史10余年，急诊头颅CT提示：左侧基底节区血肿。该患者脑出血的具体出血部位是

- A. 大脑后动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 大脑前动脉
- D. 颈内动脉
- E. 豆纹动脉

91. 女，51岁，闭经7月，此时体内哪种激素水平升高

- A. 雄激素
- B. 雌激素
- C. 孕激素
- D. 黄体生成素
- E. 卵泡刺激素

92. 女，35岁，半年前母亲突然病故。此后失眠，情绪低沉，不愿与人交往。近3个月来独处时常听见有声音对她讲话，说母亲病故与某人有关，故多次给公安机关写信反映母亲被害之事，后来又感到自己的思维、情感不由自己支配，自己的想法还未说出已人人皆知，常独自哭泣。神经系统检查未见异常，有慢性肝炎病史3年，目前肝功能ALT80U/L。该患者没有出现的症状是

- A. 强制性思维
- B. 被害妄想
- C. 情感低落
- D. 思维被洞悉妄想
- E. 言语性幻听

2023 临床助理历年真题

93. 女, 26 岁, 初产妇, 产检一切顺利, 现足月临产 10 小时, 宫缩 2 次/3 分, 宫口扩张 3cm, s=0, 宫缩中等强度, 胎心率 140 次/分, 此时应选用的治疗措施是

- A. 哌替啶肌注
- B. 缩宫素静滴
- C. 继续观察
- D. 剖宫产
- E. 产钳助产

94. 男, 65 岁, 近 2 到 3 年自觉反应慢, 饮食和运动较前无明显变化, 但每年体重上涨 2kg, 高血压 10 年, 冠心病 3 年, 规范二级预防治疗, 查体: T36.1°C, P52 次/分, R18 次/分, BP100/70mmHg, 甲状腺肿大, 质韧, FT3 下降 FT4 下降, TSH 上升, 患者在进行甲状腺治疗时要先评估的是

- A. 血脂状况
- B. 肝功能
- C. 肾功能
- D. 肺功能
- E. 心功能

95. 女, 50 岁。2 小时前不慎烧伤双侧臀部、双下肢(包括双足)。查体: 心率 120 次/分, 呼吸 20 次/分, 血压 125/85mmHg, 皮肤明显红肿, 疼痛较剧烈, 伤处满布大小水疱, 内含黄色液体, 去水疱皮, 见创面红润、潮湿, 估计该患者烧伤的深度和面积

- A. 浅 II 度 46%
- B. III 度 46%
- C. 深 II 度 41%
- D. 深 II 度 46%
- E. 浅 II 度 41%

96. 男婴, 8 个月。发热 3 小时, 体温 39.3°C。就诊过程中突然双眼上翻, 肢体强直, 持续半分钟后缓解。查体:

充血, 肺、心、腹及神经系统无异常, 2 个月前曾有同样发作, 其表现考虑为

- A. 病毒性脑炎
- B. 热性惊厥
- C. 癫痫
- D. 结核性脑膜炎
- E. 中毒性脑病

97. 患者因牙龈出血肿痛 3 天来院, 检查: 血小板 $6 \times 10^9/L$, 输注血小板 30mL 后出现荨麻疹伴瘙痒下列处理不正确的是

- A. 口服异丙嗪
- B. 停止输入
- C. 继续缓慢输入
- D. 静脉滴注糖皮质激素
- E. 肌注肾上腺素

98. 患者, 男, 52 岁。间断无痛全程肉眼血尿 3 月, 查体: 肾区无叩痛, 尿检红细胞充满/HP, 膀胱镜未见异常, 静脉尿路造影示右肾盂有充盈缺损, 首先应考虑诊断为

- A. 肾盂肾炎
- B. 肾结核
- C. 肾结石
- D. 肾囊肿
- E. 肾盂癌

99. 男, 62 岁, 左上肢抽搐 3 天, 每次发作约 10 秒钟缓解, 3 天来共发作 5 次, 该患者首选的治疗药物为

- A. 苯妥英钠
- B. 乙琥胺
- C. 奥卡西平
- D. 氯丙嗪
- E. 地西洋

100. 男, 31 岁, 车祸导致右下肢胫腓骨处开放性骨折 20 分钟, 查体: 血压

2023 临床助理历年真题

80/60mmHg，右下肢可见骨骼露出，急诊前往现场，在现场正确的处理方式是

- A. 消毒，骨折不需要复位，包扎，外固定即可
- B. 清创，骨折复位，缝合，包扎外固定
- C. 清创，纱布包扎，外固定，骨折不需复位
- D. 清创，缝合，骨折不复位，包扎，外固定
- E. 清创，纱布包扎，骨折复位，外固定

101. 患者，女，10个月，发热，伴间断呕吐10天。体检：精神可，较兴奋，方颅。脑脊液：外观毛玻璃样，白细胞 $60 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞0.60，清蛋白0.43g/L，氯化物108mmol/L，糖2.3mmol/L。可能的诊断是

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 流行性脑膜炎

102. 男孩，1岁半。生后半年发现尿有霉臭味，经常呕吐，1岁时发现智力较同龄儿落后，查体：目光呆滞，皮肤白皙，毛发浅黄。明确诊断的检查是

- A. 血苯丙氨酸浓度测定
- B. 血T₃、T₄测定
- C. 染色体核型分析
- D. 头颅CT
- E. 脑电图

A3/A4 型选择题

(103~104 题共用题干)

患者女，25岁。初孕妇。停经50天，下腹痛伴阴道少量流血半天。妇科检查：子宫前位，约50天妊娠大小，软，

宫口未开。

103. 1天后下腹阵发性疼痛明显，阴道流血量增多，妇科检查：子宫约50天妊娠大小，可见宫口处有胚胎组织堵塞。此时最可能诊断是

- A. 先兆流产
- B. 不全流产
- C. 完全性葡萄胎
- D. 难免流产
- E. 完全流产

104. 此时最有效的处理措施是

- A. 尽快行宫颈环扎术
- B. 阴道放置天然黄体酮
- C. 尽快行清宫术
- D. 纱布条填塞阴道压迫止血
- E. 静脉注射止血药物

(105~106 题共用题干)

男婴，10个月，母乳喂养。面色苍白1个月。出生以来一直母乳喂养。查体：发育可，皮肤粘膜苍白，肝肋下3cm，脾肋下1cm。实验室检查：血Hb74g/L，RBC $2.8 \times 10^{12}/L$ 。外周血涂片：血细胞大小不等，以小细胞为主，中央淡染区扩大。

105. 最有助于诊断的检查

- A. 铁代谢
- B. 骨髓活检
- C. 血清维生素B₁₂和叶酸
- D. 胸部X线片
- E. 血Hb

106. 最主要的治疗措施是

- A. 口服铁剂和维生素C
- B. 合理营养，及时添加辅食
- C. 口服维生素B₁₂和叶酸
- D. 口服泼尼松
- E. 输血

(107~109 题共用题干)

2023 临床助理历年真题

患者，女，25岁。发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑5天查体：双下肢和腹部皮肤有多处瘀斑，双侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大，活动无压痛，最大者为2.0cm×2.5cm，胸骨压痛(+)，腹软，肝肋下1.5cm脾肋下2cm。化验：Hb78g/L，WBC18×10⁹/L，分类可见原始和幼稚细胞，PLT:25×10⁹/L，网织红细胞0.002。

107. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 非霍奇金淋巴瘤
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 霍奇金淋巴瘤
- E. 系统性红斑狼疮

108. 为明确诊断首选的检查是

- A. 骨髓细胞学检查
- B. 淋巴结活检
- C. 骨髓活检
- D. 腹部B超
- E. ANA谱

109. 明确诊断后首选的治疗措施是

- A. ABVD方案化疗
- B. VDLP方案化疗
- C. 给予大剂量糖皮质激素
- D. DA方案化疗
- E. CHOP方案化疗

(110~111题共用题干)

患者女，26岁。停经9周，阴道不规则流血2周，阴道检查无异常，子宫如孕4月大。超声示宫腔内充满光点和小囊状强回声。

110. 最可能的诊断是

- A. 葡萄胎
- B. 绒癌
- C. 双胎妊娠
- D. 妊娠合并子宫肌瘤
- E. 胎盘早剥

111. 目前最佳的处理方法是

- A. 清宫术
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 保胎治疗
- E. 全子宫切除术

(112~113题共用题干)

患者，男，26岁。自觉尿频、尿痛2天就诊，多个性伴侣，6天前有不洁性交史。查体：尿道口有黄色分泌物流出。

112. 考虑诊断为

- A. 梅毒
- B. 生殖器疱疹
- C. 淋病
- D. 天疱疮
- E. 艾滋病

113. 首选的治疗药物是

- A. 多环西素
- B. 青霉素
- C. 头孢曲松
- D. 四环素
- E. 红霉素

(114~115题共用题干)

患者，女，16岁。双下肢伸侧皮疹3天，皮疹分批出现，两侧对称，颜色鲜红，伴腹痛及其关节痛，查体：血小板100×10⁹/L，WBC10×10⁹/L，HB110g/L，凝血时间正常。尿蛋白：(+++)。

114. 最可能的诊断是

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 过敏性紫癜
- C. 急性白血病
- D. 再生障碍性贫血
- E. 血友病

2023 临床助理历年真题

115. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 束臂试验
- B. Coombs 试验
- C. 骨髓穿刺
- D. 胸部 X 线
- E. 尿常规

(116~117 题共用题干)

患者, 男, 25 岁。右胫前红肿 2 天, 畏寒、发热 1 天, 既往足癣 5 年。查体: 右胫前皮肤片状红疹, 颜色鲜红, 中间较淡, 边缘清楚, 微隆起, 指压稍褪色, 边界清, 皮温增高。右腹股沟淋巴结肿痛考虑诊断为。

116. 最可能诊断的是

- A. 丹毒
- B. 蜂窝组织炎
- C. 疖
- D. 疔
- E. 气性坏疽

117. 最可能的致病菌是

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 表皮葡萄球菌
- D. 梭形芽孢杆菌
- E. 乙型溶血性链球菌

(118~120 题共用题干)

患者, 女性, 50 岁, 近来月经不规律, 潮热, 烦躁, 查体: 腹部检查未见异常, 妇科检查正常, 双附件未见异常增厚。

118. 可能考虑诊断

- A. 围绝经期综合征
- B. 老年性阴道炎
- C. 细菌性阴道炎
- D. 子宫性闭经
- E. 子宫内膜炎

119. 首选检查是

- A. 腹部 B 超

B. 阴道分泌物刮片

- C. 女性激素
- D. 宫腔镜
- E. HCG

120. 若该患者在行激素治疗后, 出现月经淋漓不尽, 且分段诊刮发现子宫内膜异常增厚 0.3mm, 应与何疾病进行鉴别

- A. 子宫内膜炎
- B. 子宫内膜癌
- C. 子宫腺肌病
- D. 葡萄胎
- E. 子宫肌瘤

(121~122 题共用题干)

患者, 男童, 8 个月, 突然抽搐持续 2 分钟, 发作时意识不清, 自行缓解。3 天内抽搐 4 次, 醒后活泼如常, 发作期间体温正常。查体: 可见枕秃, 枕部颅骨有乒乓球感。

121. 最可能的诊断是

- A. 蛋白质-能量营养不良
- B. 维生素 D 缺乏性佝偻病
- C. 癫痫
- D. 维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- E. 婴儿痉挛症

122. 首选的治疗是

- A. 静脉注射葡萄糖酸钙
- B. 地西泮
- C. 苯巴比妥
- D. 吸氧
- E. 雾化

(123~124 题共用题干)

患者女性, 79 岁, 膝关节疼痛 3 年, 活动后减轻, 冬天或潮湿时加重。查体: 膝关节内翻, WBC $1.2 \times 10^9/L$, NO. 4, RF(-)。

123. 该病可能为

2023 临床助理历年真题

- A. 痛风性关节炎
- B. 骨关节炎
- C. 损伤性关节炎
- D. 创伤性关节炎
- E. 类风湿关节炎

124. 首选的检查是

- A. 高分辨 CTA
- B. X 线片
- C. B 超
- D. MRI 平扫
- E. MRI 增强

(125~126 题共用题干)

女婴，10 个月，发热伴呕吐，腹泻 2 天，大便 10-15 次每天，呈蛋花汤状，呕吐频繁，尿量极少，查体： $T38.3^{\circ}\text{C}$ ，精神萎靡，皮肤弹性差呈花纹状，前囟、眼窝可见明显凹陷，四肢阙冷，血钠 135mmol ，粪镜检偶见白细胞。

125. 该患儿脱水程度是

- A. 中度等渗性脱水
- B. 中度低渗性脱水
- C. 重度高渗性脱水
- D. 重度等渗性脱水
- E. 重度低渗性脱水

126. 首先应选择的补液类型是

- A. 2:1 溶液
- B. 口服补液盐
- C. 静脉注射 0.9%氯化钠溶液
- D. 4:3:2 溶液
- E. 2:3:1 溶液

(127~128 题共用题干)

患者女性，吃饭时突发右侧筷子脱落，呼之不应，瘫倒在地，10 分钟后清醒，但右侧肢体持续不能活动，右侧肌力 1 级，既往有风湿性心脏瓣膜病史 5 年。

127. 诊断为

- A. 脑血栓形成
- B. 脑栓塞
- C. TIA
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 急性肺栓塞

128. 最有意义的检查

- A. 脑电图
- B. 肌电图
- C. 脑 CT
- D. MRI
- E. DSA

(129~130 题共用题干)

患者女，20 岁。2 年以来经常反复思考某个问题，如：人思考问题多了会不会伤害脑细胞。虽然知道想问题不会伤害脑细胞，却不敢放心，仍要反复思考，感觉痛苦。近半年来因为怕脏，出现反复多次，甚至长时间洗手，因为浪费时间，耽误学习和工作，又难以控制而苦恼，头颅 CT 检查正常。

129. 该患者最可能的诊断是

- A. 分离障碍
- B. 强迫障碍
- C. 精神分裂症
- D. 广泛性焦虑症
- E. 抑郁症

130. 该患者最适合选用的药物是

- A. 碳酸锂
- B. 氟西汀
- C. 苯妥英钠
- D. 卡马西平
- E. 地西洋

B1 型选择题

(131~132 题共用备选答案)

- A. 正细胞低色素性贫血
- B. 正细胞正色素性贫血
- C. 大细胞正色素性贫血

2023 临床助理历年真题

D. 小细胞正色素性贫血

E. 小细胞低色素性贫血

131. 按红细胞形态学，急性失血性贫血属于

132. 按红细胞形态学，慢性失血性贫血属于

(133~134 题共用备选答案)

A. 情绪不稳

B. 焦虑

C. 易激惹

D. 恐惧

E. 情绪高涨

133. 患者常因极小的事情而产生较强烈的情绪反应，该症状为

134. 患者惶恐不安，坐立不安，十分紧张，该症状为

(135~136 题共用备选答案)

A. 胎膜早破

B. 子宫破裂

C. 先兆子宫破裂

D. 胎盘早剥

E. 前置胎盘

135. 初产妇，25 岁，孕 37 周，重度子痫前期，昨晚突然出现腹痛伴少量阴道出血，最可能的诊断是

136. 初产妇，23 岁，临产 2 小时后突发剧烈腹痛，烦躁不安，下腹拒按，导尿淡红色血性液体，胎心 130-140 次/分，既往子宫肌瘤切除手术史，最可能的诊断是

(137~138 题共用备选答案)

A. 口服降糖药

B. 胰岛素皮下注射

C. 口服药物及胰岛素治疗

D. 胰岛素静脉注射

E. 单纯饮食+运动控制

137. 高渗高血糖综合征选用药物是

138. 妊娠合并 2 型糖尿病选用

(139~140 题共用备选答案)

A. 痛风性关节炎

B. 类风湿性关节炎

C. 银屑病关节炎

D. 骨关节炎

E. 成人 still 病

139. 属于脊柱型关节炎的是

140. 属于退行性关节炎是

(141~142 题共用备选答案)

A. 神经系统

B. 淋巴系统

C. 生殖系统

D. 呼吸系统

E. 体格发育

141. 婴儿出生后各系统、器官的生长发育不平衡，呈先快后慢的是

142. 小儿生长发育速度呈快、慢、快的是

(143~144 题共用备选答案)

A. 肾结核

B. 肾细胞癌

C. 肾积水

D. 肾盂癌

E. 肾结石

143. 临床表现为无痛性肉眼血尿，静脉尿路造影显示肾盂拉长，挤压，变形，诊断为

144. 临床表现为无痛性肉眼血尿，静脉尿路造影显示肾盂充盈缺损，诊断为

2023 临床助理历年真题

(145~146 题共用备选答案)

- A. 急进性肾小球肾炎
 - B. 肾前性肾小球肾炎
 - C. 肾后性肾小球肾炎
 - D. 肾间质性肾功能损害
 - E. 急性肾小管坏死
145. 肝硬化腹水大量失代偿期，少尿，尿比重 1.025，尿钠 10mmol/L，最可能的诊断是什么

146. 患者食入生鱼胆后出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻伴少尿，尿比重 1.010，尿钠 45mmol/L，BUN 8.97mmol/L。少尿的原因最可能的诊断是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 中央前回
 - B. 锥体外系统
 - C. 小脑
 - D. 枕叶
 - E. 颞叶
147. 癫痫的部分复杂性发作的病损在
148. 癫痫的部分运动性发作的病损在

(149~150 题共用备选答案)

- A. 感觉减退
 - B. 感觉过敏
 - C. 内感性不适
 - D. 内脏性幻觉
 - E. 错觉
149. 患者有时感到躯体内部出现牵拉，挤压，蚂蚁爬行感，性质难以描述，也没有明确性的是
150. 患者有时感到胃在扭转，断裂或穿孔了是

第二单元

A1/A2 型选择题

1. 以下属于第二级预防的是
- A. 疾病的早发现早治疗
 - B. 健康促进
 - C. 预防并发症
 - D. 预防接种
 - E. 康复治疗
2. 下列需要临终关怀的患者是
- A. 晚期肿瘤患者
 - B. 慢性病患者
 - C. 心血管疾病患者
 - D. 严重外伤患者
 - E. 危重症患者
3. 结肠癌最常见的发病部位是
- A. 直肠
 - B. 乙状结肠
 - C. 回盲部
 - D. 回肠末端
 - E. 升结肠
4. 诊断胆囊结石的简单而可靠的方法是
- A. B 超
 - B. MRI
 - C. 逆行胰胆管造影
 - D. 腹部 X 线平片
 - E. 口服法胆囊造影 (RCPC)
5. 生物转化过程中最重要的作用是
- A. 使毒物的毒性降低
 - B. 使药物失效
 - C. 使生物活性物质灭活
 - D. 使某些物质毒性增强
 - E. 增强非营养性物质极性，利于排泄
6. 因对胎儿和婴儿的软骨发育有影响，孕妇和哺乳期妇女不宜使用的药物
- A. 喹诺酮类

2023 临床助理历年真题

- B. 氨基糖苷类
- C. 四环素类
- D. 磺胺类
- E. 青霉素类

7. 急性弥漫性腹膜炎提示病情恶化的体征是

- A. 肠鸣音减弱或消失
- B. 压痛程度加重
- C. 恶心呕吐
- D. 便秘
- E. 腹胀加重

8. 机械性肠梗阻最常见的原因是

- A. 炎症性肠炎
- B. 术后肠粘连
- C. 肿瘤
- D. 粪石
- E. 蛔虫

9. 腹外疝内容物回纳后，按压住深环，不再复出的疝是下列哪个

- A. 腹股沟直疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 股疝
- D. 切口疝
- E. 白线疝

10. 关于酶活性中心的叙述，正确的是

- A. 结合产物的结合基因
- B. 结合底物并发挥作用的结合基因
- C. 催化底物变成产物的结合基因
- D. 一级结构的基因基团
- E. 酶活性中心催化基因

11. 有关于肝性脑病以下措施正确的是

- A. 乳果糖导泻灌肠
- B. 补充芳香类氨基酸
- C. 予苯巴比妥类镇静
- D. 给予高蛋白饮食
- E. 腹腔积液较多时增加利尿剂用量

12. 某年某地孕产妇总人数为 600 人，孕产妇死亡人数为 120 人，则该地孕产妇死亡率为

- A. 0.15
- B. 0.2
- C. 0.25
- D. 0.3
- E. 0.35

13. 心包积液 X 线检查的心影形态是

- A. 普大心
- B. 烧瓶心
- C. 靴型心
- D. 梨形心
- E. 主动脉型心

14. 引起肺动脉主干栓塞的栓子来自

- A. 骨折引起的脂肪栓塞
- B. 脱落的左室壁附壁栓子
- C. 下肢股静脉脱落的栓子
- D. 羊水栓塞
- E. 颈静脉破裂的空气栓塞

15. 反流性食管炎的首选治疗药物是

- A. 奥美拉唑
- B. 苯海拉明
- C. 雷尼替丁
- D. 肾上腺皮质激素
- E. 异丙嗪

16. 糖原分解得到的初产物是

- A. 葡萄糖
- B. 1-磷酸果糖
- C. 6-磷酸果糖
- D. 1-磷酸葡萄糖
- E. 6-磷酸葡萄糖

17. 国家对传染病的预防方针是什么？

- A. 防治结合
- B. 预防为主

2023 临床助理历年真题

- C. 分类管理
- D. 依靠科学
- E. 依靠群众

18. 给依法从事终止妊娠的医疗工作机构发放许可证书的是

- A. 省级妇幼保健机构
- B. 设区的市级妇幼保健机构
- C. 设区的市级卫生行政部门
- D. 省级卫生行政部门
- E. 县级卫生行政部门

19. 在检验病因假设时，以下研究设计论述强度最高的是

- A. 队列研究
- B. 生态研究
- C. 筛检
- D. 现况研究
- E. 病例对照研究

20. 腹部闭合性损伤患者，术中应首先探查

- A. 胰腺
- B. 肝、脾
- C. 胃、十二指肠
- D. 结肠
- E. 盆腔器官

21. 某市进行老年人新型冠状病毒疫苗接种率调查，首先按照经济情况将该地区分为好、中、差三类，然后在每类中随机抽取 1/10 的老年人进行调查，该方法为

- A. 单纯随机抽样
- B. 分层抽样
- C. 整群抽样
- D. 系统抽样
- E. 多级抽样

22. 女性，18 岁，因糖尿病未系统治疗，现因糖尿病足医生建议截肢，患

者表情淡漠，不同意治疗，反应的角色行为是

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为冲突
- C. 角色行为减退
- D. 角色行为强化
- E. 角色行为异常

23. 女童，4 岁，因父母离婚导致抑郁，适合该患者的心理评估为

- A. 卡特尔测试
- B. 16 型人格测试
- C. 绘画投射评估
- D. 汉密尔顿抑郁量表评估
- E. 艾特森人格评估

24. 在伦理分科中，医学伦理属于哪类

- A. 环境伦理
- B. 元伦理
- C. 规范伦理
- D. 应用性伦理
- E. 描述原理

25. 可诊断医院感染的是

- A. 新生儿住院分娩时感染
- B. 入院前感染
- C. 入院时感染
- D. 入院后感染
- E. 就诊后感染

26. 能够加快 β 氧化的是

- A. 低血糖
- B. 低血脂
- C. 低血压
- D. 高血压
- E. 高血糖

27. 开放性气胸主要的病理生理改变是

- A. 反常呼吸运动
- B. 肺内气体对流
- C. 纵隔扑动

2023 临床助理历年真题

- D. 呼气时, 纵隔显著向健侧移位
- E. 吸气时, 纵膈显著向患侧移位

28. 将骨骼肌细胞膜的电变化和肌细胞内的收缩过程耦联起来的关键部位是

- A. 横管系统
- B. 纵管系统
- C. 肌浆
- D. 纵管终末池
- E. 三联管结构

29. 目前我国医学伦理学主要的研究方向是

- A. 公民道德问题
- B. 临床医学问题
- C. 公共道德的学说和体系
- D. 生命科学的发展
- E. 医学实践中的道德问题

30. 男, 25 岁, 由 120 送往医院, 患者昏迷, 需要紧急做手术, 需告知谁

- A. 管床医生
- B. 上级医生
- C. 120
- D. 警察
- E. 医院领导

31. 支气管哮喘长期维持治疗

- A. 吸入短效 β_2 受体激动剂
- B. 吸入长效 β_2 受体激动剂
- C. 口服短效 β_2 受体激动剂
- D. 吸入糖皮质激素
- E. 色甘酸钠

32. 卡托普利治疗慢性心力衰竭的禁忌症

- A. 支气管哮喘
- B. 消化性溃疡
- C. 糖尿病
- D. 双侧肾动脉狭窄
- E. 心肌缺血

33. 医生利用自己职务之便开处方而谋求利益的应予以的处罚为

- A. 责令改正
- B. 追究刑事责任
- C. 限制处方权
- D. 停职培训
- E. 吊销执业证

34. 连枷胸最突出的症状是

- A. 反常呼吸运动
- B. 沉默呼吸
- C. 胸腹矛盾运动
- D. 间断呼吸
- E. 胸壁软化

35. 检查某患者血清滴度, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:220, 预描述其抗体滴度的平均水平, 用哪种指标较好

- A. 四份间距
- B. 算术平均数
- C. 极差
- D. 标准差
- E. 几何均数

36. 心脏骤停最常见发生的原因

- A. 心室停搏
- B. 缓慢性心律失常
- C. 室速室颤
- D. 终末期心力衰竭
- E. 无脉性电活动

37. 主动脉狭窄的三联征

- A. 呼吸困难, 水肿, 心绞痛
- B. 呼吸困难, 晕厥, 心绞痛
- C. 水肿, 晕厥, 心绞痛
- D. 水肿, 晕厥, 咯血
- E. 呼吸困难, 晕厥, 水肿

38. 2 岁小孩离开母亲后哭泣、烦躁不安, 属于哪种需要

2023 临床助理历年真题

- A. 生理需要
- B. 依赖需要
- C. 安全需要
- D. 尊重需要
- E. 自我需要

39. 心室颤动导致不可逆性脑损害，其发作至少持续

- A. 30 秒
- B. 1~3 分钟
- C. 4~6 分钟
- D. 7~9 分钟
- E. 10 分钟

40. 终末肝硬化的治疗方案是

- A. 保肝治疗
- B. 抗生素治疗
- C. 抗病毒治疗
- D. 肝移植
- E. 人工肝移植

41. 能通过产生激素，从而导致相应临床表现的肿瘤是

- A. 肺小细胞癌
- B. 乳腺癌
- C. 甲状腺髓样癌
- D. 直肠未分化癌
- E. 胃乳头状癌

42. 急性心肌梗死 24 小时内发生死亡的原是

- A. 室壁瘤
- B. 心脏破裂
- C. 心律失常
- D. 急性心力衰竭
- E. 心源性休克

43. 轻度心衰摄入钠应控制在

- A. 2~3g/d
- B. 6~8g/d
- C. 4~5g/d

- D. <1g/d
- E. 10~15g/d

44. 具有内分泌功能的癌是

- A. 肺小细胞癌
- B. 乳腺癌
- C. 卵巢癌
- D. 肝癌
- E. 类癌

45. 重症肺炎主要的诊断依据是

- A. 意识障碍(或定向障碍)
- B. 血压 <90, 需大量补液
- C. 氧合指数 ≤ 250
- D. 需机械通气
- E. 需气管插管

46. 不属于重症哮喘的体征是

- A. 双肺布满哮鸣音
- B. 喘息加重
- C. 呼吸困难
- D. 咳嗽加重
- E. 水冲脉

47. 食用新鲜蚕豆发生溶血性黄疸患者缺乏的酶是

- A. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
- B. 琥珀酸脱氢酶
- C. 异柠檬酸脱氢酶
- D. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
- E. 6-磷酸葡萄糖醛酸脱氢酶

48. 以下哪一项肺功能测定对阻塞性肺气肿的诊断有决定性意义

- A. $RV/TLC > 40\%$, MVV 预计值 80%, $FEV_1 >$ 正常 60%
- B. $RV/TLC > 40\%$, $MVV >$ 预计值 80%, FEV_1 正常 60%
- C. $RV/TLC > 40\%$, FEV_1 预计值 80%, FEV_1/FVC 小于 70%
- D. $RV/TLC < 40\%$, MVV 预计值 80%,

2023 临床助理历年真题

FEV1>正常 60%

E. RV/TLC <40%，MVV 预计值 80%，
FEV1 正常 60%

49. 最适合洋地黄使用的情况是

- A. 二尖瓣狭窄+肺动脉高压
- B. 顽固性心绞痛
- C. 肥厚型心肌病
- D. 缩窄性心包炎+中心静脉压高
- E. 扩张型心肌病+心衰

50. 心脏猝死最常见于

- A. 心肌病
- B. 二尖瓣脱垂
- C. 长 QT 间期综合症
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 风湿性心肌炎

51. 男，PH7.38，PaCO₂>67mmHg，
PaO₂<50mmHg，HCO₃⁻>47mmol/L，该
患者是什么类型的酸碱失衡

- A. 代谢性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

52. 男，60 岁，乏力明显，黄疸、消
瘦，腹部有肿块

- A. 急性胆囊炎
- B. 胆囊结石
- C. 胆总管结石
- D. 胰腺癌
- E. 胰腺炎

53. 患者腹痛行手术治疗，术中见阑尾
黑色考虑是

- A. 绞窄性阑尾炎
- B. 坏疽性阑尾炎
- C. 穿孔性阑尾炎
- D. 阑尾周围脓肿

E. 单纯性阑尾炎

54. 男，36 岁，夏季下午用硝酸清洗
工厂金属模具，突发胸闷，气促，呼
吸困难，入院治疗，该患者最可能是
吸入什么气体导致

- A. 一氧化碳中毒
- B. 二氧化碳中毒
- C. 氮氧化合物
- D. 氯气
- E. 氟化氢

55. 男，63 岁，体检现肺门占位 1 周，
既往吸烟 30 年。CT 示：右上肺肺门肿
块，3×2×2cm，手术切除右肺上叶，
最可能改变为

- A. 异细胞增生，排列成腺样
- B. 上皮样肉芽肿，伴干酪样坏死
- C. 软骨增生，排列乱，见支气管上皮
陷入
- D. 上皮样肉芽肿，伴纤维组织增生
- E. 异形细胞巢内可见角化珠

56. 男，18 岁，剧烈活动后突发右侧
胸痛伴 5 小时，查体：右胸叩诊呈鼓音，
右侧呼吸音低，X 线：气胸腔 70%，最
可能的诊断是

- A. 原发性自发性气胸
- B. 自发性支气管破裂
- C. 继发性自发性气胸
- D. 自发性血胸
- E. 自发性食管破裂

57. 女，28 岁，咳嗽、咳痰两周，体
温 38℃，听诊肺部有湿啰音。胸部显
示：有外高内低弧形影，首选应做什么
检查

- A. 肺活检
- B. 痰找结核杆菌
- C. 胸水常规加生化
- D. 痰培养

2023 临床助理历年真题

E. CT

58. 男性，车祸外伤撞击到左肋部，呼吸深快，血压 90/60mmHg，腹部穿刺抽出不凝血。此时最可能的诊断是

- A. 肝破裂
- B. 肾破裂
- C. 脾破裂
- D. 结肠破裂
- E. 小肠破裂

59. 工厂工人食物中毒，检测发现是食盐问题，中毒原因是

- A. 亚硝酸盐中毒
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 厌氧菌

60. 女，59 岁，多发性骨折入院，血压 70/30mmHg，给予补充血容量及静脉滴注去甲肾上腺素治疗，症状缓解，但滴注处皮肤出现发白、变冷。这时应皮下浸润注射下列哪种药物

- A. 阿托品
- B. 山莨菪碱
- C. 普萘洛尔
- D. 地西洋
- E. 酚妥拉明

61. 男，30 岁，因乱开处方被禁止处方权 3 个月，到期后重新参加考核恢复执业，请问医师定期考核多长时间一次

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

62. 男性，58 岁，上腹隐痛 10 余年，

加重 3 个月，腹痛无明显规律，伴早饱乏力，近 3 个月体重减少 5kg，查体：腹平软，上腹压痛无肌紧张、反跳痛，肝脾未见异常，粪潜血阳性，最可能

- A. 胃溃疡
- B. 慢性浅表性胃炎
- C. 慢性萎缩性胃炎
- D. 胃癌
- E. 急性糜烂性出血性胃炎

63. 男孩，6 岁，被妈妈带去动物园游玩，回来后给爷爷表演长颈鹿吃树叶和树袋熊喝水。此种记忆属于什么

- A. 逻辑记忆
- B. 瞬时记忆
- C. 有意记忆
- D. 无意记忆
- E. 短暂记忆

64. 某心理医生成功通过认知治疗挽救一名自杀倾向患者。在某次学术交流会中，该医生用真实姓名介绍这例成功的个案，违背了心理治疗原则

- A. 回避原则
- B. 理性原则
- C. 真诚原则
- D. 保密原则
- E. 中立原则

65. 男，60 岁，右半结肠切除术后两天，测中心静脉压 5cmH₂O，血压 90/60mmHg，既往心衰病史。下列处理措施最恰当

- A. 床旁心电图
- B. 强心药
- C. 补液试验
- D. 腹部 CT
- E. 大量补液

66. 男性，30 岁，上腹部疼痛数小时，

2023 临床助理历年真题

现出现右下腹疼痛加重，肠鸣音减弱伴有压痛反跳痛，考虑诊断为

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 肠梗阻
- E. 自发性腹膜炎

67. 患者出现上腹部疼痛，伴恶心呕吐，呕吐后不缓解，伴尿色深。查体：体温 39.5℃，血压 80/40mmHg，神志模糊，巩膜可见黄染，右上腹有深压痛，以下治疗中最重要的治疗措施是

- A. 镇痛
- B. 大量补液，补充血容量
- C. 手术切开胆管减压，T 管引流
- D. 抗感染
- E. 利尿

68. 老年男性，进行性吞咽困难 6 年，伴有胸骨烧灼感，行胃镜检查提示：胃与食管连接处见管壁僵硬，充盈性缺损。考虑诊断为

- A. 食管炎
- B. 食管平滑肌瘤
- C. 贲门失弛缓症
- D. 食管癌
- E. 食管静脉曲张

69. 女性，52 岁，间断上腹疼痛 3 年。查体：上腹部轻压痛。胃镜示：胃窦皱襞平坦，黏膜粗糙无光泽，黏膜下血管透见。此病例考虑诊断为

- A. 慢性非萎缩性胃炎
- B. 慢性萎缩性胃炎
- C. 胃溃疡
- D. 胃癌
- E. 浅表性胃炎

70. 女性，45 岁，饱餐后突发右上腹痛两天，恶心、呕吐胃内容物 1 次。

查体：T:37.3℃。BP130/80mmhg，右上腹压痛无反跳痛，Murphy 征阳性，血 WBC $14 \times 10^9/L$ ，NO.82，为明确诊断首选

- A. 腹部 CT
- B. 内镜逆行胰胆管造影
- C. 腹部立位 X 线平片
- D. 腹部 B 超
- E. 磁共振肝胆胰

71. 男性，70 岁，排便次数增加、大便变细 3 月余，血便 2 周，伴有里急后重感，首选的检查是

- A. 结肠镜
- B. 大便常规
- C. CEA 检查
- D. 直肠指检
- E. 腹部 CT

72. 48 岁中年女性，三年来感上腹部隐痛，餐后加重，偶有反酸嗝气，无呕吐、便血。口服奥美拉唑可缓解，钡餐造影示：胃窦小弯侧充盈缺损，可见 5cm 龛影。诊断考虑

- A. 胃癌
- B. 胃溃疡
- C. 淋巴结炎
- D. 慢性胃炎
- E. 急性胃炎

73. 一孕妇产检发现是三胞胎，孕妇身体状况不好，28 周早产，住院保胎后，医生建议减胎治疗，建议留胎 1 孩，但家属拒绝。出生后死亡两胎，该医生没有违背的原则是

- A. 尊重与不伤害
- B. 有利与尊重
- C. 有利与公正
- D. 公正与尊重
- E. 尊重与自主

2023 临床助理历年真题

74. 男性，46岁，查体：37.5，低热盗汗乏力数天，近期出现腹胀、腹痛，查体可有柔韧感，移动性浊音阳性，腹水常规：黄绿色，白细胞 $600 \times 10^6/L$ ，多核细胞 0.20，单核细胞 0.80。考虑诊断为

- A. 自发性细菌性腹膜炎
- B. 肝硬化腹水
- C. 结核性腹膜炎
- D. 恶性腹水
- E. 腹膜间皮瘤

75. 某阑尾炎患者，医师开医嘱头孢克肟 4g，静脉注射，护士按照医嘱下药，后护士抄写医嘱时发现医师未开皮试，自己也忘记了，观察患者输液后有无异常，该医护人员违背的伦理原则是

- A. 患者至上
- B. 有利原则
- C. 尊重原则
- D. 不伤害原则
- E. 公正原则

76. 患者男性，呕血、黑便两天，虹膜黄染，腹部膨隆，腹壁静脉曲张；肝肋下未触及，脾肋下 1cm，质软；移动性浊音(+)。既往乙肝肝炎病史 20 年，该患者上消化道出血最可能的原因是

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 食管胃底静脉曲张
- D. 急性胃炎
- E. 急性胆囊炎

77. 患者，男性，60岁，上腹部间断疼痛 10 年，加重 3 个月，与进食无关，疼痛不规律，消瘦 3.2kg。粪隐血(+)，诊断为

- A. 十二指肠溃疡
- B. 胃癌

- C. 胃溃疡
- D. 慢性浅表性胃炎
- E. 慢性萎缩性胃炎

78. 女，40岁。1小时前服敌百虫 200ml，查体：躁动，瞳孔缩小，四肢强直、肺部可闻及湿啰音。下列处理措施不恰当的是

- A. 药物导泻
- B. 2%碳酸氢钠溶液洗胃
- C. 应用解磷定
- D. 静脉应用阿托品
- E. 清洗呕吐物污染的皮肤

79. 患者，男，60岁，突发喘憋 1 小时。查体：BP160/70mmHg，双肺布满湿性啰音，心率 105 次/分，该患者最适宜的治疗措施是

- A. 口服氨苯喋呤
- B. 静脉滴注小剂量多巴胺
- C. 静脉推注呋塞米
- D. 口服氢氯噻嗪
- E. 辛伐他汀

80. 患者男，63岁。因剧烈胸痛 3 小时入院治疗。心电图示窦性心律，心率 54 次/分，II、III、aVF 导联 ST 段抬高 0.3mV，其余导联 ST 段正常。介入治疗前植入临时起搏器起搏心室，以 60 次/分钟频率起搏时，监测动脉血压由 100/70mmHg 降低至 85/60mmHg。导致上述血压变化的最可能原因是

- A. 起搏心律时外周血管阻力降低致血压下降
- B. 合并右心室梗死，右心室排血量减少致左心室充盈减少
- C. 起搏心律时心率增快，舒张期缩短导致回心血量减少
- D. 起搏心律时，心肌收缩力较弱致心排血量降低
- E. 起搏心律时失去心房收缩对心室的

2023 临床助理历年真题

充盈作用，左心室充盈减少

81. 男，50岁。持续胸痛8小时，喘憋2小时入院。心电图示I、AVL、V1~V6导联ST段抬高0.1~0.4mV。超声心动图左心室扩大，左室射血分数40%。既往高血压病史10余年，糖尿病史5年，药物控制满意。改善患者预后的治疗不包括

- A. 阿司匹林
- B. 美托洛尔
- C. 硝酸异山梨酯
- D. 利他普利
- E. 介入治疗

82. 23岁。因心悸1个月就诊。查体:BP120/80mmHg，心率85次/分，律不齐。心电图示:窦性心律可见提前出现的P波形态与窦性P波不同P-R间期0.14秒，QRS波群形态正常。该患者心悸最可能的原因是

- A. 窦性心动过速
- B. 心房颤动
- C. 窦性心动过缓
- D. 室性期前收缩
- E. 房性期前收缩

83. 男，34岁，发热1周伴胸痛，用硝酸甘油无效；体检:心音低沉，有舒张期附加音，血压110/80mmHg，肘部静脉压180mmH2O心电图:ST段抬高，弓背向下，未见病理性Q波，诊断可能为

- A. 急性心肌梗死
- B. 缩窄性心包炎
- C. 变异性心绞痛
- D. 稳定型心绞痛
- E. 急性渗出性心包炎

84. 男，56岁，持续性胸痛15小时，呼吸困难3小时，查体:血压

90/60mmHg，心率120次/分，心律齐，心电图示V1~V6呈qs型，患者最可能出现的特异性体征是

- A. 下肢水肿
- B. 第一心音亢进
- C. 颈静脉怒张
- D. 心尖部舒张杂音
- E. 舒张期奔马律

85. 患者男，56岁，患稳定型心绞痛10年，近2月上楼梯时感到喘息、心悸，休息时无症状。完善相关检查:BNP450ng/L。心脏彩超提示左室前壁及心尖部运动减低，左室EF40%，该患者的心功能分级是

- A. NYHA分级III级
- B. NYHA分级II级
- C. Killip分级II级
- D. Killip分级III级
- E. Killip分级I级

86. 男，68岁，直肠癌术后4天，今日出现左下肢肿胀伴股三角区疼痛，查体:左下肢浅静脉扩张、皮温明显升高，股三角区压痛明显。该患者最可能诊断为

- A. 动静脉瘘
- B. 下肢慢性静脉功能不全
- C. 下肢深静脉血栓形成
- D. 雷诺综合征
- E. 血栓性闭塞性脉管炎

87. 男，18岁，右上腹疼痛，伴发热，体温39.5℃呼吸急促，血压85/65mmHg，查体:皮肤湿冷右上腹有明显的压痛反跳痛。首选的治疗措施是

- A. 急诊手术
- B. 抗生素治疗
- C. 补血容量
- D. 胃肠减压

E. 继续观察

88. 男, 50 岁。因持续心悸 5 天入院。既往体检查体:BP142/80mmHg, 心界不大, 心率 132 次/分, 心律不齐。心电图示:P 波消失, 代之以 f 波, 心室律绝对不规则。该患者控制心室率宜首选

- A. 华法林
- B. 腺苷
- C. 胺碘酮
- D. 比索洛尔
- E. 普罗帕酮

89. 患者, 男, 68 岁, 直肠癌术后 3 天, 手术顺利, 白天昏睡, 或被唤醒后又很快入睡, 晚上惊恐不安, 言语凌乱, 难以理解, 双腿跨车状, 双上肢胡乱挥舞, 患者突出的临床症状是

- A. 昏睡状态
- B. 幻觉状态
- C. 谵妄状态
- D. 应激状态
- E. 妄想状态

90. 男性, 30 岁, 1 年前下岗。近 5 个月来觉得邻居都在议论他, 常不怀好意地盯着他, 有时对着窗外大骂, 自语自笑, 整天闭门不出, 拨 110 电话要求保护。该病人不存在

- A. 幻听
- B. 关系妄想
- C. 被害妄想
- D. 情绪低落
- E. 行为退缩

91. 男, 68 岁, 间断性咳嗽、咳痰 10 余年, 活动后气短 2 年, 曾行胸部 X 线片示双肺纹理增粗、紊乱, 膈肌低平, 吸烟史 40 年, 20 支/天, 已戒 3 年。为了明确诊断, 首选的检查是

- A. 胸部 X 线
- B. 高分辨 CT
- C. 支气管镜
- D. 血气分析
- E. 肺功能

92. 患者, 男, 68 岁。反复咳嗽、喘息 20 年余, 加重 1 周入院。不吸氧时动脉血气分析结果显示 PaO₂55mmHg, PaCO₂60mmHg。该患者发生低氧血症的机制主要是

- A. 肺泡通气量降低
- B. 肺内动静脉分流增加
- C. 通气血流比例失调
- D. 弥散量降低
- E. 耗氧量增加

93. 女, 28 岁。发热、咳嗽 2 个月, 胸部 X 线片示左上肺不规则片状阴影, 予抗结核治疗 1 个月余。查体:T36.5°C。巩膜稍黄染, 双肺未闻及干湿罗音。血 WBC4.3×10⁹/L, NO.55。肝功能检查示 ALT、AST 均正常。总胆红素 40.6μmol/L, 直接胆红素 17.8μmol/L。该患者目前需停用的药物是

- A. 利福平
- B. 异烟肼
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 链霉素

94. 男, 35 岁。车祸引起纵隔扑动, 经急救查体: P120 次/min, R32 次/min, BP95/65mmHg, 神志清楚, 口唇发绀, 双肺可闻及湿啰音。面罩吸氧后氧饱和度监测显示为 85%。该患者应立即采取的治疗措施是

- A. 急诊手术
- B. 无创通气
- C. 包扎固定

2023 临床助理历年真题

- D. 胸腔穿刺抽液
- E. 胸腔闭式引流

95. 男, 23 岁, 既往史有输血史, 胸部 X 线提示肺部有间质性病变, 最可能的疾病是

- A. 芽孢病毒
- B. 病毒性肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 克雷伯杆菌
- E. 细菌性肺炎

96. 患者, 18 岁, 反复咳嗽喘息 1 年, 发作时呼吸困难, 夜间和凌晨发作时症状加重。X 线胸片显示心肺无异常。应诊断为

- A. 慢性喘息性支气管炎
- B. 支气管扩张
- C. 急性间质性肺炎
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性阻塞性肺疾病

97. 男, 47 岁。从 3m 高处坠落致左胸外伤 8 小时。查体: T36.5°C, P95 次/分, R16 次/分, BP100/60mmHg。神清, 气管居中, 反常呼吸运动, 左胸壁可触及多根多处肋骨断端, 左肺呼吸音明显减弱, 最佳治疗方案首选

- A. 止痛咳痰+抗感染
- B. 胸壁加压包扎
- C. 开胸探查+肋骨固定
- D. 胸腔闭式引流
- E. 胸腔穿刺排气排痰

98. 女, 24 岁。间断发热、咳嗽 10 余天。最高体温 37.6°C, 无痰。既往体健。查体: T37.4°C, P86 次/分, R19 次/分, BP100/70mmHg, 右上肺叩诊呈浊音, 血常规: WBC $8.6 \times 10^9/L$, NO.68。胸部 X 线片示右上肺斑片状阴影, 其内可见不规则透亮区。最可能

的诊断是

- A. 肺炎克雷伯杆菌肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 吸入性肺脓肿
- D. 肺结核
- E. 肺囊肿继发感染

99. 女, 45 岁, 风心病二尖瓣狭窄, 房颤 5 年, 心功能 IV 级, 地高辛治疗 1 个月, 出现下列哪种情况应考虑停用地高辛

- A. 心率 76 次/分, 律齐
- B. 心电图 ST 呈鱼钩样改变
- C. 肺部罗音消失
- D. 肝肿大缩小
- E. 心率 45 次/分, 律齐

100. 男, 19 岁, 约 2 周前曾咳嗽、流涕, 近 3 天感心悸。查体: 心界不大, 心率 96 次/分, 律不齐, 可闻及期前收缩大于 10 次/分。心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音和附加音, 心电图示室性期前收缩, 血清肌钙蛋白升高, 该患者最可能的诊断是

- A. 扩张型心肌病
- B. 感染性心内膜炎
- C. 病毒性心肌炎
- D. 纤维素性心包炎
- E. 心包积液

A3/A4 型选择题

(101~102 题共用题干)

患者女, 68 岁, 排便习惯和排便形状改变 3 个月, 里急后重, 大便带血, 近 1 月出现消瘦, 体重下降约 5kg。腹平软, 无压痛反跳痛。血 CEA: 10.1ng/ml。

101. 首选检查

- A. B 超
- B. 肠镜
- C. X 线

2023 临床助理历年真题

- D. 直肠指检
- E. 粪培养

102. 最合理的治疗是

- A. 化疗
- B. 放疗
- C. 免疫制剂
- D. 肠造瘘口
- E. 根治性切除手术

(103~104 题共用题干)

患者男, 48 岁, 6 小时前聚餐后左上腹剧烈腹痛, 伴恶心呕吐, 疼痛向腰背部放射, 呕吐后疼痛不缓解, 查体: T: 38.6℃, P: 100 次/分, 血压 130/90mmHg, 左中上压痛, 肌紧张, 反跳痛(-), 移动性浊音(-), 肠鸣音减弱。

103. 考虑的疾病是

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 十二指肠溃疡穿孔
- E. 肠梗阻

104. 下列哪项不是该疾病首选的治疗措施?

- A. 奥曲肽
- B. 急诊手术
- C. 雷贝拉唑
- D. 头孢哌酮
- E. 禁食, 胃肠减压

(105~107 题共用题干)

患者男, 70 岁, 咳嗽, 咳痰 10 年, 气促 1 周。查体: 心率 98 次/分, 呼吸 24 次/分, 血压 120/80mmHg, 端坐呼吸, 颈静脉怒张, 球结膜充血, 双下肢凹陷性水肿。

105. 最可能诊断的是

- A. 肺炎

- B. 肺结核
- C. 慢性阻塞性肺疾病急性发作
- D. 肺气肿
- E. 肺源性心脏病

106. 目前不需要治疗的是

- A. 吸氧
- B. 抗感染
- C. 祛痰止咳
- D. 强心利尿
- E. 平喘解痉

107. (假设条件) 患者呼吸困难加重, PaO₂ 是 50mmHg, PaCO₂ 是 65mmHg, 应给予的最佳治疗是

- A. 有创机械通气
- B. 无创机械通气
- C. 持续性低浓度吸氧
- D. 高浓度吸氧
- E. 面罩吸氧

(108~109 题共用题干)

患者, 38 岁, 聚餐后突发腹痛 3 小时, 呈左中上腹部持续性疼痛, 并向左后腰部放射, 伴恶心呕吐, 呕吐后疼痛无缓解, 查体: 体温 38.6℃, 心率 92 次/分, 呼吸 24 次/分, 血压 122/85mmHg, 皮肤巩膜未见黄染, 左中上腹压痛伴肌紧张, 反跳痛(-), 移动性浊音(-), 肠鸣音减弱。

108. 目前首选辅助检查

- A. 血清淀粉酶
- B. B 超
- C. 腹部立位平片
- D. 腹部穿刺
- E. 腹部 CT

109. 目前治疗不建议的

- A. 奥美拉唑
- B. 奥曲肽
- C. 胃肠解压

2023 临床助理历年真题

- D. 抑酸护胃
- E. 手术探查

(110~112 题共用题干)

患者，男性，63 岁，发作性剑突下疼痛十天，加重六小时，既往高血压五年，查体：体温 37.2° C，呼吸 20 次/分，血压 90/55mmHg，口唇无发绀，双肺闻及少量湿啰音，心率 56 次/分，心律齐，无杂音，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及。心电图：窦性心律 II、III、aVF，V3R，V5R 导联 ST 弓背向上抬高。

110. 最可能的疾病是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性肺气肿
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性肺血栓栓塞
- E. 急性心包炎

111. 为明确确诊最有价值的实验室检查

- A. 血淀粉酶
- B. 血常规
- C. 血沉
- D. 血肌钙蛋白
- E. D-二聚体

112. 应选择的治疗是

- A. 溶栓治疗
- B. 抗炎治疗
- C. 抑制胰酶制剂
- D. β 受体阻滞剂
- E. 抗血小板

(113~114 题共用题干)

女，18 岁，高中生，近期乳房有刺痛感，到门诊就诊，因诊室除 1 名女医师外还有一名男医学生当询问病情时女生犹豫不回答，女医生让男实习生离开诊室后再次耐心询问，高中女生

才开始描述病情。

113. 女医生在接诊过程中遵循了医学伦理学的哪个要求

- A. 全神贯注，耐心倾听
- B. 关心体贴，尊重患者
- C. 语言得当，心正无私
- D. 认真细致，减少痛苦
- E. 知情同意，正确引导

114. 女医生让男实习生离开诊室后才询问初中女生病情的举动，体现了医学伦理学的哪项基本原则

- A. 尊重原则
- B. 不伤害原则
- C. 有利原则
- D. 公正原则
- E. 保密原则

(115~117 题共用题干)

患者，男，25 岁。左上腹撞击伤 2 小时，左上腹疼痛伴轻度恶心，未呕吐，伴心慌、出冷汗。查体：左上腹轻度压痛，反跳痛(+)，局限性腹肌紧张移动性浊音(+)，肠鸣音 6/min，血压 80/50mmHg。

115. 该患者最有价值的诊断方法是

- A. 血常规
- B. 血淀粉酶检查
- C. X 线腹部平片
- D. 尿常规检查
- E. 腹腔穿刺

116. 最可能损伤的脏器是

- A. 结肠破裂
- B. 空肠破裂
- C. 肝破裂
- D. 脾破裂
- E. 肾破裂

117. 腹腔抽出不凝血的原因是

- A. 患者凝血机制异常

2023 临床助理历年真题

- B. 使用抗凝药物
- C. 弥散性血管内凝血
- D. 腹膜炎性渗出液混合
- E. 腹膜脱纤维作用

(118~119 题共用题干)

患者男，59 岁，既往吸烟史 20 年，反复咳嗽咳痰 10 年，活动后气短 2 年。查体：T37° C，R18 次/分，P90 次/分，BP120/75mmHg，已经戒烟 1 年。

118. 该患者的首选检查是

- A. 血气分析
- B. 肺功能
- C. X 线
- D. 超声心动图
- E. 胸部 CT

119. 假设该患者出现肺源性心脏病，下列可能出现的体征是

- A. 右心肥厚
- B. 顺钟向转位
- C. V1R/S>1
- D. V5R/S <1
- E. 肺型 P 波

(120~121 题共用题干)

患者，男性，34 岁，患胃溃疡病史 3 年，突发上腹剧痛面色苍白伴大汗，查体：全腹压痛，腹肌紧张疑似穿孔。

120. 该穿孔的好发部位是

- A. 胃大弯
- B. 胃小弯
- C. 胃体
- D. 胃窦
- E. 胃底部

121. 为达到最佳治疗效果，该患者应在几小时内手术

- A. 48
- B. 12
- C. 24

- D. 8
- E. 10

(122~123 题共用题干)

患者，男，13 岁，进食油腻食物后出现腹痛、呕吐，肛门停止排气、排便 6 小时。2 年前曾做阑尾炎切除术。腹部 X 平片检查示：阶梯样液平面。

122. 导致此次疾病病因的是

- A. 不洁饮食
- B. 手术导致
- C. 细菌感染
- D. 遗传因素
- E. 应激反应

123. 患者考虑的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胃炎
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 胃溃疡并幽门梗阻
- E. 急性胆囊炎

(124~125 题共用题干)

某医院未经批准新设医疗美容科，营业并接诊患者未出现医疗事故卫生行政部门例行检查时发现医院未经报备审批进行美容诊疗。

124. 该医疗机构的行为性质属于

- A. 超范围执业
- B. 非法行医
- C. 正常医疗行为
- D. 特殊情况
- E. 开展新技术

125. 卫生行政部门应给予的处置是

- A. 责令整改，处以 5000 元以下罚款
- B. 予以警告，责令整改
- C. 责令整改，处以 3000 元以下罚款
- D. 吊销医疗机构执业许可证
- E. 责令整改，没收违法所得

2023 临床助理历年真题

(126~127 题共用题干)

男, 62 岁。间断咳嗽、咳痰 10 余年, 喘息 5 年, 加重 3 天入院。吸烟 41 年, 30 支/日, 已戒 5 年。查体: 烦躁球结膜充血、水肿, 口唇发绀。桶状胸, 双肺呼吸音低, 右下肺可闻及少许湿性罗音, 肝肋下 5cm, 肝颈静脉回流征(+), 双下肢水肿。血 K⁺4.5mmol/L。Na⁺129mmol/L, Cl⁻90mmol/L。

126. 若该患者出现意识障碍, 最可能的原因是

- A. 感染中毒性脑病
- B. 脑血管意外
- C. 肝性脑病
- D. 肺性脑病
- E. 低钠血症

127. 为去除病因, 该患者最重要的治疗措施为

- A. 抗感染
- B. 静脉滴注支链氨基酸
- C. 无创通气
- D. 利尿
- E. 纠正电解质紊乱

(128~130 题共用题干)

患者男, 46 岁。体检发现血压升高 6 个月。查体: 血压 150/100mmHg, 心率 86 次/分, 律齐。实验室检查: 血肌酐 196 μ mol/L, 血尿酸 500 μ mol/L。

128. 患者控制血压的目标值是血压低于

- A. 140/80mmHg
- B. 120/70mmHg
- C. 130/90mmHg
- D. 140/90mmHg
- E. 130/80mmHg

129. 该患者不宜选用的降压药是

- A. β 受体拮抗剂
- B. 噻嗪类利尿剂

- C. 血管紧张素转换酶抑制剂
- D. 钙通道阻滞剂
- E. 血管紧张素 II 受体拮抗剂

130. 若该患者伴有支气管哮喘应禁用以下哪种药物

- A. 酚妥拉明
- B. 氨氯地平
- C. 美托洛尔
- D. 卡托普利
- E. 氢氯噻嗪

B1 型选择题

(131~132 题共用备选答案)

- A. 肛周持续性跳动, 肛周皮肤明显红肿
- B. 肛门不适, 潮湿不洁
- C. 肛门疼痛、便秘和出血
- D. 间歇性无痛性肛门便后出血
- E. 肛旁脓血性或粘液性分泌物排出

131. 外痔的主要表现是

132. 肛周脓肿的临床表现

(133~134 题共用备选答案)

- A. 葡萄糖
- B. 细胞总数
- C. 腺苷脱氨酶
- D. 乳酸脱氢酶
- E. pH 值

133. 渗出液和漏出液鉴别的检查项目是

134. 鉴别结核性胸腔积液和恶性胸腔积液, 最有价值的胸水生化检查项目是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 噻嗪类利尿剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. 钙离子拮抗剂

2023 临床助理历年真题

D. ARB

E. ACEI

135. 合并窦性心动过速的高血压 1 级患者最适宜的药物是

136. 严重肾衰患者合并老年收缩期高血压最适宜的药物是

(137~138 题共用备选答案)

A. 促进黏膜修复

B. 降低门静脉压力

C. 应用止血药

D. 抑制胃酸分泌

E. 根除幽门螺旋杆菌

137. 预防十二指肠溃疡复发的主要治疗

138. 非食管静脉曲张性上消化道出血的主要治疗是

(139~140 题共用备选答案)

A. 动脉血气分析

B. 肺功能

C. 肺动脉造影

D. 胸部增强 CT

E. 胸部 X 线

139. 对鉴别诊断肺门占位最有意义的检查是

140. 诊断呼吸衰竭最有价值的检查

(141~142 题共用备选答案)

A. 呼吸性酸中毒

B. 呼吸性碱中毒

C. 代谢性碱中毒

D. 代谢性酸中毒

E. 代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒

141. 肝硬化大量腹水患者长期使用呋塞米利尿可出现

142. 肠痿患者可出现

(143~144 题共用备选答案)

A. 罹患率、续发率

B. 相对危险度、特异危险度

C. 抗体阳转率、保护率

D. 死亡率、患病率

E. 有效率、治愈率

143. 描述一个地区的居民健康状况和卫生保健工作水平, 可选用指标

144. 反应人群中某种疾病与某因素联系强度可选用指标

(145~146 题共用备选答案)

A. 巨大溃疡

B. 幽门管溃疡

C. 球后溃疡

D. 复合性溃疡

E. 难治性溃疡

145. 胃和十二指肠均有活动性溃疡的特殊类型溃疡是

146. 常见于非甾体抗炎药服用史和老年病人的特殊类型溃疡是

(147~148 题共用备选答案)

A. 肺炎支原体肺炎

B. 肺炎克雷伯杆菌肺炎

C. 病毒性肺炎

D. 肺炎链球菌肺炎

E. 葡萄球菌肺炎

147. 高热、胸痛、咳砖红色胶冻样痰最常见于

148. 高热、胸痛、咳铁锈色痰最常见于

(149~150 题共用备选答案)

A. 心尖区舒张期隆隆样杂音

B. 心尖区收缩期吹风样杂音

C. 胸骨左缘 3-4 肋收缩期杂音

2023 临床助理历年真题

- D. 胸骨左缘 3-4 肋舒张杂音
E. 胸骨右侧杂音
149. 二尖瓣狭窄的心脏杂音是

150. 二尖瓣关闭不全最重要的体征

答案

第一单元

1. 答案:D

解析:尿频最常见的早期症状,(故选D);尿潴留由于各种因素使前列腺突然充血、水肿导致急性尿潴留(A对)。增生腺体表面黏膜较大的血管破裂时,可发生无痛性肉眼血尿(B错)。当前列腺增生合并感染或结石时,可出现明显尿频、尿急、尿痛症状(C错)。进行性排尿困难最重要的症状,(E错)。

2. 答案:D

解析:肾结核诊断除临床症状、实验室检查外,主要是根据静脉尿路造影的表现。其特征是轻度病变可见肾盏有虫蚀样破坏或肾盏颈狭窄、肾盏变形或消失,严重者累及肾盏及肾功能完全丧失而不显影,(D对)。PE.T可作为肾结核检查手段之一,但其价格昂贵,且不是最有意义的。(A错)。尿路平片是肾结核影像学检查手段之一,可能见到病肾局灶或斑点状钙化影或全肾广泛钙化,但不是最有意义的(B错)。B超是肾结核检查手段之一,简单易行,对于中晚期病例可初步确定病变部位,但不是最有意义的(C错)。膀胱镜检查肾结核检查手段之一,是膀胱镜检查可见膀胱黏膜充血、水肿、浅黄色结核结节、结核性溃疡、肉芽肿及瘀痕等病变,但不是最有意义的(E错)。

3. 答案:B

解析:主要原因是受损害的肾脏产生、分泌促红细胞生成素(E.PO)减少所致。(B对)。

4. 答案:B

解析:血清与血浆主要区别,血清中不含有纤维蛋白原,而血浆是含有的纤维蛋白原。

5. 答案:E

解析:绒毛膜癌为高度侵袭性肿瘤,只有滋养层肿瘤细胞,而无肿瘤间质,由于没有间质血管,故只能从宿主细胞获得营养。绒毛膜癌侵袭破坏血管的能力很强,极易经血行转移,最常见是肺转移,其他转移方式少见。(E对)。宫颈癌的主要转移途径是直接蔓延和淋巴转移,血行转移极少见。其中,以直接蔓延最常见,多表现为癌组织局部浸润,向邻近器官及组织扩散。(A错)。卵巢癌的主要转移途径是直接蔓延和腹腔种植,淋巴转移也是重要的转移途径,血行转移少见。(B错)。肝癌最早最主要的转移是肝内转移,多经门静脉及其分支进行转移。(C错)。乳腺癌的转移方式和途径,从发病起可以发生淋巴转移和血行转移。(E错)。

6. 答案:D

解析:孕妇出现巨幼细胞贫血,主要是因为孕妇胎儿需要正常的生长发育,同时,母体也需要正常的叶酸储存。因此,女性如果处于妊娠期间,会需要相对更大的叶酸需求量。另外,孕妇在妊娠期可能会出现食欲下降,恶心呕吐等一些问题,也可能导致孕妇摄入的叶酸含量减少。

7. 答案:E

解析:①尿蛋白定量超过 3.5g/d;②血浆白蛋白低于 30g/L;③水肿;④高脂血症。其中①、②两项为诊断所必需。

8. 答案:A

解析:来源于生殖细胞的肿瘤约占所有卵巢肿瘤的 1/4、儿童和青春期的卵巢肿瘤的 60%为生殖细胞肿瘤。(A 对)。其他选项均为卵巢肿瘤的类型,但不是儿童和青春期的卵巢肿瘤最常见的。

9. 答案:A

解析:小儿患者颅内压升高可有头颅增大、头皮和额部浅静脉扩张缝增宽或分离、前囟饱满隆起,而成年人前囟闭合,不会出现前饱满、头颅增大的现象。故前囟饱满,头颅增大是小儿颅内压升高的症状。(A 对)。

10. 答案:D

解析:新生儿呼吸窘迫综合征是因肺表面活性物质缺乏所致,以生后不久出现呼吸窘迫并进行性加重为特征的临床综合征。(D 对)。

11. 答案:C

解析:肺炎是麻疹最常见的并发症,主要见于重度营养不良或免疫功能低下的小儿,临床症状较重、体征明显,预后较差,占麻疹患儿死因的 90%以上。(C 对)。心肌炎、脑炎是麻疹的并发症,喉炎是麻疹的呼吸系统并发症,但都不如肺炎常见。结膜炎可能伴随普通感冒和其它全身病毒感染(尤其是麻疹也见于水痘、风疹和腮腺炎),所以,结膜炎是麻疹的并发症,但不如肺炎常见。

12. 答案:C

解析:单纯疱疹属疱疹病毒科 α 病毒亚科,病毒质粒大小约 180 纳米。根据抗原性的差别目前把该病毒分为 1 型和 2 型。HSV-1 主要以面部和腰以上的皮肤和黏膜以及中枢神经系统的病变,偶见于外生殖器;HSV-2 主要以生殖器和腰以下的皮肤和黏膜病变偶见于口腔病变。半岁以后的婴儿容易发生 HSV-1 的原发感染,最常引起龈口炎。HSV-2 的原发感染多起因于性生活后,主要引起生殖器疱疹。单纯

疱疹病毒传播方式为直接传播或性传播。

13. 答案:D

解析:急性白血病患者中 M3 型急性早幼粒细胞白血病患者最易出现 DIC,从而导致出血。大量白血病细胞在血管中淤滞及浸润、血小板减少、凝血异常以及感染是出血的主要原因有资料表明 AL 死于出血者占 62.24%,其中 87%颅内出血。颅内出血时会发生头痛、呕吐、瞳孔大小不对称,甚至昏迷、死亡。(D 对)。其他部位的出血较少危及生命。

14. 答案:D

解析:水肿程度及大小不一的绒毛是不完全性葡萄胎的表现。而完全性葡萄胎绒毛水肿呈弥漫性。(D 对)。完全性葡萄胎镜下观察见:可确认的胚胎或胎儿组织缺失;绒毛水肿;弥漫性滋养细胞增生;种植部位滋养细胞呈弥漫和显著的异型性。

15. 答案:A

解析:甲肝、戊肝为粪口传播,乙肝丙肝为血液传播、母婴传播。麻疹、白喉为呼吸道传播。

16. 答案:A

解析:胎体纵轴与母体纵轴的关系称为胎产式;胎体纵轴与母体纵轴平行者,称为纵产式;胎体纵轴与母体纵轴垂直者,称为横产式;胎体纵轴与母体纵轴交叉者,称为斜产式。斜产式是暂时的,在分娩过程中多转为纵产式,偶尔转成横产式。

17. 答案:D

解析:骨盆漏斗韧带又称卵巢悬韧带内含卵巢动静脉。

18. 答案:B

解析:水痘未合并感染不会留疤。

19. 答案:A

解析:生后 1 周(7 天)内因奶量摄入不足、水分丢失、胎粪排出,可出现暂

时性体重下降，或称生理性体重下降，约在生后第 3~4 日达最低点，下降范围为 3%~9%，以后逐渐回升，至出生第 7~10 日应恢复到出生时的体重。

20. 答案:B

解析:略。

21. 答案:E.

解析:子宫颈肿瘤的发病与高危型 HPV 持续感染密切相关，其中约 70% 与 HPV16 和 18 型相关。(E. 对, D 错)。HSV-1 是人类单纯疱疹病毒主要引起口唇疱疹；HSV-2 疱疹病毒主要引起生殖器疱疹。(AB 错)。HIV 为获得性免疫缺陷病毒，是艾滋病的病原体。(C 错)。

22. 答案:C

解析:甲状腺功能低下时，肝脏 UDPCT 活性降低可持续数周至数月，出现生理性黄疸期延长。(C 对)。新生儿胎粪正常在出生后几小时开始排出，3 到 4 天会排尽，但患有甲低的新生儿其胎粪排出时间会延迟，并常伴有腹胀、便秘的症状，无腹泻表现。新生儿甲减无贫血表现，可表现为心率慢、体温低，但不是最早出现的症状。

23. 答案:B

解析:计划免疫包括两个程序:一个是全程足量的基础免疫，即在 1 周岁内完成的初次接种；二是以后的加强免疫，即根据疫苗的免疫持久性及人群的免疫水平和疾病流行情况适时地进行复种。卡介苗一般在小于 3 月龄内完成接种，之后无需复种。

24. 答案:B

解析:尿糖阳性只是提示血糖值超过肾糖阈(约 10mmol/L)，因而尿糖阴性不能排除糖尿病可能。并发肾脏病变时，肾糖阈升高，虽然血糖升高，但尿糖阴性。肾糖阈降低时，虽然血糖正常，尿糖可阳性；故尿糖阳性不能诊断糖尿病。

25. 答案:C

解析:子宫内膜异位症病变在卵巢，首选检查要简单、快捷、清晰，首选阴道超声，无创、无痛、清晰。(C 对)。腹腔镜是诊断子宫内膜异位症的金标准，但腹腔镜是有创操作，一般不作为筛查。

26. 答案:E.

解析:羊水抗原成分可引起 I 型变态反应。而非 II 型变态反应。

27. 答案:B

解析:正常胎心率为 110-160 次/分，胎心率 100-110 次/分或胎心率 >160 次/分为不典型 NST，胎心率 <100 次/分为异常 NST。(选 B)。正常 NST:胎心率 110-160 次/分，基线变异为中度以下，无减速或偶发变异减速，40 分钟内 2 次或 2 次以上加速超过 15 次/分(≥32 周)。

28. 答案:C

解析:严重急性感染，在应用有效抗菌药物治疗感染的同时，可用糖皮质激素作辅助治疗。因其能增加机体对有害刺激的耐受性，减轻中毒反应，有利于争取时间，进行抢救。(C 对)。糖皮质激素的抗炎作用不表现在与其他药物合用。糖皮质激素对有些组织细胞虽无直接活性，但可给其他激素发挥作用创造有利条件，称为允许作用。如糖皮质激素可增强儿茶酚胺的血管收缩作用和胰高血糖素的血糖升高作用。题干未提及休克、过敏等信息。

29. 答案:D

解析:如果排卵后没有发生受精、着床，则黄体萎缩退化，导致血中雌、孕激素水平突然降低，螺旋小动脉痉挛性收缩，因而内膜靠腔面三分之二的功能层组织出现缺血、变性、坏死，最后剥脱，血管破裂，出血。从子宫内膜开始剥脱出血到结束，正常情况下

一般持续 3~5 天所以月经第 3~5 天，体内激素的变化是雌、孕激素水平突然降低。(D 对)。在月经第 3~5 天，无孕激素，黄体生成素和卵泡刺激素。

30. 答案:C

解析:对于大多数椎管内转移瘤位于硬脊膜外，10%癌症病人可发生椎管内转移。原发灶多为肺、前列腺、乳腺和肾的癌肿。以胸段多见其次为腰段。而老年人癌症发病率高由此推断老年人最常见的硬脊膜外肿瘤是转移瘤。(C 对)。脊膜瘤发病年龄多在 20-50 岁之间。(A 错)。淋巴瘤在椎管内很少出现。(B 错。)胶质瘤和脊索瘤多好发于颅内，椎管内很少出现。(DE. 错误)。

31. 答案:B

解析:婴儿生长发育迅速，循环血量迅速增加等因素，红细胞数和血红蛋白量逐渐降低，至 2~3 个月时(早产儿较早)红细胞数降至 $3.0 \times 10^{12}/L$ 左右，血红蛋白量降至 100g/L 左右，出现轻度贫血，称为“生理性贫血”。(B 对，ACDE. 错误)。

32. 答案:C

解析:糖原在乳杆菌的作用下转化为乳酸，维持阴道正常的酸性环境($PH \leq 4.5$ ，多在 $3.8 \sim 4.4$)。

33. 答案:C

解析:甲状腺是唯一能将生成的激素大量储存于细胞外的内分泌腺。甲状腺激素的储备很多。

34. 答案:C

解析:川崎病的冠状动脉病变最常发生于起病的第 2~4 周。该时期表现为冠状动脉主要分支全层血管炎，血管内皮水肿、血管壁平滑肌层及外膜炎性细胞浸润。弹力纤维和肌层断裂可形成血栓和动脉瘤。

35. 答案:D

解析:血小板计数临床上用于判断出血

情况和血栓性疾病，不能判断营养状况。(D 对)。

36. 答案:C

解析:苯丙酮尿症属于常染色体隐性遗传疾病。(C 对)。常见的染色体畸变疾病有唐氏综合症、先天性卵巢发育不良。(A 错)。常见的常染色体显性遗传疾病有遗传性舞蹈病，(B 错)。常见的 X 连锁显性遗传疾病有抗维生素 D 佝偻病，故排除。(D 错)。常见的 X 连锁隐性遗传疾病有血友病，故排除。(E. 错)。

37. 答案:B

解析:胎方位指胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系。(B 对)。胎产式指胎体纵轴与母体纵轴的关系。(A 错)。胎先露指最先进入骨盆入口的胎儿部分。(C 错)。骨盆腔呈前浅后深的形态，其中轴为骨盆轴，分娩时胎儿沿此轴娩出。(D 错)。胎姿势指胎儿在子宫内的姿势，(E. 错)。

38. 答案:B

解析:抑郁症急性期治疗(8~12 周)以控制症状为主，尽量达到临床痊愈，同时促进患者社会功能的恢复，提高患者的生活质量。(B 对，ACDE. 错误)。

39. 答案:D

解析:前置胎盘腹部检查可见:子宫软，轮廓清楚，无压痛，子宫大小与孕周相符。胎位清楚，胎先露高浮或伴有胎位异常。(D 对，ABCE. 错误)。

40. 答案:C

解析:破伤风肌群受影响顺序:咀嚼肌—面部表情肌—颈肌—背肌—腹肌—四肢肌—膈肌。

41. 答案:E.

解析:幻觉是没有现实刺激作用于感觉器官时出现的知觉体验，是一种虚幻的知觉，幻觉是精神科临床上常见且重要的精神病性症状之一。(E. 对)。幻觉属于认知障碍，不属于感觉体验。

幻觉属于虚幻的知觉，虚幻是其主要特点。

42. 答案:A

解析:新生儿期在生长发育和疾病方面具有非常明显的特殊性，且发病率高，死亡率也高。在此期间，小儿脱离母体转而独立生存，所处的内外环境发生根本的变化，但其适应能力尚不完善。

43. 答案:D

解析:骨折无位移，为稳定型骨折，根据踝关节骨折治疗原则采用石膏固定6-8周。

44. 答案:A

解析:肩关节前脱位最典型表现为患者出现方肩畸形，因为肩关节前脱位后，肩峰明显突出，下部关节盂空虚，侧面观呈“方肩”畸形。(A对)。由于暴力的大小、力作用的方向以及肌肉的牵拉，前脱位时，肱骨头可能位于锁骨下、喙突下、肩前方及关节盂下，所以B、C不是典型表现。DE.的表现均为肩关节脱位的表现，但对于前后脱位均有该表现，并不属于前脱位典型表现。

45. 答案:E

解析:恐惧障碍和广泛性焦虑障碍都以焦虑为核心症状，但恐惧障碍的焦虑由特定的对象或处境引起，呈境遇性和发作性，而焦虑障碍的焦虑常没有明确的对象，常持续存在。所以恐惧障碍和广泛性焦虑的鉴别点是是否有特异性指向对象。

46. 答案:D

解析:病理性醉酒属于精神疾病的一种，是指所饮不足以使一般人发生醉酒的酒量而出现明显的行为和心理改变，在饮酒时或其后不久突然出现激越、冲动、暴怒、以及攻击或破坏行为，可造成自伤或伤人后果。发作时有意识障碍，亦可出现错觉、幻觉和片断

妄想。与慢性酒精性中毒无关。

47. 答案:C

解析:略。

48. 答案:D

解析:复发性外阴阴道假丝酵母菌病的抗真菌治疗方案分为强化治疗与巩固治疗，根据培养和药物敏感试验选择药物。在强化治疗达到真菌学治愈后，给予巩固治疗半年巩固治疗。

49. 答案:B

解析:最初是因含有结核杆菌的脓尿刺激膀胱黏膜引起，以后当结核病变侵及膀胱壁，发生结核性膀胱炎及溃疡，尿频加剧，并伴有尿急、尿痛。肾结核早期症状是尿频。(B对)。

50. 答案:B

解析:脑出血最常见病因是高血压合并细小动脉硬化，其他病因包括动-静脉血管畸形，脑淀粉样血管病变、血液病(如白血病、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、血友病、红细胞增多症和镰状细胞病等)、抗凝或溶栓治疗。(B对)。

51. 答案:D

解析:患者透光试验阳性，右侧睾丸未及，卧位时不消失，考虑睾丸鞘膜积液。(D对)。腹股沟疝透光试验阴性，(A错)。精索鞘膜积液，透光阳性，卧位不消失，睾丸能触及(B错)。隐睾的患儿睾丸内空虚，(C错)。交通性鞘膜积液:透光阳性，卧位消失，睾丸能触及。(E.错)。

52. 答案:C

解析:患者35岁女性，乳房周期性胀痛与月经有关，月经前疼痛加重，此为乳腺囊性增生病的典型特点，因此病人最有可能的诊断是乳腺囊性增生病，(C对)。乳腺癌多发生于中年女性，一般并呈进展较快，常伴有体重减轻等恶病质改变，查体可见包块有触痛感及周围淋巴结肿大，且疼痛与

月经周期没有关系。(A 错)。乳腺纤维腺瘤是青年女性最常见的肿瘤，此类肿块一般质稍硬有弹性，表面光滑易推动，月经周期对肿块大小无影响。(B 错)。乳管内乳头状瘤多见于经产妇，40-50 岁居多，一般无明显症状，且一般不能触及肿块，与题干描述不一致。(D 错)。急性乳腺炎多见于哺乳期妇女，一般会伴有发热等感染性征象，主要表现为发热、乳房胀痛等。(E 错)。

53. 答案:B

解析:患者阴道分泌物增多，阴道内稀薄脓性黄色泡沫状， $\text{pH}>5$ ，线索细胞阳性，考虑细菌性阴道炎可能性大，细菌性阴道炎首选甲硝唑治疗，(B 对)。制霉菌素为抗真菌药，用于治疗外阴阴道假丝酵母菌病。头菌素、青霉素、阿奇霉素均不用于治疗阴道炎。

54. 答案:C

解析:患者既往有多次输血史，体内可能存在抗体白细胞抗体且患者为再障引起的贫血，可能需要长期输血，浓缩红细胞、悬浮红细胞、全血上均可能含有一定白细胞成分，均可能发生溶血；故输注去白细胞的红细胞为最佳选项。(C 对)。辐照红细胞是用射线照射灭活活性淋巴细胞的红细胞制剂，用来预防输血相关性移植物抗宿主病的发生。

55. 答案:C

解析:高血压、蛋白尿、血尿、水肿 5 年，考虑为慢性肾小球肾炎，阿司匹林可改善可以改善动脉粥样硬化，但不能用于慢性肾小球肾炎的治疗。(C 对)。

56. 答案:C

解析:双氯芬酸为非甾体类抗炎药，会加重患者十二指肠溃疡，故应避免应用。(C 对)。

57. 答案:A

解析:患者年轻女性，月经量过多，血常规示，MCV 小于 80，属于小细胞贫血，故应诊断为缺铁性贫血应给与补铁治疗。患者缺铁元素，而不是钙元素，故不选钙剂。(A 对)。患者不是巨幼细胞贫血，故不补充 VB12 和叶酸。患者血红蛋白 96 目前未提示存在血压降低等严重失血表现，故不选择输血。

58. 答案:E

解析:火器伤均清创后延期缝合。

59. 答案:E

解析:患者诊断为:急性肾小球肾炎，以休息及对症治疗为主。急性肾衰竭有透析指征者应予透析，待其自然恢复。不宜应用激素及细胞毒类药物。

60. 答案:D

解析:对于患者高血压，情绪激动后头痛为急性脑出血有神经受损表现血的典型表现，CT 发现高密度影，故诊断为脑出血。(D 对)。短暂性脑缺血发作是指由于脑脊髓或视网膜局灶性缺血所致的短暂性神经功能缺损发作，疾病程度未达到急性脑梗死的程度，TIA 患者可突然出现身体一侧麻木、无力、视力下降、言语障碍等症状。症状持续时间短，一般在 1 小时内恢复，不遗留永久的损害或梗死灶。蛛网膜下腔出血指脑底部或脑表面的病变血管破裂，血液直接流入蛛网膜下腔引起的一种临床综合征，头颅 CT 提示蛛网膜下腔呈高密度影是经典的诊断标准。脑血栓是指脑动脉由于局部血管自身病变而继发血栓形成导致血管壁增厚、管腔狭窄或闭塞，引起脑局部血流减少或供血中断。脑组织缺血、缺氧、坏死而出现局灶性神经功能缺损的症状和体征。多数病例发病 24h 后头部 CT 逐渐显示有低密度梗死灶，边界欠清晰，并有一定的占位效应。脑血栓形成是脑梗死最常见的类型。头部 CT 多数病例发病 24h 后头部

CT 逐渐显示低密度梗死灶。

61. 答案:C

解析:患者青年男性,发热伴腹痛腹泻有南方旅游史及河水接触史,粪便培养可见虫卵,考虑血吸虫感染可能性大。血吸虫病感染方式为接触含有尾蚴的疫水,尾蚴从皮肤黏膜侵入而感染。(C对)。常见的呼吸道传播疾病有新冠流感、麻疹、白喉、结核等。常见的消化道传播疾病有甲肝、戊肝、细菌性痢疾、霍乱、脊髓灰质炎、轮状病毒感染等。常见的虫媒传播疾病有流行性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒、乙脑、登革热、疟疾等。常见的血液传播疾病有乙肝、丙肝、丁肝、艾滋、梅毒等。

62. 答案:E

解析:患者宫口已经开全,已经入第二产程,但3h无明显进展,应诊断为第二产程延长。应查看患者及胎儿情况,有无头盆不称,有无胎位异常等情况。(选E.)。由题干可知,足月初产妇,宫口开全,矢状线与骨盆前后位一致,无头颅重叠及产瘤,大囟门在骶骨后方,应为高直后位或患者已经完成内旋转。枕横位入盆的胎头侧屈以其前顶骨先入盆的一种异常胎位,称前不均倾位,易发生在头盆不称、骨盆倾斜度过大、腹壁松弛时,与题干描述胎位不符。持续性枕后位是指当胎头以枕后位或枕横位衔接,胎头双顶径抵达中骨盆平面时完成内旋转动作,大多数胎头枕部不能转向前方仍位于母体骨盆后方或侧方,致使分娩发生困难者,胎头矢状缝与骨盆横径一致,与患者胎位不符。活跃期是指活跃期停滞:当破膜若宫缩正常,宫颈口停止且宫颈口扩张 $\geq 6\text{cm}$ 后,扩张 ≥ 4 小时;若宫缩欠佳,宫颈口停止扩张 ≥ 6 小时称为活跃期停滞。患者宫口已经开全,已经进入第二产程,并不属于活

跃期。

63. 答案:A

解析:对乙酰氨基酚属于非甾体类抗炎药,它的解热镇痛作用强,抗炎作用极弱,胃肠道反应常见。该患儿发热1周,首选的解热药物为对乙酰氨基酚。(A对)。萘普生也属于非甾体类抗炎药主要用于免疫系统疾病的治疗。一般不用于普通发热患者。阿托品主要用于心动过缓,无解热镇痛作用。地西洋为镇静药,无解热镇痛作用。美托洛尔为 β 受体阻滞剂,无解热镇痛作用。

64. 答案:B

解析:患者水肿3个月(长期),尿蛋白(++++)提示大量蛋白尿,考虑患者为肾病性水肿,主要由于长期、大量蛋白尿造成血浆蛋白过低,血浆胶体渗透压降低,液体从血管内渗入组织间隙,产生水肿。

65. 答案:B

解析:尿酸是人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物。体内嘌呤核苷酸的分解代谢主要在肝脏、小肠及肾脏中进行。首先在核苷酸酶的作用下,嘌呤核苷酸脱去磷酸,生成嘌呤核苷。其中,嘌呤核苷经过脱氨、水解过程,生成次黄嘌呤,然后在黄嘌呤氧化酶催化下氧化为黄嘌呤。鸟嘌呤核苷则被直接水解,生成鸟嘌呤然后经脱氨基作用,也生成黄嘌呤。黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶催化下生成尿酸。

66. 答案:A

解析:该患者诊断为股骨颈骨折,骨折线位于股骨颈中部,股骨头有明显供血不足,易发生股骨头缺血坏死或骨折不愈合。该患者老年女性,全身情况尚好,预期寿命较长,治疗首选人工关节置换术。(A对)。单纯内固定:由于该患者年龄较大可能导致骨折不愈合,后期需要进行二次手术故不适

合。(B 错)。股骨颈骨折不适用手法复位。(C 错)。石膏外固定主要针对于股骨干等骨干处骨折,且患者年龄不易过大。(D 错)。皮牵引术适用于无移位、外展型或嵌入型等稳定性骨折、不能耐受手术者使用。(E 错)。

67. 答案:C

解析:略。

68. 答案:C

解析:患者颈部可触及一 $5 \times 6\text{cm}$ 甲状腺肿块,有明确压迫症状(气管左偏,胸闷喘憋),符合甲亢手术治疗适应证,故应采取手术治疗。(C 对)。甲疏咪唑和丙硫氧嘧啶可降低血甲状腺素水平,但长期治疗可使甲状腺进一步肿大,从而加重呼吸道狭窄。患者呼吸道压迫症状明显,碘 131 治疗对缓解呼吸道压迫症状效果不明显。患者呼吸道压迫症状明显,应尽快手术治疗。

69. 答案:B

解析:患者月经周期不规律,不能用常用的末次月经推算孕周,移植术后停经 45 天,根据胚胎移植时间推算孕周则最为准确。(B 对)。妊娠早期超声检测胎儿头臀长(CRL)是估计孕周最准确的指标,而非双顶径。患者胚胎移植术后停经 45 天,孕早期,子宫底位于盆腔内,宫高难以触及,且宫高并不是判断孕周的方法。自身激素变化及体温变化不能用来判断孕周。

70. 答案:E

解析:患者有不洁性行为史,龟头处有硬质溃疡,为梅毒一期典型表现-硬下疳,病原体为梅毒螺旋体,梅毒螺旋体对低温不敏感。(E 对)。

71. 答案:B

解析:患者为初产妇,孕 $37+1$ 周,已经足月,产检示:胎方位、羊水、胎儿胎心正常,宫颈评分 4 分(宫颈不成熟),胎儿位置于坐骨棘下 1cm (第一产程),且患者血糖控制良好,应继续

观察,等待妊娠。

72. 答案:E

解析:患儿自幼体弱,易患呼吸道感染(肺循环血流增多而易反复发生呼吸道感染见于多种先天性心脏病)。查体:心前区稍隆起(心脏增大的体征),胸骨左缘 $2\sim 3$ 肋间闻及 $3/6$ 级收缩期杂音, P_2 亢进,固定分裂(房间隔缺损的听诊特点)。综合患儿症状、体征,此患儿最可能的诊断是房间隔缺损。(选 E)。动脉导管未闭易发生于早产儿,听诊有胸骨左缘上方有一连续性“机器”样杂音,占整个收缩期与舒张期,杂音向左锁骨下、颈部和背部传导。(不选 A)。风湿性心脏病是由于风湿热累及心脏,主要有心肌炎,表现为安静时心动过速、心音低顿,可闻及奔马律和主动脉瓣区舒张中期杂音;心内膜炎时表现为心尖部吹风样全收缩期杂音(二尖瓣关闭不全的体征)或胸骨左缘第 3 肋间舒张期叹气样杂音(主动脉瓣关闭不全的体征)。(不选 B)。室间隔缺损,缺损小时可无症状,缺损大时表现为消瘦,活动后乏力、气短,听诊有胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及 II-IV 粗糙全收缩期杂音,向四周广泛传导。(不选 C)。法洛三联症表现为紫绀,少动,蹲踞症状、杵状指、阵发性缺氧表现等,听诊胸骨左缘 $2\sim 4$ 肋间可闻 III 级收缩期喷射性杂音。(不选 D)。

73. 答案:E

解析:由题干可知患者为顺产后 2 周,发热,下腹痛,白细胞升高,无咳嗽咳痰,对产后发热者,首先考虑产褥感染,再排除引起产褥病率的其他疾病。(E 对)。患者并无子宫肌瘤病史,不符合患者既往史。(ACD 错误)。阑尾炎有下腹痛、恶心呕吐等症状,与患者本身症状不符。(B 错误)。

74. 答案:B

解析:青年女性,尿频尿急尿痛 3 天,化验 WBC $6\sim 10$ /HP,未提及全身表现,静脉肾盂造影未见异常,考虑诊断急性膀胱炎,对于女性无并发症的单纯性膀胱炎,可选择敏感的抗菌药物,如喹诺酮、复方磺胺甲恶唑、头孢菌素等药物,首选 3 日疗法。(选 B,不选 A、C、D、E.)。

75. 答案:B

解析:新生儿,出生后 Apgar 评分 1 分钟为 2 分(≤ 3 分)5 分钟为 5 分(< 5 分)。12 小时后才出现吸吮(原始反射异常)。考虑其诊断为新生儿缺血缺氧性脑病。(选 B)。新生儿低血糖的患儿多无症状补充血糖后多能恢复。(不选 A)。新生儿脑出血的症状表现:常突然发病,表现为类声哭叫,前囟门隆起,双眼凝视或上翻,频繁呕吐,烦躁不安,肢体抽搐、昏迷等。与本例患儿表现不符。(不选 C)。先天性脑发育不全的婴儿多外貌表现为额头扁平,肌张力低下,全身松软,特别安静或烦躁,易受惊抽搐。另外还可以表现为哭声微弱或持续哭闹,不会吸允或拒乳,智力发育障碍等。与本例患儿表现不符。(不选 D)。先天性甲状腺功能减退症主要临床表现为体格和智能发育障碍。与本例患儿表现不符。(不选 E.)。

76. 答案:E

解析:ABO 血型不合溶血病表现为生后 2-3 天出现黄疸,母亲血型为 O 型,胎儿为 A 型或 B 型,本题中患儿出生 3 天,黄疸迅速加重 2 天,血清总胆红素 $289\mu\text{mol/L}$,母血型为 O 型、Rh 阳性,父血型为 AB 型、Rh 阳性,故考虑为 ABO 血型不合溶血病。

77. 答案:C

解析:患儿前有上呼吸道感染史,水肿(颜面部及双下肢轻度水肿)、蛋白尿、镜下血尿、高血压,补体 C3 轻度下降。

为典型的急性肾小球肾炎的表现。

78. 答案:B

解析:伤寒是由伤寒杆菌引起的急性肠道传染病,临床特征为持续发热、相对缓脉、神经系统中毒症状以消化道症状、玫瑰疹、肝脾肿大与白细胞减少等。根据题中所述,应为伤寒。急性乙型肝炎血清检查应有 HBAg 阳性。钩端螺旋体病以肌肉酸痛为特征,尤其是腓肠肌。急性血吸虫病和急性细菌性痢疾多伴脓血便。(B 对)。

79. 答案:A

解析:患者有臀区痛 1 年、晨僵现象,血沉升高、HLA-B27(+),双侧骶髂关节面虫蚀样改变,提示为中轴型脊柱关节炎,初次治疗首选非甾体抗炎药(A 对)。不支持全身应用糖皮质激素治疗中轴关节病变。甲氨蝶呤主要用于抗肿瘤、银屑病、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、皮炎。TNF 抑制剂推荐在至少经 2 种 NSAIDs 足量治疗 2~4 周疗效不佳的病人可以使用该类药物。来氟米特为免疫抑制剂,具有抗主要应用于类风湿性关节炎、系统性风湿活性,红斑狼疮、韦格纳肉芽肿、抗排斥反应等。(E. 错误)。

80. 答案:D

解析:患者右小腿外伤后,右侧足背前内侧感觉障碍。腓总神经支配小腿前外侧伸肌群及小腿前外侧和足背皮肤。腓骨头、颈部骨折易引起腓总神经损伤,导致小腿前外侧和足背前内侧感觉障碍。故最可能损伤的神经是腓总神经。(D 对)。股神经损伤:股神经损伤较少见,表现为股四头肌麻痹所致膝关节伸直障碍及股前和小腿内侧感觉障碍。胫神经损伤:小腿后侧、足背外侧、跟外侧和足底感觉功能障碍。腓肠神经损伤:足背及足胫部感觉障碍。隐神经损伤:小腿后侧、足背外侧、跟外侧和足底感觉功能障碍。

81. 答案:C

解析:患者青年男性,有开放性骨折病史,且创口长久不愈合,为慢性病程,并形成窦道,有少量脓性分泌物,并有死骨排出,应当诊断为慢性血源性骨髓炎。

82. 答案:D

解析:男性工人,高温环境下连续工作数周后,工作能力提高,血压和心率降低,根据表现该工人长期在高温下工作适应了此环境,故这种现象属于热适应。

83. 答案:A

解析:患者跌伤后昏迷,中间有清醒期(步行回家,后再次意识障碍),头颅CT提示颅内双凸形高密度影,为硬膜外血肿的典型表现。(A对)。急性脑内血肿比较少见。常与枕部着力时的额、颞对冲性脑挫裂伤同时存在,少数位于着力部位;CT检查表现为脑挫裂伤区附近或脑深部白质内类圆形或不规则高密度影。(B错误)。脑挫裂伤是头部遭受暴力造成的原发性脑器质性损伤,既可发生于着力点的脑组织,也可在对冲部位。典型CT表现为局部脑组织内有高低密度混杂影,点片状高密度影为出血灶,低密度影则为水肿区。(C错误)。脑震荡是较轻的脑损伤,其特点为伤后即刻发生短暂时间的意识障碍和近事遗忘,CT检查颅内无异常。(D错误)。急性硬膜下血肿急性和亚急性硬脑膜下血肿的出血主要是因为脑皮质血管破裂,大多由对冲性脑挫裂伤所致,好发于额极、颞极及其底面。CT检查表现为脑表面与颅骨之间有新月形高密度、混杂密度或等密度影。(E错误)。

84. 答案:B

解析:患者头部撞伤后眼睑青紫、结膜下出血,为淤血所致,俗称熊猫眼或眼镜征,伴脑膜撕裂者,脑液沿裂口

经鼻腔流出,出现脑脊液鼻漏(淡红色液体)。为颅前窝骨折时,骨折累及额骨水平部(眶顶)和筛骨所致。(B对)。眼外伤可有眼睑青紫、结膜下出血表现,但一般不伴嗅觉丧失这种神经系统表现,也不会有淡红色液体从鼻腔流出。(A错误)。颅中窝骨折不会累积到嗅神经。(C错误)。颅后窝骨折在乳突和枕下部可见皮下淤血(Battle征),或在咽后壁发现硬膜下淤血。骨折位于中线者可出现舌咽神经、迷走神经、副神经和舌下神经损伤。一般不累及嗅神经,不导致熊猫眼或眼镜征。(D错误)。面部软组织损伤可出现眼睑青紫,但不累及骨质,不导致脑脊液鼻漏。(E错误)。

85. 答案:C

解析:患者之前患有上呼吸道感染且服用抗生素治疗达10天(诱发因素),可能破坏了身体中的菌群平衡,假丝酵母菌转化为菌丝相,大量繁殖生长侵袭组织,引起炎症反应。(C对)。滴虫阴道炎是由阴道毛滴虫引起的常见阴道炎症,也是常见的性传播疾病,性交直接传播是其主要传播方式。题干中并未体现任何滴虫性阴道炎的症状体征病因。细菌性阴道病是阴道内正常菌群失调所致的感染。促使阴道菌群发生变化的原因仍不清楚,可能与频繁性交、反复阴道灌洗等因素有关。且患者还在应用抗生素,排除细菌性阴道病。萎缩性阴道炎为雌激素水平降低局部抵抗力下降引起的、以需氧菌感染为主的阴道炎症。常见于自然绝经或人工绝经后的妇女也可见于产后闭经、接受药物假绝经治疗者。题目并未体现。非特异性外阴炎是由物理、化学等非病原体因素所致的外阴皮肤或黏膜炎症。患者有明显的抗生素使用史的诱因,故不选非特异性阴道炎。

86. 答案:C

解析:略。

87. 答案:C

解析:患儿发热 5 天出疹 1 天, 现于耳后、发际, 渐蔓延至躯干、四肢, 疹间可见正常皮肤, 不伴痒感, 可诊断为麻疹。肺炎是麻疹最常见的并发症, 多见于 5 岁以下小儿, 可发生于麻疹的各期, 是麻疹死亡的主要原因之一。(C 对)。

88. 答案:A

解析:患儿 3 岁, 发育落后, 少动, 紫绀, 有蹲踞现象(法洛四联症的典型表现)。胸骨左缘 2、3 肋间可闻及响亮粗糙的收缩期杂音(法洛四联症的听诊特点), X 线示右室肥大, 肺动脉凹陷(靴型心的表现)。综合患儿症状、体征, 此患儿最可能的诊断是法洛四联症。

89. 答案:A

解析:老年患者男性, 进行性记忆力减退, 忘记回家的路, 查体无异常, 根据典型的病史及临床表现, 考虑阿尔茨海默症。(A 对)。环境障碍是阻碍人们获得最佳作业活动能力的任何外部因素。包括物质的、社会的、文化的、政治的等因素。记忆障碍指个人处于一种不能记住或回忆信息或技能的状态, 有可能是由于病理生理性的或情境性的原因引起的永久性或暂时性的记忆障碍。轻度记忆障碍一般不会忘记回家的路。帕金森病痴呆属于一种在帕金森病疾病的中期或晚期所发生的不良症状, 在患者死亡前 5 年到 2 个月这一段时间最为明显一般伴有震颤等典型帕金森病表现。血管性痴呆是脑血管病变或血管危险因素引起的脑损害所致的痴呆, 患者表现出记忆、注意、执行功能和语言等高级认知功能的严重受损, 是血管性认知障碍中的痴呆阶段。血管性痴呆查体

一般有阳性体征。

90. 答案:E.

解析:患者意识模糊伴呕吐, 有高血压病史, 结合 CT 表现明确为脑出血, 出血部位为基底节区, 该区为豆纹动脉供血区, 故出血为豆纹动脉破裂所致。(E. 对)。大脑后动脉起自基底动脉皮层支供应枕叶、颞叶底部深穿支供应脑干、丘脑、海马、膝状体, 其出血一般导致上述部位 CT 改变。(A 错误)。大脑中动脉作为颈内动脉最大的分支, 分为皮层支和中央支。大脑中动脉的皮层支供应大脑半球背外侧面的大部分以及岛叶。其中央支也叫豆纹动脉, 供应; 基底节区, 如尾状核、豆状核、内囊膝部、内囊后肢的前部等位置。大脑中动脉主干出血影响范围不局限于基底节区。(B 错误)。大脑前动脉是颈内动脉的主要分支之一, 位于大脑纵裂内, 由前向后行, 起始段与对侧同名动脉在中线上借前交通动脉相连。它主要营养顶枕沟以前的大脑半球内侧面、额叶底面的一部分和内囊前段, 其出血不表现为基底节区血肿。(C 错误)。颈内动脉是颈总动脉的终支之在颅内分支主要分布于大脑的前 2/3 部和视器。其出血不表现为基底节区血肿。(D 错误)。

91. 答案:E.

解析:患者 51 岁, 闭经 7 个月, 考虑绝经, 处于围绝经期(从卵巢功能开始衰退直至绝经过渡期 FSH 水平升高经后 1 年内的时期)呈波动型。

92. 答案:B

解析:被害妄想指患者坚信自己被某些人或某些组织进行迫害, 被害主体是自己。而患者说母亲故与某人有关, 被害主体不是自己, 故不属于被害妄想。

93. 答案:C

解析:患者为初产妇, 临产 10h, 宫口

扩张 3cm (4cm, 处于潜伏期 (初产妇潜伏期不超过 20 小时), 宫缩 2 次/3 分钟(无宫缩乏力, 宫缩 <2 次/10 分钟为宫缩乏力), 宫缩中等强度, 胎儿双顶径位于坐骨棘(无头盆不称), 胎心率 140 次/分(无胎儿窘迫)故该产妇属正常产程, 应继续观察。

94. 答案:E.

解析:患者近 2 到 3 年自觉反应慢、饮食和运动较前无明显变化、但每年体重上涨 2kg、FT3 及 FT4 降低, TSH 升高, 提示甲状腺功能减退症; 冠心病史 3 年, 且患者年龄 50 岁以上, 应用左旋甲状腺素治疗需常规检查心脏状态, 防止诱发和加重心脏病。

95. 答案:A

解析:患者烧伤面积:双臀+双下肢面积=5+21+13+7=46%, 患者烧伤程度评估:浅 II 度烧伤; 伤及表皮的生发层和真皮乳头层。局部红肿明显, 有大小不一的水疱形成, 内含淡黄色澄清液体, 创面红润、潮湿、疼痛明显。(A 对, BCDE. 错误)。

96. 答案:B

解析:根据患儿 8 个月, 主要症状为高热(体温 39.3°C), 有全面惊厥发作表现(双眼上翻, 肢体强直), 神志很快恢复(持续半分钟后缓解), 2 个月前曾有同样发作史, 首先考虑为热性惊厥。

97. 答案:C

解析:患者输注血小板后出现荨麻疹伴瘙痒。考虑过敏性输血反应, 故停止输血为最佳处理措施。继续缓慢输入不正确。

98. 答案:E.

解析:患者, 中老年男性, 间断无痛全程肉眼血尿(泌尿系肿瘤的主要表现), 静脉尿路造影示右肾盂有充盈缺损(肾盂癌有明显影像学表现), 可诊断为肾盂癌。

99. 答案:A

解析:患者老年男性, 左上肢抽搐 3 天, 每次发作约 10 秒钟缓解, 3 天来共发作 5 次考虑为单纯性局灶性癫痫。苯妥英钠:治疗大发作和局限性发作的首选药物。

100. 答案:A

解析:开放性骨折, 创口用无菌敷料或清洁布类予以包扎, 以减少再污染。骨折端已戳出伤口, 可能伴有污染, 又未压迫重要血管、神经者, 不应将其复位, 以免将污物带到伤口深处。应送至医院经清创处理后, 再行复位。(A 对)。现场不是无菌环境, 不能进行缝合。(BCDE. 错误)。

101. 答案:B

解析:患儿 10 个月(结核性脑膜炎多见于 3 岁以内婴幼儿), 发热、呕吐(提示颅内压增高), 较兴奋(结核性脑膜炎的前期表现)。脑脊液外观毛玻璃样(结核性脑膜炎的脑脊液特点), 白细胞升高, 氯化物降低(正常 120~130mmol/L)、糖降低(正常 2.5~4.5mmol/L), 糖和氯化物均降低是结核性脑膜炎的典型表现), 综合患儿的病史、症状、体征, 考虑结核性脑膜炎。

102. 答案:A

解析:男孩, 尿有霉臭味(苯丙酮尿症特征表现), 智力落后, 查体:目光呆滞, 皮肤白皙, 毛发浅黄, 诊断考虑苯丙酮尿症, 为明确诊断应完善血苯丙氨酸浓度测定。

103. 答案:D

解析:患者下腹痛明显, 流量量增多病情发展, 查体可见:子宫如孕周大小, 宫口处有胚胎组织堵塞, 考虑为难免流产。(D 对)。先兆流产指妊娠 28 周前先出现少量阴道流血, 常为暗红色或血性白带, 无妊娠物排出, 随后出现阵发性下腹痛或腰背痛。妇科检查

宫颈口未开，胎膜未破，子宫大小与停经周数相符。经休息及治疗后症状消失，可继续妊娠；若阴道流血量增多或下腹痛加剧，可发展为难免流产。本患者即为病情加重，发展为难免流产(A 错误)。不全流产：难免流产继续发展部分妊娠物排出宫腔，还有部分残留于宫腔内或嵌顿于宫颈口处，或胎儿排出后胎盘滞留宫腔或嵌顿于宫颈口，影响子宫收缩，导致出血，甚至发生休克。妇科检查见宫颈口已扩张，宫颈口有妊娠物堵塞及持续性血液流出，子宫小于停经天数。(B 错误)。完全性葡萄胎为最常见的症状为停经后阴道流血，因葡萄胎迅速增长及宫腔内积血导致子宫大于停经月份，质地变软，并伴 hCG 水平异常升高。患者子宫大小同孕周，不符合完全性葡萄胎的表现。(C 错误)。完全流产：指妊娠物已全部排出，阴道流血逐渐停止，腹痛逐渐消失，妇科检查宫颈口已关闭，子宫接近正常大小。(E 错误)。

104. 答案:C

解析:由上一小问条件可知患者目前诊断为孕早期难免流产。难免流产一旦确诊，应尽早使胚胎及胎盘组织完全排出。早期流产应及时行清宫术，对妊娠物应仔细检查，并送病理检查；如有条件可行绒毛染色体核型分析，对明确流产的原因有帮助。

105. 答案:A

解析:患儿主要表现为面色苍白，母乳喂养，查体:皮肤粘膜苍白，实验室检查:血 Hb74g/L，考虑缺铁性贫血，应完善铁代谢检查。(A 对)。骨髓活检可以观察到骨髓造血组织的结构、骨髓增生程度、骨髓细胞成分及形态变化，可以发现骨髓是否有肿瘤性改变，是否有髓外肿瘤浸润等，可以用于诊断急性白血病、多发性骨髓瘤、转移

瘤、再生障碍性贫血等疾病。(B 错误)。血清维生素 B12 和叶酸有助于巨幼红细胞性贫血的诊断。(C 错误)。胸部 X 线明确肺部病变部位、性质以及有关气管、支气管通畅程度有重要价值。(D 错误)。血 Hb 用于评估有无贫血及贫血严重程度。(E 错误)。

106. 答案:A

解析:铁剂是治疗缺铁性贫血的特效药，维生素 C 有助于铁剂吸收。(A 对)。合理营养，及时添加辅食是缺铁性贫血的辅助治疗，不是主要治疗方法。口服维生素 B12 和叶酸是巨幼红细胞性贫血的治疗方法。服泼尼松有抗炎、抗过敏、抗风湿和免疫抑制作用，不用于贫血的治疗。输血的适应症:①贫血严重，尤其是发生心力衰竭者；②合并感染者；③急需外科手术者。

107. 答案:A

解析:患者青年女性，发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑 5 天。胸骨压痛，轻度肝脾肿大，双侧颈部、腋窝和腹股沟的淋巴结肿大，外周血可见原始和幼稚细胞(急性淋巴细胞白血病表现)故考虑该患者应为急性淋巴细胞白血病。(A 对)。

108. 答案:A

解析:骨髓细胞学检查主要反应骨髓细胞及其他细胞的形态学分类和数量及其质量的变化。急性淋巴细胞白血病 WHO 诊断标准为:骨髓中有大量原始、幼稚淋巴细胞 $\geq 20\%$ 。(A 对)。淋巴结活检是淋巴瘤的首选检查。(B 错误)。骨髓活检可以获得完整的骨髓组织结构，对再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合症的诊断有重要意义。(C 错误)。腹部 B 超可以了解患者有无腹腔淋巴结肿大，非该患者首选检查。(D 错误)。ANA 谱主要用于诊断风湿免疫性疾病。(E 错误)。

109. 答案:B

解析:VDLP 方案化疗是急性淋巴细胞白血病的化疗方案。(B 对)。ABVD 方案化疗是霍奇金淋巴瘤的化疗方案。给予大剂量糖皮质激素用于治疗特发性血小板减少性紫癜。DA 方案化疗是急性粒细胞白血病的化疗方案。CHOP 方案化疗是非霍奇金淋巴瘤的化疗方案。(ACDE. 错误)。

110. 答案:A

解析:患者停经 9 周出现阴道不规则流血 2 周(停经后阴道流血是葡萄胎最常见的症状), 子宫如孕 4 月大(符合葡萄胎子宫异常增大表现), 超声示宫腔内充满光点和小囊状强回声, 符合葡萄胎超声检查的表现, 因此最可能的诊断为葡萄胎。

111. 答案:A

解析:葡萄胎诊断一经成立, 应及时清宫, 但清宫前首先应注意有无休克、子痫前期、甲状腺功能亢进及贫血等合并症, 出现时应先对症处理, 稳定病情, 目前最佳的处理方法为清宫术。

112. 答案:C

解析:青年男性, 有不洁性交史, 尿道口有黄色分泌物流出, 最可能为淋病。淋病是由淋病奈瑟菌感染所引起的一种常见疾病, 主要表现为泌尿生殖系统黏膜的化脓性炎症, 主要通过性接触传染, 男性患者主要表现为尿道口有脓性分泌物流出。

113. 答案:C

解析:患者考虑淋病, 淋病治疗首选三代头孢, 如头孢曲松。(C 对)。多西环素用于立克次体病、支原体属感染、衣原体属感染、回归热、布鲁菌病、霍乱、兔热病、鼠疫、可用于中、重度痤疮患者作为辅助治疗。青霉素用于梅毒、钩端螺旋体流脑等。四环素用于立克次体病、支原体属感染、衣原体属感染、回归热、布鲁菌病、霍乱、鼠疫治疗。红霉素临床主要应用

于链球菌引起的扁桃体炎、猩红热、白喉及带菌者、肺炎链球菌下呼吸道感染。

114. 答案:B

解析:患者年轻女性, 双下肢对称性皮炎, 血小板处于正常值范围内, 提示患者应诊断为过敏性紫癜。

115. 答案:A

解析:患者年轻女性, 双下肢对称性皮炎, 血小板处于正常值范围内, 提示患者应诊断为过敏性紫癜。束臂实验阳性可提示患者毛细血管壁的结构和功能存在问题, 故可诊断过敏性紫癜。(A 对)。Coombs 试验是诊断自身免疫性溶血性贫血的重要指标。患者血常规未提示异常, 且诊断为过敏性紫癜, 故不需行骨髓穿刺、胸部 X 线尿常规。

116. 答案:A

解析:患者右胫前红肿伴畏寒、发热(提示感染), 皮疹呈片状, 颜色鲜红, 中间较淡边缘清楚, 微隆起, 指压稍褪色, 边界清, 结合足癣病史及皮损特点, 考虑诊断为丹毒。丹毒是乙型溶血性链球菌侵袭感染皮肤淋巴管网所致的急性非化脓性炎症。好发于下肢与面部, 大多常先有病变远端皮肤或黏膜的某种病损, 如足癣发病后淋巴管网分布区域的皮肤出现炎症反应。(A 对)。

117. 答案:E

解析:患者诊断为丹毒, 丹毒是乙型溶血性链球菌侵袭感染皮肤淋巴管网所致的急性非化脓性炎症。

118. 答案:A

解析:患者为中年女性, 月经不规律伴潮热、烦躁的症状, 且查体未见器质性病变, 首先考虑围绝经期综合征。

119. 答案:C

解析:患者 50 岁, 月经不规律、潮热烦躁, 未见器质性病变, 可能为绝经综合征, 而卵巢功能评价等实验室检

查有助于诊断。故首选女性激素。(C 对)。根据患者的症状体征,排除妊娠,无需检查 HCG,高度怀疑为绝经综合征妇科超声、宫腔镜仅能体现是否有器质性病变分泌物可用来检测患者是否有阴道炎的症状,与患者的表现不符。

120. 答案:B

解析:患者为中年女性患者,根据其月经不规律及潮热烦躁的表现,该患者可能绝经期综合征,激素治疗后发现子宫内膜异常增厚应格外注意子宫内膜癌。

121. 答案:D

解析:患儿 8 个月,抽搐可自行缓解不伴发热,醒后活泼如常,枕部颅骨有乒乓球感可见枕秃(维生素 D 缺乏的典型表现)。综合考虑患儿诊断为维生素 D 缺乏手足抽搐症。(D 对)。蛋白质-能量营养不良:患儿出现喂养困难,骨骼和智力发育迟缓,肌张力低下,肌肉松弛,表情冷淡或激动,面无笑容,体重下降,肌肉萎缩,皮下脂肪消失,消瘦,可有低蛋白性水肿,常有腹泻和腹部膨胀。维生素 D 缺乏性病主要表现在扁平胸、脊柱前弯、身体矮小、身体消瘦、面黄肌瘦、皮肤干燥、头发干枯、骨瘦如柴,伴有严重的营养不良、身体体虚乏力、没有精神、少言寡语、经常头晕、食欲不振、大便干燥、容易出汗,特别是夜间盗汗等。癫痫发作时的表现形式多种多样,但都具有突发、突止和周期性发作的特点但无部颅骨有乒乓球感。婴儿痉挛症为癫痫的一种表现。起病于 1 岁以内,呈突然发作,头及躯干、上肢均屈曲,手握拳,下肢弯曲至腹部,呈点头哈腰状抽搐和意识障碍,发作数秒至数十秒自停,脑电图有特征性的高幅异常节律波出现。

122. 答案:A

解析:综合考虑患儿诊断为维生素 D 缺乏手足抽搐症。应尽快给予 10%葡萄糖酸钙 5~10ml 加入 10%葡萄糖液 5~20ml 中,缓慢静脉注射或滴注,迅速提高血钙浓度,惊厥停止后口服剂,不可皮下或肌内注射钙剂以免造成局部坏死。

123. 答案:B

解析:患者高龄老人,膝关节长期疼痛活动后减轻,同时伴有内翻畸形,RF:(-),均为骨性关节炎的特征。故诊断为骨性关节炎。(B 对)。痛风性关节炎好发于男性,多见于第一距趾关节,可饮随低食物防止痛风复发,也发于踝部与足部关节。(A 错误)。创伤性关节炎又叫损伤性关节炎,由创伤引起的以关节软骨的退化变性和继发的软骨增生、骨化为主要病理变化,以关节疼痛活动功能障碍为主要临床表现的一种疾病。任何年龄组均可发病,但以青壮年多见。患者无外伤史。(CD 错误)。类风湿关节炎(RA)是一种病因未明的慢性、以炎性滑膜炎为主的系统性疾病其特征是手、足小关节的多关节、对称性、侵袭性关节炎,经常伴有关节外器官受累及 RF(+),可以导致关节畸形及功能丧失。(E. 错误)。

124. 答案:B

解析:根据患者症状,患者为骨性关节炎可能,优先选择 X 线检查。可见称性关节间隙变窄,软骨下骨硬化和囊性变,关节边缘增生和骨赘形成或伴有不同程度的关节积液,部分关节内可见游离体。严重者出现关节畸形,如膝内翻。

125. 答案:D

解析:患儿具有典型的临床表现,包括较重的胃肠道症状(腹泻频繁,呈蛋花汤状,呕吐频繁,尿量极少)和重度脱水的表现(皮肤弹性差,呈花纹状,前,

眼窝可见明显凹陷), 说明循环血容量不足。血钠 135mmol (等渗性脱水时血清钠在 130~150mmol/L), 综合考虑患儿为重度等渗性脱水。

126. 答案:A

解析:本例患者为重度等渗性脱水伴循环不良。对伴有循环不良和休克的重度脱水患儿开始应快速输入等张含钠液(生理盐水或 2:1 等张液)按 20ml/kg 于 30 分钟~1 小时输入。其余累计损失量补充常在 8~12 小时内完成。(A 对)。

127. 答案:B

解析:略。

128. 答案:E

解析:患者考虑脑栓塞, DSA(血管造影)是脑血管病检查的“金标准”, 可以明确脑血管病类型。

129. 答案:B

解析:患者经常反复思考某个问题, 因为怕脏, 反复多次, 甚至长时间洗手, 难以控制而苦恼, 考虑为强迫障碍。(选 B)。分离障碍主要临床表现是形式各异的运动和感觉障碍, 但客观的神经系统检查和实验室检查不能发现导致这些运动和感觉障碍的器质性基础, 或者所发现的证据不能解释患者的神经系统症状, 如症状和体征不符合神经系统解剖的生理特征, 与患者临床表现不符。(A 错误)。精神分裂症患者可出现强迫症状, 强迫症患者的强迫观念亦可达到妄想的程度, 二者鉴别的要点:前者往往还会出现幻觉、妄想、言行紊乱等其他精神病性症状;患者是否为之苦恼, 还是淡漠处之, 以及是否与环境、现实协调等。患者没有出现幻觉、妄想、言行紊乱等其他精神病性症状, 不考虑精神分裂症。(C 错误)。广泛性焦虑障碍患者关注多是日常生活的现实问题, 忧虑源于感知到外界有威胁存在, 但内容多是

一种含糊不清、令人烦恼的不祥预兆, 患者不认为自己的忧虑是不合适的, 不会导致强迫性仪式行为, 与患者临床表现不符。(D 错误)。抑郁症主要表现为心境低落、兴趣减退、快感缺失等, 与患者临床表现不符。(E 错误)。

130. 答案:B

解析:强迫症临床表现包括强迫观念和强迫行为两大方面。强迫观念中的强迫穷思竭虑表现为患者对一些常见的事情、概念或现象反复思索, 刨根究底, 自知毫无现实意义, 但不能自控。该患者经常反复思考某个问题, 感觉痛苦(强迫观念), 反复多次甚至长时间洗手, 难以控制而苦恼(强迫行为)。头颅 CT 检查正常, 可诊新为强迫症。药物可选择性 5-羟色胺, 再摄取抑制剂(SSRIs)如氟西汀、氟伏沙明、舍曲林、帕罗西汀; 三环类抗抑郁药物, 如氯米帕明等。其中, SSRIs 是目前的一线治疗药物, 氯米帕明因不良反应限制了其应用。所以首选氟西汀。(B 对)。碳酸锂有明显抑制躁狂症的作用, 还可改善精神分裂症的情感障碍, 不用于强迫症。苯妥英是抗癫痫药、抗心律失常药, 不用于强迫症。卡马西平是抗惊厥药、镇痛药不用于强迫症。地西洋具有镇静、抗焦虑、抗惊厥作用的药物, 不用于强迫症。

131. 答案:B

解析:急性失血性贫血, 使血管内总的红细胞数量和血红蛋白下降, 但是红细胞的形态和每个红细胞内所含血红蛋白的浓度均正常, 所以为正细胞正色素性贫血。(B 对)。大细胞正色素性贫血多见于巨幼细胞性贫血。小细胞低色素性贫血多见于缺铁性贫血。正细胞低色素性贫血和小细胞正色素性贫血不常见。(ACDE. 错误)。

132. 答案:E

解析:慢性失血性贫血主要为铁离子丢失,且未得到及时得补充,故应为小细胞低色素性贫血。如胃肠道慢性失血,月经量增多导致得慢性失血,均会导致缺铁性贫血。(E.对,ABCD错误)。

133. 答案:C

解析:易激惹的定义:指情绪不稳定变化快,容易因小事产生强烈反应,若不避免激惹,患者可能会疲劳。患者因一件小事引起极大的情感波动,符合此诊断。

134. 答案:B

解析:焦虑主要临床表现;精神障碍患者常常有不明原因的提心吊胆、紧张不安,显著的自主神经功能紊乱症状、肌肉紧张及运动性不安。患者往往能够认识到这些担忧是过度和不恰当的,但不能控制,因难以忍受而感到痛苦。该患者无客观原因的出现惶恐不安,心慌,坐立不安,均是焦虑的表现。

135. 答案:D

解析:由题目可知患者为足月初产妇突发的阴道出血伴下腹痛可能是因为重度子痛前期导致的血管病变。

136. 答案:C

解析:患者妊娠晚期,既往有子宫肌瘤剔除手术史,为瘢痕子宫,是子宫破裂的诱因,患者下腹剧烈痛,烦躁不安,下腹拒按,导尿为淡血水样,为先兆子宫破裂,C对。子宫破裂后宫腔与腹腔相通,因羊水、血液进入腹腔刺激腹膜,出现全腹持续性疼痛,并伴有低血容量休克的征象。患者目前并未出现休克等症状。(B错误)。

137. 答案:D

解析:高渗高血糖状态属于糖尿病急性并发症,胰岛素静脉滴注可迅速控制血糖水平(D对)。高渗高血糖状态属于糖尿病急性并发症,口服降糖药物起效较慢,不能迅速控制血糖水平。

皮下注射胰岛素起效较静脉滴注起效慢,且剂量调节不如静脉滴注迅速,不能快速控制高渗高血糖状态。运动及饮食不能迅速控制血糖水平。

138. 答案:B

解析:妊娠期合并2型糖尿病首选胰岛素皮下注射,皮下注射胰岛素后,最大吸收峰出现在1-2小时,吸收曲线上升和下降较为平缓胰岛素作用较为稳定、持久。(选B)。口服降糖药可能对胎儿发育有影响,不是首选。(不选AC)。胰岛素静脉滴注不适宜日常控制血糖。(不选D)。运动与饮食只是治疗糖尿病的辅助手段。(不选E.)。

139. 答案:C

解析:脊柱关节炎包括:强直性脊柱炎、银屑病关节炎、炎性肠病关节炎、反应性关节炎。

140. 答案:D

解析:骨关节炎是一种以关节软骨损害为主,并累及整个关节组织的最常见的关节疾病,最终发生关节软骨退变、纤维化、断裂、缺损及整个关节面的损害。骨关节炎属于骨关节退行性变。

141. 答案:A

解析:神经系统:在胎儿期,神经系统的发育领先于其他各系统,发育最早、先快后慢。

142. 答案:E.

解析:生后6个月内生长最快,1周岁后基本稳步成长,至青春期又迅速加快。所以,体格发育规律为快、慢、快。

143. 答案:B

解析:肾细胞癌金标准是肾活检,增强CT是最常用、确诊率高、最可靠的影像学方法;静脉尿路造影(IVU)可见肾盂肾盂不规则变形、狭窄、拉长、移位;鉴别肾囊肿可行肾动脉造影检查。

144. 答案:D

解析:肾盂癌静脉尿路造影显示肾盂充

盈缺损。

145. 答案:B

解析:肝硬化腹水大量失代偿期、出现少尿,提示肾脏血流灌注不足,考虑肾前性肾功能损害。

146. 答案:E

解析:患者食入生鱼胆(肾毒性)后恶心、呕吐、腹痛、腹泻伴少尿,尿比重降低(正常 1.015~1.025),尿钠升高(大于 30),BUN 8.97mmol/L(正常 3.2~7.1),考虑诊断为急性肾小管坏死。

147. 答案:E

解析:癫痫复杂部分性发作病灶多颞叶。(E 对)。中央前回及附近多是癫痫部分运动性发作病灶。(A 错误)。锥体外系统可引起帕金森等疾病,不会引起癫痫等疾病。(B 错误)小脑病损主要表现为共济失调。(C 错误)。枕叶主要表现为伴有视觉症状的单纯部分性发作。(D 错误)。

148. 答案:A

解析:中央前回及附近多是癫痫部分运动性发作病灶。

149. 答案:C

解析:内感性不适属于内脏感觉的障碍,是躯体内部产生性质不明确,部位不确定的不舒服感难以忍受,表现有蚂蚁爬的感觉,还有游走感、挤压感,性质比较模糊。符合题干描述。

150. 答案:D

解析:内脏幻觉是患者身体内部某一部位或某一脏器虚幻的知觉体验,患者有时感到胃在扭转,断裂或穿孔符合内脏性幻觉的表现。

第二单元

1. 答案:A

解析:①一级预防:病因预防(病因明确的疾病;传染病、职业病)排除 BD;

②二级预防:三早(早发现、早诊断、早治疗)(病因不太明确的或多病因:肿瘤);③三级预防:防伤残、促康复、预防并发症。(病因不明)排除 CE。

2. 答案:A

解析:临终关怀:不是“治疗”,而是一种特殊服务。服务对象:临终患者及家属。参与人员:社会各个层面。目的:提高生存质量,而不是延长生存时间。

3. 答案:B

解析:结肠癌的好发部位,由高到低排列,依次是右半结肠、乙状结肠、直肠、横结肠和降结肠,最后是盲肠和阑尾。

4. 答案:A

解析:B 超可以发现结石,并明确其大小和部位,操作简单,价格低廉,对结石的诊断准确率接近 100%,是诊断胆囊结石首选的检查方法。

5. 答案:E

解析:肝脏生物转化的生理意义:①对体内大部分的非营养物质进行代谢转化,使其生物学活性降低或丧失,或使有毒物质的毒性减低或消除。②增加非营养物质的水性或极性,从而易于从胆汁或尿液中排出。但应该指出的是,有些非营养物质经肝的生物转化作用后,虽然溶解性增加,但其毒性反而增强,有的还可能溶解性降低,不易排出体外。

6. 答案:A

解析:喹诺酮抗菌药的不良反应主要是胃肠道反应、中枢毒性光毒性、心脏毒性及软骨损害等。禁用于喹诺酮过敏者、孕妇和哺乳期妇女。(A 对)。氨基糖苷类不良反应主要是前庭神经功能损伤和耳蜗听神经功能损伤、肾毒性及神经肌肉麻痹。(B 错误)。四环素类不良反应主要是局部刺激、二重感染、抑制骨骼和牙齿生长及肝肾损伤等。(C 错误)。磺胺类的不良反

应包括胃肠道反应、泌尿系统损害、过敏反应和血液系统反应等。(D 错误)。青霉素类的不良反应包括变态反应、赫氏反应、大剂量青霉素钾盐或钠盐静脉滴注,可引起明显的水、电解质紊乱。(E 错误)。

7. 答案:E

解析:腹膜炎的体征(主要标志)。包括腹部压痛、腹肌紧张(重者为板样强直)、反跳痛。腹胀加重是病情恶化的重要标志。

8. 答案:B

解析:机械性肠梗阻是肠梗阻中最常见的,其中机械性肠梗阻的常见的原因包括肠内因素:寄生虫(E)、粪块(D)、大胆石、异物;肠外因素:肠粘连(B)、扭转、嵌顿性疝、腹腔内肿瘤压迫、索带压迫等;肠壁因素:先天性肠道闭锁、肿瘤(C)、炎性狭窄(A)、肠系膜血管栓塞或血栓形成等。以上都是机械性肠梗阻的常见原因,其中最常见的是术后肠粘连。(B 对)。

9. 答案:B

解析:腹股沟斜疝多发生于儿童及青壮年,病块呈圆或梨形回纳后压住深环不再突出。(B 对)。腹股沟直疝多发生于年老体弱,病块呈半球性,压住深环后增高腹内压,疝块仍突出。(A 错误);股疝多见于 40 岁以上女性,疝块经股管突出,回纳后不能完全消失。(C 错误)。切口是发生于腹壁手术切口的疝。(D 错误)。白线是指发生于腹壁正中线(白线)处的疝,很少发生嵌顿。(E 错误)。

10. 答案:C

解析:酶分子中能与底物特异地结合并催化底物转变为产物的具有特定三维结构的区域称为酶的活性中心或酶的活性部位。(C 对)。酶活性中心是与底物特异地结合并催化底物转变为产物的结合基因,而不是结合底物并

发挥作用的结合基因,也不是结合产物的结合基因。(AB 错误)。酶的活性中心具有三维结构,往往形成裂缝或四陷。而不是一级结构的基因基因。(D 错误)。辅酶和辅基往往是酶活性中心的组成成分。酶分子中有许多化学基团,但它们并非都与酶的活性有关,其中一些与酶的活性密切相关的基团称为酶的必需基团。所以酶活性中心催化基因的说法是错误的。(E 错误)。

11. 答案:A

解析:肝性脑病患者,应减少肠内氨的产生和吸收,可用乳果糖灌肠,禁用肥皂水灌肠。(A 对)。应抑制芳香族氨基酸进入大脑,减少假性神经递质的形成。(B 错误)。当肝性脑病患者出现烦躁、抽搐时禁用阿片类、巴比妥类、苯二氮卓类镇静剂。因为肝性脑病本身可以造成神经系统功能异常或是昏迷的可能,使用镇静剂可以造成病情加重诱发形成肝性脑病。(C 错误)。应尽可能保证热能供应,避免低血糖;补充各种维生素、酌情输注血浆或清蛋白,急性起病数日内禁食蛋白质。(D 错误)。利尿过度常出现低钾性碱中毒的内环境紊乱,因此,应重视病人的营养支持,利尿药的剂量不宜过大。(E 错误)。

12. 答案:B

解析:死亡率:指某人群在一定期间内(一般为一年)的总死亡人数与该人群同期平均人口数之比,故选 B。

13. 答案:B

解析:心包积液 X 线检查可见心影向两侧增大呈烧瓶状,心脏搏动减弱或消失。(B 对)。

14. 答案:C

解析:肺动脉栓塞造成肺动脉栓塞的栓子 95%以上来自下肢膝以上的深部静脉,特别是腓静脉、股静脉和髂静脉,偶尔可来自盆腔静脉或右心附壁血栓。

15. 答案:A

解析:反流性食管炎的病因是胃酸、胃蛋白酶等反流物的直接损伤故治疗时应当首选抑酸药物,其中PPI(质子泵抑制剂),抑酸作用强,疗效确切,是治疗反流性食管炎的首选药物,如奥美拉唑(A对)。苯海拉明为抗组胺药可用于过敏性疾病,而非反流性食管炎。(B错误)。雷尼替丁为H₂受体拮抗剂,能明显地抑制食物、组胺、胃泌素、咖啡因与胰岛素等刺激引起的胃酸分泌。但在体内分布广泛,药理作用复杂,故副作用及不良反应较多,疗效不及PPI,不作为首选。(C错误)。肾上腺皮质激素可用于自身免疫病、肾上腺皮质功能不全等而非反流性食管炎。(D错误)。异丙嗪为抗组胺药多用于晕动病、镇静催眠等,而非反流性食管炎。

16. 答案:D

解析:糖原分解是从非还原性末端进行磷酸解,糖原磷酸化酶分解 α -1,4-糖苷键释放出葡糖-1-磷酸(1-磷酸葡萄糖),进而转变为6-磷酸葡萄糖。(D对)。肝内存在葡糖-6-磷酸酶,可将6-磷酸葡萄糖水解成葡萄糖入血。肝内存在果糖激酶,特异催化生成果糖衍生物1-磷酸果糖。6-磷酸果糖是糖酵解过程中的产物。

17. 答案:B

解析:根据《中华人民共和国传染病防治法》第二条:国家对传染病防治实行预防为主方针,防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众。

18. 答案:E

解析:根据《母婴保健法》第三十三条规定:从事本法规定的遗传病诊断、产前诊断的人员,必须经过省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门的考核,并取得相应的合格证书;从事本法规定的从事婚前医学检查的人员,须经

设区的市级人民政府卫生部门许可;从事施行结扎手术和终止妊娠手术的人员以及从事家庭接生的人员,必须经过县级以上地方人民政府卫生行政部门的考核,并取得相应的合格证书。(E对)。

19. 答案:A

解析:队列研究:将研究对象分为暴露组和非暴露组,追踪观察一定期限,比较两组某病发病率或死亡率有无明显差别,从而判断暴露因素与疾病的关系的研究方法。生态学研究:以群体为基本单位收集和分析资料,研究暴露与疾病的关系。通过快速的试验、检验、检查或其他措施,从表面健康的人群中去发现那些未被识别的病人或有缺陷的人(可疑对象)。现况研究:按照事先设计的要求,在某一时间点或短时间内,通过普查、筛检或抽样调查的方法,对某一特定人群的某种疾病或健康状况及有关因素进行调查,从而描述该病或健康状况的分布及其与相关因素的关系。对照研究:选择一个病例组和一个对照组,调查他们发病前暴露于某个因素的情况,比较两组中暴露率的差异,以研究疾病与因素的关系。其中研究设计论述强度最高的是队列研究。

20. 答案:B

解析:腹部闭合性损伤患者如果没有腹腔内大出血,则应对腹腔脏器进行系统、有序的探查,探查次序原则上应先探查肝、脾等实质性器官,同时探查膈肌、胆囊等有无损伤;接着从胃开始,逐段探查十二指肠第一段、空肠、回肠、大肠以及其系膜,然后探查盆腔脏器,再后则切开胃结肠韧带显露网膜囊,检查胃后壁和胰腺,如有必要,最后还应切开腹膜探查十二指肠二、三、四段。

21. 答案:B

解析:分层抽样是先将总体的单位按某种特征分为若干次级总体(层),然后再从每一层内进行单纯随机抽样组成一个样本。(B对)。单纯随机抽样是指从总体N个单位中任意抽取n个单位作为样本,使每个可能的样本被抽中的概率相等的一种抽样方式,抽样误差大。(A错误)。整群抽样是指整群地抽选样本单位,未考虑地域差异性。(C错误)。系统抽样(又称机械抽样)就是将总体各单位按一定标志或次序排列成为图形或一览表式,然后按相等的距离或间隔抽取样本,未考虑区域差异性,间距无法确定。(D错误)。多级抽样它把抽取样本单位分为n个步骤进行,即先从总体中抽取一级单位,然后再从抽中的一级单位中抽取二级单位,直到抽取最终单位。(E错误)。

22. 答案:E

解析:患者因糖尿病足医生建议截肢患者无法承受截肢带来的挫折和压力,由此而导致行为异常:表现出绝望,冷漠,拒绝治疗,故反应的是患者角色异常。(E对)。角色行为缺如:不承认自己有病。角色行为冲突:病人角色与其他社会角色发生心理冲突。角色行为减退:进入病人角色后,由于某种原因又重新承担起其社会角色。角色行为强化:安于病人角色,小病大养。(ABCD错误)。

23. 答案:D

解析:因患者为儿童,且属于抑郁状态故应选用汉密尔顿抑郁量表评估,由专业人士来评估。ABCE均属于自评量表,不符合题意。

24. 答案:C

解析:医学伦理学是研究医学道德现象的学问,是医学与伦理学相互交叉形成的一门学科。医学伦理学是规范伦理学在医疗卫生领域中的具体应用,

即运用一般规范伦理学的理论和方法来分析和解决医疗卫生实践和医学科学发展中的各种道德问题,属于应用规范伦理学。(C对)。

25. 答案:D

解析:是指患者入院时不存在、也不处于潜伏期,而于入院48小时后在医院内发生感染。

26. 答案:A

解析:脂酰COA进入线粒体是脂肪酸 β 氧化的限速步骤,肉碱脂酰转移酶I是脂肪酸 β -氧化的关键酶。当饥饿、高脂低糖膳食或糖尿病时机体没有充足的糖供应,或不能有效利用糖,需脂肪酸供能,肉碱脂酰转移酶I活性增加,脂肪酸氧化增强,加快 β 氧化。能够加快 β 氧化的是高血糖。(不选B)。 β 氧化与血压无关。(不选CD)。能够加快 β 氧化的是低血糖,而不是高血糖。(不选E)。

27. 答案:C

解析:开放性气胸,外界空气可随呼吸自由进出胸膜腔,呼、吸气时,两侧胸膜腔压力不均衡出现周期性变化,使纵隔在吸气时移向健侧,呼气时移向患侧,称为纵隔扑动。(C对)。

28. 答案:E

解析:骨骼肌兴奋-收缩耦联的结构基础是三联管,耦联因子是 Ca^{2+} 。三联管结构(1横管+2纵管系统的终池)处的信息传递和转换,T管膜上特定蛋白质活化,激活肌质网终池膜上的 Ca^{2+} 释放通道。(E对)。

29. 答案:E

解析:医学伦理学是研究医学道德的科学,同时,它是医学与伦理学相交叉的学科,是认识、解决医疗卫生实践和医学科学发展中人们之间、医学与社会之间伦理道德关系的科学。

30. 答案:E

解析:《侵权责任法》规定,紧急情况

下，为挽救患者而急需手术，在无陪同家属签字的情况下，经医疗机构负责人或者授权的负责人批准，可以立即实施相应的医疗措施。(E 对，ABCD 错误)。

31. 答案:D

解析:吸入糖皮质激素由于其局部抗炎作用强、全身不良反应少，已成为目前哮喘长期治疗的首选药物。

32. 答案:D

解析:高血钾症、妊娠妇女和双侧肾动脉狭窄患者禁用 ACEI 类制剂。

33. 答案:D

解析:医生利用自己职务之便开处方而谋求利益，违反了《中华人民共和国执业医师法》，应责令暂停六个月以上一年以下执业活动。

34. 答案:A

解析:连枷胸见于根多处肋骨骨折时，使局部胸壁失去完整肋骨支撑而软化，在自主呼吸时出现反常运动。(A 对)。沉默呼吸提示体内有缺氧而引起的反射性呼吸动作。临床上可见于各种原因引起的严重肺部感染(B 错误)。胸腹矛盾运动多见于如下原因呼吸系统疾病，包括肺气肿，重症哮喘，慢性阻塞性肺疾病;呼吸肌疲劳;肋骨骨折，相邻的多根肋骨多处骨折时，也会导致胸壁浮动，会出现矛盾呼吸。(C 错误)。神经系统急症脑干受压可出现间停呼吸，损伤区域迅速扩大可出现呼吸暂停。(D 错误)。胸壁软化是指严重的闭合性胸部损伤导致多根多处肋骨骨折，使局部胸壁失去肋骨支撑而软化，出现反常呼吸。(E 错误)。

35. 答案:E

解析:抗体滴度的特点是值之间成倍数关系变化，需通过计算几何均数来描述其集中趋势。(E 对)。标准差、极差、四分位间距是用来反映观察值离散程度的。(ACD 错误)。算术平均数

是用来反映观察值的集中趋势的，但是适用于呈正态或近似正态分布的定量资料。(B 错误)。

36. 答案:C

解析:心脏骤停是指心脏射血功能突然终止，造成全身血液循环中断、呼吸停止和意识丧失。导致心脏骤停的病理生理机制最常见的快速型室性心律失常(室颤和室速)，其次为缓慢型心律失常或心脏停搏，较少见的为无脉性电活动。(C 对)。终末期心力衰竭可导致心脏骤停但不是最常见的原因。

37. 答案:B

解析:呼吸困难、心绞痛和晕厥是典型主动脉狭窄的常见三联征。(B 对)。水肿不是典型主动脉瓣狭窄的常见三联征。(ACDE 错误)。

38. 答案:C

解析:2 岁小孩对母亲产生的是安全的需要，以求免于威胁、免于孤独的状态。(C 对)。生理需要主要以饥饿和渴为主。(A 错误)。依赖需要也属于生理需要的范畴。(B 错误)。尊重需要是个体对自身价值的认同，在 2 岁小孩可能尚不完善;自我需要是最高层次的需要，一般与年龄增长相适应，2 岁的小孩对此类需要较低。(DE 错误)。

39. 答案:C

解析:心室颤动可导致心脏骤停。心脏骤停发生后，大部分病人将在 4~6 分钟内开始发生不可逆脑损害，随后经数分钟过渡到生物学死亡。

40. 答案:D

解析:肝移植是终末期肝硬化最有效的治疗方法。(D 对)。保肝治疗只是常规的一般治疗，抗肝炎病毒治疗可以去除或减轻病因，改善肝功能，但无法挽救终末期肝硬化;当患者出现肝性脑病或腹水并发腹膜炎等其他感染时需要抗生素治疗。(ABC 错误)。因缺少肝源不能进行肝移植治疗的患者，

人工肝可以代替人体的肝脏进行移植但是人工肝使用年限比较短，一般3~5年。不是最佳选项。

41. 答案:A

解析:肺小细胞癌(或燕麦细胞癌)组织合成并自主性释放 AVP (抗利尿激素),半数以上肺小细胞癌病人的血浆 AVP 增高,使尿液中的水分重吸收增加,尿量减少,导致水排泄障碍。

42. 答案:C

解析:心律失常见于 75%~95%的急性心肌梗死病人,多发生在起病 1~2 天,而以 24 小时内最多见,可伴乏力、头晕、晕厥等症状。

43. 答案:A

解析:我国在 2007 年提出的中国心衰指南的相关标准来摄入,其中提出轻度心衰患者的钠盐摄入量以 2~3g/d 为佳,中至重度心衰患者以 <2g/d 为佳。欧洲在 2012 年的心脏病学学会中提出的标准则以 2g/d 的摄入量为佳。

《2017 加拿大心血管协会心力衰竭管理指南》未对患者进行临床分期,而是总体建议心衰患者限制钠摄入量 2~3 g/d。

44. 答案:A

解析:小细胞肺癌细胞质内含有神经内分泌颗粒,具有内分泌和化学受体功能,能分泌 5-羟色胺、儿茶酚胺、组胺、激肽等物质,可引起类癌综合征。

45. 答案:D

解析:若 CAP 符合下列 1 项主要标准或 3 项次要标准者可诊断为重症肺炎,需密切观察积极救治,有条件时收住 ICU 治疗。主要标准:需要气管插管行机械通气治疗;脓毒症休克经积极液体复苏后仍需要血管活性药物治疗。次要标准:呼吸频率 ≥ 30 次/分; PaO_2/FiO_2

<250mmHg(1mmHg=0.133kPa);多肺叶漫润;意识障碍和(或)定向障碍;血尿

素氮 ≥ 20 mg/dl(7.14mmol/L);收缩压 <90mmHg,需要积极的液体复苏。需机械通气是主要标准,可作为重症肺炎的主要依据,其他为次要标准。(D 对,ACE 错误)。

46. 答案:E

解析:水冲脉是主动脉瓣关闭不全的周围血管征的一种。正常人遇热、精神激动、妊娠、饮酒及血管扩张时均可有轻度水冲脉的表现。亦可见于甲状腺功能亢进、贫血、主动脉瓣关闭不全、肝衰竭及肺源性心脏病等。支气管哮喘可有奇脉,水冲脉不属于重症哮喘的体征。(E 对)。

47. 答案:D

解析:还原型谷胱甘肽是体内重要的氧化剂,可保护一些含巯基的蛋白质或酶免受氧化剂(尤其是过氧化物)的损害。对于红细胞,还原型谷胱甘肽的意义更为重要,可保护红细胞膜的完整性。葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷者,其红细胞不能经磷酸戊糖途径获得充足的 NADPH,不足以使谷胱甘肽保持还原状态,因而表现出红细胞(尤其是较老的红细胞)易于破裂,发生溶血性黄疸。这种溶血现象常在食用蚕豆(是强氧化剂)后诱发,故称为蚕豆病。(D 对)。

48. 答案:C

解析:RV/TLC 一般是指残气/肺总量,正常值为小于或等于 35%,超过 40%提示患者可能存在肺气肿的情况,肺气肿患者应该及时前往医院就诊,明确诊断后积极治疗。慢阻肺病人吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC < 70%$,再依据其 FEV_1 下降幅度进行气流受限的严重程度分级。(C 对)。

49. 答案:E

解析:洋地黄的临床应用:伴有快速心房颤动/心房扑动的收缩性心力衰竭是应用洋地黄的最好指征,包括扩张型

2023 临床助理历年真题

心肌病、二尖瓣或主动脉瓣病变、陈旧性心肌梗死及高血压性心脏病所致慢性心力衰竭。在选项中，扩张型心肌病+心衰最适合使用洋地黄。

50. 答案:A

解析:各种心肌病引起的心脏性猝死占5%~15%，是冠心病易患年龄前(<35岁)心脏性猝死的主要原因，如梗阻性肥厚型心肌病、致心律失常型右室心肌病。

51. 答案:D

解析:患者 PH7.38，处于代偿期， $\text{PaCO}_2 > 67\text{Hg}$ ，考虑呼吸性酸中毒， $\text{HCO}_3^- > 47\text{mmol/L}$ ，考虑代谢性碱中毒。

52. 答案:D

解析:胰腺癌好发与40岁以上，男性比女性多见，最常见表现腹痛、黄疸和消瘦，(D对)。急性胆囊炎突发的右上腹阵发性绞痛、Murphy征阳性，(A错误)。胆囊结石可有胆绞痛，黄疸较少见，(B错误)。胆总管结石可有腹痛、寒战高热、黄疸，(C错误)。胰腺炎可有腹痛腹胀、恶心呕吐，无消瘦，(E错误)。

53. 答案:B

解析:坏疽性及穿孔性阑尾炎是一种重型的阑尾炎。阑尾管壁坏死或部分坏死，呈暗紫色或黑色。阑尾腔内积脓，压力升高，阑尾壁血液循环障碍。该患者术中见阑尾变黑，考虑为坏疽性阑尾炎。(B对)。绞窄性阑尾炎，穿孔性阑尾炎呈深红色，肿胀充血。阑尾周围脓肿临床表现有腹胀腹痛、腹膜刺激征象，压痛性包块和全身感染中毒症状等。单纯性阑尾炎外观轻度肿胀充血。

54. 答案:C

解析:患者用硝酸清洗工厂金属模具后出现中毒，考虑氮氧化物中毒，氮氧化物的主要接触机会，制造硝酸或用硝酸浸洗金属及硝化有机物时，

制造硝基炸药、硝化纤维、苦味酸等硝基化合物时，苯胺染料的重氮化过程，电焊气焊、气割时。氮氧化物中毒大部分为氧化氮和二氧化氮(NO_2)所致。

55. 答案:C

解析:该患者老年男性，肺门占位，考虑为中央型肺癌。早期病变气管壁可弥漫增厚或形成息肉状或乳头状肿物突向管腔，使气管腔狭窄或闭塞。随病情进展，肿瘤破坏气管壁向周围肺组织浸润，扩展，在肺门部形成包绕支气管的巨大肿块同时，癌细胞经淋巴管转移至支气管和肺门淋巴结，肿大的淋巴结常与肺门肿块，软骨增生，排列乱，见支气管上皮陷入。(C对)。

56. 答案:A

解析:患者剧烈活动后突发右侧胸痛，查体右胸叩诊鼓音，右侧呼吸音低，应考虑原发性自发性气胸。

57. 答案:C

解析:患者女性，咳嗽咳痰、发热，肺部听诊湿啰音，胸部显示:有外高内低弧形影，考虑肺炎合并胸腔积液，首选胸腔穿刺，明确胸水性质。

58. 答案:C

解析:患者撞击左肋部，肝破裂常因右侧外伤，肾破裂常因腰部外伤。排除AB;诊断性腹腔穿刺术，抽出不凝血提示实质性脏器破裂所致内出血，排除DE。

59. 答案:A

解析:亚硝酸盐中毒:是指进食了含有较大量的亚硝酸盐食物后，在短期内引起的以高铁血红蛋白血症为主的全身性疾病。(A对)。

60. 答案:E

解析:患者滴注处皮肤出现发白、变冷，考虑是去甲肾上腺素的不良反应导致局部组织的坏死。处理:停止注射或更换注射部位，热敷，用普鲁卡因或酚

妥拉明，作局部浸润注射，以扩张血管。

61. 答案:C

解析:被处罚的医师到期后，暂停执业活动期满，再次进行考核，对考核合格的，允许其继续执业；执业医师和执业助理医师定期考核周期为3年。

62. 答案:D

解析:患者老年男性，长期无规律上腹隐痛，近3个月体重减少5kg，上腹痛和体重减轻为进展期胃癌常见症状。结合上腹压痛，粪潜血阳性。考虑诊断胃癌。(D对)。胃溃疡表现为慢性、周期性、节律性上腹痛。(A错误)。慢性浅表性胃炎和慢性萎缩性胃炎可无明显症状或仅有消化不良症状。(BC错误)。急性糜烂性出血性胃炎为急性病程。(E错误)。

63. 答案:C

解析:男孩游玩回来后给爷表演长颈鹿吃树叶和树袋熊喝水，是按一定的目的和任务需要采取积极的思维活动进行，属于有意记忆。(C对)。逻辑记忆是以词语、概念、原理为内容的记忆。这种记忆所保持的不是具体的形象，而是反映客观事物本质和规律的定义、定理公式、法则等。(A错误)。瞬时记忆也叫感觉记忆是指客观刺激停止作用后感觉信息在一个极短的时间内保存下来这种记忆叫感觉记忆或瞬时记忆。(B错误)。无意记忆是指没有自觉记忆目的和任务，也不需要意志努力的记忆。(D错误)。短暂记忆是指瞬时记忆和长时记在大脑中约停留5-20秒。(E错误)。

64. 答案:D

解析:学术会议上医生用真实姓名介绍个案，违背了心理治疗中保密守信原则。(D对)。回避原则是指在心理治疗时不宜在熟人之间做此项工作。亲人与熟人均应在治疗中回避，与题意

不符(A错误)。理性原则是指在心理治疗时医生应保持一个理性的思路和思维，切不可陷入患者感性的带入中，一旦发现陷入感性的状态，应立即停止心理治疗，与题意不符(B错误)。真诚原则是指在心理治疗时医生对患者要真诚，以诚相待，与题意不符(C错误)。中立原则是指在心理治疗时医生不能替病人作任何选择，而应保持某种程度的中立，与题意不符(E错误)。

65. 答案:C

解析:患者老年男性右半结肠切除术后，中心静脉压正常(正常5-12cmH₂O)，血压90/60mmHg(偏低，正常下限)，既往心衰病史。此时应进行补液实验来明确原因、指导补液。(C对)。

66. 答案:B

解析:患者上腹部疼痛数小时，现出现右下腹疼痛加重，是转移性右下腹疼，阑尾炎的典型症状。

67. 答案:C

解析:患者有上腹疼痛，高热、黄疸、休克、神经中枢系统受抑制(Reynolds五联征)典型症状，诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎。对于该疾病患者的治疗，只有使胆道压力降低，才有可能中止胆汁或细菌向血液的反流，阻断病情的恶化。胆道减压主要为抢救病人生命，方法力求简单有效，故首选胆总管切开减压、T管引流。(C对)。大量补液，补充血容量是纠正休克的治疗，不能针对原发病治疗，故不是最重要的。其他选项均为保守治疗方法可以作为术前准备，但是不作为最终治疗手段。

68. 答案:D

解析:老年男性，进行性吞咽困难伴胸骨后烧灼感，食管钡餐造影符合食管癌的特征(管壁僵硬，充盈缺损)，故考虑诊断食管癌。(D对)。食管炎患

者临床表现主要为反酸烧心等，进食时胸骨后会有疼痛、烧灼感，无吞咽困难的症状。(A 错误)。食管平滑肌瘤患者半数可没有临床症状，即使有症状也比较轻微，且食管钡餐造影结果与之不符。(B 错误)。贲门失弛缓症症状与之类似，但食管钡餐造影可见贲门梗阻呈漏斗或鸟嘴状，边缘光滑，食管下段扩张明显。(C 错误)。食管静脉曲张的原发病为肝硬化多累及食管中下段，食管钡餐造影可见蚯蚓状或串珠状充盈缺损，食管边缘凹凸不平，管腔增宽，收缩不佳，排空延迟。(E 错误)。

69. 答案:B

解析:中年女性患者，间断上腹疼痛3年，上腹部轻压痛。胃镜符合慢性萎缩性胃炎的表现，故考虑诊断慢性萎缩性胃炎。(B 对)。慢性非萎缩性胃炎的黏膜可充血水肿或黏膜皱襞肿胀增粗，以红为主。(A 错误)。胃溃疡胃镜下可见多数活动性溃疡，有龛影，边缘较规整，周围黏膜常有充血水肿，表面覆以渗出物形成的白苔或黄苔。(C 错误)。早期胃癌表现为小的息肉样隆起或凹陷，也可呈平坦样，但黏膜粗糙、触之易出血，斑片状充血及糜烂，进展期胃癌表面常凹凸不平，糜烂，有污秽苔，活检时易出血，也可呈深大溃疡，底部覆有污秽灰白苔，溃疡边缘呈结节状隆起。(D 错误)。慢性浅表性胃炎:可见红斑(点、片状或条状)、黏膜粗糙不平、出血点/斑。(E 错误)。

70. 答案:D

解析:中年女性患者，饱餐后突发右上腹痛。查体:发热，右上腹压痛，墨菲征阳性(胆囊炎典型体征)，白细胞和中性粒细胞升高(提示细菌感染)，故考虑诊断为急性胆囊炎，首选腹部超声，诊断性价比最高。(D 对)。X线和

CT 检测对胆囊颈以及胆囊管或者胆总管等比较深部的结构观察比超声好但是对能够透过 X 光的结石不具备检查能力。(AC 错误)。虽然经内镜逆行胰胆管造影诊断肝外胆管结石的阳性率最高，但是腹部超声无创实惠、方便，同时其对胆囊内部结构观察比较灵活，对胆囊结石、胆囊息肉的诊断率比较高无需进行费用较高的有创造影。(B 错误)。磁共振胰胆管成像可发现结石并明确大小和部位，但胆总管远端结石仍受诸多因素影响，诊断的准确率欠佳。(E 错误)。

71. 答案:D

解析:患者老年男性，排便次数增加里急后重(属于直肠癌的直肠刺激症状)，血便(符合癌肿破溃出血症状)，大便变细(肠腔狭窄症状)，因此最可能为直肠癌，对于直肠癌 60~70%能在直肠指诊时触及，是最重要的体格检查。

72. 答案:B

解析:患者呈慢性、周期性节律性上腹隐痛，服用 PPI 可缓解，钡餐造影符合胃溃疡特征，故考虑诊断胃溃疡。(B 对)。早期胃癌无症状，部分患者可有消化不良症状，进展期胃癌最常见的症状是体重减轻和上腹痛，另有贫血、食欲缺乏、厌食、乏力，胃镜检查结合黏膜活检可确诊。(A 错误)。淋巴结炎主要症状为淋巴结肿大、疼痛，与题意不符。(C 错误)。慢性胃炎主要表现为中上腹不适、饱胀、钝痛、烧灼痛等也可有食欲不振、暖气、泛酸、恶心等消化不良症状，慢性萎缩性胃炎钡餐可出现皱壁平坦的表现。(D 错误)。急性胃炎呈急性病程可出现上腹痛、恶心、呕吐、食欲减退、呕血及黑便等典型症状，还可伴有寒颤、发热等其他症状，与题意不符。(E 错误)。

73. 答案:B

解析:孕妇身体状况不好,医生出于产妇健康考虑要求减胎,这是有利原则。但是孕妇丈夫不同意减胎,故未行减胎术,也涉及到尊重原则。(B对)。不伤害原则是指不伤害原则是指在医学服务中不使患者受到不应有的伤害,不伤害原则强调医务人员对患者高度负责、保护患者健康和生命,努力使患者免受不应有的伤害。(A错误)。公正原则是指在医学服务中公平地对待每一位患者。(CD错误)。在自主原则中,最能代表尊重病人自主的方式是“知情同意”。(E错误)。

74. 答案:C

解析:患者中年男性(为结核性腹膜炎的好发人群),37.5(结核导致的低热),腹胀、腹痛、腹部揉面感及移动性浊音阳性(符合结核性腹膜炎临床表现),再结合腹水常规,积液为黄绿色渗出液,白细胞 $600 \times 10^6/L$ (结核性腹膜炎腹腔积液多为草绿色),因此最可能为结核性腹膜炎(C对)。自发性细菌性腹膜炎为肝硬化的并发症,肝硬化病人出现腹腔积液后容易导致该病,而本题无肝硬化表现,因此可排除AB。恶性腹水是指由于发生在腹腔的恶性肿瘤或癌性病变引起腹腔脏壁层胸腹膜发生弥漫性病变而导致体腔液体异常增多的现象,见于恶性肿瘤或癌性病变,本题无癌性表现。腹膜间皮瘤指的是发生于腹膜上皮和间皮组织的肿瘤,主要症状有腹痛、腹部块、腹胀等。临床上腹膜间质瘤常见于恶性肿瘤。

75. 答案:A

解析:护士在执行医嘱时,发现了医生所开医嘱的不足之处,未及时反馈,没有把患者的利益放在首位。反映了该护士在工作中违背了患者至上的诊疗原则。(A对)。有利原则是指把有利于患者健康放在第一位,切实为患

者谋利益,亦称行善原则不符合题意。尊重原则是指医患交往时应该真诚地相互尊重,并强调医务人员尊重患者及其家属。不符合题意。在医学实践中,不伤害是指在诊治、护理过程中不使患者的身心受到损伤。不符合题意。公正原则是指在医学服务中公平地对待每一位患者。不符合题意。

76. 答案:C

解析:该患者乙肝病史20年有肝功能减退(巩膜黄染)和门静脉高压(腹壁静脉曲张、腹水)表现,可诊断为肝硬化。肝硬化导致门静脉高压可引起食管胃底静脉曲张,当破裂出血可出现突发大量呕血或柏油样变,严重者可导致出血性休克,所以该患者出现呕血、黑便最可能的原因是食管胃底静脉曲张破裂出血。(C对)。

77. 答案:B

解析:患者老年男性,长期上腹间断疼痛,近3个月体重减少3.2kg,上腹痛和体重减轻为进展期胃癌常见症状。结合粪潜血阳性考虑诊断胃癌。(B对)。十二指肠溃疡和胃溃疡表现为慢性周期性、节律性上腹痛,与进食有关。(AC错误)。慢性浅表性胃炎和慢性萎缩性胃炎可无明显症状或仅有消化不良症状,与题意不符。(DE错误)。

78. 答案:B

解析:敌百虫中毒禁用2%碳酸氢钠溶液洗胃,因为碱性溶液可使敌百虫转变为毒性更强的敌敌畏。所以此方法不恰当。(B对)。迅速清除毒物:敌百虫中毒后立即将患者撤离中毒现场,彻底清除未被机体吸收的毒物可用清水反复洗胃,直至洗出液清亮为止,然后可用硫酸镁导泻。(AE错误)。可在专业医生指导下,采用解毒剂进行治疗,如硫酸阿托品注射液、盐酸戊乙奎醚注射液、碘解磷定注射液、氯解磷定注射液等。(CD错误)。

79. 答案:C

解析:患者老年男性,查体:BP160/70mmHg(高血压),突发喘憋,双肺布满湿性啰音(肺循环淤血),心率105次/分,根据病史以及体征可考虑诊断为急性左心衰,急性左心衰的处理包括体位处理、吸氧、静脉注射吗啡、快速利尿等,静脉推注呋塞米能快速降低全身静脉血容量,降低左心室充盈压,还有扩张静脉作用,减轻肺淤血。该患者最适宜的治疗措施是静脉推注呋塞米。

80. 答案:C

解析:该患者胸痛3小时II、III、aVF导联ST段抬高0.3mV可诊断为急性ST段抬高型心肌梗死主要出现左心室舒张和收缩功能障碍的一些血流动力学变化,心脏收缩力减弱顺应性减低、心肌收缩不协调,左心室压力曲线最大上升速度(dp/d)减低左心室舒张末期压增高、舒张和收缩末期容量增多。射血分数减低,心搏量和心排血量下降,心率增快或有心律失常,血压下降。该患者心率由54次/分钟起搏至60次/分钟时,突发血压下降此时主要考虑是心率增快,舒张期缩短导致回心血量减少所引起。(C对,ABDE错误)。

81. 答案:C

解析:患者中老年男性,持续胸痛8小时(胸痛持续不缓解是急性心梗的典型表现)心电图示I、AVL、V1~V6导联ST段抬高0.1~0.4mV(典型的急性心梗的表现)。左心室扩大左室射血分数降低(正常50%~70%,考虑合并心力衰竭)。综合考虑患者目前诊断为急性心梗、心力衰竭、高血压、糖尿病。右心室MI者可一开始即出现右心衰竭表现(本例患者发病6小时即有心力衰竭表现),不排除右心室心梗。大多数AMI病人有应用硝酸酯类药物指征,

而在下壁MI、可疑右室MI或明显低血压的病人(收缩压低于90mmHg),不适合使用。

82. 答案:E

解析:年轻女性患者,除心悸外无其他症状,查体血压无异常、心率正常,心律不齐,结合心电图提前出现的与窦性P波不同的P波,且P-R间期>0.12s,QRS无异常,考虑为房性期前收缩。

83. 答案:E

解析:中年男性,发热1周伴胸痛,用硝酸甘油无效,心电图:ST段抬高,弓背向下未见病理性Q波(典型心包炎的表现)。综合考虑诊断为急性渗出性心包炎。(E对)。本例患者用硝酸甘油无效,且心电图表现无相邻导联ST段弓背向上抬高,可排除急性心肌梗死。(A错误)。缩窄性心包炎的体征有颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢浮肿、心率增快。(B错误)。变异型心绞痛常出现典型的心电图变化,近50%的患者出现高耸对称的T波,如果痉挛持续则出现进行性抬高的ST段,持续数分钟后逐步回落。(C错误)。稳定型心绞痛服用硝酸甘油可缓解,故不考虑。(D错误)。

84. 答案:E

解析:患者中老年男性,持续性胸痛15小时,心电图示V1-V6呈qs型(广泛前壁心梗)最可能的诊断是急性心肌梗死。听诊可出现第四心音(心房性)奔马律,少数有第三心音(心室性)奔马律。所以,舒张期奔马律是因为心肌严重受损的体征,是急性心梗的特异性体征。

85. 答案:B

解析:中老年男性,患稳定型心绞痛10年(既往有心脏病病史),心脏彩超提示左室收缩功能减低(左室射血分数EF正常50%~70%)加上BNP偏高,提示

心功能不全，近 2 月上楼梯时感到喘息、心悸(一般活动后出现症状，活动轻度受限)，考虑患者因稳定型心绞痛导致的慢性心力衰竭，采用 NYHA 分级。II 级:心脏病病人体力活动轻度受限，休息时无自觉症状，一般活动下可出现心衰症状。

86. 答案:C

解析:患者老年男性，直肠癌术后 4 天(外科手术为血栓形成的病因)，左下肢肿胀伴股三角区疼痛，查体:左下肢浅静脉扩张、皮温明显升高，股三角区压痛明显(左下肢深静脉血栓形成的典型表现)。综合考虑患者诊断为左下肢深静脉血栓形成。

87. 答案:C

解析:青年患者，右上腹疼痛，伴发热呼吸急促，血压 85/65mmHg(血压低，休克状态)，应首选补充血容量。(C 对)。患者休克，在补充血容量的同时积极治疗原发病(如急诊手术、抗生素治疗胃肠减压等)，继续观察病情变化。

88. 答案:D

解析:中老年男性患者，持续心悸。心电图示:P 波消失，代之以 f 波，心室律绝对不规则(心房颤动的典型表现)，综合考虑患者诊断为心房颤动。房颤患者控制房颤过快的心室率，可选用 β 受体阻滞剂(比索洛尔)、通道阻滞剂或地高辛。

89. 答案:C

解析:谵妄是一种急性的脑高级功能障碍，表现为认知、注意力、定向、记忆功能受损，思维推理迟钝，语言功能障碍，错觉，幻觉，睡眠觉醒周期紊乱等，可表现为紧张、恐惧和兴奋不安，甚至可有冲动和攻击行为。病情常呈波动性，夜间加重，白天减轻，常持续数小时和数天。符合该患者表现。

90. 答案:D

解析:情绪低落是指患者情绪异常低落，心境抑郁。表现为忧愁、语音低落、动作明显减少、自我感觉不良、异常乏力等。该患者并未出现上述临床表现。

91. 答案:E

解析:患者吸烟多年，咳嗽、咳痰、活动后气短，X 线片示双肺纹理增粗、紊乱，膈肌低平，考虑为慢性阻塞性肺疾病，首选的检查是肺功能，吸入支气管扩张剂后，FEV1/FVC $<70\%$ 确定为持续气流受限。

92. 答案:A

解析:患者反复咳嗽、喘息 20 年余，加重 1 周，不吸氧时动脉血气分析提示 II 型呼吸衰竭。考虑患者为慢性阻塞性肺疾病，慢阻肺特征性的病理生理变化是持续气流受限致肺通气功能障碍。

93. 答案:A

解析:患者抗结核药物治疗中，转氨酶正常，巩膜黄染，总胆红素 $40.6\text{mol/L} > 17.1\text{mol/L}$ ，提示出现黄疸。由于利福平会导致肝功能损伤，用药后如出现一过性转氨酶上升可继续用药，加保肝治疗观察，如出现黄疸应立即停药。

94. 答案:B

解析:患者青年男性，车祸纵隔扑动(开放性气胸)。面罩吸氧后氧饱和度不良，为顽固性低氧血症，考虑诊断急性呼吸窘迫综合征。应及时给予进一步呼吸支持治疗，无创正压通气已广泛应用于临床治疗多种急、慢性呼吸衰竭如 COPD 急性加重、急性心源性肺水肿、阻塞型睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)、免疫力低下患者和术后预防呼吸衰竭以及家庭康复等。(B 对)。

95. 答案:B

解析:患者青年男性，既往史有输血史，

胸部 X 线提示肺部有间质性病变，考虑诊断为病毒性肺炎。病毒侵入细支气管上皮引起细支气管炎，感染可波及肺间质与肺泡而致肺炎，单纯病毒性肺炎多为间质性肺炎。

96. 答案:D

解析:患者青年女性(不符合一般慢性阻塞性肺疾病的年龄),反复咳嗽喘息、发作时呼吸困难夜间和凌晨发作时症状加重(哮喘重要的临床特征),X 线胸片显示心肺无异常(不符合感染的 X 线表现),考虑诊断为支气管哮喘。

97. 答案:A

解析:患者中老年男性,从 3m 高处坠落致左胸外伤,查体:基本生命体征平稳,反常呼吸运动,左胸壁可触及多根多处肋骨断端,左肺呼吸音明显减弱。考虑诊断为闭合性多根多处肋骨骨折,诊疗原则是有效镇痛和呼吸管理,多根多处肋骨骨折患者痰不易排出,容易发生肺部感染,故首选止痛咳嗽+抗感染。

98. 答案:D

解析:患者青年女性,有间断发热、咳嗽症状,低热、白细胞正常(排除普通细菌感染的肺部疾病),胸部 X 线片示右上肺斑片状阴影其内可见不规则透亮区,考虑诊断为肺结核。

99. 答案:E

解析:患者中年女性,心功能 IV 级(提示存在心衰),地高辛治疗可增加心输出量,减轻心衰;兴奋迷走神经,抑制心脏传导系统,减慢心室率,当出现心率降至 45 次/分,应考虑停用。

100. 答案:C

解析:根据病史青年男性患者,2 周前感冒(前驱感染史),心脏各瓣膜区未闻及杂音和附加音,可闻及频发期前收缩,心电图示室性期前收缩,血清肌钙蛋白升高(心肌损伤),结合患者症状和体征考虑诊断为病毒性心肌炎。

(C 对)。

101. 答案:D

解析:患者老年女性,里急后重(属于直肠刺激的症状),排便性状改变考虑是肠壁狭窄症状,因此最有可能诊断为直肠癌,直肠癌首选直肠指检。

102. 答案:E

解析:直肠癌主要方法是根治性手术,切除的范围包括癌肿在内的两端足够肠段(低位直肠癌的下切缘应距肿瘤边缘 2cm),全部直肠系膜或至少包括癌肿下缘下 5cm 的直肠系膜、周围淋巴结及受浸润的组织。

103. 答案:C

解析:该患者聚餐后左上腹剧烈腹痛伴恶心呕吐,疼痛向腰背部放射,呕吐后疼痛不缓解,发热并伴左中上压痛,肠鸣音减弱,符合急性胰腺炎的临床表现。故诊断为急性胰腺炎。(C 对)。急性阑尾炎的典型临床表现是转移性右下腹痛。该患者无此症状,(A 错误)。急性胆囊炎的典型临床表现是上腹疼痛,可放射至右肩和背部。该患者无此症状(B 错误)。十二指肠溃疡多在空腹时出现上腹痛,并且有周期性和规律性。该患者无此症状(D 错误)。肠梗阻临床症状为阵发性腹痛伴恶心、呕吐、腹胀及停止排气排便。该患者无此症状(E 错误)。

104. 答案:B

解析:急性腺炎治疗的两大任务:①寻找并去除病因;②控制炎症。尽可能采用内科及微创治疗。不建议手术。

105. 答案:E

解析:患者老年男性,咳嗽,咳痰 10 年。(慢性阻塞性肺疾病),气促 1 周(急性发作)端坐呼吸,颈静脉怒张,球结膜充血,双下肢凹陷性水肿(合并右心功能不全),综合考虑诊断为肺源性心脏病。

106. 答案:D

解析:本例患者为肺心病,慢性肺心病病人一般在积极控制感染、改善呼吸功能、纠正缺氧和二氧化碳潴留后,心力衰竭便能得到改善,病人尿量增多,水肿消退,不需常规使用利尿药和正性肌力药。但对经上述治疗无效或严重心力衰竭病人,可适当选用利尿药、正性肌力药或扩血管药物。所以,目前无需强心利尿。(D对)。

107. 答案:B

解析:患者诊断为慢性肺心病,出现呼吸困难加重,PaO₂是50mmHg,PaCO₂是65mmHg,提示呼吸衰竭。此时患者吸困难加重,需要时给予无创正压通气或气管插管有创正压通气治疗。

108. 答案:A

解析:患者聚餐,左中上腹部持续性疼痛,后向左后腰部放射,考虑急性胰腺炎,首选辅助检查血清(胰)淀粉酶,血清(胰)淀粉酶起病后2~12小时开始升高24小时达高峰,48小时开始下降,持续3~5天。超过正常值3倍以上可确诊。

109. 答案:E

解析:患者考虑胰腺炎,急性胰腺炎的手术适应证是手术适应证①虽经合理支持治疗,临床症状继续恶化;②腹腔间隔室综合征,即出现腹部严重膨隆、腹部高度紧张,伴有心、肺、肾功能衰竭,经内科治疗无效;③胆源性胰腺炎;④不能排除其他急腹症;⑤胰腺和胰周坏死组织继发感染;⑥病程后期合并肠瘘或胰腺假性囊肿。

110. 答案:C

解析:老年男性,发作性剑突下疼痛10天,加重6小时,血压降低,心电图:II、III、AVF、V3R、V5R导联ST段弓背向上抬高(急性心梗的典型表现)。综合考虑诊断为急性心肌梗死。

111. 答案:D

解析:患者目前考虑诊断为急性心肌梗

死。肌钙蛋白对心肌梗死的诊断具有重要意义。肌钙蛋白起病3~4小时后升高,cTnI于11~24小时达高峰,7~10天降至正常,cTnT于24~48小时达高峰,10~14天降至正常。

112. 答案:A

解析:患者目前考虑诊断为急性心肌梗死,此次患者发病10天,加重6小时,发病时间已达12~24小时,但如仍有进行性缺血性胸痛、广泛ST段抬高者也可考虑进行溶栓治疗。(A对)。抗炎治疗、β受体阻滞剂、抗血小板都可随后应用,不是首选。(BDE错误)。抑制胰酶制剂主要用于急性胰腺炎患者。(C错误)。

113. 答案:B

解析:患者为青年女性,有男实习医生在场时不愿说出自己的病情,遂女医师让男实习生离开,体现了女医生尊重患者的人格,维护患者的自尊。

114. 答案:A

解析:尊重原则要求医务人员尊重患者。女医生让男实习生离开诊室后才询问女生病情,高中女生才开始描述病情。此举动体现了医生把患者作为一个完整的人加以尊重,尊重了患者的人格尊严。

115. 答案:E

解析:患者系一青年男性,左上腹外伤后腹痛、反跳痛,BP80/50mmHg(正常为90~139/60~89mmHg,血压下降,脉快、血压下降提示失血性休克),移动性浊音(+)(提示腹腔内实质性器官破裂出血),结合患者病史和临床表现,应诊断为腹部闭合性损伤伴实质性脏器损伤(脾破裂可能性大)。为明确诊断,最有意义的辅助检查是诊断性腹腔穿刺。

116. 答案:D

解析:患者左上腹(脾脏的部位)撞伤,腹膜刺激征轻度,局限性腹肌紧张(可

排除空腔脏器损伤), 腹移动性浊音(+), 血压下降(内出血多); 考虑脾脏损伤、出血, 导致失血性休克。(D 对)。肝位于右上腹, 患者未左上腹撞伤, 损伤肝脏可能性小。

117. 答案:E

解析:腹腔穿刺如果抽到不凝血, 提示实质性器官破裂所致内出血, 因腹膜的去纤维作用而使血液不凝固。(E 对)。凝血机制异常多见于血友病的病。(A 错误)。使用抗凝药物常见于脑梗死、房颤病史的老年人。(B 错误)。由于血液内凝血机制被弥散性激活, 促发小血管内广泛纤维蛋白沉着, 导致组织和器官损伤; 另一方面, 由于凝血因子的消耗引起全身性出血倾向。(C 错误)。腹膜炎性渗出液混合多不会出现血性液体。(D 错误)。

118. 答案:B

解析:患者中老年男性, 长期吸烟史反复咳嗽喘, 考虑患者存在慢阻肺。肺功能检查是判断持续气流受限的主要客观指标。(B 对)。

119. 答案:A

解析:患者老年男性, 考虑肺源性心脏病, 会出现 $P_2 > A_2$, 三尖瓣区可出现收缩期杂音或剑突下心脏搏动增强, 提示有右心室肥厚。(A 对)。顺钟向转位、肺型 P 波是肺源性心脏病的心电图表现, 不是体征。

120. 答案:B

解析:青年男性患者, 有胃溃疡病史, 今突发上腹剧痛, 查体全腹压痛, 腹肌紧张, 结合病史和体格检查, 考虑急性胃溃疡穿孔。胃溃疡穿孔多见于胃小弯。

121. 答案:D

解析:考虑急性胃溃疡穿孔。溃疡穿孔后酸性的胃内容物流入腹腔, 可引起化学性腹膜炎, 约 6-8 小时细菌开始繁殖, 逐渐形成化脓性腹膜炎, 因

此穿孔后 8 小时内手术治疗效果最好。

122. 答案:B

解析:患者系一青春期男性, 进食后出现腹痛、呕吐, 肛门停止排气、排便 6 小时(肠梗阻的典型表现:痛、吐、胀、闭), 腹部 X 平片立位检查示阶梯样液平面。结合患者停止排气排便考虑完全性肠梗阻。患者既往阑尾炎切除术后, 存在腹部手术史, 腹部手术多会导致黏连性肠梗阻。

123. 答案:C

解析:患者系一青春期男性, 进食后出现腹痛、呕吐, 肛门停止排气、排便 6 小时(肠梗阻的典型表现:痛、吐、胀、闭), 腹部 X 平片立位检查示阶梯样液平面。结合患者停止排气排便考虑完全性肠梗阻。患者既往阑尾炎切除术后, 存在腹部手术史, 腹部手术多会导致黏连性肠梗阻。

124. 答案:A

解析:医疗机构应当按照核准登记的诊疗科目开展诊断、治疗活动。需要改变诊疗科目的, 应当按照规定的程序和要求, 办理变更登记手续, 未经允许不得擅自扩大业务范围。该医院未经批准擅自开展医疗美容科, 属于超范围执业。

125. 答案:C

解析:《医疗机构管理条例》规定, 对未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业的, 由县级以上人民政府卫生行政部门责令停止执业活动, 责令整改, 并处以 3000 元以下罚款。(C 对)。

126. 答案:D

解析:患者老年男性, 既往有吸烟病史, 间隔咳嗽、咳痰、喘息, 桶状胸(为慢阻肺的典型表现), 提示慢阻肺(COPD)。烦躁, 球结膜充血、水肿, 口唇发绀, 双肺呼吸音低, 右下肺可闻及少许湿性罗音, 肝肋下 5cm, 肝颈静脉回流征(+), 双下肢水肿(为右心衰竭的表

现),提示为由慢阻肺引起的肺源性心脏病。该患者出现意识障碍,最可能的原因是由于缺氧和二氧化碳潴留导致的肺性脑病。

127. 答案:A

解析:综合患者病史、症状、体征及辅助检查,考虑诊断为慢性肺源性心脏病肺、心功能失代偿期。失代偿期的治疗原则为积极控制感染,通畅呼吸道,改善呼吸功能,其中感染是引起慢性肺心病急性加重致肺、心功能失代偿的常见原因,故需积极控制感染。

128. 答案:E

解析:综合病史、临床表现和实验室检查,该患者考虑诊断为高血压合并肾脏疾病及高尿酸血症。高血压合并糖尿病、慢性肾脏病、心力衰竭或病情稳定的冠心病合并高血压者,血压控制目标值 $<130/80\text{mmHg}$ 。(选E)。无合并症的高血压患者血压控制目标为 $<140/90\text{mmHg}$ 。(不选D)。其余目标值均错误(不选A、B、C)。

129. 答案:B

解析:患者系一中年男性,体检血压 $150/100\text{mmHg}$ (提示2级高血压),实验室检查提示肾功能受损(男性肌酐 $>133\text{mmol/L}$,女性肌酐 $>124\text{mmol/L}$)、高尿酸血症(血尿酸 $>420\text{umol/L}$),综合病史、临床表现和实验室检查,该患者考虑诊断为高血压合并肾脏疾病及高尿酸血症。噻嗪类利尿剂可抑制尿酸的排泄,加重患者高尿酸血症。

130. 答案:C

解析:美托洛尔为 β 受体拮抗剂,可增加气道阻力,加重哮喘。其余选项不会加重哮喘,可以应用。

131. 答案:B

解析:外痔主要临床表现是肛门不适潮湿不洁,有时有癌痒。(选B)。肛周脓肿多表现为肛周持续性跳痛,肛周皮肤明显红肿,而不是外痔。肛门疼

痛、便秘和出血,多见于肛裂患者,而不是外痔。间歇性无痛性肛门便后出血见于内痔,而不是外痔。旁脓血性或黏液性分泌物排出见于肛痿,而不是外痔。

132. 答案:A

解析:肛周脓肿的典型表现是肛周持续性跳痛,肛周皮肤明显红肿,全身感染症状不明显。

133. 答案:D

解析:LDH是反映胸膜炎程度的指标,其值越高,表明炎症越明显。渗出液乳酸脱氢酶(LDH)大于 200U/L ,且胸腔积液/血清LDH比值 >0.6 。所以,渗出液和漏出液鉴别的检查项目是乳酸脱氢酶。

134. 答案:C

解析:腺脱氨酶(ADA)在淋巴细胞内含量较高。结核性胸膜炎时,因细胞免疫受刺激,淋巴细胞明显增多,故胸腔积液中ADA多高于 45U/L 。其诊断结核性胸膜炎的敏感度较高。

135. 答案:B

解析: β 受体阻滞剂适用于不同程度高血压病人,尤其是心率较快的中、青年病人或合并心绞痛和慢性心力衰竭者,对老年高血压疗效相对较差。所以,合并窦性心动过速的高血压1级患者最适宜的药物是 β 受体阻滞剂。(B对)。

136. 答案:C

解析:钙通道阻滞剂能减轻ATII和 $\alpha 1$ 肾上腺素能受体的缩血管效应,减少肾小管钠重吸收。所以,严重肾衰患者合并老年收缩期高血压最适宜的药物是钙离子拮抗剂。(C对)。

137. 答案:E

解析:根除幽门螺旋杆菌可显著降低胃、十二指肠溃疡的复发率。故为预防十二指肠溃疡复发的主要治疗。

138. 答案:D

解析:非食管静脉曲张性上消化道出血主要见于消化性溃疡出血。PPI 是治疗消化性溃疡的首选药物。PPI 入血,进入到胃黏膜壁细胞酸分泌小管中,酸性环境下转化为活性结构,与质子泵即 H^+-K^+-ATP 酶结合,抑制该酶的活性、从而抑制胃酸的分泌。

139. 答案:D

解析:胸部增强 CT 具有更高的分辨率,可发现肺微小病变和普通 X 线胸片难以显示的部位(如位于心脏后、脊柱旁、肺尖、肋角及肋骨头等)。增强 CT 能敏感地检出肺门及纵隔淋巴结肿大,有助于肺癌的临床分期。

140. 答案:A

解析:动脉血气分析对判断呼吸衰竭和酸碱失衡的严重程度及指导治疗均具有重要意义。(A 对)。肺功能主要用于检测呼吸道的通畅程度、肺容量的大小,对于早期检出肺、气道病变,评估疾病的病情严重程度及预后。

141. 答案:C

解析:呋塞米(袢利尿剂)可抑制髓袢对 Cl^- 的主动重吸收和 Na^+ 的被动重吸收,促进远曲小管和集合管细胞分泌 H^+ 及 K^+ 增加, H^+ 经肾大量丢失使 HCO_3^- 重吸收增加,血中 HCO_3^- 含量升高,造成原发性代谢性碱中毒。(C 对)。

142. 答案:D

解析:肠痿因碱性消化液($NaHCO_3$)大量丢失,导致体液 pH 值下降,引起代谢性酸中毒。

143. 答案:D

解析:死亡率表示某人某地每千人口中的死亡人数,反映当地居民总的死亡水平。患病率也称现患率,表示某一时点某人群中患某病的频率。二者可用来描述一个地区的居民健康状况和卫生保健工作水平。

144. 答案:B

解析:相对危险度是暴露组发病率(或

死亡率)与非暴露组发病率(或死亡率)的比值。特异危险度是暴露组发病率与对照组发病率的差值。

145. 答案:D

解析:复合性溃疡:指胃和十二指肠均有活动性溃疡,多见于男性,幽门狭窄、梗阻发生率较高。(D 对)。巨大溃疡指直径 $>2cm$ 的溃疡常见于有 NSAIDs 服用史及老年病人,故可排除。幽门管溃疡指餐后很快发生疼痛,易出现幽门梗阻、出血和穿孔等并发症,故可排除。球后溃疡指发生在十二指肠降段、水平段的溃疡,多位于十二指肠降段的初始部及乳头附近,溃疡多在后内侧壁,故可排除。难治性溃疡指经正规抗溃疡治疗而溃疡仍未愈合,故可排除。

146. 答案:A

解析:巨大溃疡指直径 $>2cm$ 的溃疡常见于有 NSAIDs 服用史及老年病人。(A 对)。

147. 答案:B

解析:克雷伯杆菌肺炎常有寒战高热胸痛、全身衰竭表现,典型特征为咳砖红色胶冻样痰。(选 B)。肺炎支原体肺炎表现为乏力、头痛咽痛、肌肉酸痛,多为发作性干咳,持久的阵发性剧咳为其典型表现。病毒性肺炎起病较急,发热、头痛、全身酸痛、倦怠等全身症状较突出,少痰或白色黏液痰。肺炎链球菌肺炎多有上呼吸道感染的前驱症状,起病急骤,表现为高热、寒战,全身肌肉酸痛,痰液特征为铁锈色痰。葡萄球菌肺炎以痰中带血或脓血痰为特征,且全身毒血症状更明显。

148. 答案:D

解析:铁锈色痰是典型肺炎链球菌肺炎的表现,且肺炎链球菌肺炎患者常有高热,体温可达 $39\sim 40^\circ C$,同时伴有患侧胸痛,对咳嗽或深呼吸而加剧,

2023 临床助理历年真题

故高热、胸痛、咳铁锈色痰最常见于肺炎链球菌肺炎。

149. 答案:A

解析:二尖瓣狭窄心脏杂音:心尖区舒张期隆隆样杂音。(A对)。二尖瓣关闭不全心脏杂音:心尖区收缩期吹风样杂音。梗阻性肥厚型心肌病:胸骨左缘3-4肋收缩期杂音。主动脉瓣关闭不全:胸骨左缘3-4肋舒张杂音。主动脉瓣狭窄:胸骨右侧杂音。

150. 答案:B

解析:二尖瓣关闭不全:心脏区收缩期吹风样杂音。