

中西医执业助理医师押题卷

第一单元

A1 型题

1. 诊断疾病时以气息分阴阳，属阳者为

- A. 语声低微
- B. 语声无力
- C. 少言沉静
- D. 语声高亢
- E. 低声懒言

答案:D

解析:以气息分阴阳，语声高亢洪亮、多言而躁动者，属实、属热，为阳；语声低微无力、少言而沉静者，属虚、属寒，为阴。

1. 见肝之病，知肝传脾的病机传变是

- A. 木克土
- B. 木乘土
- C. 土侮木
- D. 母病及子
- E. 子病犯母

答案:B

解析:肝属木，脾属土，木与土之间为相克的关系，正常的生克关系受到破坏后就会出现不正常的相克关系导致的偏盛偏衰的情况，当对被克制的“一行”因克制太过引起异常的反应，称为相乘；当五行中的“一行”过于强盛，对原来克制自己的“一行”进行反克，称为相侮。所以肝病及脾为相乘关系。

2. 与血液生成及运行关系密切的是

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 心与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

答案:C

解析:心主血而脾生血，心主行血而脾主统血。心与脾的关系，主要表现在血液生成方面的相互为用及血液运行方面的相互协同。

3. 在肾主闭藏的功能活动中，最具有生理意义的是

- A. 纳气归肾，促进元气之生成
- B. 固摄二便，防止二便之失禁
- C. 固摄水液，防止水液无故流失
- D. 固摄精气，防止精气无故散失
- E. 摄纳阳气，防止阳气浮越于上

答案:D

解析:肾主闭藏，是肾的藏精、主纳气、主生殖和主二便等功能的高度概括。其中，肾所封藏之精，是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质，是生命之本原，是脏腑形体官窍功能活动的物质基础，故肾藏精、固摄精气的功能最具生理意义。

4. 临床出现自汗多尿，是气的哪一种功能减退的表现

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用



答案:D

解析:气具有固摄汗液、尿液、唾液、胃液、肠液,控制其分泌量、排泄量,使其有度而规律地排泄,防止其过多排出及无故流失所以临床上出现自汗多尿是气固摄作用功能的减退。气的推动作用是指阳气的激发、兴奋、促进等作用;气的调控作用,是指阴气的减缓、抑制、宁静等作用。气的温煦作用,是指阳气的促进产热,消除寒冷,使人体温暖的作用。气的防御作用,气既能护卫肌表,防御外邪入侵,同时也可以祛除侵入人体内的病邪。气的中介作用,主要指气能感应传导信息以维系机体的整体联系。

5.循行于上肢内侧中线的经脉是

- A.手太阳经
- B.手少阳经
- C.手厥阴经
- D.手少阴经
- E.手太阴经

答案:C

解析:手经循行于上肢,足经循行于下肢;阳经循行于四肢外侧,阴经循行于四肢内侧;分布于四肢内侧前缘的称太阴经;分布于四肢内侧中间的称厥阴经;分布于四肢内侧后缘的称少阴经;分布于四肢外侧前缘的称阳明经;分布于四肢外侧中间的称少阳经;分布于四肢外侧后缘的称太阳经。

6.在血液和精神情志方面关系密切的两脏是

- A.心与肺
- B.心与肾
- C.心与脾
- D.心与肝
- E.肺与脾

答案:D

解析:心主行血,肝主藏血;心主神志,肝主疏泄、调畅情志。因此,心与肝的关系,主要表现在行血与藏血以及精神调节两个方面。

7.“决渎之官”指的是

- A.胆
- B.胃
- C.小肠
- D.三焦
- E.膀胱

答案:D

解析:津液自胃肠经三焦下渗膀胱,三焦水道通畅,则津液源源不断渗入膀胱,成为尿液生成之源。《素问·灵兰秘典论》说:“三焦者,决渎之官,水道出焉。”

8.与女子月经来潮关系最密切的是

- A.肾阳
- B.脾阳
- C.天癸
- D.冲脉
- E.任脉

答案:C

解析:天癸,是肾精肾气充盈到一定程度时体内出现的一种精微物质,有促进生殖器官发育成熟、女子月经来潮及排卵、男子精气溢泻,因而具备生殖能力的作用。女子胞的发育成熟、月经按时来潮及其后定期排卵,与天癸的来至和其对胞宫的作用有极其密切的关系。

9.下列各项,与机体易感外邪的原因密切相关的是

- A.气推动的功能减弱



- C.气营养的功能减弱
- D.气固摄的功能减弱
- E.气防御的功能减弱

答案:E

解析:气的防御功能,气既能护卫肌表,防御外邪入侵,同时也可以祛除侵入人体内的病邪。若气防御功能减弱,邪气易于侵入机体,使机体易感外邪。

10.手三阳经的走向为

- A.从头走足
- B.从足走腹
- C.从胸走手
- D.从手走头
- E.从手走足

答案:D

解析:十二经脉的走向,《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”

11.痰浊为病,随气上逆易致

- A.流注经络,气机阻滞
- B.停滞胃腑,失于和降
- C.蒙蔽清窍,扰乱心神
- D.阻滞肺气,失于宣降
- E.留滞脏腑,升降失常

答案:C

解析:痰饮致病,随气上逆,易于蒙蔽清窍,扰乱心神,致使心神活动失常,出现头晕目眩、精神不振等。

12.肝阳上亢所致的中风,所属发病类型是

- A.感邪即发
- B.徐发
- C.伏而后发
- D.继发
- E.复发

答案:D

解析:继发首先本身有原发疾病,并且所产生的新的疾病与原发病在病理上有密切联系。而肝阳上亢所致的中风属于在中风之前就有肝阳上亢,后来又继发了中风,肝阳上亢又是中风的病因。

13.热者寒之属于

- A.正治、逆治
- B.反治、从治
- C.正治、从治
- D.反治、逆治
- E.标本同治

答案:A

解析:正治指采用与疾病的证候性质相反的方药以治疗的一种原则。适用于疾病的征象与其本质相一致的病证。由于采用的方药与疾病证候性质相逆,如热证用寒药,故又称“逆治”。包括寒者热之、热者寒之、虚者补之、实者泻之。

14.阴虚热证汗出特点是

- A.动则汗出
- B.蒸蒸汗出
- C.半身汗出



E.睡时汗出

答案:E

解析:蒸蒸汗出属于实热内盛;睡时汗出即盗汗,病机是阴虚内热。

15.湿热熏蒸的面色是

A.黄而鲜明

B.黄如烟熏

C.苍黄

D.淡黄消瘦

E.淡黄浮肿

答案:A

解析:黄色,主虚证,湿证。黄而鲜明如橘子色者,属“阳黄”,因湿热熏蒸所致。黄如烟熏即黄而晦暗如烟熏者,属“阴黄”,因寒湿郁阻所致。苍黄,即黄中透青,因肝郁脾虚所致。淡黄消瘦,多因胃病虚热所致。淡黄浮肿,即“黄胖”,多因脾气虚衰,湿邪内阻所致。

16.垂危病人突然出现神清多语、两颧泛红如妆、意欲进食的表现的是

A.神乱

B.少神

C.失神

D.假神

E.得神

答案:D

解析:“望神就是观察人体生命活动的整体表现来判断病情的方法。假神,临床表现为原本目光晦滞,突然目似有光,但却浮光外露;本为面色晦暗,一时面似有华,但为两颧泛红如妆;本已神昏或精神极度萎靡,突然神识似清,想见亲人,言语不休,但精神烦躁不安;原本身体沉重难移,忽思起床活动,但不能自己转动;本来毫无食欲,久不能食,突然索食,且食量大增等。

17.唇边生疮,红肿疼痛多为

A.燥热津伤

B.阴虚火旺

C.心脾积热

D.胃火亢盛

E.湿热熏蒸

答案:C

解析:唇之形态:①口唇干裂为津液损伤,多属燥热伤津或阴虚液亏。②口唇糜烂多为脾胃积热上蒸。③唇内溃烂,其色淡红为虚火上炎。④唇边生疮,红肿疼痛为心脾积热。⑤唇角生疔,麻木痒痛,多为锁口疔;人中沟生疔,多为人中疔。⑥人中满唇反:久病而人中沟变平,口唇翻卷不能覆齿,称“人中满唇反”,为脾气将绝,属病危。

18.阳虚湿盛的舌象是

A.舌红苔白滑

B.舌淡嫩苔白滑

C.舌边红苔黑润

D.舌红瘦苔黑

E.舌绛苔黏腻

答案:B

解析:舌红多为湿热或阴虚,苔白滑为外感寒湿或脾肾阳虚,水湿内停。舌淡嫩为阳虚水湿内停,苔白滑为外感寒湿或脾肾阳虚,水湿内停,舌淡嫩苔白滑为阳虚湿盛。舌边红多为肝经有热,苔黑润为寒湿内盛所致。舌红瘦为阴虚火旺,苔黑为阴寒内盛或里热炽盛。舌绛为里热亢盛或阴虚火旺,苔黏腻为湿浊所致。

19.郑声的病因为

A.心气大伤



- C.痰火扰心
- D.风痰阻络
- E.热扰心神

答案:A

解析:郑声指神识不清,语言重复,时断时续,语声低弱模糊的症状。多因久病心气大伤,精神散乱所致,属虚证。因心气不足,神失所养,多可见独语。因痰火扰心,多可见狂证。因风痰阻络,多可见语言謇涩。因热扰心神,多可见谵语。

20.下列除哪项外,均可出现口臭

- A.龋齿
- B.心火
- C.胃热
- D.宿食
- E.内痈

答案:B

解析:口臭是指从口中散发臭气者。口臭多与口腔不洁、龋齿、便秘或消化不良有关。故龋齿可见口臭。口气臭秽者,多属胃热。故胃热可见口臭。口气酸臭,并伴食欲不振,脘腹胀满者,多属食积胃肠。故宿食可见口臭。口气腐臭,或兼咳吐脓血者,多是内有溃腐脓疡。故内痈可见口臭。心火可见口舌生疮非口臭。

21.自汗、盗汗并见,其病机是

- A.精血亏虚
- B.阴阳两虚
- C.阳气不足
- D.津液不足
- E.肾阴不足

答案:B

解析:精血亏虚,化汗乏源,可致里证无汗。阴虚则内热,入睡则卫阳由表入里,肌表不固,内热加重,蒸津外泄而汗出,见盗汗。自汗常见于气虚证和阳虚证,阳虚多在气虚的基础上发展而来。阳气亏虚,不能固护肌表,玄府不密,津液外泄,可见自汗,故自汗可见于气阴两虚证和阴阳两虚证。阳气不足,不能固护肌表,玄府不密,津液外泄,可见自汗。津液不足,化汗乏源,可见少汗或无汗。

22.渴不多饮,身热不扬,多属

- A.阳明腑实
- B.阴虚内热
- C.湿热内蕴
- D.热入营血
- E.血瘀发热

答案:C

解析:渴不多饮,兼身热不扬,心中烦闷,苔黄腻者,属湿热证。因热邪伤津则口渴,体内有湿故不多饮。日晡潮热为阳明腑实证。口渴咽干,夜间尤甚,颧赤盗汗,五心烦热者,是阴虚津亏,虚火内炽的表现。渴不多饮,兼身热夜甚,心烦不寐,舌红绛者,属温病营分证。口干,但欲漱水不欲咽,兼面色黧黑,或肌肤甲错者,为瘀血的表现。

23.濡脉与弱脉的主要不同点,在于

- A.脉位的浮沉
- B.脉力的大小
- C.脉形的长短
- D.脉率的快慢
- E.脉律的齐否

答案:A



于脉位的浮沉。濡脉和弱脉的脉力都是小的。濡脉与弱脉的脉形细，非长非短。濡脉与弱脉的脉率是慢的。濡脉与弱脉脉律是整齐的。

24.切脉时三指沿寸口脉长轴循行，诊察脉之长短，比较寸关尺三部脉象特点的方法是

- A.循法
- B.寻法
- C.总按
- D.举法
- E.按法

答案:A

解析:三指平布，同时用力按脉，称为总按，目的是总体体会三部九候脉象；分别用一指单按其中一部脉象，重点体会某一部脉象特征，称为单按；用指轻按在皮肤上称为举，又称为浮取或轻取；用指重按在筋骨间，称为按，又称为沉取或重取；指力从轻到重，从重到轻，左右前后推寻，以寻找脉动最明显的特征，称为寻。切脉时三指沿寸口脉长轴循行，诊察脉之长短，比较寸关尺三部脉象特点为循法。

25.能缓和拘急疼痛的药物大多具有的药味是

- A.苦味
- B.咸味
- C.辛味
- D.甘味
- E.酸味

答案:D

解析:甘味能补、能和、能缓，具有补益，和中、调和药性和缓急止痛的作用。

26.具有敛肺止咳，利咽开音的药物是

- A.五味子
- B.五倍子
- C.五加皮
- D.椿皮
- E.诃子

答案:E

解析:诃子功效：涩肠止泻，敛肺止咳，利咽开音。

27.下列除哪味药物外，均是妊娠禁用药物

- A.牵牛
- B.桃仁
- C.巴豆
- D.莪术
- E.水蛭

答案:B

解析:妊娠禁忌药的分类与使用原则①禁用药物指毒性较强或药性猛烈的药物，如巴豆、牵牛子、大戟、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、斑蝥、雄黄、砒霜等。②慎用的药物包括通经祛瘀、行气破滞及辛热滑利之品，如桃仁、红花、牛膝、大黄、枳实、附子、肉桂、干姜、木通、冬葵子、瞿麦等。慎用的药物可以根据病情需要酌情使用，禁用的药物绝对不能使用。

28.车前子、旋覆花入汤剂宜

- A.久煎
- B.先煎
- C.布包煎
- D.另行熔化
- E.另煎



解析:包煎: 主要指那些黏性强、粉末状及带有绒毛的药物, 宜先用纱布袋装好, 再与其他药物同煎, 以防止药液混浊或刺激咽喉引起咳嗽及沉于锅底, 加热时引起焦化或糊化。如蛤粉、滑石、青黛、旋覆花、车前子、蒲黄及灶心土等。

29. 下列具有透疹功效的药物是

- A. 桂枝、柴胡、辛夷
- B. 升麻、葛根、香薷
- C. 升麻、柴胡、藁本
- D. 薄荷、葛根、升麻
- E. 荆芥、麻黄、薄荷

答案:D

解析:薄荷、葛根、升麻都属于发散风热药。薄荷的功效是疏散风热, 清利头目, 利咽透疹, 疏肝行气; 葛根的功效是解肌退热, 透疹, 生津止渴, 升阳止泻; 升麻的功效是解表透疹, 清热解毒, 升举阳气, 三味药均具有透疹功效。桂枝、柴胡、辛夷三味药无透疹之功, 香薷无透疹之功, 柴胡和藁本无透疹之功, 麻黄无透疹之功。

30. 以下除哪项外均是陈皮的功

- A. 理气
- B. 健脾
- C. 燥湿
- D. 疏肝
- E. 化痰

答案:D

解析:陈皮功效: 理气健脾, 燥湿化痰。

31. 青蒿的功效是

- A. 退虚热, 除疳热, 清湿热
- B. 清热凉血, 活血解毒, 透疹消斑
- C. 清热凉血, 解毒, 定惊
- D. 清虚热, 除骨蒸, 解暑热
- E. 清热凉血, 利尿通淋, 解毒疗疮

答案:D

解析:青蒿属于清虚热药。青蒿的功效是清透虚热, 凉血除蒸, 解暑, 截疟, 无除疳热、清湿热的功效。

32. 治疗湿热黄疸, 应首选的药物是

- A. 夏枯草
- B. 淡竹叶
- C. 马齿苋
- D. 地骨皮
- E. 龙胆草

答案:E

解析:龙胆草应用于湿热黄疸, 阴肿阴痒, 带下, 湿疹瘙痒, 肝火头痛, 目赤肿痛, 耳鸣耳聋, 胁痛口苦, 强中, 惊风抽搐。

33. 桑寄生、五加皮除均可祛风湿外, 还具有的功效是

- A. 清热安胎
- B. 利尿消肿
- C. 定惊止痉
- D. 温通经络
- E. 补肝肾, 强筋骨

答案:E

解析:桑寄生祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎; 五加皮祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 利水。桑寄生、五加皮除均可祛

34.上述反佐药涵义的表述，正确的是

- A.针对主病或主证起主要治疗作用
- B.针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用
- C.针对次要兼证起直接治疗作用
- D.消减或制约君、臣药的毒性和峻烈之性
- E.防止病重邪甚时药病格拒

答案:E

解析:针对主病或主证起主要治疗作用的为君药。针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用为臣药。针对次要兼证起直接治疗作用为佐助药。消减或制约君、臣药的毒性和峻烈之性的为佐制药。防止病重邪甚时药病格拒的为反佐药。

35.桂枝汤服已须臾，啜热稀粥的意义是

- A.防止脾胃受损
- B.滋汗源，以防伤阴
- C.滋汗源，以防伤阳
- D.助汗并祛除外邪
- E.既防亡阴又防亡阳

答案:D

解析:桂枝汤中五味药配伍发中有补，散中有收，邪正兼顾，阴阳并调。服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力，借水谷之精气，充养中焦，不但易为酿汗，更可使外邪速去而不致复感。

36.外感风邪头痛、头风，治宜选用

- A.消风散
- B.二陈汤
- C.川芎茶调散
- D.天麻钩藤饮
- E.半夏白术天麻汤

答案:C

解析:川芎茶调散主治外感风邪头痛。消风散主治风疹、湿疹，不能用于治疗外感风邪头痛、头风。二陈汤主治湿痰证，不能用于治疗外感风邪头痛、头风。天麻钩藤饮主治肝阳偏亢，肝风上扰证，不能用于治疗外感风邪头痛、头风。半夏白术天麻汤主治风痰上扰证，不能用于治疗外感风邪头痛、头风。趣记：川芎茶调散薄荷老戒放枪，穷仔细。一一薄荷老芥防羌，芎芷细。

37.手足不温，腹痛，泄利下重，脉弦者，治宜选用

- A.健脾丸
- B.保和丸
- C.四逆散
- D.痛泻要方
- E.葛根黄芩黄连汤

答案:C

解析:手足不温，腹痛，泄利下重，脉弦为阳郁厥逆证，是因外邪传经入里，气机郁遏，不得疏泄，导致阳气内郁，不能达于四末的假外寒证。四逆散功能透邪解郁，疏肝理脾主治阳郁厥逆证和肝脾气郁证。

38.香薷散的功用是

- A.祛暑解表，化湿和中
- B.祛暑解表，清热化湿
- C.清暑解热，化气利湿
- D.清暑化湿，理气和中
- E.祛暑化湿，健脾和中

答案:A



39.葛根黄芩黄连汤中配伍黄芩的用意是

- A.和解清热
- B.清热燥湿
- C.清热止血
- D.清热安胎
- E.凉血解毒

答案:B

解析:葛根黄芩黄连汤中以苦寒之黄连、黄芩为臣,清热燥湿,厚肠止利。黄芩的功效,清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎。因此,主要取清热燥湿的功效。

40.桑螵蛸散与天王补心丹两方组成中均含有的药物是

- A.龙骨、人参
- B.人参、菖蒲
- C.菖蒲、远志
- D.远志、当归
- E.当归、石斛

答案:D

解析:桑螵蛸散的组成是桑螵蛸、远志、菖蒲、龙骨、人参、茯神、当归、炙龟甲(人参汤调下)。方歌:桑螵蛸散用龙龟,参苓菖远及当归;尿频遗尿精不固,滋肾宁心法勿违。天王补心丹组成是人参、茯苓、玄参、丹参、桔梗、远志、当归、五味、麦门冬、天门冬、柏子仁、炒酸枣仁、生地、朱砂、竹叶。方歌:补心丹用柏枣仁,二冬生地当归身;三参桔梗朱砂味,远志茯苓养心神。

41.炙甘草汤中配伍桂枝、生姜的主要用意是

- A.温阳化气
- B.温经散寒
- C.温经通脉
- D.通阳复脉
- E.通阳化气

答案:D

解析:炙甘草汤中炙甘草、人参、大枣益心气,补脾气,以资气血生化之源;阿胶、麦冬、麻仁滋心阴,养心血,充血脉,共为臣药。佐以桂枝、生姜辛行温通,温心阳,通血脉,诸厚味滋腻之品得姜、桂则滋而不腻。用法中加清酒煎服,以清酒辛热,可温通血脉,以行药力,是为使药。诸药合用,滋而不腻,温而不燥,使气血充足,阴阳调和,则心动悸、脉结代,皆得其平。

42.适宜用开窍剂治疗的症候是

- A.阳明腑实,神昏谵语
- B.阴虚风动,神倦瘖痲
- C.痰热扰神,谵语如狂
- D.热陷心包,窍闭神昏
- E.火毒扰神,错语不眠

答案:D

解析:热陷心包,窍闭神昏,治宜清心凉营,开窍醒神,故选用开窍药。阳明腑实,神昏谵语,治宜清热泻火,故选用泻下药。阴虚风动,神倦瘖痲由肝阴虚引起,治宜滋养阴液,故选用补阴药。痰热扰神,谵语如狂,本症见于痰火内盛,闭扰心神之痰火扰神证,故应选用清热化痰药。火毒扰神,错语不眠,治宜清解火热毒邪,故选用清热解毒药。

43.百合固金汤中的玄参是

- A.君药
- B.臣药
- C.佐药



E.佐使药

答案:B

解析:方中百合、麦冬相合,润肺止咳,清虚火而固肺金,共为君药;生地、熟地、玄参壮水制火,兼凉血止血,又能润燥利咽,合为臣药;君臣相配,有金水相生之妙用。当归、白芍相配,能够养血补肝,柔肝疏肝,贝母化痰止咳,桔梗载药上行,俱为佐药;甘草调药为使。全方滋养肺肾,有金水相生之用,有兼以柔肝疏肝,寓五行制化之理。

44.主治风痰上扰证的方剂是

- A.二陈汤
- B.定喘汤
- C.大定风珠
- D.大秦芎汤
- E.半夏白术天麻汤

答案:E

解析:主治风痰上扰证的是半夏白术天麻汤。二陈汤主治湿痰证。定喘汤主治风寒外束,痰热内蕴证。大定风珠主治阴虚风动证。大秦芎汤主治风邪初中经络证。

45.下列各项,不属于保和丸组成药物的是

- A.山楂
- B.麦芽
- C.半夏
- D.茯苓
- E.神曲

答案:B

解析:保和丸的组成有山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子,没有麦芽。

46.白术与苍术并用的方剂是

- A.健脾丸
- B.完带汤
- C.参苓白术散
- D.藿香正气散
- E.九味羌活汤

答案:B

解析:完带汤的药物组成:白术、山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、黑芥穗、柴胡。

47.具有温肺化饮功用的方剂是

- A.半夏白术天麻汤
- B.苏子降气汤
- C.半夏厚朴汤
- D.苓甘五味姜辛汤
- E.二陈汤

答案:D

解析:苓甘五味姜辛汤具有温肺化饮的功效,主治寒饮咳嗽。半夏白术天麻汤具有化痰息风,健脾祛湿的功效。苏子降气汤具有降气平喘,祛痰止咳的功效。半夏厚朴汤具有行气散结,降逆化痰的功效。二陈汤具有燥湿化痰,理气和中的功效。

48.既能治疗肠腑病,又能治疗妇科病的腧穴是

- A.归来
- B.梁门
- C.丰隆
- D.天枢



答案:D

解析:天枢穴既能治疗肠腑病,又能治疗妇科病。归来主治①小腹痛,疝气;②月经不调、带下、阴挺等妇科疾患。梁门“主治纳少、胃痛、呕吐等胃疾。丰隆主治①头痛,眩晕;②癫狂;③咳嗽痰多等痰饮病症;④下肢痿痹;⑤腹胀,便秘。内庭主治①齿痛、咽喉肿痛、鼻衄等五官热性病症;②热病;③吐酸、腹泻、痢疾、便秘等肠胃病症;④足背肿痛,跖趾关节痛。

49.以下哪项不属于《四总穴歌》的内容

- A.腰背委中求
- B.肚腹三里留
- C.胸胁内关谋
- D.面口合谷收
- E.头项寻列缺

答案:C

解析:《四总穴歌》所载“肚腹三里留,腰背委中求,头项寻列缺,面口合谷收”。

50.外感热病宜选用下列何穴治疗

- A.大椎
- B.二间
- C.内庭
- D.鱼际
- E.后溪

答案:A

解析:大椎主治外感热病,为退热要穴,且督脉主一身之阳气,刺络出血可清泻热邪。二间主治鼻衄、齿痛等五官疾患;热病。内庭主治齿痛、咽喉肿痛等五官热性病证;吐酸、腹泻等肠胃病证;足背肿痛,跖趾关节痛。鱼际主治咳嗽咯血等肺系热性病证;咽喉肿痛,失音。后溪主治头项强痛、腰背痛等痛症。

51.耻骨联合上缘至髌底的骨度分寸是

- A.18寸
- B.19寸
- C.20寸
- D.21寸
- E.22寸

答案:A

解析:耻骨联合上缘至股骨内上髌上缘的骨度分寸为18寸。股骨大转子至腓横纹的骨度分寸为19寸。常用骨度分寸无20寸、21寸、22寸。

52.药物的首过消除发生于

- A.舌下给药后
- B.吸入给药后
- C.口服给药后
- D.静脉给药后
- E.皮下给药

答案:C

解析:首过消除是指从胃肠道吸收入门静脉系统的药物在到达全身血循环前必先通过肝脏,如果肝脏对其代谢能力很强,或由于胆汁排泄的量,则使进入全身血循环内的有效药物量明显减少,这种作用也称为首过效应。首过效应发生于药物进入体循环之前的胃肠道、肠黏膜细胞和肝脏,所以是在口服给药后。

53.酚妥拉明可用于治疗顽固性充血性心力衰竭的主要原因是其可

- A.兴奋心脏,增强心肌收缩力,使心率加快,心输出量增加
- B.抑制心脏,使其得到休息
- C.扩张肺动脉,减轻右心后负荷



E.扩张外周小静脉，减轻心脏前负荷

答案:D

解析:酚妥拉明可用于治疗顽固性充血性心力衰竭的主要原因是其可扩张外周小动脉，减轻心脏后负荷。

54.用于帕金森病、晕动病的抗胆碱药是

A.山莨菪碱

B.后马托品

C.樟柳碱

D.阿托品

E.东莨菪碱

答案:E

解析:东莨菪碱的中枢镇静作用比阿托品强，有中枢抗胆碱作用，防晕防吐，可用于麻醉前给药、帕金森病、晕动病。

55.无明显中枢副作用的 H₁ 受体阻滞药是

A.异丙嗪

B.苯海拉明

C.阿司咪唑

D.曲吡那敏

E.氯苯那敏（扑尔敏）

答案:C

解析:H₁ 受体阻滞剂具有中枢抑制作用，多数药物可通过血脑屏障，产生不同程度的镇静、嗜睡等中枢抑制作用，可能是由中枢 H₁ 受体被阻断，拮抗了内源性组胺介导的觉醒反应所致。中枢抑制作用，以苯海拉明和异丙嗪最强，第二代药物如阿司咪唑无中枢抑制作用。

56.主要兴奋β受体的拟肾上腺素药是

A.去甲肾上腺素

B.肾上腺素

C.间羟胺

D.异丙肾上腺素

E.多巴胺

答案:D

解析:异丙肾上腺素是主要兴奋β受体的拟肾上腺素药。去甲肾上腺素主要激动α受体，对β受体激动作用很弱。肾上腺素能激动α和β两类受体。间羟胺直接激动α受体。多巴胺低剂量激动多巴胺受体，中剂量具有β₁受体激动作用。

57.关于氯解磷定的叙述，正确的是

A.可迅速制止肌束颤动

B.对乐果中毒疗效好

C.属可逆性抗胆碱酯酶药

D.不良反应较碘解磷定多

E.对内吸磷中毒无效

答案:A

解析:胆碱酯酶复活药有氯解磷定、碘解磷定、双复磷等。以氯解磷定为首选药。碘解磷定为最早应用的 AchE 复活药，不良反应较多，作用较弱。氯解磷定主要用于中度和重度有机磷酸酯类中毒的解救。对酶复活的效果随不同的有机磷酸酯类而异，对内吸磷、马拉硫磷和对硫磷中毒的疗效较好；对敌百虫、敌敌畏中毒的疗效稍差；对乐果中毒无效，因乐果中毒时所形成的磷酰化胆碱酯酶比较稳定，酶活性不易恢复，加之乐果乳剂还含有苯，可能同时有苯中毒。不良反应较少，但剂量过大，可直接与胆碱酯酶结合而抑制其活性，加剧中毒。

58.可保护溃疡面，并引起便秘的药物是

A.氢氧化铝

B.三硅酸镁



- D.碳酸钙
- E.氧化镁

答案:A

解析:氧化酶能中和胃酸保护溃疡面,但产生的氯化镁可引起腹泻。氢氧化铝抗酸作用较强,作用后产生的氧化铝具有收敛、止血和致便秘作用。

59.下列药物可产生“宿醉”现象的是

- A.地西洋
- B.丙磺舒
- C.卡马西平
- D.乙琥胺
- E.丙戊酸钠

答案:A

解析:地西洋常规用量下少有严重不良反应。常见有服药次日出现头昏、嗜睡、乏力等“宿醉”现象。长期使用可产生耐受性,亦可产生依赖性,突然停药可出现反跳或戒断症状如失眠、焦虑、震颤等。

60.室性心律失常危急病例的抢救可选用

- A.奎尼丁
- B.阿托品
- C.普萘洛尔
- D.维拉帕米
- E.利多卡因

答案:E

解析:利多卡因用于室性心律失常,特别适用于危急病例,是治疗急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药。

61.高血压危象应选用药物

- A.ACEI类
- B.硝普钠
- C.β受体阻滞药
- D.卡托普利
- E.利血平

答案:B

解析:高血压危象患者宜给予静脉滴注或肌注快速起效的药物,如硝普钠,硝普钠通过释放NO直接舒张小动脉和静脉,降压作用强、起效快、维持时间短。

62.治疗肝性脑病的抗帕金森药是

- A.左旋多巴
- B.苯海索
- C.溴隐亭
- D.金刚烷胺
- E.司来吉兰

答案:A

解析:左旋多巴用于帕金森病、急性肝功能衰竭所致的肝昏迷辅助治疗等。苯海索抗震效果好,也能改善运动障碍和肌肉强直。溴隐亭用于抗震颤麻痹。金刚烷胺用于治疗原发性帕金森病、脑炎后的帕金森综合征、药物诱发的锥体外系反应、一氧化碳中毒后帕金森综合征及老年人合并有动脉硬化的帕金森综合征。司来吉兰与多巴胺相似。

63.下列疾病,表现为弛张热的是

- A.肺炎球菌肺炎
- B.疟疾
- C.布鲁斯菌病



E.风湿热

答案:E

解析:弛张热:体温常在 39°C以上,波动幅度大,24 小时内波动范围超过 2°C,但都在正常水平以内,常见于败血症、风湿热、肺结核及化脓性炎症等。

64.下列疾病,多表现为下垂性水肿的是

A.肾小球肾炎

B.肝硬化

C.血管神经性水肿

D.右心衰竭

E.甲状腺功能减退症

答案:D

解析:心源性水肿特点是下垂性水肿,心源性水肿见于右心衰竭、慢性缩窄性心肌炎等。肾小球肾炎表现为肾源性水肿,肝硬化表现为肝源性水肿,血管神经性水肿表现为局部性水肿,甲状腺功能减退症表现为内分泌源性水肿。

65.下列各项,不属肝细胞性黄疸特点的是

A.尿胆原可增加

B.粪便白陶土色

C.尿胆红素阳性

D.血清结合胆红素增高

E.血清非结合胆红素升高

答案:B

解析:肝细胞性黄疸的实验室检查特点:血清结合及非结合胆红素均增多。尿中尿胆原通常增多,尿胆红素阳性。大便颜色通常改变不明显。有转氨酶升高等肝功能受损的表现。

66.能导致瞳孔扩大的疾病是

A.有机磷杀虫药中毒

B.吗啡中毒

C.青光眼绝对期

D.毒蕈中毒

E.虹膜炎

答案:C

解析:瞳孔扩大见于外伤、青光眼绝对期、视神经萎缩、完全失明、濒死状态、颈交感神经刺激和阿托品、可卡因等药物影响;瞳孔缩小常见于虹膜炎、有机磷农药中毒、毒蕈中毒、吗啡中毒等。

67.空洞型肺结核患者胸部的叩诊音为

A.清音

B.过清音

C.实音

D.浊音

E.鼓音

答案:E

解析:清音为肺部正常叩诊音;过清音见于肺气肿或支气管哮喘发作时;实音见于肺实变、胸腔内巨大肿物等;浊音见于病灶范围较小,或较深、积液量较少的肺部疾病,如肺炎、胸腔积液、胸膜增厚粘连等;鼓音见于气胸及直径大于 3~4cm 的浅表肺空洞,如空洞型肺结核。

68.上消化道大出血时,粪便的特点是

A.水样稀便

B.黏液脓血便

C.米泔样便

D.柏油样便



答案:D

解析:水样稀便见于各种感染性或非感染性腹泻,如急性胃肠炎、甲状腺功能亢进症等;黏液脓血便常见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等;米泔样便见于霍乱;柏油样便见于各种原因引起的上消化道出血;鲜血便见于肠道下段出血,如痔疮、肛裂、直肠癌等。

69.丝虫病可引起的尿液改变是

- A.乳糜尿
- B.血红蛋白尿
- C.胆红素尿
- D.脓尿
- E.血尿

答案:A

解析:尿中混有淋巴液而呈稀牛奶状称为乳糜尿,常见于丝虫病及肾周围淋巴管梗阻。血红蛋白尿主要见于严重的血管内溶血,如溶血性贫血、血型不合的输血反应。胆红素尿由于尿中有大量的结合胆红素,尿液呈豆油样改变,常见于胆汁淤积性黄疸和肝细胞性黄疸。脓尿见于泌尿系统感染如肾盂肾炎、膀胱炎等。血尿多见于泌尿系统炎症、结石、肿瘤、结核、外伤等,也可见于血液系统疾病,如血友病、血小板减少性紫癜等。

70.高血压性心脏病左心室增大,其心脏浊音界呈

- A.靴形
- B.梨形
- C.烧瓶形
- D.普大形
- E.心腰部凸出

答案:A

解析:靴形为高血压、主动脉瓣关闭不全;梨形为二尖瓣狭窄;烧瓶形见于心包积液;普大形见于扩心病;心腰部凸出为左房与肺动脉段均增大,心腰更为丰满或膨出。

71.方颅可见于

- A.呆小症
- B.先天性梅毒
- C.脑膜炎
- D.脑积水
- E.小儿营养不良

答案:B

解析:方颅,前额左右突出,头顶平坦呈方形,颈部静脉充盈,对比之下颜面很小,由于颅内压增高,压迫眼球,形成双目下视、巩膜外露的特殊表情,常见于先天性梅毒。呆小症、脑膜炎、脑积水、小儿营养不良均不符合。

72.心尖区触及舒张期震颤,提示

- A.主动脉瓣狭窄
- B.肺动脉瓣狭窄
- C.室间隔缺损
- D.二尖瓣狭窄
- E.动脉导管未闭

答案:D

解析:二尖瓣狭窄时,心尖部可闻及舒张中晚期隆隆样杂音,呈递增型,音调较低而局限,左侧卧位呼气末时较清楚,常伴有第一心音亢进、二尖瓣开放拍击音及舒张期震颤,肺动脉瓣第二心音亢进、分裂;主动脉瓣关闭不全所致的相对性二尖瓣狭窄的杂音,称为奥-弗杂音(Austin-Flint杂音),性质柔和,不伴有第一心音亢进、开瓣音,无震颤。

73.病原体被局限化而不引起显性感染,但不足以将病原体清除,待机体免疫功能下降时,才引起疾病。此种表现属于



- B.病原携带状态
- C.机会性感染
- D.潜伏性感染
- E.隐性感染

答案:D

解析:潜伏性感染:病原体侵入人体后,寄生于机体的某些部位,机体的免疫功能使其局限化而不引起显性感染,但也不能将病原体清除,一旦机体免疫功能下降才引起显性感染。如单纯疱疹、带状疱疹、疟疾、结核病等。潜伏性感染期间病原体一般不排出体外。

74.下列各项中属乙类传染病的是

- A.霍乱
- B.鼠疫
- C.传染性非典型肺炎
- D.风疹
- E.流行性感冒

答案:C

解析:根据中华人民共和国传染病防治法及其实施细则,将法定传染病分为三类:甲类、乙类和丙类。其中,鼠疫和霍乱属于甲类,风疹和流行性感冒属于丙类,2003年4月卫生部通知,将传染性非典型肺炎列入法定传染病管理,按乙类传染病管理。

75.下列各项,不是狂犬病传染源的是

- A.病犬
- B.蝙蝠
- C.臭鼬
- D.浣熊
- E.患者

答案:E

解析:带狂犬病毒的动物是本病传染源,我国狂犬病主要传染源是病犬,蝙蝠、臭鼬、浣熊等野生动物也成为主要传染源,一般来说,狂犬患者不是传染源。

76.流行性脑脊髓膜炎的主要传染源是

- A.患者和带菌者
- B.苍蝇
- C.鼠类
- D.污染水源
- E.病毒

答案:A

解析:流行性脑脊髓膜炎传染源是带菌者和流脑患者,因脑膜炎球菌在外界生活力极弱,故间接传播极少。

77.中毒性菌痢最严重的临床表现是

- A.起病急骤
- B.高热
- C.惊厥
- D.循环衰竭和呼吸衰竭
- E.昏迷

答案:D

解析:中毒性菌痢最严重的临床表现是循环衰竭和呼吸衰竭,为混合型的临床表现,其死亡率高达90%以上。起病急骤、高热可见于普通型菌痢;惊厥、昏迷可见于中毒性菌痢中的脑型;以上两者并非最严重的临床类型。

78.有关隔离的描述,错误的是

- A.是控制传染病流行的重要措施



- C.可防止病原体向外扩散给他人
- D.根据传染病的平均传染期来确定隔离期限
- E.某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察

答案:D

解析:传染病患者的隔离期限原则是根据传染病的 longest 传染期而确定的,同时尚应根据临床表现和微生物检验结果来决定是否可以解除隔离。某些传染病患者出院后尚应追踪观察。

79.下列各项,不属卫生行政处罚的是

- A.警告
- B.停止损害
- C.罚款
- D.没收违法所得
- E.责令停产停业

答案:B

解析:卫生行政处罚程序所指行政处罚,是指县级以上卫生行政机关依据卫生法律、法规、规章,对受制裁的违法行为,作出的警告、罚款、没收违法所得、责令停产停业、吊销许可证以及卫生法律、行政法规规定的其他行政处罚。停止损害不属于卫生行政处罚范围。

80.医疗机构发现甲类传染病时,对疑似病人应依法及时采取的措施是

- A.采取预防措施
- B.进行医学观察
- C.予以隔离治疗
- D.在指定场所进行医学观察
- E.确诊前在指定场所进行单独隔离治疗

答案:E

解析:医疗机构发现甲类传染病时,应当及时采取下列措施:①对病人、病原携带者,予以隔离治疗,隔离期限根据医学检查结果确定;②对疑似病人,确诊前在指定场所单独隔离治疗;③对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者,在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。

81.突发公共卫生事件严重危害

- A.公众权益
- B.社会公众利益
- C.经济秩序
- D.社会秩序
- E.社会公众健康

答案:E

解析:突发公共卫生事件是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

82.下列各项,不属卫生行政处罚的是

- A.警告
- B.停止损害
- C.罚款
- D.没收违法所得
- E.责令停产停业

答案:B

解析:卫生行政处罚程序所指行政处罚,是指县级以上卫生行政机关依据卫生法律、法规、规章,对受制裁的违法行为,作出的警告、罚款、没收违法所得、责令停产停业、吊销许可证以及卫生法律、行政法规规定的其他行政处罚。停止损害不属于卫生行政处罚范围。

83.医疗机构发现甲类传染病时,对疑似病人应依法及时采取的措施是



- B.进行医学观察
- C.予以隔离治疗
- D.在指定场所进行医学观察
- E.确诊前在指定场所进行单独隔离治疗

答案:E

解析:医疗机构发现甲类传染病时,应当及时采取下列措施:①对病人、病原携带者,予以隔离治疗,隔离期限根据医学检查结果确定;②对疑似病人,确诊前在指定场所单独隔离治疗;③对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者,在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。

84.突发公共卫生事件严重危害

- A.公众权益
- B.社会公众利益
- C.经济秩序
- D.社会秩序
- E.社会公众健康

答案:E

解析:突发公共卫生事件是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

A2 型题

85.患者,男,54岁。咳嗽气粗,痰多痰黄,面赤身热,口干欲饮,舌红苔黄,脉滑数。其证候是

- A.痰热郁肺
- B.肺阴亏耗
- C.风燥伤肺
- D.风热犯肺
- E.风寒袭肺

答案:A

解析:患者咳声气粗伴痰多痰黄,面赤身热,口干欲饮,舌红苔黄,脉滑数提示为痰热郁肺证。为痰热郁肺,郁久化火,火灼津液所致。B以干咳为特点。C则同时并见形体干燥失濡润的症候。D、E应同时并见表证。

86.感冒患者,恶寒发热轻微,但以脘腹冷痛,呕吐,腹泻为主要症状,舌苔薄,脉紧。其病机是

- A.寒邪伤及卫阳
- B.寒邪伤及太阴
- C.寒邪直中少阴
- D.寒邪直中脾胃
- E.寒邪伤及厥阴

答案:D

解析:患者有发热恶寒提示外邪致病,有表证。见脘腹冷痛、腹泻等为寒邪留滞胃肠,寒凝气阻、传导失司之象。故此病机为寒邪直中脾胃,表证未解。寒邪伤及卫阳以表证为主要临床表现。寒邪伤及太阴病变特点以里虚寒为主。邪直中少阴以脉微细,但欲寐为主要脉症。寒邪伤及厥阴以上热下寒为其提纲。

87.患者恶寒发热,无汗,头痛,身痛,喘咳,舌苔薄白,脉浮紧。其证候是

- A.湿淫
- B.暑淫
- C.寒淫
- D.风淫
- E.燥淫

答案:C

解析:根据患者临床表现,可以得出患者所患为表寒证,属于寒淫证的范畴。寒为阴邪,其性清冷,遏制并损伤阳

88.患者外感风寒，恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳。治疗宜选用

- A.麻黄
- B.桂枝
- C.细辛
- D.杏仁
- E.白前

答案:A

解析:该题考查麻黄的临床应用。患者外感风寒，恶寒发热，头身疼痛，无汗为伤寒表实证，治以发散风寒，咳喘以宣肺平喘。麻黄具有发散风寒，宣肺平喘，利水消肿的功效，宜用于风寒外郁，腠理密闭无汗的外感风寒表实证，并且麻黄味辛为治疗肺气壅遏所致喘咳的要药。

89.患者咳嗽痰多，痰白清稀，食少便溏，近日下肢轻度浮肿，舌淡苔白，脉弱。治疗应选用

- A.党参
- B.薏苡仁
- C.山药
- D.白术
- E.黄精

答案:D

解析:患者咳嗽痰多，痰白清稀，食少便溏，下肢轻度浮肿，舌淡苔白，脉弱，为脾气不足，运化失健引起，治以健脾补气，燥湿利水。白术具有益气健脾，燥湿利水，止汗，安胎的功效，被誉为“脾脏补气健脾第一要药”。

90.患者痰壅气逆，咳嗽喘逆，痰多胸闷，食少难消，舌苔白腻，脉滑。治疗宜选用

- A.山楂
- B.莱菔子
- C.神曲
- D.鸡内金
- E.麦芽

答案:B

解析:该题考查莱菔子的临床应用。患者痰壅气逆，咳嗽喘逆，痰多胸闷，治以降气化痰，止咳平喘，食少难消，舌苔白腻，脉滑，治以消食化积。莱菔子具有消食除胀，降气化痰的功效，尤善行气消胀。

91.患者癆嗽，干咳无痰，颧红，盗汗，午后及夜间低热，治疗方中不应出现的药物是

- A.知母
- B.麦冬
- C.鳖甲
- D.地骨皮
- E.石膏

答案:E

解析:据题干所述，患者干咳无痰，颧红，盗汗，午后及夜间低热，均为阴虚内热的表现，治疗方中应以滋阴清热药为主，石膏生用清热泻火，除烦止渴，煨用收湿，生肌，敛疮，止血，不具备滋阴清热的功效。

92.患者自幼患有痫证，近期发作较频，并见心神不安，心悸，失眠，健忘，舌淡白，脉滑。治疗应选用

- A.竹茹
- B.茯苓
- C.琥珀
- D.党参
- E.远志

答案:E

解析:患者自幼患有痫证，近期发作频繁，舌淡白，脉滑治以补益心肾，祛痰开窍；心神不安，心悸，失眠，健忘，治以交通心肾、安神定志、益智强识。远志味辛通利，能利心窍，逐痰涎，故可用治痰阻心窍所致之癫痫抽搐、

肾、安神定志、益智强识之佳品。

93.某女，45岁。头痛多年，后头部疼痛固定不移，痛如椎刺，舌暗，脉细涩。针灸治疗除百会、风池外，宜取

- A.列缺、曲池
- B.申脉、悬钟
- C.肝俞、脾俞
- D.太溪、侠溪
- E.血海、膈俞

答案:E

解析:根据题干症状诊断为:瘀血头痛。针灸治疗宜配血海、膈俞。

94.患者外感风寒，咽喉赤肿疼痛，吞咽困难，咽干，咳嗽。治疗应首选

- A.合谷
- B.内庭
- C.太溪
- D.鱼际
- E.廉泉

答案:A

解析:合谷为手阳明经原穴，主治五官诸疾、外感病证。内庭为足阳明胃经之荥穴，主治齿痛、咽喉肿痛、鼻衄等五官热性病证；太溪为足少阴肾经之输穴、原穴，可治疗咽喉肿痛、齿痛、耳聋、耳鸣等阴虚性五官病证；鱼际为手太阴肺经之荥穴，可治疗咳嗽、咯血、咽干、咽喉肿痛、失音等肺系热性病证；廉泉穴属任脉，可治疗中风失语、暴暗、吞咽困难、舌缓流涎、舌下肿痛、口舌生疮、喉痹等咽喉口舌病证。

95.患儿，男，7岁。睡中遗尿，白天小便频而量少，劳累后遗尿加重，面白气短，食欲不振，大便易溏，舌淡苔白，脉细无力。治疗除取主穴外，还应选用的是

- A.神门、阴陵泉、胃俞
- B.气海、肺俞、足三里
- C.次髎、水道、三阴交
- D.百会、神门、内关
- E.关元俞、肾俞、关元

答案:B

解析:该患者7岁，以睡中遗尿为主症，故诊断为遗尿。白天小便频而量少，劳累后遗尿加重，面白气短，食欲不振，大便易溏，舌淡苔白，脉细无力均为肺脾气虚之象，故辨为肺脾气虚证。遗尿肺脾气虚证配肺俞、脾俞、足三里，气海能补元气。

96.患者，女性，50岁。因恼怒致胃脘胀痛，暖气，呕酸，舌苔薄白，脉弦。依据“近部取穴”的原则，治疗应首选

- A.足三里
- B.膻中
- C.太冲
- D.天枢
- E.中脘

答案:E

解析:中脘既是胃募穴又是八会穴之腑会，位于任脉，在上腹部，前正中线上，当脐中上4寸，近于胃脘部，可调中焦，理脾胃。

97.患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加

- A.大椎、曲池
- B.肾俞、关元
- C.脾俞、气海



E.肾俞、合谷

答案:A

解析:本题考查常见的病症的辨证、处方。题中患者两膝关节红肿热痛,尤以右膝部为重,痛不可触,关节活动不利,可辨证为痹证,并见身热,口渴,舌苔黄燥,脉滑数可进一步辨证为热痹证。大椎、曲池合用可用于治疗热痹症。

98.患者,女,30岁。3天前因对着空调入睡,次日睡眠醒来时发现一侧面部肌肉板滞、麻木、瘫痪,额纹消失,针刺起远治作用的主穴是

A.攒竹、丝竹空

B.合谷、太冲

C.阳白、四白

D.颧髎、颊车

E.丝竹空、阳白

答案:B

解析:本病患者属面瘫急性发作。治法为祛风通络,疏调经筋。取局部穴、手足阳明经穴为主。主穴为攒竹、阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、合谷、太冲。面部诸穴可疏通局部经筋气血,活血通络。“面口合谷收”,合谷为循经远端取穴,可祛除阳明、太阳经筋之邪气,祛风通络。太冲为足厥阴原穴,肝经循行“上出额”,“下颊里,环唇内”,与合谷相配,具有加强疏调面颊部经气作用。

99.患者,女,45岁,失眠2个月,近日来入睡困难,有时睡后易醒,醒后不能再睡,甚至彻夜不眠,舌苔薄,脉沉细。治疗应首选

A.神门、内关

B.神门、胆俞

C.神门、三阴交

D.心俞、脾俞

E.心俞、足三里

答案:C

解析:神门、内关、三阴交治疗失眠伴随脾胃不和之症状。神门、胆俞治疗失眠伴心胆气虚之症状。心俞、脾俞治疗失眠伴心脾亏虚之症状。神门为心经的原穴,功能补益心气,主治心痛心烦,惊悸怔忡,失眠健忘等心与神志病证。三阴交功用为健脾和胃,调理气血,通经活络,可治疗心悸、失眠、高血压等证。本题为不寐,治疗应补气养心安神。

B1 型题

(共用备选答案题)

A.心、肺

B.心、肝

C.肺、脾

D.肺、肝

E.肺、肾

100.与气的生成关系最密切的是

答案:C

解析:肺主气,指肺为五脏中与气关系最密切的内脏,亦指肺对全身气机的调节作用。肺主呼吸,是指肺是气体交换的场所,通过肺的呼吸作用,不断吸进清气,排出浊气,吐故纳新,实现机体与外界环境的气体交换。脾为气血化生之源,指脾将饮食水谷精微传输布散,把水谷精气上输于肺,再由肺通过经脉布散全身,以营养五脏六腑和全身,维持正常的生命活动。

101.与呼吸运动关系最密切的是

答案:E

解析:肺主气,指肺为五脏中与气关系最密切的内脏,亦指肺对全身气机的调节作用。肺主呼吸,是指肺是气体交

气，指肾有帮助肺保持吸气的深度，防止呼吸浅表的作用。

（共用备选答案题）

- A.阴跷脉、阳跷脉
- B.阴维脉、阳维脉
- C.督脉、任脉
- D.冲脉、任脉
- E.阴跷脉、阴维脉

102.患者，女。因流产而失血过多，导致月经不调，久不怀孕。其病在

答案:D

解析:任脉具有调节阴经气血的作用，“任主胞胎”；冲脉具有调节十二经气血的作用，“冲为血海”。

103.患者久病，眼睑开合失司，下肢运动不利。其病在

答案:A

解析:阴阳跷脉主肢节运动，司眼睑开合；阴阳维脉具有维系、联络全身阳经或阴经的作用；督脉具有调节阳经气血的作用，反映脑、髓和肾的功能。

（共用备选答案题）

- A.体质因素
- B.精神刺激
- C.工作环境
- D.气候因素
- E.精神状态

104.“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”指出与防病关系密切的因素是

答案:E

解析:“恬淡虚无……病安从来。”讲的是精神调节方面的要点。可理解为：身心平静，不会得病。精神刺激是致病因素。此句话讲的是精神状态与发病的关系。

105.“肉不坚，腠理疏，则善病风。”指出与发病关系密切的因素是

答案:A

解析:“肉为墙”，意即肌肉起着屏障作用。肌肉既可保护内在脏器，缓冲外力的损伤，又可抗拒外邪的侵袭。“肉”为身体的组成部分。此句话讲的是体质与发病的关系。

（共用备选答案题）

- A.表寒证
- B.真寒假热证
- C.虚寒证
- D.实寒证
- E.亡阳证

106.脘腹冷痛拒按，大便秘结，多见于

答案:D

解析:脘腹冷痛为寒象，题干中无热象表现，其中实证疼痛特点为拒按。

107.脘腹冷痛喜按，大便溏软，多见于

答案:C

解析:脘腹冷痛为寒象，题干中无热象表现，虚证疼痛特点为喜按。

（共用备选答案题）

- A.疫毒痢初期，高热烦渴，舌红脉数，急骤出现四肢厥冷，面色苍白
- B.咳嗽吐痰、息粗而喘、苔腻脉滑，久之气短而喘、声低懒言
- C.初为关节冷痛、重着，病久见患处红肿灼痛
- D.自觉发热、欲脱衣揭被，下肢厥冷，面色浮红如妆
- E.神识昏沉，四肢厥冷、胸腹灼热，口鼻气灼，舌红苔黄

答案:A

解析:热证转寒是指原为热证,后出现寒证,而热证随之消失的病变。疫毒痢初期,高热烦渴,舌红脉数,急骤出现四肢厥冷,面色苍白,原为热证后出现寒证。

109.真寒假热的临床表现是

答案:D

解析:真寒假热证其表现既有四肢厥冷,下利清谷、小便清长,舌淡苔白等一派真寒之象,又有面赤,身热,口渴,脉大的热象。但面虽赤,仅颧红如妆,时隐时现,与热证之满面通红不同;身虽热而反欲盖衣被,或自感烦热而胸腹必无灼热,下肢必厥冷;口虽渴但不欲饮或不多饮或喜热饮,与热证之渴喜冷饮不同;脉虽浮大但按之必无力,与热证之脉洪大有力不同。由此可以判定其面赤、身热、口渴、脉大均为假热。

(共用备选答案题)

- A.气滞血瘀
- B.气不摄血
- C.气随血脱
- D.气血两虚
- E.气血失和

110.肝病日久,两胁胀满疼痛,并见舌质瘀斑、瘀点。其病机是

答案:A

解析:肝病日久,导致肝的功能失常,肝气瘀滞,进而出现血瘀症状。胁胀疼痛,是血瘀之象。且舌质出现瘀点瘀斑,更加印证了气滞血瘀的病理改变。

111.产后大出血,继则冷汗淋漓,甚则晕厥。其病机是

答案:C

解析:产后大出血,导致血液丢失过多,使气随血脱,不能顾护人体,出现冷汗淋漓和晕厥的表现。

(共用备选答案题)

- A.合欢皮
- B.酸枣仁
- C.远志
- D.琥珀
- E.磁石

112.既能活血消肿,又能解郁安神的药物是

答案:A

解析:合欢皮解郁安神,活血消肿;酸枣仁养心益肝,安神,敛汗;远志宁心安神,祛痰开窍,消散痈肿。

113.既能活血散瘀,又能镇惊安神的药物是

答案:D

解析:琥珀镇惊安神,活血散瘀,利尿通淋;磁石镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气定喘。

(共用备选答案题)

- A.活血行气,祛风止痛
- B.活血行气,清心凉血
- C.活血调经,除烦安神
- D.活血通经,清热解毒
- E.活血通经,祛瘀止痛

114.郁金具有的功效是

答案:B

解析:郁金活血止痛,行气解郁,清心凉血,利胆退黄。

115.红花具有的功效是

答案:E

解析:红花活血通经,祛瘀止痛。

- A.甘、咸，温
- B.酸、苦，温
- C.苦、咸，温
- D.甘、淡，温
- E.辛、甘，温

116.鹿茸的性味

答案:A

解析:鹿茸为补阳药，味甘，性温。而鹿茸味咸，功偏益精血，强筋骨。

117.淫羊藿的性味

答案:E

解析:淫羊藿为补阳药，味甘，性温；淫羊藿味辛，功偏祛风除湿。

(共用备选答案题)

- A.麻黄汤
- B.桑菊饮
- C.银翘散
- D.麻杏石甘汤
- E.柴葛解肌汤

118.主治风温初起，邪客肺络证的方剂是

答案:B

解析:桑菊饮主治风温初起，邪客肺络证。

119.主治外感风寒表实证的方剂是

答案:A

解析:麻黄汤主治外感风寒表实证。

(共用备选答案题)

- A.具有调和方中诸药作用的药物
- B.引方中诸药至特定病所的药物
- C.针对主病或主证起主要治疗作用的药物
- D.针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物
- E.直接治疗次要兼证的药物

120.上述各项，君药指的是

答案:C

解析:君药是针对主病或主证起主要治疗作用的药物，是方中不可或缺，且药力居首的药物。

121.上述各项，臣药指的是

答案:D

解析:臣药：一是辅助君药加强治疗主病或主证的药物；二是针对兼病或兼证起治疗作用的药物。其在方中之药力小于君药。

(共用备选答案题)

- A.肝火犯胃
- B.胃热阴虚
- C.湿热痢疾
- D.肺热喘咳
- E.胃火牙痛

122.清胃散主治

答案:E

解析:左金丸主治肝火犯胃证。玉女煎主治胃热阴虚证。芍药汤主治湿热痢疾。泻白散主治肺热喘咳证。清胃散主治胃火牙痛。

答案:B

解析:左金丸主治肝火犯胃证。玉女煎主治胃热阴虚证。芍药汤主治湿热痢疾。泻白散主治肺热喘咳证。清胃散主治胃火牙痛。

(共用备选答案题)

- A.足太阳膀胱经
- B.足阳明胃经
- C.足少阳胆经
- D.手少阳三焦经
- E.手太阳小肠经

124.从耳后,入耳中至目外眦之下的经脉是

答案:D

解析:足太阳膀胱经起于目内眦,至耳上角,入络脑。足阳明胃经起于鼻,入上齿,环口夹唇,循喉咙。足少阳胆经至目锐眦,下耳后,入耳中,出耳前。手少阳三焦经从耳后,出耳上角,入耳中,至目锐眦。

125.至目外眦,转入耳中的经脉是

答案:E

解析:手太阳小肠经循咽,至目内外眦,入耳中,抵鼻。

(共用备选答案题)

- A.手太阴肺经
- B.手阳明大肠经
- C.足阳明胃经
- D.手少阴心经
- E.手太阳小肠经

126.曲池穴归属于

答案:B

解析:曲池为手阳明大肠经合穴,当屈肘,成直角时,曲池当时横纹外端与肱骨外上髁连线的中点。

127.通里穴归属于

答案:D

解析:通里穴为手少阴心经腧穴,在前臂前区,腕掌侧远端横纹上1寸,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

(共用备选答案题)

- A.可待因
- B.喷托维林
- C.氯哌斯汀
- D.右美沙芬
- E.苯丙哌林

128.有镇咳、局麻及轻度阿托品样作用,用于呼吸道炎症引起的干咳、阵咳,尤其是小儿百日咳的药物是

答案:B

解析:喷托维林有镇咳、局麻及轻度阿托品样作用,用于呼吸道炎症引起的干咳、阵咳,尤其是小儿百日咳。

129.各种原因引起的剧烈干咳,尤其是其他药物无效者、胸膜炎干咳伴胸痛者,应首选的药物是

答案:A

解析:可待因用于各种原因引起的剧烈干咳,尤其是其他药物无效者、胸膜炎干咳伴胸痛者。

(共用备选答案题)

- A.阿司匹林
- B.对乙酰氨基酚
- C.布洛芬
- D.塞来昔布
- E.吲哚美辛

答案:D

解析:塞来昔布主要用于风湿性、类风湿性关节炎和骨关节炎,一般在用药2周后疼痛和关节功能状态明显改善,也用于手术后疼痛、牙痛、痛经等。

131.长期口服可引起凝血障碍的药物是

答案:A

解析:阿司匹林能抑制血小板聚集,延长出血时间,大剂量或长期使用还能抑制凝血酶原形成,延长凝血酶原时间。

(共用备选答案题)

- A.胸膜炎
- B.肺炎链球菌肺炎
- C.空洞型肺结核
- D.支气管扩张
- E.喉头水肿

132.可表现为犬吠样咳嗽伴呼吸困难的疾病是

答案:E

解析:喉头水肿可见犬吠样咳嗽伴呼吸困难。

133.可表现为发热伴干性咳嗽的疾病是

答案:A

解析:胸膜炎可见发热伴干性咳嗽;肺炎链球菌肺炎、空洞型肺结核可见发热伴湿性咳嗽;支气管扩张可见咯血、脓痰。

(共用备选答案题)

- A.苦笑面容
- B.伤寒面容
- C.甲亢面容
- D.二尖瓣面容
- E.慢性病面容

134.消瘦,两眼球突出,兴奋不安,呈惊恐貌,多见于

答案:C

解析:消瘦,两眼球突出,兴奋不安,呈惊恐貌,多见于甲亢面容。

135.两颧紫红,口唇发绀,多见于

答案:D

解析:苦笑面容见于破伤风;伤寒面容表情淡漠,反应迟钝,呈无欲状态,见于肠伤寒、脑脊髓膜炎、脑炎等高热衰竭患者;慢性病面容憔悴,面色晦暗或苍白无华,目光暗淡,见于慢性消耗性疾病,如恶性肿瘤、肝硬化、严重结核病等。两颧紫红,口唇发绀,多见于二尖瓣面容。

(共用备选答案题)

- A.淀粉酶
- B.血清转氨酶
- C.γ-谷氨酰基转肽酶
- D.血清碱性磷酸酶
- E.肌酸磷酸激酶

136.对诊断骨质疏松最有意义的是

答案:D

解析:淀粉酶是胰腺炎的实验室诊断依据;血清转氨酶、γ-谷氨酰基转肽酶用于肝功能的检测;血清碱性磷酸酶是骨质疏松的实验室诊断依据。

137.对诊断心肌梗死最有意义的是

答案:E

解析:肌酸磷酸激酶是心肌梗死的实验室诊断依据。



- A.米泔样
- B.黏液脓样
- C.柏油样
- D.灰白色
- E.果酱色

138.霍乱的粪便形状是

答案:A

解析:米泔样见于霍乱;黏液脓样见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等。

139.细菌性痢疾的粪便形状是

答案:B

解析:柏油样见于各种原因所致的上消化道出血;灰白色见于阻塞性黄疸;果酱色见于阿米巴痢疾。

(共用备选答案题)

- A.P波
- B.QRS波群
- C.S-T段
- D.T波
- E.Q-T间期

140.代表心室除极和复极总时间的是

答案:E

解析:代表心室除极和复极总时间的是Q-T间期。P波反应心房的除极过程。QRS波群反应心室除极过程。S-T段反应心室的缓慢复极过程。T波反映了心室的快速复极过程。

141.代表心房除极波形的是

答案:A

解析:代表心房除极波形的是P波。QRS波群反应心室除极过程。S-T段反应心室的缓慢复极过程。T波反映了心室的快速复极过程。Q-T间期反应心室开始除极至心室复极完毕全过程的时间。

(共用备选答案题)

- A.变质性炎
- B.化脓性炎
- C.增生性炎
- D.出血性炎
- E.假膜性炎

142.流行性脑脊髓膜炎,病理变化为

答案:B

解析:变质性炎为流行性乙型脑炎的病理改变。增生性炎是增生性炎的病变特点:①浸润的细胞主要是淋巴细胞、浆细胞和单核细胞;②局部组织破坏主要是由炎细胞引起;③常有较明显的结缔组织、血管和上皮细胞、腺体等实质细胞的增生,在黏膜可形成息肉,在肺常形成炎性假瘤,在管道性脏器可引起狭窄和梗阻。出血性炎是渗出性炎症的一个类型,因炎症灶的血管损伤严重,致使渗出物中含大量红细胞,常见于流行性出血热、钩端螺旋体病和鼠疫等。假膜性炎易发生于黏膜、浆膜和肺组织。发生于黏膜者渗出的纤维蛋白原形成的纤维素、坏死组织和嗜中性粒细胞共同形成假膜,又称假膜性炎,见于白喉。

143.流行性乙型脑炎,其病理变化为

答案:A

解析:变质性炎为流行性乙型脑炎的病理改变。增生性炎是增生性炎的病变特点:①浸润的细胞主要是淋巴细胞、浆细胞和单核细胞;②局部组织破坏主要是由炎细胞引起;③常有较明显的结缔组织、血管和上皮细胞、腺体等实质细胞的增生,在黏膜可形成息肉,在肺常形成炎性假瘤,在管道性脏器可引起狭窄和梗阻。出血性炎是渗出性炎症的一个类型,因炎症灶的血管损伤严重,致使渗出物中含大量红细胞,常见于流行性出血热、钩端螺旋体病和鼠疫等。假膜性炎易发生于黏膜、浆膜和肺组织。发生于黏膜者渗出的纤维蛋白原形成的纤维素、坏死组织

(共用备选答案题)

- A.复方磺胺甲基异唑
- B.痢特灵
- C.四环素
- D.土霉素
- E.庆大霉素

144.治疗中毒型菌痢的首选药物是

答案:A

解析:中毒型菌痢的病原治疗, 首选药物为喹诺酮类药物, 包括环丙沙星和左氧氟沙星等, 其次为复方磺胺甲基异唑, 其他如阿奇霉素、多西环素、庆大霉素和三代头孢菌素等药物也可根据药敏结果选用。

145.治疗霍乱的首选药物是

答案:C

解析:霍乱的病原体是霍乱弧菌, 革兰染色阴性。四环素族均为广谱抗生素, 对多数革兰阳性与阴性菌有抑制作用, 对革兰阴性杆菌作用较好。其作用机制主要是阻止氨酰基与核糖核蛋白体的结合, 阻止肽链的增长和蛋白质的合成, 从而抑制细菌的生长, 高浓度时也有杀菌作用。

(共用备选答案题)

- A.医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系
- B.患者的经济状况
- C.患者亲友在纠纷处理过程中的态度
- D.无过错输血感染造成的不良后果
- E.医患双方协商解决

146.医疗事故赔偿确定具体赔偿数额, 应当考虑的因素是

答案:A

解析:医疗事故赔偿确定具体赔偿数额, 应当考虑的因素: 医疗事故等级; 医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度; 医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系, 不属于医疗事故的, 医疗机构不承担赔偿责任。

147.对发生医疗事故的赔偿等民事责任争议问题处理时, 可以考虑的方式是

答案:E

解析:《医疗事故处理条例》中第四十六条指出: 发生医疗事故的赔偿等民事责任争议, 医患双方可以协商解决; 不愿意协商或者协商不成的, 当事人可以向卫生行政部门提出调解申请, 也可以直接向人民法院提起民事诉讼。

(共用备选答案题)

- A.医学关系中的主体在道义上应享有的权利和利益
- B.医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命
- C.医学关系的主体对应尽义务的自我认识 and 自我评价的能力
- D.医学关系中的主体因履行道德职责受到褒奖而产生的自我赞赏
- E.医学关系中的主体在医疗活动中对自己和他人关系的内心体验和感受

148.作为医学伦理学基本范畴的良心是指

答案:C

解析:医学道德的基本范畴有权利与义务、情感与良心、审慎与保密、荣誉与幸福等。医学道德良心是指医务人员在履行对病人、集体和社会义务的过程中, 对自己行为应负道德责任的自觉认识 and 自我评价能力。

149.作为医学伦理学基本范畴的情感是指

答案:E

解析:医学道德情感是建立在医务人员对病人的生命价值、人格和权利尊重的基础上, 表现出对病人、对医学事业的真挚热爱, 是一种高尚的情感。

第二单元

A1 型题



- A.强迫端坐位
- B.出现严重呼气性呼吸困难
- C.呼吸动度增大，呈吸气位
- D.语音震颤减弱
- E.大汗淋漓伴发绀

答案:C

解析:支气管哮喘发作时患者可出现严重的呼气性呼吸困难，被迫采取坐位或端坐位，呼吸辅助肌参与呼吸，严重者大汗淋漓伴发绀呼吸动度变小，呈吸气位。由于多数并发肺气肿，所以语音震颤减弱。两肺可闻干啰音及哮鸣音。

2.治疗溃疡性结肠炎阴血亏虚证首选

- A.四神丸
- B.驻车丸
- C.痛泻要方
- D.白头翁汤
- E.膈下逐瘀汤

答案:B

解析:溃疡性结肠炎阴血亏虚证治法为滋阴养血，清热化湿，方药首选驻车丸。

3.外感温热证之白细胞减少症与粒细胞缺乏症的治疗方药是

- A.归脾汤加减
- B.黄芪建中汤合右归丸加减
- C.生脉散加减
- D.六味地黄丸加减
- E.犀角地黄汤合玉女煎加减

答案:E

解析:外感温热证之白细胞减少症与粒细胞缺乏症的治疗方法是清热解毒，滋阴凉血，方用犀角地黄汤合玉女煎加减。

4.系统性红斑狼疮热瘀积饮证的方药为

- A.清瘟败毒饮加减
- B.葶苈大枣泻肺汤合泻白散加减
- C.犀角地黄汤加减
- D.八珍汤加减
- E.茵陈蒿汤合柴胡疏肝散加减

答案:B

解析:系统性红斑狼疮热郁积饮证的治疗方法为清热蠲饮，方用：葶苈大枣泻肺汤合泻白散加减。

5.下列哪项不是急性中毒的临床表现有

- A.皮肤、黏膜症状
- B.眼症状
- C.神经系统症状
- D.泌尿系统症状
- E.内分泌系统症状

答案:E

解析:急性中毒的临床表现有：皮肤黏膜表现，眼部表现，神经系统表现，呼吸系统表现，循环系统表现，泌尿系统表现，血液系统表现。

6.休克的监测除呼吸、血氧饱和度、神志和尿量外，还包括

- A.食量
- B.体重



D.水、电解质

E.视力

答案:C

解析:休克需监测血压、心率、呼吸、血氧饱和度、神志和尿量等。

7.不寐的表现不包括

A.睡眠时间不足

B.睡眠深度不够

C.入睡困难

D.彻夜不寐

E.经常不能获得正常睡眠

答案:E

解析:E项为不寐的特征,其余选项均为不寐的表现。不寐是以经常不能获得正常睡眠为特征的一类病证,主要表现为睡眠时间、深度的不足,轻者入睡困难,或寐而不酣,时寐时醒,或醒后不能再寐,重则彻夜不寐,常影响人们的正常工作、生活、学习和健康。

8.阳水辨证属湿热壅盛者,其治疗最佳选方是

A.己椒苈黄丸

B.木防己汤

C.舟车丸

D.疏凿饮子

E.八正散

答案:D

解析:阳水湿热壅盛证。证候:遍体浮肿,皮肤绷急光亮,胸脘痞闷,烦热口渴,小便短赤,或大便干结,舌红,苔黄腻,脉沉数或濡数。治法:分利湿热。方药:疏凿饮子加减。

9.自汗、盗汗肺卫不固证选用的治法是

A.益气固表

B.养血补心

C.滋阴降火

D.益气养血

E.清肝泻火,化湿和营

答案:A

解析:肺卫不固证。证候:汗出恶风,稍劳汗出尤甚,或表现半身、某一局部出汗,易于感冒,体倦乏力,周身酸楚,面色白少华,苔薄白,脉细弱。治法:益气固表。方药:桂枝加黄芪汤或玉屏风散加减。

10.痿证肺热津伤,筋失濡润证代表方是

A.三仁汤

B.虎潜丸

C.清燥救肺汤

D.益胃汤

E.加味二妙散

答案:C

解析:肺热津伤,筋失濡润证。证候:病起发热,或热病后突然出现肢体软弱无力,皮肤枯燥,心烦口渴,咳呛少痰,咽干不利,小便黄少,大便干燥,舌质红,苔黄,脉细数。治法:清热润燥,养肺生津。方药:清燥救肺汤加减

11.肺炎球菌肺炎发病1~2天后,其痰液特征是

A.白色黏液痰

B.黏液泡沫痰

C.黏液脓性痰



E.大量脓痰

答案:D

解析:肺炎球菌肺炎由于渗出到肺泡内的红细胞破坏后释放出含铁血黄素,混在痰中,故出现铁锈色痰为痰液的特征。白色黏液痰、黏液泡沫痰不具特异诊断价值,黏液脓性痰、大量脓痰一般提示肺脓肿。

12.慢性肺心病,咳喘无力,气短难续,咳痰不爽,面色晦暗,心慌,唇甲发紫,神疲乏力,舌淡暗,脉沉细涩无力。治疗应首选

A.越婢加半夏汤

B.生脉散合血府逐瘀汤

C.真武汤

D.苏子降气汤

E.补肺汤

答案:B

解析:慢性肺心病,呼吸浅短,声低气怯,张口抬肩,倚息不能平卧,心慌,形寒,汗出,舌淡紫,脉沉细微无力,属于肺肾气虚,治疗首选补肺汤加减。咳喘无力,气短难续,咳痰不爽,面色晦暗,心慌,唇甲发紫,神疲乏力,舌淡暗,脉沉细涩无力,是气虚不能推动血行而导致的瘀血,治疗应选生脉散合血府逐瘀汤。

13.治疗上消化道出血脾不统血证,应首选

A.泻心汤合十灰散加减

B.龙胆泻肝汤加减

C.归脾汤加减

D.独参汤加减

E.四味回阳饮加减

答案:C

解析:治疗上消化道出血脾不统血证需益气健脾,养血止血,方选归脾汤加减。A用于胃中积热证,B用于肝火犯胃证,D、E合用于气随血脱证。故本题选C。

14.下列各项中,不符合缺铁性贫血诊断的是

A.男性血红蛋白 $<120\text{g/L}$,女性血红蛋白 $<100\text{g/L}$

B.血清铁浓度常 $<8.9\mu\text{mol/L}$,总铁结合力 $>65.1\mu\text{mol/L}$

C.血清铁蛋白 $<14\mu\text{g/L}$

D.红细胞内游离原卟啉 $>0.9\mu\text{mol/L}$

E.骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁增加

答案:E

解析:缺铁性贫血的诊断包括:①贫血为小细胞低色素性,男性Hb $<120\text{g/L}$,女性Hb $<100\text{g/L}$,孕妇Hb $<100\text{g/L}$ 。②血清铁浓度低于正常。③血清铁蛋白 $<12\mu\text{g/L}$ 。④骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞少于15%,转铁蛋白饱和度 $<15\%$ 。⑤存在铁缺乏的病因,铁剂治疗有效。

15.脾胃虚弱,痞满反复发作,治法宜首选

A.疏肝解郁,和胃消痞

B.清热化湿,和胃消痞

C.理气宽胸,补泻并用

D.补气健脾,升清降浊

E.和胃降气,消痞开结

答案:D

解析:腹痛脾胃虚弱证。证候:脘腹满闷,时轻时重,喜温喜按,纳呆便溏,神疲乏力,少气懒言,语声低微,舌质淡,苔薄白,脉细弱。治法:补气健脾,升清降浊。方药:补中益气汤加减。

16.疮疡中期,毒盛而正气不虚者,应选用的治法为

A.清热解毒

B.补托法



- D.活血化痰
- E.软坚散结

答案:C

解析:透托法用于毒气虽盛而正气未衰者。

17.关于煮沸灭菌法,下列哪项说法不当

- A.持续煮沸 15~20 分钟可杀灭一般细菌
- B.持续煮沸 1~2 小时以上,可杀灭带芽孢细菌
- C.适用于金属器械、玻璃、橡胶类等物品的消毒
- D.持续 30 分钟,即可杀死包括细菌芽孢在内的一切细菌
- E.铝锅洗净去脂污后,可作煮沸灭菌用

答案:D

解析:在正常压力下,在水中煮沸至 100°C,持续 15~20 分钟能杀灭一般细菌,持续煮沸 1~2 小时以上,可杀灭带芽孢细菌。

18.治疗低血容量性休克阴厥型的首选方药为

- A.清营汤加减
- B.四味回阳饮加减
- C.人参养营汤加减
- D.保元汤合固阳汤加减
- E.独参汤合四逆汤加减

答案:C

解析:低血容量性休克属阴厥者,症见烦躁不安,汗出,唇舌干燥,口渴欲饮,无力,舌红少津,脉细无力等,治宜益气固脱,养血育阴。方用人参养营汤加减。

19.治疗阴虚火盛之痢,当用

- A.仙方活命饮
- B.竹叶黄芪汤
- C.四君子汤
- D.金匱肾气丸
- E.十全大补汤

答案:B

解析:阴虚火盛之痢,治当滋阴生津,清热托毒,方用竹叶黄芪汤加减。

20.尿道骑跨伤多引起

- A.前尿道损伤
- B.后尿道损伤
- C.尿潴留
- D.尿道完全断裂
- E.尿道狭窄

答案:A

解析:尿道骑跨伤常发生会阴部、阴囊处淤斑、肿胀。前尿道损伤有会阴部疼痛,并可放射至尿道外口。所以说尿道骑跨伤多引起前尿道损伤。

21.关于局部冻伤临床分度的表述错误的是

- A.I° 冻伤,伤及表皮层
- B.II° 冻伤,损伤达皮肤全层
- C.III° 冻伤,损伤皮肤全层
- D.III° 冻伤,损伤深至皮下组织
- E.IV° 冻伤,损伤深达肌肉、骨骼等组织

答案:B



伤深达肌肉、骨骼等组织。

22.中医认为月经的产生是以下哪项协调作用于胞宫的结果

- A.肾气、天癸、冲任、气血
- B.冲、任、督、带诸脉
- C.心、肝、脾、肾诸脏
- D.营卫、气血、天癸
- E.天癸、胞宫、胞脉

答案:A

解析:月经是肾气、天癸、冲任、气血协调作用于胞宫,并在其他脏腑、经络的协同作用下,使胞宫定期藏泻而产生的生理现象。

23.下列不属于先兆流产症状的是

- A.阴道流血
- B.腹痛
- C.腰背痛
- D.小腹坠胀
- E.阴道胎块

答案:E

解析:先兆流产指妊娠 28 周前出现少量阴道流血,下腹痛或腰背痛。妇科检查:子宫颈口未开,胎膜未破,子宫大小与停经周数相符。经治疗及休息后症状消失,可继续妊娠。中医称“胎漏”、“胎动不安”。如果出现阴道胎块指胚胎组织或者羊膜囊,是难免流产的表现。

24.临产的主要标志是

- A.见红,规律宫缩,胎头下降
- B.规律宫缩,破膜,胎头下降
- C.见红,破膜,宫口扩张
- D.规律宫缩,胎头下降,宫口扩张
- E.见红,破膜,规律宫缩

答案:D

解析:临产开始的主要标志是有规律而逐渐增强的子宫收缩,持续 30 秒及以上,间歇 5~6 分钟,并伴有进行性宫颈管消失,宫口扩张和胎先露部下降。

25.正常枕先露分娩机制,下述哪项正确

- A.下降,衔接,内旋转,俯屈,仰伸复位,外旋转
- B.衔接,俯屈,内旋转,下降,仰伸复位,外旋转
- C.衔接,下降,俯屈,内旋转,仰伸复位,外旋转
- D.下降,俯屈,衔接,内旋转,仰伸复位,外旋转
- E.衔接,下降,内旋转,俯屈,仰伸复位,外旋转

答案:C

解析:正常分娩机制为:衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转。

26.妇科疾病的发生机理,可概括为

- A.脏腑功能失常,气血失调,冲任督带损伤以及胞宫、胞脉、胞络受损
- B.先天肾气不足,后天房劳多产损伤肾精,肾为冲任之本,肾虚,冲任不固
- C.情志内伤,肝气郁结,血为气滞,冲任失调
- D.忧思劳倦,饮食不节,损伤脾气,脾失统摄,气随血陷,冲任不固
- E.忧愁思虑,心阴暗耗,营血不足,冲任虚损

答案:A

解析:妇科疾病的发生机理是:脏腑功能失常、气血失调、冲任督带损伤以及胞宫、胞脉、胞络受损。

27.产后三审中以验津液之盛衰的是



- B.乳汁的多少
- C.饮食的多少
- D.大便的通与不通
- E.小便的利与不利

答案:D

解析:产后病的辨证应注重“产后三审”，即一审小腹痛与不痛，以辨恶露有无停滞；二审大便通与不通，以验津液之盛衰；三审乳汁与饮食多少，以察胃气的强弱。

28.急性上呼吸道感染风寒感冒证的治疗方剂为

- A.荆防败毒散加减
- B.银翘散加减
- C.新加香薷饮
- D.人参败毒散
- E.玉屏风散

答案:A

解析:急性上呼吸道感染风寒感冒证的治疗方法为辛温解表，方用荆防败毒散加减。

29.鹅口疮的主要临床特征是

- A.口腔内满布红色溃疡
- B.咽喉部白色假膜
- C.齿龈满布白色疱疹
- D.口腔周围满布白色小红点
- E.口腔舌面满布灰白色乳凝块样白膜

答案:E

解析:鹅口疮临床特征主要为口腔黏膜上出现白色或灰白色乳凝块样白膜。

30.治疗小儿伤食泻的首选方剂是

- A.保和丸
- B.健脾丸
- C.消乳丸
- D.资生健脾丸
- E.参苓白术散

答案:A

解析:伤食泻证候:大便稀溏，夹有乳凝块或食物残渣，气味酸臭，或如败卵，脘腹胀满，便前腹痛，泻后痛减，腹痛拒按，嗳气酸馊，或有呕吐，不思乳食，夜卧不安，舌苔厚腻，或微黄，脉滑实，指纹滞。治法:运脾和胃，消食化滞。方药:保和丸加减。

31.小儿癫痫与晕厥共有的表现是

- A.体位性低血压
- B.惊惕不安
- C.呼吸暂停
- D.意识障碍
- E.二便失禁

答案:D

解析:癫痫临床表现为意识、运动、感觉、精神或自主神经功能障碍。晕厥是各种原因引起的一过性脑供血不足导致突然发生的意识丧失状态，发作时先有出汗，面色苍白，视物模糊，继之意识障碍，全身肌张力丧失，严重者可见惊厥发作，一般无二便失禁。

32.注意力缺陷多动障碍的主要发病机制是

- A.心常有余
- B.肝常有余



D.肾常虚

E.阳动有余，阴静不足

答案:E

解析:注意力缺陷多动障碍的主要发病机制是阴阳平衡失调，即阳动有余，阴静不足。

33.口服铁剂治疗小儿缺铁性贫血，为促进铁的吸收，应同时服用的药物是

A.维生素 E

B.维生素 B₁

C.维生素 C

D.维生素 B₆

E.维生素 A

答案:C

解析:口服铁剂最好于两餐之间服药，既减少对胃黏膜的刺激，又利于吸收。同时口服维生素 C 促进铁的吸收。牛奶、茶、咖啡及抗酸药等与铁同服均可影响铁的吸收。

A2 型题

34.女，36 岁，患风心病 10 年，近来心悸、胸闷痛、气短、下肢浮肿、尿少。数分钟前突然晕倒，意识丧失，皮肤苍白，唇绀，大动脉搏动扪不到，呼吸停止，其原因是

A.脑栓塞

B.急性左心衰竭

C.癫痫大发作

D.心脏性猝死

E.急性右心衰竭

答案:D

解析:风湿性心脏病患者，突然意识丧失，大动脉搏动扪不到，呼吸停止，其表现符合心脏性猝死的诊断标准。根据病史介绍，病人确有全心衰竭，但心脏呼吸突然停止并非急性左心衰竭或右心衰竭引起，心功能不全导致死亡表现为循环衰竭，不包括心跳、呼吸突然停止。大的肺动脉栓塞可致死，但病历未提肺栓塞证据。

35.患者，男，50 岁。反复浮肿，尿血 3 年。症见：面色无华，少气乏力，易感冒，午后低热，口干咽燥，舌偏红少苔，脉细。检查：血压 140/95mmHg (18.6/12.6kPa)，尿蛋白 (++)，定量 3g/d，尿红细胞 20 个/高倍视野，内生肌酐清除率 48%。其诊断是

A.慢性肾炎普通型气阴两虚证

B.慢性肾炎高血压型气阴两虚证

C.慢性肾炎肾病型肝肾阴虚证

D.慢性肾炎普通型肝肾阴虚证

E.慢性肾盂肾炎肾阴亏虚证

答案:A

解析:慢性肾炎一般分普通型和肾病型。从面色无华，少气乏力，易感冒可判断气虚；从午后低热，口干咽燥，舌偏红少苔，脉细可判断阴虚。综合分析为慢性肾炎普通型气阴两虚证。

36.患者，男性，12 岁，患缺铁性贫血。症见面色萎黄少华，腹胀，善食易饥，恶心呕吐，便溏，嗜食生米、泥土、茶叶等，神疲肢软，气短头晕，舌质淡，脉象虚弱。治宜选用

A.归脾汤加减

B.香砂六君子汤合当归补血汤加减

C.八珍汤合无比山药丸加减

D.化虫丸合八珍汤加减

E.当归芍药散加减

答案:D

解析:综观脉证，患者为缺铁性贫血的虫积证，治当杀虫消积，补益气血，应选用的方剂是化虫丸合八珍汤加减。

其治法是

- A.健脾养心，益气安神
- B.健脾养心，益气活血
- C.健脾养心，化痰解郁
- D.益气养血，化痰祛瘀
- E.益气和胃，养心安神

答案:A

解析:梦魂颠倒，心悸易惊，是心气虚弱而致的心神不安的表现；肢体困乏，饮食减少是脾气不足，运化无权的表现，因此治疗上应当心脾双补兼以安神。故本题选 A。

38.患者，女，28岁。跳舞时突感剧烈头痛，呕吐。查体：脑膜刺激征(+)，无肢瘫。临床诊断蛛网膜下腔出血。为确诊，应首选的辅助检查是

- A.脑电图
- B.脑超声血流
- C.脑动脉造影
- D.头颅 CT
- E.腰穿

答案:E

解析:临床疑诊蛛网膜下腔出血首选头颅 CT 检查，安全、敏感，并可早期诊断。若头颅 CT 不能确定应行腰穿取脑脊液，脑脊液呈均匀一致血性、压力增高，可确诊。需注意的是：本题考查内容为确诊，只有脑脊液呈均匀血性、压力增高可确诊，故选腰穿。

39.患者，女，24岁。进餐时突然倒地，意识丧失，四肢抽搐，双目上翻，牙关紧闭，口吐白沫，小便失禁。约20分钟后抽搐停止，神识清醒，自觉肢体酸痛。头颅 CT、血液生化检查均正常。自幼有类似发病，其诊断是

- A.癔症性抽搐
- B.低血钙性抽搐
- C.脑寄生虫病
- D.癫痫大发作
- E.昏厥性抽搐

答案:D

解析:临床上癫痫大发作的突出症状有突然倒地，意识丧失，四肢抽搐，双目上翻，牙关紧闭，口吐白沫，小便失禁等，癫痫过后，自觉肢体酸痛。有时头颅 CT、血液生化检查均正常。故本题选 D。

40.患者，男，60岁。黎明之前泄泻，腹痛肠鸣即泻，泻后则安，形寒怕冷，舌淡苔白，脉沉。其病机是

- A.食滞肠胃
- B.肾阳虚衰
- C.寒湿困脾
- D.湿热伤脾
- E.肝气乘脾

答案:B

解析:泄泻日久，肾阳虚衰，不能温养脾胃，运化失常，黎明之前阳气未振，阴寒较盛，故腹部作痛，肠鸣即泄。泄后则腑气通利，故泄后则安。形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细，为脾肾阳气不足之证。

41.夏某，男，38岁。症见腹中积块，胀满疼痛，按之软而不坚，固定不移，舌苔薄白，脉弦。治宜选用

- A.六磨汤
- B.逍遥散
- C.膈下逐瘀汤
- D.少腹逐瘀汤
- E.大七气汤加减

答案:E



血散瘀。方药：大七气汤加减。

42.患者吐血色红或紫暗，脘腹胀闷，嘈杂不适，口臭，便秘，舌质红，苔黄腻，脉滑数，治疗应首选

- A.白虎汤合四生丸
- B.失笑散合四生丸
- C.泻心汤合十灰散
- D.玉女煎合十灰散
- E.丹参饮合十灰散

答案:C

解析:胃热壅盛证。证候:脘腹胀闷,嘈杂不适,甚则作痛,吐血色红或紫暗,常夹有食物残渣,口臭,便秘,大便色黑,舌质红,苔黄腻,脉滑数。治法:清胃泻火,化瘀止血。方药:泻心汤合十灰散加减。

43.患者,男,38岁。腰酸,遗精,两足软弱,眩晕,耳鸣,口干,咽痛,颧红,舌红少津,脉沉细。其中医证型是

- A.肝阴虚证
- B.肾阳虚证
- C.心阴虚证
- D.心脾两虚证
- E.肾阴虚证

答案:E

解析:肾阴虚证。证候:腰酸,遗精,两足软弱,眩晕,耳鸣,甚则耳聋,口干,咽痛,颧红,舌红少津,脉沉细。治法:滋补肾阴。方药:左归丸加减。

44.患者汗出恶风,遇劳则发,易于感冒,体倦乏力,面色少华,舌苔薄白,脉细弱。治疗应首选

- A.桂枝汤
- B.四妙丸
- C.玉屏风散
- D.当归六黄汤
- E.龙胆泻肝汤

答案:C

解析:汗出恶风,易于感冒-表虚失固,体倦乏力,面色少华,舌苔薄白,脉弱-气虚,治以益气固表为法,方用玉屏风散。

45.张某,男,59岁,下肢痿软无力一年余,加重两个月。现发热,胸痞脘闷,小便短赤涩痛,苔黄腻,脉细数。选用方药是

- A.清瘟败毒饮
- B.清燥救肺汤
- C.加味二妙散
- D.参苓白术散
- E.大补阴煎

答案:C

解析:患者为痿证之湿热浸淫,气血不运证,治宜清热利湿,通利筋脉,选用加味二妙散加减。

46.患者,女,62岁。既往有糖尿病和冠心病。平时劳累后有胸痛发作,近日安静时亦有胸痛发作,胸痛较剧,痛有定处,入夜加重,舌质紫暗,有瘀斑,脉涩。心电图II、III、aVF导联T波倒置,心肌酶谱正常。应首先考虑的方剂是

- A.补阳还五汤
- B.瓜蒌薤白桂枝汤合涤痰汤
- C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D.血府逐瘀汤
- E.参附汤合右归丸

解析:患者胸痛较剧,痛有定处,入夜加重,舌质紫暗,有瘀斑,脉涩,属于胸阳痹阻血行瘀滞,应首先考虑用血府逐瘀汤进行治疗。A 主治中风之气虚血虚证; B 可涤痰开窍,温阳通脉; C 主治胸阳不振痰气互结之胸痹; E 主治阳气暴脱,脉微欲绝证。故本题选 D。

47.患者,男,35岁。昨晚因暴食而胁腹剧痛,胸胁胀满,矢气后可缓,舌苔薄黄,脉弦小数。实验室检查:血清淀粉酶 600 索氏单位。应首先考虑的是

- A.胃穿孔
- B.胆石症
- C.急性胰腺炎
- D.肠梗阻
- E.急性胆囊炎

答案:C

解析:血清淀粉酶超过正常值 5 倍即可确诊为急性胰腺炎,故本题选 C。

48.患者,女,50岁。胃脘胀痛,痛窜两胁,每因情志不舒而加重,暖气嘈杂,舌淡,脉弦缓。经胃镜检查诊断慢性浅表性胃炎。治疗应首先考虑的方剂是

- A.四君子汤加减
- B.益胃汤加减
- C.失笑散合丹参饮加减
- D.柴胡舒肝散加减
- E.三仁汤加减

答案:D

解析:患者胃脘胀痛,痛窜两胁,因情志不舒而加重,暖气嘈杂,舌淡,脉弦缓,属于肝气郁滞证。治疗应疏肝行气,活血止痛,首先考虑的方剂是柴胡舒肝散加减。四君子汤主治脾胃气虚;益胃汤主治胃阴损伤;失笑散合丹参饮主治气血瘀滞之心胃诸痛;三仁汤主治湿温初起,湿重于热者。故本题选 D。

49.患者男性,28岁。经常出现规律性上腹痛3年,空腹发作,夜间更重,进食可缓解,服抗酸药可止痛。最可能的诊断为

- A.胃溃疡
- B.十二指肠球部溃疡
- C.复合性溃疡
- D.十二指肠壅积症
- E.胃黏膜脱垂症

答案:B

解析:DU 空腹痛和(或)午夜痛,腹痛多于进食或服用抗酸药后缓解,DU 多发生于十二指肠球部。

50.患者,男,50岁。反复浮肿,尿血3年,经常感冒。症见面色无华,少气乏力,午后低热,口干咽燥,舌红少苔,脉细。检查:血压 140/95mmHg,尿蛋白(++),24 小时尿蛋白定量 3g,内生肌酐清除率 48%,血尿素氮 10mmol/L。除对症治疗外,还应加用

- A.参芪地黄汤
- B.六味地黄汤
- C.右归丸
- D.左归饮
- E.大补元煎

答案:A

解析:蛋白尿、血尿、高血压、水肿为慢性肾小球肾炎的基本临床表现。早期患者可有乏力、疲倦;水肿可有可无;实验室检查见尿蛋白 1~3g/d;血压可正常或轻度升高;内生肌酐清除率下降或轻度氮质血症。由症状可见属于气阴亏虚,故用参芪地黄汤益气养阴。B 补阴, C 补肾阳, D 滋阴补肾, E 益气补血,滋补肝肾,均不符合证治。故本题选 A。

51.患者,男,40岁。患再生障碍性贫血,面色苍白,唇甲色淡,头晕,心悸,乏力,动则加剧,舌淡,脉细弱。

- A.右归丸合当归补血汤
- B.左归丸、右归丸合当归补血汤
- C.八珍汤
- D.六味地黄丸合桃红四物汤
- E.左归丸合当归补血汤

答案:C

解析:根据症状辨为气血亏虚证,治法为大补气血,应首先考虑的方剂是具有气血双补作用的八珍汤。A用于肾阴虚证;B用于肾阴阳两虚证;D用于肾虚血瘀证;E用于肾阳亏虚证。故本题选C。

52.某患者,48岁,女性,患白细胞减少症,临床表现为腰膝酸软,头晕耳鸣,五心烦热,失眠多梦,低热,口干咽燥,舌红少苔,脉细数。治疗宜用

- A.归脾汤加减
- B.黄芪建中汤合右归丸加减
- C.生脉散加减
- D.六味地黄丸加减
- E.犀角地黄汤合玉女煎加减

答案:D

解析:综观脉证,患者为白细胞减少症之肝肾阴虚证,治疗方法为滋补肝肾,方用六味地黄丸加减。

53.患者输血5分钟后即出现寒战,高热,头痛,腰背部剧痛,心前区压迫感。检查:血压78/60mmHg(10.4/8KPa),血浆呈粉红色。应首先考虑的是

- A.发热反应
- B.过敏反应
- C.溶血反应
- D.细菌污染反应
- E.循环超负荷

答案:C

解析:溶血反应的一般表现为头痛,胸痛,心前区压迫感,全身不适,腰背酸痛,寒战,高热,恶心,呕吐,面色苍白,烦躁不安,呼吸急迫,脉搏细速,甚至休克。患者输血5分钟后即出现寒战,高热,头痛,腰背部剧痛,心前区压迫感,血压78/60mmHg(10.4/8KPa),血浆呈粉红色。所以,应首先考虑的是溶血反应。故本题选C。

54.女性,62岁,诊断胃癌,血压150/95mmHg,中度贫血,消瘦,术前准备不是必要的项目是

- A.纠正贫血
- B.改善营养状态
- C.检测肝功能
- D.血压降至正常
- E.血生化检查

答案:D

解析:病人血压160/100mmHg以下可不作特殊准备。血压过高者,术前应用合适的降压药物,使血压稳定在一定水平,但不要求降至正常水平。余选项均为术前必要的准备项目。

55.患者,女,38岁。甲状腺肿块坚硬如石,推之不移,局部僵硬,形体消瘦,皮肤枯槁,声音嘶哑,腰酸无力,舌质红,少苔,脉沉细数,诊断为甲状腺肿瘤,治疗首选方剂是

- A.海藻玉壶汤合逍遥散
- B.桃红四物汤合海藻玉壶汤
- C.通窍活血汤合养阴清肺汤
- D.海藻玉壶汤合神效瓜蒌散
- E.知柏地黄丸合海藻玉壶汤

答案:C

解析:瘀热伤阴证的证候:肿块坚硬如石,推之不移,局部僵硬;形体消瘦,皮肤枯槁,声音嘶哑,腰酸无力;舌

56.患者，男，32岁。左下肢丹毒，皮肤红肿，痛如火燎，口渴少饮，尿黄，舌红苔黄腻，脉滑数。其证型是

A.热毒蕴结
B.热毒入营
C.湿热毒蕴
D.风热毒蕴
E.脾虚湿困

答案:C

解析:丹毒好发部位为下肢和头面部，常见的中医证型有：①风热毒蕴证，先发于鼻额部。②肝脾湿火证，发于腰胯肋下，大片鲜红，红肿蔓延，摸之灼手，肿胀触痛；舌红，苔黄腻，脉弦滑数。③湿热毒蕴，下肢小腿处肿胀，痛如火燎，口渴少饮，尿黄，舌红苔黄腻，脉滑数。④胎火蕴毒证，多发生于初生儿。根据患者皮肤红肿，舌红苔黄腻，脉滑数可诊断为湿热毒蕴。故应选C。

57.患者，女，35岁，乳房胀痛半年，经前加重，经后痛减；伴情绪抑郁，心烦易怒，失眠多梦，胸胁胀满；舌质淡红，苔薄白，脉细涩。其证型是

A.痰瘀凝结证
B.肝郁气滞证
C.气滞血瘀证
D.冲任失调证
E.毒热蕴结证

答案:B

解析:乳腺增生病之肝郁气滞证的证候：乳房胀痛或有肿块，一般月经来潮前乳痛加重和肿块稍肿大，行经后好转；常伴有情绪抑郁，心烦易怒，失眠多梦，胸胁胀满等；舌质淡红，苔薄白，脉细涩。治法：疏肝理气，散结止痛。方药：逍遥散加减。

58.男性，40岁，腹痛、发热48小时，血压80/60mmHg，神志清楚，面色苍白，四肢湿冷，全腹肌紧张，肠鸣音消失，诊断为

A.低血容量性休克
B.感染性休克
C.神经源性休克
D.心源性休克
E.过敏性休克

答案:B

解析:患者血压低，面色苍白，四肢湿冷，考虑为休克，另根据全腹肌紧张为腹膜炎的体征，考虑为感染性休克。

59.25岁妇女，月经规则6/35天一次，末次月经8月20日，推算其排卵期应在

A.9月11日左右
B.9月4日左右
C.9月7日左右
D.9月5日左右
E.8月30日左右

答案:A

解析:排卵多发生在下次月经来潮前14日左右。若未怀孕，下次月经正常时间为： $(20+35=55, 55-31=24)$

(注：8月为大月，故为31天)9月24日，故选项A为最佳答案。

60.患者，女，27岁，产后2小时内出现子宫收缩乏力，应首先采取的措施是

A.让产妇进食清淡半流食
B.让产妇排尿与排便
C.应给予抗生素
D.按摩子宫并肌注子宫收缩剂
E.适当补充维生素和铁剂

解析:产后2小时内极易发生产后出血、子痫、产后心力衰竭等严重并发症,若发现子宫收缩乏力,应按摩子宫并肌注子宫收缩剂。

61.患者,女,31岁,妊娠中晚期出现肢体面目肿胀,考虑诊断为

- A.子肿
- B.子晕
- C.子痫
- D.子冒
- E.晕厥

答案:A

解析:子肿:妊娠中晚期,孕妇出现肢体面目肿胀。

62.患者,女,36岁,带下量增多一个月,色黄,呈脓样,阴痒,口干口苦,小便黄赤,大便干结,舌苔薄黄腻,脉弦数。西医诊断为阴道炎,治疗应首选的方剂是

- A.内补丸
- B.完带汤
- C.龙胆泻肝汤
- D.萆薢渗湿汤
- E.仙方活命饮

答案:C

解析:此患者表现为阴道炎之肝经湿热证。证候:带下多,色白或黄,呈泡沫状或黄绿如脓,甚或杂有赤带,有臭味,外阴瘙痒,头晕目胀,心烦口苦,胸胁、少腹胀痛,尿黄便结;舌质红,苔黄,脉弦涩。治则:清热利湿,杀虫止痒。方药:龙胆泻肝汤加苦参、百部、蛇床子。故此题的最佳选项是C。

63.患者,女,24岁,孕后阴道下血,色暗红,腰酸腹痛下坠;舌边有瘀点,脉弦滑。选用的治法是

- A.补肾益气,固冲安胎
- B.补气养血,固肾安胎
- C.清热凉血,固冲安胎
- D.活血消癥,补肾安胎
- E.补肾益气,调固冲任

答案:D

解析:该患者为胎动不安之血瘀证。证候:宿有癥疾,或孕后阴道下血,色暗红或红,甚则腰酸腹痛下坠;舌暗或边有瘀点,脉弦滑或沉弦。治法:活血消癥,补肾安胎。方药:桂枝茯苓丸加菟丝子、桑寄生、续断。

64.患者,女,孕29周,心悸怔忡,气短胸闷,胸胁作痛,口唇发绀,舌紫暗,脉弦涩,治疗应首选的方剂是


- A.真武汤
- B.补阳还五汤
- C.血府逐瘀汤
- D.阳和汤
- E.养心汤

答案:B

解析:此患者为妊娠合并心脏病的患者,根据所给出的信息,为气虚血瘀证。证候:妊娠期间,心悸怔忡,气短胸闷,胸胁作痛,咳嗽气喘,口唇发绀;舌质紫暗,脉弦涩或结代。治法:益气化瘀,通阳安胎。方药:补阳还五汤合瓜蒌薤白半夏汤去红花、桃仁、半夏、地龙,加桑寄生、杜仲。此题的正确答案是B。

65.患儿,6岁。下肢伸侧及臀部皮疹3天,皮疹表现为瘀点、瘀斑高出皮肤,色泽鲜红,大小不一,压之不褪色,呈对称性,伴有阵发性腹痛。实验室检查:血小板,出血、凝血时间,均正常。便常规、尿常规无异常。应首先考虑的诊断是

- A.猩红热
- B.手足口病
- C.过敏性紫癜



E.皮肤黏膜淋巴结综合征

答案:C

解析:过敏性紫癜临床表现为皮肤紫癜,多见于四肢及臀部,部分累及上肢及躯干,典型皮疹初为小型荨麻疹或紫红色斑丘疹,高出皮肤,压之不退色,皮疹无压痛,分批出现,新旧并存,呈对称性分布。消化道症状以脐周或下腹部绞痛伴呕吐为主。

66.患儿,男,3岁6个月。麻疹已6日,现高热不退,咳嗽气急,鼻翼扇动,口渴烦躁,疹点密集色暗,舌红苔黄,脉数。其证型是

- A.麻疹顺证,初热期
- B.麻疹顺证,见形期
- C.麻疹逆证,邪毒闭肺证
- D.麻疹逆证,热毒攻喉证
- E.麻疹逆证,邪陷心肝证

答案:C

解析:麻疹邪毒闭肺证。证候:高热不退,疹点不多,或疹点早回,或疹点密集,疹色紫暗,咳嗽气促,鼻翼煽动,唇周发绀,喉间痰鸣,烦躁不宁,舌红,苔黄,脉数。

67.患儿,男,6岁。症见:脐周腹痛,时作时止,饮食不振,面色萎黄,睡眠不安,寐中磨牙,粪便镜检有蛔虫卵。中医治疗首选方剂是

- A.保和丸
- B.消乳丸
- C.乌梅丸
- D.使君子散
- E.人参乌梅汤

答案:D

解析:此患儿的表现有蛔虫病之蛔虫证。蛔虫证证候:脐周腹痛,时作时止,饮食不振,日渐消瘦,大便不调,面色萎黄,或恶心、呕吐,或吐蛔虫,或大便下虫。睡眠不安,寐中磨牙,甚则爱挖鼻孔,咬衣角,嗜食泥土等;有的患儿面部出现淡色白斑,巩膜出现蓝色斑点,或下唇出现颗粒样大小白点。粪便镜检有蛔虫卵。治法:驱蛔杀虫,调理脾胃。方药:使君子散加减。

68.患儿,3岁,体重13kg,近1个月来食欲不振,面色少华,倦怠乏力,大便偏稀,夹有不消化食物,舌质淡,苔薄白。应首先考虑的诊断是

- A.厌食,脾胃气虚证
- B.积滞,脾虚夹积证
- C.蛋白质-能量营养不良,疳气证
- D.营养性缺铁性贫血,脾胃虚弱证
- E.小儿腹泻,伤食泻


答案:A

解析:患儿食欲不振1个月,诊断为厌食。食欲不振为脾虚运化乏力,胃纳不开所致。面色少华,倦怠乏力为精微转输不足,气虚失养所致。大便偏稀,夹有不消化食物为脾弱清气不升,清浊相混所致。舌质淡,苔薄白为气虚之象。辨证为脾胃气虚证。

69.患儿,男,7岁。4周前曾发热、咽痛,诊断为急性化脓性扁桃体炎。1天前双眼睑水肿,继而下肢水肿,按之凹陷即起,尿少色赤,恶风,咳嗽,舌质淡,苔薄黄,脉浮。治疗应首选的方剂是

- A.五味消毒饮合小蓟饮子
- B.麻黄连翘赤小豆汤合五苓散
- C.实脾饮合五味消毒饮
- D.越婢加术汤合桑白皮汤
- E.麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮

答案:B



恶风舌质淡，苔薄黄，脉浮，诊断为急性肾小球肾炎风水相搏证。的治法为疏风宣肺，利水消肿，代表方为麻黄连翘赤小豆汤合五苓散加减。

70.患儿，男，11岁。西医确诊为急性肾小球肾炎，中医辨证为湿热内侵证。中医治疗宜选方剂是

- A.真武汤
- B.五味消毒饮合小蓟饮子
- C.温胆汤合附子泻心汤
- D.麻黄连翘赤小豆汤
- E.银翘散合苓桂术甘汤

答案:B

解析:急性肾小球肾炎湿热内侵证。证候:浮肿或轻或重，小便黄赤而少，甚者尿血，烦热口渴头身困重，常有近期疮毒史，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治法:清热利湿，凉血止血。方药:五味消毒饮合小蓟饮子加减。故正确的选项是 B。

A3/A4 型题

共用题干:患者，男，21岁，胸闷、咳嗽，咳痰，伴腹胀，食少纳呆，少气懒言，面色萎黄，舌淡苔白，脉缓弱。检查:支气管舒张试验阳性，FEV₁增加≥12%，且 FEV₁增加绝对值≥200mL。

71.考虑该患者为

- A.慢性支气管炎
- B.呼吸衰竭
- C.支气管哮喘
- D.慢性阻塞性肺疾病
- E.原发性支气管肺癌

答案:C

解析:该患者的支气管哮喘的症状不明显，但是可以根据支气管舒张试验阳性，FEV₁增加≥12%，且 FEV₁增加绝对值≥200mL 诊断该患者为支气管哮喘。

72.发病的夙根是

- A.宿痰伏肺
- B.先天不足
- C.饮食不当
- D.气候变化
- E.外邪侵袭

答案:A

解析:病理因素以痰为主。痰主要由于肺不布津，脾失转输，肝不散精，肾失蒸腾气化，以致津液凝聚成痰，伏藏于肺，成为发病的“夙根”，遇各种诱因而引发。

73.治疗宜首选

- A.射干麻黄汤
- B.定喘汤
- C.六君子汤
- D.玉屏风散
- E.金匱肾气丸

答案:C

解析:结合患者的症状可辨证为脾虚证。证候:腹胀，食少纳呆，便溏，少气懒言，面色萎黄，舌淡苔白，脉缓弱。治法:健脾化痰。方药:六君子汤加减。

共用题干:某女，35岁，两手指间和掌指关节强直不舒2年，近2周病情加重，关节疼痛，肿大变形，活动受限，伴发热，口苦，饮食无味，纳呆，全身困乏无力，舌苔黄腻，脉滑数。查血沉45mm/h，类风湿因子(++)。

74.诊断为

- B.风湿性关节炎
- C.类风湿关节炎
- D.系统性红斑狼疮
- E.骨性关节炎

答案:C

解析:结合患者的关节症状以及实验室检查血沉升高, 类风湿因子阳性, 考虑该患者为类风湿关节炎。

75.治法是

- A.清热利湿, 祛风通络
- B.养阴清热, 祛风通络
- C.祛风散寒, 清热化湿
- D.益肝肾, 补气血, 祛风湿, 通经络
- E.活血化瘀, 祛痰通络

答案:A

解析:结合患者的症状辨证为类风湿关节炎活动期之湿热痹阻证。证候: 发热, 口苦, 饮食无味, 纳呆或有恶心, 泛泛欲吐, 关节肿痛以下肢为重, 全身困乏无力, 下肢沉重酸胀, 浮肿或有关节积液, 舌苔黄腻, 脉滑数。治法: 清热利湿, 祛风通络。方药: 四妙丸加减。

76.该病的基本病理改变是

- A.皮肤炎
- B.滑膜炎
- C.心包炎
- D.血管炎
- E.心脏炎

答案:B

解析:类风湿关节炎的基本病理改变为滑膜炎。

共用题干:患者男性, 56岁。胃溃疡病10年。现胃痛隐隐, 喜温喜按, 畏寒肢冷, 泛吐清水, 腹胀便溏, 舌淡胖, 边有齿痕, 苔白, 脉迟缓。

77.治疗方剂是

- A.黄芪建中汤
- B.活络效灵丹合丹参饮
- C.化肝煎合左金丸
- D.一贯煎合芍药甘草汤
- E.柴胡疏肝散合五磨饮子

答案:A

解析:结合患者的症状可辨证为消化性溃疡之脾胃虚寒证。证候: 胃痛隐隐, 喜温喜按; 畏寒肢冷, 泛吐清水, 腹胀便溏, 舌淡胖边有齿痕, 苔白, 脉迟缓。治法: 温中散寒, 健脾和胃。方药: 黄芪建中汤加减。

78.X线钡餐检查中直接征象是

- A.龛影
- B.胃黏膜僵直
- C.钡剂潴留
- D.痉挛性切迹
- E.上腹疼痛

答案:A

解析:X线发现龛影是消化性溃疡的直接征象, 有确诊价值。

79.西医治疗的三联疗法是

- A.质子泵抑制剂+羟氨苄青霉素+铋剂
- B.铋剂+克拉霉素+甲硝唑



D.质子泵抑制剂+铋剂+克拉霉素

E.铋剂+克拉霉素+甲硝唑+羟氨苄青霉素

答案:B

解析:根除幽门螺杆菌的常用三联疗法,三联疗法为PPI(奥美拉唑、兰索拉唑)或胶体铋剂(枸橼酸铋钾),再加上任两种抗生素(克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑)。

共用题干:患者,男,40岁,诊断为肝硬化。症见:腹大胀满,按之如囊裹水,颜面微浮,下肢浮肿,怯寒懒动,精神困倦,脘腹痞胀,得热则舒,食少便溏,小便短少,舌苔白滑,脉缓。

80.治疗应选

A.柴胡疏肝散合胃苓汤加减

B.实脾饮加减

C.中满分消丸合茵陈蒿汤加减

D.调营饮加减

E.附子理中汤合五苓散加减

答案:B

解析:寒湿困脾证证候:腹大胀满,按之如囊裹水,甚则颜面微浮,下肢浮肿,怯寒懒动,精神困倦,脘腹痞胀,得热则舒,食少便溏,小便短少,舌苔白滑或白腻,脉缓或沉迟。治法:温中散寒,行气利水。方药:实脾饮加减。

81.中医病因不包括

A.酒食不节

B.情志失调

C.感染血吸虫

D.黄疸、积聚日久

E.感受外邪

答案:E

解析:中医学认为,本病的形成多由酒食不节、情志失调、感染血吸虫、黄疸积聚等病迁延日久,引起肝、脾、肾亏损,气滞、血瘀、湿阻腹中所致。

82.最严重的并发症是

A.上消化道出血

B.原发性肝癌

C.感染

D.肝肾综合征

E.肝性脑病

答案:E

解析:肝性脑病是肝硬化最严重的并发症,亦是最常见的死亡原因。主要临床表现为性格行为失常、意识障碍、昏迷。

共用题干:患者,男,26岁,4小时前吐血,血色鲜红,混有食物残渣,大便黑如漆,口干喜冷饮,胃脘胀闷灼痛,舌红苔黄,脉滑数。

83.中医辨证为

A.湿热内蕴证

B.胃中积热证

C.肝火犯胃证

D.脾不统血证

E.气随血脱证

答案:B

解析:结合患者的症状可辨证为上消化道出血之胃中积热证。证候:吐血紫暗或咖啡色,甚则鲜红,常混有食物残渣,大便黑如漆,口干喜冷饮,胃脘胀闷灼痛,舌红苔黄,脉滑数。

- A.独参汤
- B.归脾汤
- C.龙胆泻肝汤
- D.泻心汤合十灰散
- E.四味回阳饮

答案:D

解析:上消化道出血之胃中积热证的治法为清胃泻火,化瘀止血。方药:泻心汤合十灰散。

85.若患者出现乏力、心慌,出血量为

- A.>5mL
- B.50~100mL
- C.250~300mL
- D.>400~500mL
- E.>1000mL

答案:D

解析:成人每日消化道出血>5mL即可出现粪便隐血试验阳性,每日出血量50~100mL可出现黑便,胃内蓄积血量在250~300mL可引起呕血。一次出血量<400mL时,一般不出现全身症状;出血量超过400~500mL,可出现乏力、心慌等全身症状;短时间内出血量超过1000mL,可出现周围循环衰竭表现。

共用题干:患者,男性,34岁。因身体不适就诊,全身浮肿,面色苍白,畏寒肢冷,腰脊冷痛,神疲,纳少,便溏,舌嫩淡胖,有齿痕,脉沉。尿常规检查见蛋白尿,血压160/90mmHg。

86.中医辨证为

- A.肺肾气虚证
- B.脾肾阳虚证
- C.脾肾气虚证
- D.肝肾阴虚证
- E.气阴两虚证

答案:B

解析:结合患者的症状可诊断为慢性肾小球肾炎之脾肾阳虚证。证候:全身浮肿,面色苍白,畏寒肢冷,腰脊冷痛,神疲,纳少,便溏,遗精,阳痿,早泄,或月经失调,舌质嫩淡胖,边有齿痕,脉沉细或沉迟无力。

87.治疗首选方剂是

- A.异功散加味
- B.玉屏风散合金匱肾气丸
- C.附子理中丸或济生肾气丸加减
- D.杞菊地黄丸加减
- E.五苓散合五皮饮加减

答案:C

解析:慢性肾小球肾炎之脾肾阳虚证治法:温补脾肾。方药:附子理中丸或济生肾气丸加减。

88.若患者蛋白尿>1g/d,血压应控制在

- A.115mmHg以下
- B.120mmHg以下
- C.125mmHg以下
- D.130mmHg以下
- E.130/80mmHg以下

答案:C

解析:积极控制高血压和减少尿蛋白:力争把血压控制在理想水平,即蛋白尿 \geq 1g/d,血压应控制在125mmHg以下;蛋白质<1g/d,血压控制可放宽到130/80mmHg以下。

共用题干:6岁女童,喜食泥块,面色萎黄,神疲乏力,口唇色淡,食少便溏,舌淡,苔薄腻,脉细弱。血红蛋白

89.初步诊断为

- A.巨幼红细胞性贫血
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.肾性贫血

答案:C

解析:结合患者异食癖,面色萎黄、乏力及实验室检查可以考虑患者为缺铁性贫血。

90.治宜选用

- A.香砂六君子汤合当归补血汤
- B.归脾汤
- C.八珍汤合无比山药丸
- D.化虫丸合八珍汤
- E.桃红四物汤

答案:A

解析:结合患儿的症状可辨证为脾胃虚弱证。证候:面色萎黄,食欲不振,恶心呕吐,胃脘部不适,脘腹胀满,食后腹胀,大便稀溏。舌质淡,舌苔薄腻,脉象细弱。治法:健脾和胃,益气养血。方药:香砂六君子汤合当归补血汤加减。

91.若 Hb 降至 60g/L 以下,宜选用

- A.注射铁剂
- B.输血或输入红细胞
- C.口服铁剂
- D.驱虫剂
- E.氨基酸

答案:B

解析:输血或输入红细胞:仅适用于严重病例,血红蛋白在 60g/L 以下,症状明显者。

共用题干:患者,男,32岁,因腹胀就诊,症见:面色萎黄,头晕眼花,心悸,心慌,疲乏无力,气短懒言,自汗,食欲减退,舌质淡,苔薄白,脉细弱。查体脾脏增大至脐下,质地坚实,表面光滑,切迹明显,无压痛,血象检查白细胞为 $80 \times 10^9/L$,杆状核粒细胞和晚幼粒细胞增多,骨髓象见各系细胞极度增生,以粒系为主,粒:红比例增至 30:1。

92.最可能的诊断

- A.急性淋巴细胞性白血病
- B.慢性淋巴细胞性白血病
- C.急性髓细胞性白血病
- D.慢性髓细胞性白血病
- E.类白血病反应

答案:D

解析:慢性髓细胞性白血病常表现为脾大,白细胞数明显增高,骨髓增生明显至极度活跃,以粒细胞为主,粒:红比例明显增高。

93.治疗首选方剂是

- A.黄连解毒汤
- B.八珍汤
- C.归脾汤
- D.当归补血汤
- E.青蒿鳖甲汤

答案:B



自汗，食欲减退，舌质淡，苔薄白，脉细弱。治法：补益气血。方药：八珍汤加减。

94.治疗首选化疗药是

- A.马利兰
- B.长春新碱
- C.干扰素
- D.小剂量 Ara-C
- E.羟基脲

答案:E

解析:羟基脲为细胞周期特异性抑制 DNA 合成的药物，起效快，但持续时间短。为当前首选化疗药物。

共用题干:王某，女，47 岁。西医诊断甲状腺功能亢进症。症见：颈前肿胀，眼球突出，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。

95.治法为

- A.活血化瘀，软坚散结
- B.疏肝理气，化痰散结
- C.清肝泻火，消瘿散结
- D.滋阴降火，消瘿散结
- E.益气养阴，消瘿散结

答案:C

解析:结合患者的症状可诊断为甲状腺功能亢进症之肝火旺盛证。证候：颈前肿胀，眼突，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治法：清肝泻火，消瘿散结。方药：龙胆泻肝汤加减。

96.反应甲状腺功能最有价值的指标是

- A.血清 TSH
- B.血清 T₃、FT₄
- C.摄 ¹³¹I 率
- D.血清 FT₃、FT₄
- E.血清 TT₃、TT₄

答案:A

解析:血清 TSH 测定较 T₃、T₄ 灵敏度高，是反应甲状腺功能最有价值的指标。

97.不属甲亢主要临床表现的是

- A.眼征
- B.甲状腺危象
- C.高代谢症候群
- D.弥漫性甲状腺肿
- E.胫前黏液性水肿

答案:B

解析:甲亢主要临床表现有：高代谢症候群、弥漫性甲状腺肿、眼征和胫前黏液性水肿。甲状腺危象为甲亢的特殊临床表现。

共用题干:患者，男，29 岁，骑摩托车时不慎被扶手撞到右侧胸部，自觉疼痛逐渐加重，胸闷，呼吸短促，胸肋刺痛，固定不移，面色发青，舌紫暗，脉沉涩。右侧胸部叩诊呈鼓音，呼吸音降低。胸部 X 线示肺萎陷，胸腔积气。

98.其诊断为

- A.血胸
- B.开放性气胸
- C.张力性气胸
- D.急性肺栓塞
- E.闭合性气胸

解析:根据患者的受伤史及症状可诊断为闭合性气胸。胸部损伤后引起胸膜腔积血者为血胸;胸壁穿透性损伤导致胸膜腔与外界大气交通称为开放性气胸。张力性气胸为较严重的闭合性胸部损伤,患者主要表现为严重的呼吸困难,烦躁,意识障碍,发绀,脉细速,血压降低等;急性肺栓塞X线无气胸征象,故可排除。

99.若需进行胸腔穿刺排气,其穿刺点应该在

- A.锁骨中线第2肋间
- B.锁骨中线第3肋间
- C.腋中线第7肋间
- D.腋后线第7肋间
- E.腋后线第8肋间

答案:A

解析:闭式胸膜腔引流的穿刺部位:液体一般选在腋中线和腋后线之间的第6~8肋间隙插管引流。气体常选锁骨中线第2肋间隙。

100.治疗首选的方剂为

- A.参附汤
- B.理气止痛汤
- C.四君子汤
- D.复元活血汤
- E.生脉散

答案:D

解析:患者胸胁刺痛,固定不移,面色发青均为血瘀之象,呼吸短促提示存在气滞,因此可辨证为血瘀气滞证,治法为理气活血,逐瘀通经。方剂首选复元活血汤。

共用题干:患者,男,32岁。诊断为原发性支气管肺癌。现症见:咳嗽咳痰,痰中带血,胸部隐痛,乏力,五心烦热,自汗盗汗;舌质红,苔少,脉沉细数。

101.肺癌确诊的重要手段是

- A.CT
- B.MRI
- C.X线
- D.纤维支气管镜
- E.痰液细胞学检查

答案:E

解析:痰液细胞学检查是肺癌确诊的重要手段。

102.肺癌转移引起的体征最常见的为

- A.锁骨上淋巴结肿大
- B.锁骨下淋巴结肿大
- C.滑车上淋巴结肿大
- D.腹股沟淋巴结肿大
- E.腋窝淋巴结肿大

答案:A

解析:肺癌转移引起的体征最常见的为锁骨上淋巴结肿大,也可见腋下淋巴结肿大。

103.治疗首选

- A.血府逐瘀汤
- B.六君子汤合海藻玉壶丸
- C.百合固金汤
- D.白虎承气汤
- E.生脉散合沙参麦冬汤

答案:E



盗汗；舌质红，苔少，脉沉细数。治法：益气养阴，化痰散结。方药：生脉散合沙参麦冬汤加减。

共用题干:男性，24岁，不慎跌入80°C热水池内，池水淹没下半身超过臀部，皮肤表皮剥脱，散在水疱，疱皮下创面微湿，红白相间，痛觉迟钝。

104.初步估计烫伤面积为

- A.30%~34%
- B.35%~39%
- C.40%~44%
- D.45%~50%
- E.>60%

答案:D

解析:按体表面积划分为11个9%的等份，另加1%，构成100%的体表面积，即头颈部：1×9%；躯干：3×9%；两上肢：2×9%；双下肢：5×9%+1%，共为11×9%+1%。

105.其烧伤深度为

- A.I°
- B.浅II°
- C.深II°
- D.III°
- E.IV°

答案:C

解析:深II°烧伤：伤及皮肤的真皮层，介于浅II°和III°之间，也可有水疱，但去疱皮后创面微湿，红白相间，痛觉较迟钝。

106.若患者头、面、颈部全部烧伤，其面积约为全身面积的

- A.3%
- B.6%
- C.9%
- D.18%
- E.20%

答案:C

解析:中国新九分法按体表面积划分为11个9%的等份，另加1%，构成100%的体表面积，即头、面、颈部：1×9%；躯干：3×9%；两上肢：2×9%；双下肢：5×9%+1%，共为11×9%+1%。

共用题干:患者，女，33岁，自然流产3次，月经量少，面色萎黄，心悸，神疲乏力，舌淡，苔薄，脉细弱。

107.首先考虑的诊断

- A.先兆流产
- B.复发性流产
- C.完全流产
- D.稽留流产
- E.不全流产

答案:B

解析:与同一性伴侣自然流产连续发生3次或3次以上者为复发性流产。

108.中医辨证为

- A.脾气虚弱证
- B.脾肾阳虚证
- C.气血虚弱证
- D.肾气亏损证
- E.肝胃不和证

答案:C



黄，头晕心悸，神疲乏力；舌质淡，苔薄，脉细弱。治法：益气养血，固冲安胎。

109.治疗首选的方药为

- A.寿胎丸
- B.胎元饮
- C.保阴煎
- D.补肾固冲丸
- E.泰山磐石散

答案:E

解析:泰山磐石散为治疗气血虚弱证的首选方；补肾固冲丸为治疗肾气亏损证的首选方。

共用题干:患者，女，34岁，妊娠期间，心悸怔忡，面色少华，唇甲色淡，头晕目眩，失眠，舌质淡，脉细弱。检查：颈静脉怒张，心脏听诊粗糙的3级以上全收缩期杂音。

110.治法宜选用

- A.养血益气，宁心安胎
- B.温阳化气，宁心安胎
- C.益气养血，宁心安胎
- D.温阳化气，养血安胎
- E.益气化瘀，通阳安胎

答案:A

解析:根据患者的临床表现可诊断为妊娠合并心脏病之心血虚证。证候：妊娠期间，心悸怔忡，面色少华，唇甲色淡，头晕目眩，眠差多梦，舌质淡，脉细弱。治法：养血益气，宁心安胎。

111.治疗首选方为

- A.五苓散
- B.归脾汤
- C.瓜蒌薤白半夏汤
- D.养心汤
- E.补阳还五汤

答案:B

解析:归脾汤为治疗心血虚证的首选方；真武汤合五苓散去猪苓，加桑寄生、菟丝子为治疗阳虚水泛证的首选方；养心汤去肉桂、半夏，加麦冬为治疗心气虚证的首选方；补阳还五汤合瓜蒌薤白半夏汤去红花、桃仁、半夏、地龙，加桑寄生、杜仲为治疗气虚血瘀证的首选方。

112.常见并发症不包括

- A.心力衰竭
- B.缺氧和发绀
- C.静脉栓塞
- D.肺栓塞
- E.慢性感染性心内膜炎

答案:E

解析:常见并发症包括心力衰竭（易发生在妊娠32~34周、分娩期及产褥早期）；亚急性感染性心内膜炎；缺氧和发绀；静脉栓塞及肺栓塞（是孕产妇重要死因之一）。

共用题干:患者，女，29岁，妊娠期间身目俱黄，色鲜明如橘子色，右胁胀痛，恶心厌食，口苦咽干，胸胁痞满，倦怠乏力，尿黄便坚；舌质红，苔黄腻，脉弦滑。

113.治法为

- A.清热利湿，佐以安胎
- B.健脾化湿，养血安胎
- C.疏肝理气，健脾安胎
- D.清热解毒，凉血救阴



答案:A

解析:根据患者的临床表现可诊断为妊娠合并病毒性肝炎之湿热蕴结证。证候:妊娠期间身目俱黄,色鲜明如橘子色,右胁胀痛,恶心厌食,口苦咽干,胸胁痞满,倦怠乏力,尿黄便坚;舌质红,苔黄腻,脉弦滑或濡数。治法:清热利湿,佐以安胎。

114.治疗首选

- A.胃苓汤
- B.逍遥散
- C.茵陈蒿汤
- D.犀角地黄汤
- E.黄连解毒汤

答案:C

解析:茵陈蒿汤加金钱草、虎杖、桑寄生、续断为治疗湿热蕴结证的首选方;胃苓汤去桂枝、泽泻,加桑寄生、菟丝子为治疗湿邪困脾证的首选方;逍遥散加桑寄生、菟丝子为治疗肝郁脾虚证的首选方;犀角地黄汤合黄连解毒汤加茵陈、大青叶为治疗热毒内陷证的首选方。

115.除哪项外,均为西医治疗原则

- A.预防治疗肝性脑病
- B.治疗肝硬化
- C.预防及治疗 DIC
- D.保护肝脏
- E.治疗肾衰竭

答案:B

解析:妊娠合并病毒性肝炎的西医治疗原则:保护肝脏,预防治疗肝性脑病,预防及治疗 DIC,治疗肾衰竭。

共用题干:足月男婴,出生后 8 小时即出现身黄、目黄、哭闹不安、呕吐、乳食不思,尿黄,舌质红,苔黄稍腻。

116.治疗首选方为

- A.茵陈理中汤加减
- B.茵陈蒿汤加减
- C.膈下逐瘀汤加减
- D.羚角钩藤汤合茵陈蒿汤加减
- E.黄连解毒汤加减

答案:B

解析:此患儿为新生儿黄疸中湿热熏蒸证的表现。湿热熏蒸证证候:面目皮肤发黄,颜色鲜明,精神疲倦或烦躁啼哭,不欲吮乳,小便短黄,舌质红,舌苔黄腻。重者腹胀,呕吐,甚或神昏、抽搐。治法:清热利湿退黄。方药:茵陈蒿汤加味。

117.下列各项中,与发病无关的脏腑是

- A.脾
- B.胃
- C.肝
- D.胆
- E.肾

答案:E

解析:胎黄的发病与先天禀赋因素及后天感受湿邪或湿热毒邪密切相关。病机为湿邪或湿热之邪阻滞脾胃,肝失疏泄,胆汁外溢,而发为胎黄,病位主要在脾、胃、肝、胆。故根据题干要求,此题的正确选项是 E。

118.病理性黄疸出现的时间一般为

- A.婴儿出生后 1~2 天
- B.婴儿出生后 2~3 天
- C.婴儿出生后 4~5 天



E.出生后3~4周

答案:D

解析:生理性黄疸大多在出生后2~3天出现,4~6天达高峰,10~14天消退,早产儿持续时间较长,除有轻微食欲不振外,一般无其他临床症状。若出生后24小时内即出现黄疸,3周后仍不消退,甚或持续加深,或消退后复现,均为病理性黄疸。

共用题干:8个月患儿,母乳喂养,未加辅食,近2个月来腹泻,食欲不振,有异食癖,皮肤黏膜渐苍白,伴面色萎黄,唇淡,指甲苍白,精神倦怠,形体消瘦,大便不调,舌淡苔白,脉细无力,指纹淡红。检查:肝肋下3cm,脾肋下1.5cm,血红蛋白70g/L,红细胞 $3.5\sim 10^{12}/L$ 。

119.最可能的诊断是

- A.营养性大细胞性贫血
- B.生理性贫血
- C.营养性感染性贫血
- D.营养性缺铁性贫血
- E.先天性再生低下性贫血

答案:D

解析:营养性缺铁性贫血的临床表现:皮肤黏膜苍白,以口唇、甲床和睑结膜最为明显,疲乏无力,食欲减退,或异食癖。年长儿有头晕、眼花、耳鸣等症状。部分患儿可有肝脾肿大。实验室检查:小细胞低色素性贫血;网织红细胞数正常或轻度减少;白细胞、血小板一般无特殊改变;血清铁、总铁结合力、运铁蛋白饱和度、红细胞原卟啉、血清铁蛋白等异常。

120.治疗应首选方剂为

- A.左归丸
- B.归脾汤
- C.右归丸
- D.大补阴丸
- E.参苓白术散

答案:E

解析:结合患儿的症状可辨证为脾胃虚弱证。证候:面色萎黄无华,唇淡不泽,指甲苍白,长期食欲不振,神疲乏力,形体消瘦,大便不调,舌淡苔白,脉细无力,指纹淡红。治法:健运脾胃,益气养血。方药:参苓白术散加减或异功散加味。

121.使用铁剂治疗后停药指征为

- A.网织红细胞升高后再用1~2个月
- B.血红蛋白及红细胞恢复正常
- C.面色转红,精神及食欲好转
- D.血清铁恢复正常
- E.血红蛋白及红细胞恢复正常后再用6~8周左右

答案:E

解析:铁剂治疗有效者于2~3天后网织红细胞即见升高,5~7天达高峰,2~3周后下降至正常;治疗约2周后,血红蛋白相应增加,临床症状亦随之好转。血红蛋白达正常水平后应继续服用铁剂6~8周左右再停药,以补足铁的贮存量。如3周内血红蛋白上升不足20g/L,应注意寻找原因。

共用题干:患儿,女,6岁。症见:乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多;伴胸闷不舒、心烦易怒、痤疮、便秘、舌红,苔黄,脉弦数。

122.治法宜选用

- A.滋补肾阴,清泻相火
- B.疏肝解郁,清利湿热
- C.滋阴清热,凉血宁络
- D.清热解毒,凉血止血

答案:B

解析:结合患儿的症状可诊断为性早熟之肝经郁热证。证候:女孩乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多;男孩阴茎勃起,变声。伴胸闷不舒、心烦易怒、痤疮、便秘、舌红,苔黄或黄腻,脉弦数或弦细数。治法:疏肝解郁,清利湿热。

123.治疗首选方剂是

- A.人参大补丸
- B.丹栀逍遥散
- C.黄连解毒汤
- D.知柏地黄丸
- E.六味地黄丸

答案:B

解析:知柏地黄丸加减为治疗性早熟之阴虚火旺证的首选方;丹栀逍遥散加减为治疗性早熟之肝经郁热证的首选方。

124.鉴别该病的真假性质最有意义的标准是

- A.乳房发育
- B.月经来潮
- C.骨龄提前
- D.骨骼生长加速
- E.GnRH 兴奋试验

答案:E

解析:诊断真性性早熟和假性性早熟可以通过 GnRH 兴奋试验鉴别。GnRH 兴奋试验亦称黄体生成素释放激素(LHRH)兴奋试验。其原理是通过 GnRH 刺激垂体分泌黄体生成素(LH)和卵泡刺激素(FSH),从而评价垂体促性腺激素细胞储备功能,对鉴别真性和假性性早熟非常有价值。故此题的正确选项是 E。

B1 型题

(共用备选答案题)

- A.24 小时尿蛋白定量
- B.尿培养及菌落计数
- C.肾功能检查
- D.摄腹部平片
- E.静脉肾盂造影

125.对确诊泌尿系感染最有意义的检查是

答案:B

解析:泌尿系感染的诊断是除膀胱刺激征外,应有尿细菌培养及菌落计数,其标准为尿含菌数 $>10^5/\text{mL}$ 为阳性。

126.对肾病综合征最有诊断意义的检查是

答案:A

解析:肾病综合征的诊断标准是大量蛋白尿、低蛋白血症、高胆固醇血症、明显水肿。故 24 小时尿蛋白定量对肾病综合征的检查最有诊断意义。

(共用备选答案题)

- A.颊部蝶形皮疹及蛋白尿
- B.腕、掌指、近指关节受累
- C.膝关节受累
- D.第一趾较剧烈疼痛
- E.大量龋齿提示

127.类风湿关节炎(RA)的临床表现特点是

答案:B

解析:类风湿关节炎以小关节受累为主要表现。



答案:A

解析:系统性红斑狼疮除面部皮肤损害外,伴有肾脏损害。临床表现为颊部蝶形皮疹及蛋白尿。

(共用备选答案题)

A.炙甘草汤

B.独参汤

C.四逆加味

D.白虎加人参汤合犀角地黄汤

E.三甲复脉汤

129.治疗休克阳气暴脱证,应首选的方剂是

答案:C

解析:临床上治疗休克阳气暴脱证代表方是四逆加味。

130.治疗休克真阴衰竭证,应首选的方剂是

答案:E

解析:临床上治疗休克阳气暴脱证的代表方是三甲复脉汤。

(共用备选答案题)

A.下肢疼痛或间歇性跛行

B.视物模糊,眼底可见微血管瘤

C.直立性低血压,少汗或多汗,心动过速

D.双下肢麻木,灼热或如踏棉垫感

E.外阴瘙痒

131.糖尿病周围神经病变可见

答案:D

解析:糖尿病微血管病变是肾病、视网膜病变等,其中视网膜病变可致视物模糊,眼底可见微血管瘤。糖尿病神经病变以周围神经为最常见,通常为麻木、刺痛、灼热或踏棉垫感。

132.糖尿病微血管病变可见

答案:B

解析:糖尿病微血管病变是肾病、视网膜病变等,其中视网膜病变可致视物模糊,眼底可见微血管瘤。糖尿病神经病变以周围神经为最常见,通常为麻木、刺痛、灼热或踏棉垫感。

(共用备选答案题)

A.急性白血病之湿热内蕴证

B.急性白血病之阴虚火旺证

C.急性白血病之热毒炽盛证

D.急性白血病之气阴两虚证

E.急性白血病之痰热瘀阻证

133.温胆汤合桃红四物汤加减可用于

答案:E

解析:急性白血病之痰热瘀阻证的治疗方法是清热化痰,活血散结,方用温胆汤合桃红四物汤加减。

134.葛根芩连汤加味可用于

答案:A

解析:急性白血病之湿热内蕴证的治疗方法是清热解毒,利湿化浊,方用葛根芩连汤加味。

(共用备选答案题)

A.养心汤合补肺汤加减

B.生脉散加减

C.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合肾气丸加减

D.人参养荣汤合桃红四物汤加减

E.真武汤加减

答案:C

解析:急性心力衰竭心肾阳虚证的治疗方法为温补心肾,选方应为桂枝甘草龙骨牡蛎汤合肾气丸加减。

136.急性心力衰竭阳虚水泛证的治疗方剂为

答案:E

解析:急性心力衰竭阳虚水泛证的治疗方法为温阳利水,选方应为真武汤加减。

(共用备选答案题)

A.三仁汤

B.四君子汤

C.柴胡疏肝散

D.益胃汤

E.失笑散合丹参饮

137.慢性胃炎之胃络瘀血证的治疗方药为

答案:E

解析:慢性胃炎之胃络瘀血证的治疗方法为化瘀通络,和胃止痛,方宜失笑散合丹参饮加减。

138.慢性胃炎之脾胃湿热证的治疗方药为

答案:A

解析:慢性胃炎之脾胃湿热证的治疗方法为清利湿热,醒脾化浊,方宜三仁汤加减。

(共用备选答案题)

A.赤游丹

B.抱头火丹

C.流火

D.内发丹毒

E.腿游风

139.新生儿发于臀部的丹毒称

答案:A

解析:丹毒发无定处,发病部位不同病名不同,如发于躯干部者,称内发丹毒;发于头面部者,称抱头火丹;发于小腿足部者,称流火;新生儿多生于臀部,称赤游丹。

140.生于小腿足部的丹毒称

答案:C

解析:丹毒发无定处,发病部位不同病名不同,如发于躯干部者,称内发丹毒;发于头面部者,称抱头火丹;发于小腿足部者,称流火;新生儿多生于臀部,称赤游丹。

(共用备选答案题)

A.阳和汤

B.桃红四物汤

C.四妙勇安汤

D.十全大补汤

E.六味地黄丸

141.治疗血栓闭塞性脉管炎寒湿证,应首选的方剂是

答案:A

解析:血栓闭塞性脉管炎寒湿证的治法为温阳通脉,祛寒化湿,代表方为阳和汤加减。

142.治疗血栓闭塞性脉管炎热毒证,应首选的方剂是

答案:C

解析:血栓闭塞性脉管炎热毒证的治法为清热解毒,化瘀止痛,代表方为四妙勇安汤加减。

(共用备选答案题)

A.血府逐瘀汤

B.桃红四物汤



D.两地汤

E.少腹逐瘀汤

143.治疗子宫内膜不规则脱落血瘀证，应首选的方剂是

答案:B

解析:子宫内膜不规则脱落血瘀证的治法为活血化瘀，固冲调经，代表方为桃红四物汤合失笑散。

144.治疗排卵期出血血瘀证，应首选的方剂是

答案:C

解析:排卵期出血血瘀证的治法为活血化瘀，理血归经，代表方为逐瘀止血汤。

(共用备选答案题)

A.量、色、质

B.量、色、质、味

C.期、量、色、质

D.期、量、色、味

E.期、量、色、质、味

145.月经病的诊断主要是查月经的

答案:E

解析:月经病的诊断主要是查月经的期、量、色、质、气味。

146.带下病的诊断主要是看带下的

答案:B

解析:带下病的诊断主要是看带下的量、色、质、气味。

(共用备选答案题)

A.苔白厚腻

B.苔薄白

C.苔黄燥

D.苔少或花剥

E.苔薄腻

147.积滞乳食内积证的舌象特点是

答案:A

解析:积滞乳食内积证，临床表现为不思乳食，嗳腐酸馊或呕吐食物、乳片，脘腹胀满，疼痛拒按，大便酸臭，苔白厚腻，脉象弦滑，或指纹紫滞。

148.厌食脾胃阴虚证的舌象特点是

答案:D

解析:厌食脾胃阴虚证，临床表现为不思进食，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，手足心热，舌红少津，苔少或花剥，脉细数。

(共用备选答案题)

A.活动过多，冲动任性

B.智力低下，学习困难

C.躯体多部位肌群抽动

D.睡时症状加重

E.肌力及肌张力减低

149.属于小儿多发性抽动症临床特征的是

答案:C

解析:小儿多发性抽动症临床特征有躯体多部位肌群抽动，发声抽动，秽语症，模仿他人语言、习惯等。

150.属于小儿注意力缺陷多动障碍临床特征的是

答案:A

解析:小儿注意力缺陷多动障碍临床特征为动作过多，易冲动和注意力不集中，学习困难等。